1477



## ОТЧЕТЫ

О СОСТОЯНІИ И ДЪЯТЕЛЬНОСТИ

# опытныхъ хлопковыхъ учрежденій

въ Туркестанъ и Закаспійской области

### въ 1910 году.

- 1. Опытное поле Голодная степь, Самарканд. обл.
- 2. Андижанское опытное поле, Ферганской области.
- 3. Асхабадское опытное поле, Закасп. обл.
- 4. Показательныя хлопковыя плантаціи въ Мервскомъ увздв, Закасп. обл.

Приложеніе: Описаніе способовъ измѣренія длины волокна хлопка. А. Е. Любченко.

вып. У.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія В. Ө. Киршбаума, д. М-ва Финансовъ; на Дворц. площ. 1913.

## Г. У. З. и З. Департаментъ Земледълія.

1477



# ОТЧЕТЫ

О СОСТОЯНІИ И ДЪЯТЕЛЬНОСТИ

# ОПЫТНЫХЪ ХЛОПКОВЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ

въ Туркестанъ и Закаспійской области

### въ 1910 году.

---

- 1. Опытное поле Голодная степь, Самарканд. обл.
- 2. Андижанское опытное поле, Ферганской области.
- 3. Асхабадское опытное поле, Закасп. обл.
- 4. Показательныя хлопковыя плантаціи въ Мервскомъ уѣздѣ, Закасп. обл.

Приложеніе: Описаніе способовъ измѣренія длины волокна хлопка. А. Е. Любченко.

вып. V.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія В. Ө. Киршбаума, д. М-ва Финансовъ, на Дворц. площ. 1913.



purpud



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

	CTP.
пытное поле Голодная степь въ 1910 г. Отчетъ завъдующаго полемъ	
м. М. Бушуева.	
Главнъйшіе выводы изъ предшествовавшей дъятельности опытнаго	
попя	1-5
Показательное хиопковое хозяйство	5
Лабораторные опыты и изслъдованія	6
Фенологическія и другія схозяйственныя наблюденія въ 1910 году.	16
Метеорологическія условія въ 1910 году	19
Опыты съ хлопчатникомъ.	
Сравненіе сортовъ	41
Вліяніе качества съмянъ хлопчатника на его урожай	56
» глубины предпосъвной вспашки	56
» способовъ поства	58
» числа поливокъ	58
» удобреній	60
» предшествующихъ культуръ (плодосмѣнъ)	65
» чеканки	67
» густоты стоянія кустовъ	68
Опыты съ яровыми посъвами и люцерной.	
Опыты съ сортами: кукурузы, подсолнечника, свеклы, яровой пшеницы б	39—75
Вліяніе удобреній на яровые (кукуруза, свекла) и на люцерну 7	7-80
Вліяніе числа поливокъ (кукуруза, машъ)	81
» густоты посвва (кукуруза и машъ)	82
Культура риса на солонцахъ	83
Опыты съ озимыми.	
Сорта озимыхъ пшеницъ	85
» озимаго ячменя	86
Вліяніе способовъ поства на оз. пшеницу	87
» удобреній	89
Плодовый садъ, виноградникъ, питомникъ и	
огородъ	90
Андижанское опытное поле въ 1910 году. Отчетъ завъдующаго полемъ	
А. Я. Мухина.	
Метеорологическія условія	97
Опыты съ хлопчатникомъ.	
Сравненіе различныхъ сортовъ	116
Вліяніе удобреній	148
» способовъ поства	151
» чеканки	156
» числа поливокъ	156
» предшествовавшихъ растеній (плодосмѣнъ)	157

		159
	Опыты съ кукурузой, озимой пшеницей, кормовой свеклой и др	160
	хабадское опытное поле въ 1910 году. Отчетъ завъд. полемъ инструктора по хлопководству П. А. Козика.	
		161
		163
		166
		173
	1	175
	Опыты съ бобовыми (чечевица, фасоль, машъ, нутъ)	173
	Опыты съ хлопчатникомъ.	
	Вліяніе на урожай удобреній	176
		178
		180
		183
. 1		184
		189
1	HERE NEW YORK NEW YO	191
	Показательныя хлопковыя плантаціи въ Мерв-	101
1		194
	Приложеніе. Описаніе способовъ измѣренія длины волокна хлопка.	101
	А. Е. Любченко	202
	A. E. SINOTCHRO.	202
	and we will have been a second of the second	
	СПИСОКЪ РИСУНКОВЪ.	
	Об пригосивно в се выполнения принения по на разрежения инструмент и и и и и	
	СПИСОКЪ РИСУНКОВЪ.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Control of some state of the source of the s	40
	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь	
2.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь	40
2. 3.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь	40 41
2. 3. 4.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь	40 41 56
2. 3. 4. 5.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь	40 41 56 57
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>6.</li> </ol>	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями Уборка стеблей хлопчатника Уборка стеблей хлопчатника	40 41 56 57 104
2. 3. 4. 5. 6. 7.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями. Уборка стеблей хлопчатника Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля Поливка передъ вспашкой (тамъ-же).	40 41 56 57 104 105
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями. Уборка стеблей хлопчатника Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля. Поливка передъ вспашкой (тамъ-же). Вспашка плугомъ	40 41 56 57 104 105 112
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями. Уборка стеблей хлопчатника Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля Поливка передъ вспашкой (тамъ-же) Вспашка плугомъ Приготовленіе грядъ окучникомъ.	40 41 56 57 104 105 112 112
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями. Уборка стеблей хлопчатника Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля. Поливка передъ вспашкой (тамъ-же). Вспашка плугомъ Приготовленіе грядъ окучникомъ. Устройство джояковъ (туземныя гряды)	40 41 56 57 104 105 112 112
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями. Уборка стеблей хлопчатника Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля. Поливка передъ вспашкой (тамъ-же). Вспашка плугомъ Приготовленіе грядъ окучникомъ. Устройство джояковъ (туземныя гряды) Поливка джояковъ	40 41 56 57 104 105 112 113 113
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями. Уборка стеблей хлопчатника Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля Поливка передъ вспашкой (тамъ-же) Вспашка плугомъ Приготовленіе грядъ окучникомъ.	40 41 56 57 104 105 112 113 113 128
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями. Уборка стеблей хлопчатника Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля. Поливка передъ вспашкой (тамъ-же). Вспашка плугомъ Приготовленіе грядъ окучникомъ. Устройство джояковъ (туземныя гряды) Поливка джояковъ	40 41 56 57 104 105 112 113 113 128
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями. Уборка стеблей хлопчатника Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля. Поливка передъ вспашкой (тамъ-же) Вспашка плугомъ Приготовленіе грядъ окучникомъ. Устройство джояковъ (туземныя гряды) Поливка джояковъ Всходы хлопчатника машиннаго рядового посъва. Работа культиватора передъ поливкой Первая поливка хлопчатника по бороздамъ	40 41 56 57 104 105 112 113 113 128 128
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями. Уборка стеблей хлопчатника Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля Поливка передъ вспашкой (тамъ-же) Вспашка плугомъ Приготовленіе грядъ окучникомъ. Устройство джояковъ (туземныя гряды) Поливка джояковъ Всходы хлопчатника машиннаго рядового посъва. Работа культиватора передъ поливкой Первая поливка хлопчатника по бороздамъ Хлопковое поле передъ сборомъ	40 41 56 57 104 105 112 113 113 128 128 129
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями. Уборка стеблей хлопчатника Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля Поливка передъ вспашкой (тамъ-же) Вспашка плугомъ Приготовленіе грядъ окучникомъ. Устройство джояковъ (туземныя гряды) Поливка джояковъ Всходы хлопчатника машиннаго рядового посъва. Работа культиватора передъ поливкой Первая поливка хлопчатника по бороздамъ Хлопковое поле передъ сборомъ	40 41 56 57 104 105 112 113 128 128 129 136
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями. Уборка стеблей хлопчатника. Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля. Поливка передъ вспашкой (тамъ-же). Вспашка плугомъ Приготовленіе грядъ окучникомъ. Устройство джояковъ (туземныя гряды) Поливка джояковъ Веходы хлопчатника машиннаго рядового посъва. Работа культиватора передъ поливкой Первая поливка хлопчатника по бороздамъ Хлопковое поле передъ сборомъ Очистка хлопка на джинъ	40 41 56 57 104 105 112 113 128 128 129 136 137
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями. Уборка стеблей хлопчатника. Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля. Поливка передъ вспашкой (тамъ-же). Вспашка плугомъ Приготовленіе грядъ окучникомъ. Устройство джояковъ (туземныя гряды) Поливка джояковъ Всходы хлопчатника машиннаго рядового посъва. Работа культиватора передъ поливкой Первая поливка хлопчатника по бороздамъ Хлопковое поле передъ сборомъ Очистка хдопка на джинъ Озимая пшеница банатка.	40 41 56 57 104 105 112 113 128 128 129 136 137 160
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями. Уборка стеблей хлопчатника. Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля. Поливка передъ вспашкой (тамъ-же). Вспашка плугомъ. Приготовленіе грядъ окучникомъ. Устройство джояковъ (туземныя гряды) Поливка джояковъ Всходы хлопчатника машиннаго рядового посъва. Работа культиватора передъ поливкой Первая поливка хлопчатника по бороздамъ Хлопковое поле передъ сборомъ Очистка хдопка на джинъ Озимая пшеница банатка. Кормовая свекла.	40 41 56 57 104 105 112 113 128 128 129 136 137 160 160
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями. Уборка стеблей хлопчатника. Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля. Поливка передъ вспашкой (тамъ-же). Вспашка плугомъ Приготовленіе грядъ окучникомъ. Устройство джояковъ (туземныя гряды) Поливка джояковъ Всходы хлопчатника машиннаго рядового посъва. Работа культиватора передъ поливкой Первая поливка хлопчатника по бороздамъ Хлопковое поле передъ сборомъ Очистка хлопка на джинъ Озимая пшеница банатка. Кормовая свекла Плодовый питомникъ Андижанскаго опытнаго поля.	40 41 56 57 104 105 112 113 128 128 129 136 137 160 160
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.	Вегетаціонная оранжерея опытнаго поля Голодная степь Мотыженіе и пропашка хлопчатника Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ Опыты съ удобреніями. Уборка стеблей хлопчатника. Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля. Поливка передъ вспашкой (тамъ-же). Вспашка плугомъ. Приготовленіе грядъ окучникомъ. Устройство джояковъ (туземныя гряды) Поливка джояковъ Всходы хлопчатника машиннаго рядового посъва. Работа культиватора передъ поливкой Первая поливка хлопчатника по бороздамъ Хлопковое поле передъ сборомъ Очистка хдопка на джинъ Озимая пшеница банатка. Кормовая свекла.	40 40 41 56 57 105 112 113 128 128 129 136 137 160 161

CTP.

## Опытное поле Голодная степь

въ 1910 году.

Составилъ завъдывающій полемъ агрономъ М. Бушуевъ.

Въ 1910 году Голодностепскому Опытному полю исполнилось 10 лъть со дня основанія его. Этоть періодь можно считать въ жизни опытнаго учрежденія и достаточно большимъ и-короткимъ, въ зависимости отъ условій и цълей его дъятельности. Если старъйшее русское поле-Полтавское насчитываетъ 25 лътъ дъятельности, Одесское-16 лътъ, Костычевская и Энгельгардовская станціи -- 16 лътъ (1894 г.). Шатиловская—14 лътъ, Безенчукская—7 лътъ, то наше опытное поле. конечно, можно назвать старымъ, хотя и тогда оно моложе перваго хлопковаго опытнаго поля—Караязскаго (1894 г.) и даже Асхабадскаго (1897 г.); но по сравненію съ опытными учрежденіями С. Америки (значительное число ихъ учреждено въ 1885—1889 годахъ) при ихъ огромныхъ бюджетахъ, достигшихъ 1903 году почти 47.000 рублей на одну станцію, и большемъ числъ работниковъ-спеціалистовъ-около 12 человъкъ на станцію, всв наши старыя и новыя опытныя учрежденія должны быть признаны еще далекими до полнаго развитія. Если припомнить, что всв почти русскія опытныя учрежденія до 1910 года имъли бюджетъ не болъе 4-6.000 рублей, за исключениемъ Безенчукской станціи (29.000 руб.), Караязскаго опытнаго поля и Сухумской станціи (по 10.000 руб.), а весь спеціальный и административный персональ ихъ ограничивался 1 или 2 лицами, то понятно, что американцы на своихъ опытныхъ учрежденіяхъ сділають въ годъ столько, сколько наши, можеть быть, не успъють сдълать и въ 3-4 года. Неудивительно, что американскія опытныя учрежденія блестяще выполняють постановление конгресса д'ятелей по сельскому хозяйству, чтобы станціи не только производили опыты, но и проводили въ народъ результаты опытовъ, при чемъ залогомъ продуктивности работы опытныхъ станцій Америки считается спеціализація въ опредъден-

ныхъ отдълахъ знанія и постановка немногихъ вопросовъ и тщательное ихъ разръшеніе. Надо еще удивляться, какъ при всей скудности оборудованія, многія русскія учрежденія, въ лицъ знаменитыхъ Полтавскаго, Одесскаго, Херсонскаго опытныхъ полей и Шатиловской опытной станціи, могли съ выдающимся успъхомъ и тщательностью разработать многіе вопросы теоріи и практики районнаго сельскаго хозяйства. Выводы опытныхъ полей, чтобы ихъ неревести въ практику сельскаго хозяйства даннаго района, должны быть статистическаго характера-постоянно повторяемыми для значительнаго періода лъть, включающаго въ себъ, по крайней мъръ, предполагаемые климатическіе періоды или 2—3 кратную повторяемость вводимаго съвооборота; съ этой точки зрвнія Голодностепское опытное поле при существованіи своего 6-польнаго основного ствооборота не закончило еще второго цикла и выводы изъ нъкоторыхъ опытовъ по основнымъ вопросамъ полеводства и хлопководства, въ силу нашествій саранчи, недостатка оросительной воды и пр. неблагопріятныхъ условій, могли быть сдъланы лишь, однократно, посему и не имъютъ основаній претендовать на неопровержимость. Это обстоятельство и самая заинтересованность составителя этого отчета въ судьбъ Голодностенскаго опытнаго поля заставляеть насъ съ съ большей осторожностью отнестись къ практическимъ выводамъ опытнаго поля; поэтому мы пока воздержимся отъ юбилейныхъ выступленій и отдадимъ обычную дань срочный отчеть юбиляра за 1910 годъ. Позволимъ себъ только напомнить, на основаніи отчетовъ за предыдущіе годы, что въ томъ архивномъ матеріалъ, каковымъ являются цифровые выводы изъ многочисленныхъ нашихъ опытовъ, есть уже довольно много хорошо обоснованныхъ и оригинальныхъ сельско-хозяйственныхъ истинъ и выводовъ, которые мы разръшили и можемъ твердо пустить въ обращение въ практику мъстнаго сел.-хозяйственнаго района.

- 1. Опытное поле въ Голодной Степи располагаетъ солиднымъ, детально разработаннымъ матеріаломъ по метеоролигическимъ условіямъ Голодной Степи, пользуясь которымъ, хозяева хлопководы будущаго Голодностепскаго района въ 65.000 орошенныхъ десятинъ, могутъ съ увъренностью съять хлопчатникъ только въ оптимальные сроки; изъ нихъ они узнаютъ о критическихъ метеорологическихъ моментахъ для хлопчатника и проч.
- 2. Опытное поле своими почвенными изслѣдованіями и опытами съ удобреніями ясно и неопровержимо доказало, что Голодностепскія почвы, какъ и вообще почвы Туркестана, бѣдны азотомъ, гумусомъ, и солонцеваты; что веденіе здѣсь полеводства безъ удобреній или безъ введенія въ сѣвообороты люцерны и друг. бобовыхъ—не возможно.
- 3. Опытное поле доказало необыкновенно рентабельное и благопріятное для хлопчатника и другихъ растеній д'яйствіе зеленаго удобренія, для котораго лучшимъ однол'ятнимъ бобовымъ является по

мѣстнымъ условіямъ машъ ("Phaseolus Mungo") и моголѣтнимъ— люцерна. Въ цѣляхъ практической пропаганды этихъ выводовъ, Опытное поле вводитъ на показательномъ хозяйствѣ въ Голодной Степи два раціональныхъ сѣвооборота:

I. 1) Озимая пшеница+машъ на зеленое удобреніе (2-мъ посъвомъ за лъто).2) Хлопчатникъ.3) Хлопчатникъ.4) Кукуруза+машъ

на зерно (въ междурядьяхъ кукурузы).

II. 1) Хдопчатникъ. 2) Хлопчатникъ. 3) Кукуруза—машъ на зерно. 4) Озимая пшеница—люцерна (посъвъ весной). 5) Люцерна. 6) Люцерна (съ удобреніемъ 6) пуд. двойного суперфосфата.

- 4. Опытное поле широко распространило среди крестьянъ Голодной Степи рядовой посъвъ хлопчатника съялкой, конную пропашку междурядій хлопка, употребленіе плуга Сакка и французской бороны—катка.
- 5) Опытное поле доказало возможность посѣва хлопчатника безъ весенней предпосѣвной поливки съ одной лишь поливкой осенью и вспашкой полей на зябь.
- 6) Опытное поле рекомендуеть для хлопчатника въ районъ Голодной Степи умъренную поливку хлопчатника (3—4 раза въ лъто), съ расходомъ воды на десятину около 400—500 куб. саж., примъняя орошеніе главнымъ образомъ въ періодъ отъ начала цвътенія хлопчатника до 1-го сбора.
- 7. Опытное поле давно уже убъждаеть хлопководовь свять хлопчатникъ только двухъ сортовъ: Кингъ и Кокъ-Чигитъ, которые пока оказались изъ всъхъ испытанныхъ на Опытномъ полъ сортовъ, самыми урожайными и скороспълыми.

Опыты посъва и селекція многихъ сортовъ другихъ растеній—кукурузы, свеклы, люцерны и пр., также позволяютъ Опытному полю выдвинуть на первый планъ нъкоторые урожайные сорта для Голодной Степи.

- 8. Опытное поле рекомендуеть, въ цѣляхъ поддержанія плодородія мѣстныхъ почвъ, примѣненіе только слѣдующихъ удобреній, какъ наиболѣе рентабельныхъ и имѣющихъ шансы на распространеніе среди населенія (подъ хлопчатникъ и другія растенія): навоза, зеленаго удобренія, хлопковаго жмыха, суперфосфата (главнымъ образомъ для люцерны) и кровяной муки.
- 9. Опытное поле не рекомендуетъ разводить въ Голодной Степи, при солонцеватости мѣстныхъ почвъ, большихъ плодовыхъ садовъ; оно рекомендуетъ плодовыя деревья разводить на хорошихъ почвахъ—преимущественно въ карликовой формѣ и изъ всѣхъ плодовыхъ деревьевъ отдавать предпочтеніе сливамъ, менѣе страдающимъ отъ солонцовъ, изъ яблонь же, грушъ и абрикосовъ—только 2—3 сортамъ, удовлетворительно плодоносившимъ въ маточномъ саду Опытнаго поля.

Лучшій способъ культуры междурядій въ плодовыхъ садахъ это занятіе ихъ люцерной, при искуственномъ орошеніи. Виноградникъ въ первые года тоже рекомендуется содержать подъ люцерной и, кромѣ того, на солнцеватыхъ почвахъ—подъ деревьями (въ цѣляхъ отѣненія и уменьшенія капиллярности поднятія солей); только 3—4 мѣстныхъ сорта и 2—3 европейскихъ можно считать надежными сортами винограда для Голодной Степи.

10. Наконецъ, наблюденіе надъ стадомъ полуголландскаго молочнаго скота, принадлежащаго Опытному полю, даютъ богатый матеріалъ для сужденія объ условіяхъ содержанія и разведенія улучшеннаго скота въ Туркестанъ, объ условіяхъ акклиматизаціи его здъсь и предохраненія отъ заболъванія распространенными здъсь на скотъ маляріи и эмфизематознаго карбункула.

Разумћется, эти выводы Опытнаго поля не говорять объ особо большомъ масштабѣ практической его дѣятельности, но нужно сказать, что объемъ работъ поля за эти 10 лѣтъ далеко превосходитъ только что выдвинутые вопросы, и мы не говоримъ здѣсь о нихълишь потому, что они еще находятся въ процессѣ разрѣшенія. Ближайшее будущее сулитъ для Опытнаго поля лучшія условія работы и тогда оно съ большей энергіей можетъ продолжать разработку прежнихъ и вновь выдвинутыхъ жизнью вопросовъ полеводства, какътого требуетъ серьезность предпринятыхъ правительствомъ работъ по орошенію новыхъ 65.000 десятинъ (а въ будущемъ, б. м., и 250.000 дес.) въ районъ Голодной Степи.

Теперь уже не мечта, что на опытномъ полъ будетъ оборудована агрономическая лабораторія, увеличенъ персоналъ, а съ 1911 года на содержаніе опытнаго поля предположено отпускать изъ казны вмъсто прежнихъ 5.500 рублей (на 120 дес. культурной площади, кромъ солонцевъ) уже около 14.000 рублей.

Опытное поле въ Голодной Степи на порогѣ второго десятилѣтія втупаетъ, такимъ образомъ, въ новый фазисъ своего развитія, начиная эру широкихъ научно-опытныхъ работъ по хлопководству и изученію условій полеводства на солонцевыхъ почвахъ въ Голодной Степи.

Приступая къ обзору дъятельности опытнаго поля за 1910 годъ, необходимо замътить, что направленіе работъ Опытнаго Поля въ отчетномъ году было такое же, какъ и въ 1909 году, только объемъ этихъ работъ былъ значительно больше: прибавились нъкоторыя лабораторныя работы и полевые опыты.

Какъ и въ предшествующіе два года, персоналъ опытнаго поля въ 1910 году состоялъ изъ завъдывающаго опытнымъ полемъ, практи-

канта - студента Московскаго сельско-хоз. инст. Д. Г. Медвѣдева (съ 10/IV—I/III—1911 г.), на обязанности котораго лежали главнымъ образомъ фенологическія наблюденія и разработка метеорологическихъ данныхъ за 1910 годъ; низшій персоналъ оставался тотъ-же — садовникъ, десятникъ, скотникъ, доярка, караульщикъ, 3 мѣсячныхъ рабочихъ, большая же часть полевыхъ работъ производилась поденными рабочими—русскими изъ с. Спасскаго и узбеками ближайшихъ волостей.

Въ 1910 году завъдующему опытнымо полемъ была дана командировка на съъздъ естествоиспытателей и врачей въ Москвъ (зимой 1909—1910 г.) и разръщена поъздка по хлопковымъ районамъ Туркестана (съ 20 іюля по 6 августа), въ цъляхъ ознакомленія съ особенностями въ нихъ культуры хлопчатника; отчетъ объ этой поъздкъ (на 70 страницахъ) представленъ особо въ Управленіе Земледълія. Къ юбилейному 1910 году, наконецъ, былъ выстроенъ новый домъ для завъдующаго опытнымъ полемъ.

Поназательное хозяйство въ Голодной Степи въ 1910 году блестяще оправдало разсчеты на доходность при правильномъ веденіи полеводства, какъ оно было организовано М. М. Бушуевымъ въ 1908 году, съ 2-мя раціональными для Голодной степи сѣвооборотами, съ пропашной культурой хлопчатника и проч.; дѣйствительно, валовой доходъ съ 9 десятинъ надѣла (кромѣ 1 десят. подъ усадьбой, садомъ, бахчей) въ этомъ году (2.329 руб.) превысилъ даже теоретически вычисленный для показательнаго хозяйства доходъ (1.476 руб.) почти на 1.000 рублей, а чистый доходъ-остатокъ достигъ уже 429 рублей или почти 43 рублей съ десятины всѣхъ посѣвовъ при валовомъ доходѣ съ десятины въ 232 рубля, а для хлопка—въ 560 рублей, какъ видно изъ приводимой ниже таблицы (табл. 1).

Наибольшій доходъ даль хлопчатникъ, съ двухъ десятинъ котораго было получено 237 пуд. сырца главнымъ образомъ 1-го сорта, проданнаго заводу Рубенчикъ на сумму 1.120 рублей (часть сырпа очищалась на джинъ опытнаго поля для полученія своихъ съмянъ); хлопчаткихъ весь съялся рано — 25 марта по 10 апръля рядовой съялкой; высъвались 2 сорта—Кингъ и Кокъ-Чигитъ. Успъхи показательнаго хозяйства въ 1910 году не мало способствовали тому, многіе крестьяне въ Голодной степи съ осени же стали просить выписать для нихъ хлопковыя съялки, и въ 1910 году въ Голодной степи было распродано крестьянамъ за наличныя 12 свялокъ-первый случай такого распространенія хлопковыхъ свялокъ въ Туркестанв. Расходы по хозяйству въ 1910 году возрасли тоже значительно-до 1.900 рублей вмъсто исчисленныхъ 1.076 руб.; при этомъ большій % расходовъ падаетъ на пищу (19%) и содержание скота (24%). Покупныхъ продуктовъ израсходовано въ хозяйствъ на 1.216 рублей, а собственныхъ-676 рублей.

Бюджеть показательнаго крестьянскаго хозяйства

въ Голодной Степи, Самаркандской области.

				Figure 1 and					Conception.					(Accused to				
приходъ в	ъ 1910 г	оду.	on a	P	A	С.	X	0	Д	Ъ	В	ъ	1910	r	о д	у.		
Статьи прихода.	Пуды— фунты.	На сумму.	%%	Статьи расхода.	Япварь.	Февраль.	Mapre.	Aupėas.	Май.	Тюнь.	Іюль.	ABIYCTE.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Всего	%%
	и. Ф.	РУБ.			Р. К.	P. K.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	
Получено урожая:  1. Хлопка 2 дес  2. Ячменя 1 дес  3. Пшеницы 1 дес		1.120 120 100	49	Питаніе	7 95 4 26	собст 8 95 куп 5 37	венн. 11 90 ленн. 3 45		20 86	21 64 23 34	25 25 26 94		13 02 25 77		5 80 123 39	11 30 40 70	544 —	18,6
4. Кукурузы ½ дес 5. Подсолнечника ½ дес	10 10	10	_ _	Жилище	3 10	1 80 1 78		1 33	 1 49	— — — 85	— — 84	5 83	3 76	 17 80	86 01	8. 20	} 124 75	7,1
<ul><li>6. Маша 2 дес</li><li>7. Свеклы сахарн. % дес.</li></ul>	500 —	100 70	_ _	Одежда и обувь Различн. потребности семьи	2 —	купл. куп 4 78	2 50 ленн. — 64	9 2 84	2 45	12 25 1 34	17 — 27 99	1 50 28 30	8 30	10 30 13 73	159 — 62 60	56 70 89 67	278 50 242 65	14,7 12,7
8. Люцерны 1¾ дес 9. Соломы	900 —	360 72	15,4	На скотъ	41 20	собст 42 30	— 64 Венн. 32 39	13 84			21 45			60 —		66 —	451 98	23,7
<ul><li>10. Съ огорода</li><li>11. Продукты скотоводства</li></ul>		42 264	1,7 13	На полеводство, садъ и проч	8 60 купл.	8 — 5 40	13 60 13 80		собст 38 39	венн.			60 10	 30 -	2 50	   15 -	 211 58	11,5
<ul><li>12. Продажа скота</li><li>13. Посторонніе заработки .</li></ul>		40 25	— —	Различн. хозяйствен- ные расходы	1 50	1 15	-72		1 —	<b>—</b> 45	5 03	5 20			9 33	11 70	37 12	1,8
Итого прихода		2.329	-	Итого расхода	61 79	42 01	81 74	68 86	106 17	95 27	124 50	127 12	163 30	178 75	517 63	299 27	1.892 —	-
Въ томъ числѣ до 1. Отъ земли 2. Отъ скота , 3. Отъ заработковъ Изъ суммы всего дохо	2. 	304 » 25 »	CALLE FIGURE	- продано на 1.532 p.; 50	к., а ос	заньные	2. X 3. 0	. схинги овярать статокъ.	ТПОИР «И «ХИНН ОЙКЕОХ «			. 83	35 » 29 »	тьи и пд	роч <b>.</b>		on state of	

### Лабораторные опыты и изслѣдованія.

Какъ уже было сказано выше, въ 1910 году на опытномъ полъ кромъ полевыхъ опытовъ велись еще наблюденія и изслъдованія общаго характера—надъ влажностью почвы, глубиной грунтовыхъ водъ, физическими свойствами почвъ, всхожестью съмянъ и проч. Данныя этихъ наблюденій сведены въ нижеприводимыя таблицы (см. табл. 2—8).

Производившіяся 10 числа каждаго м'єсяца изслѣдованія влажности почвы въ степи (около опытнаго поля), при чемъ образцы почвы

брали до глубины 100 сантиметровъ, черезъ каждые 5 сантиметровъ буромъ Яновчика, дали любопытную картину влажности неорошаемой степи (см. табл. 2).

Въ общемъ годовой запасъ влаги въ нашей степи 1910 году (при 92,2 millim. осадковъ и 926,0 mm. испаренія въ году) былъ чрезвычайно скудный: на глубинъ до 5 сант. отъ поверхности почвы влаги было всего лишь 1,9%, на глубинъ 25 сант.—5,7% и на глубинъ 100 сант.—11,8%; при такой влажности степная растительность уже въ началъ апръля посохла и степь пожелтъла. Только въ январъ и

Влажность почвы въ Голодной Степи на орошаемыхъ поляхъ и въ сухой степи въ 1910 году.

			H	а какой	і глуби	нѣ изс	лѣдовал	ась по	чва				
Мѣсто изсл <b>ѣ</b> дова-	Мѣсяцъ и число	0-5	10—15	20—25	30—35	40—45	50-55	60-65	80—85	90—100	mill.	Испареніе mill.	Примѣчаніе.
ній почвы.	изслёдованій почвы.		C a	H	т и	м е	т	p o	в ъ		Осадки	арен	
			В	лажі	ност	ь по	чвы	въ	% %-		Oca	Исп	
											11117		
1	10 января	19,0	10,0	5,4	8,0	6,2	7,1	10,8	13,0	14,3	15,1	51,0	сант.: послъ глубинъ 0— бже—одина-
	8 февраля	9,9%	8,3%	8,3%	9,2	9,2	9,2		-	-	17,3	44,0	30 сант.: посл на глубинѣ 0- глубже—один
	2 марта	18,0	17,0	17,0	12,0	12,0	12,0	B-	-	-	20,7	38,7	30 сант на глуб глубже-
	11 апръля	4,7	7,5	9,7	10,5	9,8	6,8	6,1	9,1	8,6%	8,8	96,7	а на а гл
	17 мая	2,0	6,0	6,7	6,5	8,0	10,4	10,4	12,8	14,0	2,5	136,4	ая до была ,0%, а пт.
Степь неоро-	16 іюня	1,0	2,8	5,3	6,1	7,8	9,7	9,3	11,3	12,4	0,8	142,9	ерэлая сть бы = 4,0% 10/хи.
шенная	16 іюля	0,6	2,3	4,9	5,3	7,2	8,5	9,8	11,2	12,5	1,1	140,4	ь м жно нт.
	16 августа	0,9	4,3	5,7	6,9	7,4	9,1	10,6	12,3	13,2	0,8	107,0	гъгом: 1, вла -30 са ковая
	(?) сентября	0,94	3,5	5,3	5,6	6,8	8,5	10,0	11,4	12,4	0,5	77,0	
	2 октября	0,98	2,8	4,9	5,4	6,3	7,9	9,5	10,5	11,7	6,5	52,4	подть 18 2 % 2
	10 ноября	1,7	0,7	4,6	5,3	6,5	7,8	9,6	11,8	i2,6	100 A	30,0	ыла под сиѣга— = 9,3%
	10 декабря	3,4	2,8	4,4	5,8	6,5	8,0	10,4	11,1	9,2	_	90	Почва была подъ стаянія сифга—18 10 сант. — 9,3% 20
Средняя год	овая влажность	1,9%	3,8	5,75	6,48	7,4	8,5	9,45	11,25	11,8	92,2	926,0	Поч ста: 10

			Н	а како	й глубі	инф изо	авдовал	ась по	чка.				
Мѣсто изслѣдова-	Мѣсяцъ и число	0-5	10—15	20—25	30—35	40—45	50—55	60—65	80—85	90—100	Примъчаніе.		
нія почвы.	изслѣдованій почвы.		C a	Н	т и	M 6	T	p o	В - Т	5.			
			В	лаж	ност	ь п (	ч в ы	Въ	% %-				
Овсяное поле, орошенное и всиа- ханное осенью въ 1909 году		8,9 3,4	12,0 17,6 — 14,8 8,2 9	12,0 17,6 — 14,2 7,2 12,3	11,8% 17,0 — 17,2 8,4 13,3	11,8% 17,0 — 16,9 10,5 12,5	11,8% 17,0 — 16,7 11,1 12,8	18,8 9,2 14,6	23,3 18,1 16,3	- 22,6 18,6 18,8			
Средняя вла	ажность	5,0	11,0	11,2	13,0	13,3	13,5	14,2	19,2	20,0			
Кукурузное поле, орошавшееся съ апръля	17 мая	6,2 5,3	13,0 7,5 9,5 7,8	16,6 7,7 11,0	19,0 9,9 12,3 11,1	23,0 12,1 12,6 —	21,0 13,6 14,0 13,1	22,0 15,3 15,7 16,4	19,0 - 15,3 16,4	18,2 - 17,0 14,4			
Хлопковое поле, орошавшееся съ апръя	28 марта	13,1 16,3 9,5	15,3 16,5 16,2 14,6	15,3 18,6 16,7 15,5 13,8	16,0% 19,2 17,3 15,2 12,9	16,0% 20,3 16,8 15,6	16,0% 21,0 17,8 16,4 13,6	21,7 18,7 18,6	19,8 19,1 19,6	21,1 19,2 20,4 12,5	По уборкѣ хлопчат- ника, послѣ поливки: почва покрыта снѣгомъ.		
Средняя вла	жность	12,5	15,8	15,9	16,5	17,55	17,15	19,7	19,5	18,3			
Озимое поле, оро- шенное до посъва озимаго ячменя— 1 октября.	10 октября		15,3 —	10,6	12,7	- 12,0	15,5 —	17,9 13,6	17,9 —	18,0 10,0	Въ день посѣва яч- меня. Подъ снѣгомъ.		

марть и то лишь на глубинь 5 сантиметровь была высокая влажность—до 19%, которой и возпользовались для своего кратковременнаго существованія такія мелкоукореняющіяся однольтнія растенія какь бобовое—Trigonella, злакь Роа bulbosa и др.; глубже 45 сантиметровь влажность весь годь была настолько низкой (8—12%), что ее не могли использовать даже глубокоукореняющіяся растенія. Поэтому то всь мъстныя полыни (Artemisia), давь весной всходы, къ лъту погибли, не найдя достаточного количества влаги въ глубокихъ горизонтахъ. Самая высокая влажность (19%) въ степи наблюдалась въ январь—на глубинь до 5 сант. и въ январь же на 100 сантиметрахъ (14,3%), а самая низкая (0,6%) въ іюнь на глубинь до 5 сантиметровъ, на глубинь же 100 сант. самая низкая влажность (9,2%) была въ декабрь.

Что касается влажности полей опытнаго поля, орошавшихся съ апръля мъсяца по ноябрь раза по 3-4, при чемъ на десятину расходовалось отъ 350 до 600 куб. саженъ оросительной воды, то она ръзко измънялась во всъхъ горизонтахъ до глубины 65 сант., смотря по времени взятія образца почвы: вскоръ послъ поливки доходила до 16% къ верхнихъ горизонтахъ и до 23% въ нижнихъ (на глубинъ 85-100 сант.), а недъли черезъ 2 послъ поливки въ верхнихъ горизонтахъ было уже не болъе 8-12%, въ нижнихъ же около 15-18%. Въ общемъ, если всять влажность по горизонтамъ на двухъ типичныхъ поляхъ-овсяномъ (съ разброснымъ посввомъ), съ поливкой его напускомъ, и хлопковомъ (пропашномъ), съ поливкой его главнымъ образомъ инфильтраціонно, то влажность почвъ перваго поля съ мая по августь была: на глубинъ до 5 сантиметровъ 5%, на 25 сантиметрахъ-11,2%, на 65 сант.-14,2% и на 100 сант.-20,0%; у второго же поля (хлопковаго) съ мая по декабрь—на глубинъ 5 сантиметровъ— 12,5%, на глубинъ 25 сант.—16,0%, на 65 сант.—19,7% и на глубинъ 100 сант. отъ 18 до 20,0%.

Интересно отмътить, что данныя опредъленій влагаемости почвы опытнаго поля близки къ выводамъ опытовъ въ вегетаціонныхъ сесудахъ.

Дъйствительно, въ нашихъ вегетаціонныхъ сосудахъ (рисун. 1) лучшій урожай и развитіе растеній получались: у пшеницы при 19—22%, а для хлопчатника при 22—25%. Въ то же время, мы видимъ, что въ полъ при 3—4 кратномъ орошеніи посъвовъ такое оптимальное увлажненіе почвъ могло имъть мъсто лишь на какой-нибудь короткій срокъ, въ остальное же время влажность была значительно болье низкой, чъмъ теоретически необходимая и, несмотря на это, урожай зерна у злаковъ и волокна у хлопчатника былъ нормальный и у хлопчатника наибольшій именно тогда, когда его поливали отъ

3 до 5 разъ, преимущественно въ періодъ двѣтенія (съ 16/IV. по 18/VIII.), съ промежутками между поливками въ 2—3 недѣли (напримѣръ, поле, давшее лучшій урожай—-130 пуд.—орошалось 10 іюля, 25 іюля, и 10 августа, кромѣ того, оно получило 18 апрѣля предпосѣвною поливку).

Полная влагоемкость лесса Опытнаго поля, по опредъленіямъ 5-го апръля 1910 г., равнялась 32,7% отъ въса сухой почвы.

Полезная влагоемкость лесса — около 27% (она равна полной влагоемкости безъ двойной гигроскопичности).

Благопріятная для растеній влагаемкость (опгимальная)—19% для злака и 22% для хлончатника и др., т. е. 50—60% отъ полезной влагоемкости плюсъ двойная гигроскопичность.

Здѣсь, кстати, приведемъ наши опредѣленія въ 1910 г. гигроскопичности почвъ опытнаго поля и, для сравненія, чернозема съ полей Безенчукской станціи и песка изъ одного лога въ Голодной степи— Джетысая: гигроскопичность почвы опытнаго поля—2,5%, Безенчукскаго чернозема—5,0% и песка—0,02%.

Чтобы опредълить величину испаренія воды изъ почвы сравнительно съ испареніемъ воды изъ эвапорометра Вильда въ воздухъ (въ метеорологической будкъ), мы употребили въ качествъ почвенныхъ испарителей (вмъсто испарителя Рыкачева) обыкновенные цинковые вегетаціонные сосуды такого же поперечнаго съченія

Табл. 3.
Испареніе изъ почвы въ вегетаціонныхъ сосудахъ въ землъ и изъ воды въ будкъ—на воздухъ.

Испареніе изъ почвы въ сосу- дахъ.		Испареніе изъ почвы въ сосу- дахъ.	Испареніе изъ воды въ воз- духѣ въ милл.	
Съ 16 апрълз 6 золотя. 7 » 9 » 6 » 4 » 3 » 6 » 2 » 9 » 6 » 5 » 7 »	я по 26 іюня: 3,8 4,4 4,4 5,7 5,4 4,3 3,3 4,0 6,0 3,6 3,8 5,2 4,8 3,2	8 ЗОЛОТН. 23 » 18 » 11 » 19 » 22 » 21 » 19-го мая: 27 золотн. 13 » 7 » 23 » 222 » 225 »	5,2 4,0 7,4 6,4 3,2 4,4 2,4 4,5 4,2 5,0 2,8 4,2 5,0	Почвы было взято по 14 съ половиною фунт; влажность почвы — 12%. Въ одинъ день испарялось почвой 14,7 золотниковъ, на воздухъ или съ 1 кв. сант. испарялось 0,16 grm. въ почвъ. Между тъмъ поверхность воды въ эвапорометръ метеорологической будки испаряла 19½ золотник. въ день или 0,26 grm. съ поверхн. 1 кв. сант.

(250 кв. сант.), какъ и испаритель Вильда; набивъ сосуды почвой опытнаго поля съ влажностью въ 12%, мы вкопали ихъ въ землю до уровня верхняго края и каждый день въ 7 час. утра производили взвѣшиваніе и пополненіе водой убыли въ вѣсѣ сосуда до первоначальнаго вѣса; опыть велся съ 16 апрѣля до 26 іюня и результаты его таковы (см. таблицу 3): почва испаряла въ среднемъ ежедневно около 1,2 или 0,16 grm. съ кв. сантиметра поверхности, а вода въ испарителѣ Вильда значительно больше—1,7 или 0,26 grm. съ 1 кв. сантиметра.

Очевидно, если бы наша почва была покрыта еще дерномъ или вообще травой, то испареніе изъ нея было бы еще меньше. Если бы мы, польуясь этими данными, взумали учесть годовое испареніе воды изъ почвы, то получили бы около 500 милл., тогда какъ испареніе съ поверхности воды у насъ равно въ среднемъ 842 милл.

Водопропусная способность (проницаемость) нашей почвы, какъ видно изъ приводимыхъ ниже данныхъ, оказалась значительно большей, чѣмъ у чернозема изъ Безенчука и особено ила и солонцевой почвы; такъ слой воды въ 8 сантиметровъ просачивался черезъ слой лессовой почвы высотою 16 сант. въ одномъ случаѣ черезь 1 часъ, а у чернозема — черезъ 3 часа, у или — черезъ 4 часа, у солонца черезъ 5 час.; песокъ изъ Джетысая, однако, пропускалъ воду уже черезъ 9 минутъ.

Слой воды въ 8 сантиметровъ, налитый въ трубкѣ поверхъ столба почвы въ 16 сантим., просачивался весь въ почву въ такіе сроки:

	1-й разъ.	2-й разъ. 3-й разъ	
1) Въ лессъ Опытнаго поля	1 час.	3 час. 4—9 час	
2) Въ черноземъ Безенчука	3 »	11 » —	
3) Въ илъ изъ арыка	4 »		
4) Въ пескъ	9 мин.	15 мин. 15 мин	<b>.</b>
5) Въ солонцъ Опытнаго поля	5 час.	13 час. 16 час.	

Водоподъемная (капиллярная) способность указанныхъ почвъ, какъ видно изъ таблицы 3, въ первое время идетъ параллельно проницаемости ихъ, т. е. самая большая—у песка (28 сант. черезъ 30 минутъ), затъмъ у чернозема (8½ сант. черезъ 30 мин.), далъе у почвы опытнаго поля (8 сант.) и у ила 1½ сант., но начиная со вторыхъ сутокъ, темпъ поднятія воды начинаетъ ослабъвать въ пескъ и увеличиваться въ лессъ, затъмъ въ черноземъ, а съ 10 сутокъ—въ илъ. Въ среднемъ за 30 сутокъ опыта вода въ лессъ опытнаго поля поднялась до 77 сант. (по 2,6 сант. въ сутки), въ черноземъ—до 65 сант. (по 2,0 сант.) и въ илъ—до 52 сант. (по 1,7 сант. въ сутки).

Гаол. 4.

Капиллярное поднятіе воды въ разныхъ почвахъ. По опытамъ въ трубкахъ съ 23-го марта по 16 іюня 1910 года.

	Вѣсъ столба		M			11 3		ie 1		ды	ВЪ		ант	ги	ме	тр	a 2	О		n e	3 ъ:			Среднее поднятіе
Какія почвы.	почвы высот. въ 85 сант.	5	10	утъ. 15		1	3	6		24	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20		50		
	грамм.																	6						сант.
Лессъ Опытнаго поля	705,0	1	5	6	8	12	21	29	40	41	44	50	53	55	58	62	62	62	62	67		тру лопн	бка ула.	2,6
Черноземъ изъ Безенчука	600,0	1,5	7	8,5	11	24	32	36	38	43	44	46	46,5	47	48	49	50	52	53	€0	65	73	76	2,2
Илъ изъ оросительнаго ары- ка полевого		· .	, 	_	_	1,5	3,0	5,5	6,8	7,5	11,5	15	16,5	22	22	22	24	26,5	27,8	42	51,6	65	69	1,7
Песокъ Джетысая	831,0	10	20	24	28	33	40	44	50	51	тр	уб	ка	Л	оп	н	ул	a.	-	-	-		-	_

Высокой капиллярной способностью Голодностепских почвъ, в роятно, и объясняется то, что постоянные слъды влажности въ нихъ, не смотря на скудость осадковъ (въ годъ 267 милл., а въ 1910 г. 92 милл.), констатируются уже съ 35 сант. отъ поверхности почвы, а значительно влажными эти почвы въ сухой степи становятся уже на глубинъ 65—80 сант., при грунтовой водъ на глубинъ 420 сант.; нътъ ничего удивительнаго, поэтому, что наши солонцеватыя почвы съ грунтовыми водами на глубинъ 2½ аршинъ въ саду опытнаго поля, на опытномъ участкъ оказываются безо всякаго орошенія и дождей очень влажными уже съ 30—50 сант., а со 100 сант. глубины ихъ идетъ уже грязь-плывунъ.

Наблюденія надъ глубиной **грунтовыхъ водъ**, производимыя ежемѣсячно въ двухъ мѣстахъ опытнаго поля— въ колодцѣ на дворѣ и въ скважинѣ на опытномъ участкѣ, по сосѣдству съ коимъ дѣлянки орошаются 3—4 раза въ лѣто,—дають такую картину глубины грунтовой воды;

	ВЪ	ко	под	цъ:			на опытномъ участкѣ:									
въ	январъ.			28	рш	101	верш.	3 a	рш.	10 E	верш.	<u> </u>	арш.	— В	ерш.	
	апрълъ.						))	3	))	-	))	—	))	-	))	
))	мав			2	))	4	))	1	))	7	))	2	))	9	))	
))	іюнъ			2	))	7	))	2	))	7	n		))	-	))	
	іюль			3	))	9	))	2	))	12	))		))	_	n <	
	августъ.			4	))		))	2	))	14	))	-	))	_	))	
	сентябръ			3	))	1	))	3	15	—	))	_	))		))	
))	декабръ.			2	))	12	))	3	))	5	))		))	_	))	

Такимъ образомъ, уровень грунтовой воды колебался въ колодцъ отъ 2 арш. 4 верш. (въ маѣ) до 4 арш. (въ августѣ), а на опытномъ участкѣ—отъ 1 арш. 7 верш. въ маѣ до 3 арш. 10 верш. въ декабрѣ. Изслѣдованіе воды изъ колодца показало, что она содержитъ твердаго остатка солей 2%; на вкусъ—горькосоленая, съ непріятнымъ запахомъ.

Воспользовавшись командировкой на съъздъ естествоиспытателей въ Москвъ, завъдывающій опытнымъ полемъ остановился въ Безенчукъ для ознакомленія съ постановкой опытнаго дѣла; оттуда, между прочимъ, были вывезены сорта яровыхъ пшеницъ и овсовъ для опытовъ въ Голодной степи и черноземная почва Самарской губерніи, съ которой были произведены опыты сравненія ея плодородія въ вегетаціонныхъ сосудахъ съ нашей лессовой почвой, а также измъренія температуры этой почвы и голодностелской въ тѣхъ же сосудахъ. Послъднія изслъдованія дали слъдующія любопытныя данныя:

Табл. 5. Температура почвенныхъ образцовъ.

Лессъ	оны:	гнаго	) поля.	Черноземъ изъ Безенчука.	Лесс	ъ опы	тнаго	поля.	Чернозем <sup>*</sup> изъ Безенчука
15 ðu	еврал	я 4	- 8,4	8,4	1 1	юября	r +	9,5	9,2
16	)) ))	+		7,0	2	»	+	9,4	9,1
17	))	+		10,2	3	))	+		9,6
18	»	+		8,4	4	))		10,0	9,8
19	<b>»</b>	+		4,6	5	))	+		9,2
20	<b>&gt;&gt;</b>	+		5,4	6	))-	+	7,7	7,3
21	))	+	- 9,2	10,0	7	))	-+-	6,4	6,0
22	))	+	- 10,4	11,6	.8	))	+	6,8	6,6
23	<b>&gt;&gt;</b>	+	- 12,0	14,3	9	))	+	6,3	6,0
24	))	+	- 10,0	15,4	10	>>	+	6,6	6,3
25	))	+	- 13,0	15,4	11	))	+	5,4	5,2
26	))	+	- 13,0	15,6	12	))	+	5,2	4,9
27	))	+	- 13,9	15,6	13	))	+	4,9	4,7
28	))	+	- 12,0	14,0	14	))	_	0,1	0,3
					15	»	_	2,4	2,8
Ср	едняя		. 9,9	11,2	Ср	едняя	ı <b>.</b> .	6,4	6,0

Изъ этихъ данныхъ видно, что t черной почвы Самарской губ. въ теплые у насъ мѣсяцы (февраль) значительно выше (на 1,2 С), чѣмъ палево - желтой лессовой почвы Голодной степи; въ холодные же мѣсяцы (ноябрь) она, наоборотъ, была ниже на черноземѣ (на 0,4 С).

Изъ серіи лабораторныхъ изслѣдованій здѣсь мы приведемъ въ дальнѣйшемъ только нѣкоторыя, оставляя другія до будущаго года (напримѣръ, механическій анализъ солонцевъ, опредѣленіе твердаго остатка въ полевыхъ и грунтовыхъ водахъ опытнаго поля). Сначала приведемъ данныя изслѣдованій, сдѣланныхъ въ дополненіе къ результатамъ полевыхъ опытовъ, именно-данныя по опредѣленію всхожести посѣвныхъ сѣмянъ (табл. 6), вѣса ихъ оболочекъ у хлопчатника, а также—длины, толщины и выхода хлопковаго волокна у разныхъ сортовъ (табл. 8).

Табл. 6. Всхожесть посъвныхъ съмянъ.

Названіе сѣмянъ.	Всхожесть	Энергія проро- станія въ %%.
Овесъ желаниый 14/11	100	60
» тріумфъ	99	10
» шатиловскій	96	8
» рыхликъ	94	64
» гигантскій	90	72
» канадскій	87	47
» австралійскій	82	66
» немерчанскій	88	8
Ячмень черный озимый	98	44
Ячмень черный озимый	98	84
" букинскій		70
Пшеница озимая мъстная	100	100
» » красная	96	96
» яровая арнаутка	96	92
» » H09	96	96
» » нолтавка	94	92
» хлудовская	88	88
Люцерна туркестанская	94	91
» французская	71	72
» русская	78	36
Свекла кормовая эккендорфская	62	18
» тріумфъ	82	22
» полусахарная	82	22
» сахарная Клейнвансл	96	1
» Каунчинскаго завода	64	46
Хлопчатникъ Кинга Опытнаго поля	86	60
» Кинга американскій	58	4
» Кинга американскій	76	60
» Кукъ американскій		4
Хлопчатникъ-протравленныя мъднымъ купо-		
росомъ (въ 1%) съмена (10 мин.)	98	42
Тоже (30 мин.)	100	78
» въ формалинъ (0,2%)	99	60
» не протравлени. съмена	95	21
» не протравлени. съмена	78	63
» 2 » (средній ярусь)	72	50
<ul> <li>» 2 » (средній ярусь)</li> <li>» 3 » (верхній ярусь)</li> </ul>	35	18

Tao.a. 7.

#### Въсъ 1.000 штукъ съмянъ хлопчатника.

Крупныхъ-Кинга	107,0 грамм.	3-го сбора Кинга	90,8 грамм.
Мелкихъ	103,8 »	Смъсь джинныхъ	97,1 »
1-го сбора Кинга	113,2 »	» линтерныхъ	97,8 »
2-го сбора »	112,2 »		

Табл. 8.

#### Процентъ оболочекъ, зародыша и влаги въ съменахъ хлопчатника Кокъ-Чигита.

	Вѣс	ъ въ 1.0 въ гра	000 сѣм аммахъ		Вля	%%		
Сортъ сѣмянъ.	Сѣ- мянъ.			%% за- родыша.		Въ сѣме- нахъ.	Въ волокив.	волокна.
1-й сортъ нижн. ярусъ 2-й » средн. » . 3-й » верхн. »	114,0 113,0 98,0	50,4 51,5 48,0	63,6 61,5 50,0	55,8 54,4 50,5	8,6 8,3 11,6	9,5 9,5 11,4	8,1 9 6	26,0 30,0 25,7

# Фенологическія и другія сельско-хозяйственныя наблюденія въ 1910 году.

Со 2-го февраля 1910 г. показалась въ степи зелень злаковъ, полыни; цвътетъ Тагахасим (одуванчикъ); зеленъетъ прошлогодняя люцерна; Trigonella тоже (на болъе влажныхъ мъстахъ). 4 февраля начали посадку черенковъ тополя; 5 февраля пахали подъ яровые. 6 февраля подръзка на крону саженцевъ въ питомникъ. 8 февраля посъвъ нъсколькихъ сортовъ овса и яровой пшеницы. 5—10 февраля вносили удобренія: суперфосфатъ—по люцернъ и (1-й разъ) жмыхъ—подъ будущій хлопчатникъ. 19/ІІ стадо коровъ выпущено на пастьбу въ степь. 20/ІІ посадка дичковъ и молодыхъ деревьевъ и акаціи, тутовника, ясеня. 23/ІІ цвътутъ миндали, карагачъ.

28/П появились всходы овса и пшеницы, посъянныхъ 8 февраля. 1 марта замъченъ облетъ пчелъ изъ ульевъ (многія прилетъли съ обножкой). З/ПІ зацвълъ въ степи дикій клеверъ (Trigonella grandiflora). 4/ПІ былъ снъгъ (при—0,5 С.). 9 Марта посъвъ люцерны и ярового ячменя; она дала всходы 18 марта; 9 марта выкапывали и выдавали крестьянамъ плодовые саженцы для посадки; пересаживали землянику. 10 марта цвътетъ абрикосъ. 12 марта открывали покрытые на зиму виноградникъ, розы, гранаты. 20 марта цвътутъ нъкоторые персики; распускаются талы, горный тополь; цвътетъ ясень. 20 марта посъвъ въ огородъ моркови, свеклы, а на бахчъ—арбузовъ, дыней. 22 марта удобряли нъкоторыя деревья въ плодовомъ саду. 24 мартъ морозъ (—1,7 С.), послъдній весной. 26 марта начали посъвъ ранняго хлопчатника, сахарной свеклы и моркови въ полъ; свекла взошла 4 апръля,

а хлопчатникъ 8 апръля. 26 марта начала цвъсти земляника, а обильно съ 5 апръля. 28 марта кое-гдъ началъ колоситься озимый ячмень (мъстный). 28/III съяли кукурузу,

1-го апръля цвътуть райскія яблоки, сливы. 4 апръля начали поливать изъ арыка озимую пшеницу, ячмень и подъ посъвъ хлопчатника. 2-5 апръля отродилась въ степи саранча (Мароккская кобылка). 5 апръля зацвълъ въ степи дикій макъ «Papaver pavoninum» показатель времени начала съва хлопчатника. 6 апръля цвътеть озимый мъстный ячмень. 8 апръля цвътеть въ саду сирень, распускаются листья тутовника. 12 апръля-оживились шелковичные черви, а 20 мая начали завивать коконы. 17 апръля зацвъла бълая акація. Съ 15—18 апръля саранча въ степи линяеть—2-й разъ и переходить въ 3-й возрасть. 25 апръля выпаль большой градъ, побившій много фруктовь и почти всь ранніе всходы хлопчатника. 26 апръля пересъвали вновь хлопчатникъ, побитый градомъ; всходы этого посъва-6 мая. 26/V цвътеть англійская люцерна и французская; зацвъли розы въ саду. 26/ІУ цвътеть—озимая мъстная ишеница. 28/ІУ свяли позднюю свеклу, хлопчатникъ, а также кукурузу, просо, чумизу; всходы кукурузы появились 9 мая. 5 мая косьба люцерны (1-й укосъ), 2-й укосъ—20 іюня, 3-й укосъ—25 іюля, 4-й укосъ 15 сентября. 8 мая—жнитво ранняго озимаго ячменя. Въ ночь съ 5 на 6 мая и утромъ 6 мая, во время прохожденія кометы Галлея, былъ дождь; къ ночи 6/V съ Ю.-З. была молнія и отдаленный громъ. 9 мая колосятся яровыя пшеницы. 10 мая выкидываеть метелки ранній овесь, а 25 мая онъ уже созрълъ. 10 мая отроился одинъ рой изъ ульевъ. 13 мая—посъвъ маша; всходы—17 мая. 15 мая появилась на полъ летучая саранча и фстъ яровой ячмень. 1 іюня созрълъ абрикосъ «душистый». 5 іюня выкидываеть султаны кукуруза, посѣянная 16 апрѣля. 9 іюня зацвъль хлопчатникъ ранняго посъва (28/III). 15 іюня цвъль хлопчатникъ посъва 14 апръля, а 2-го іюля цвътетъ хлопчатникъ поздняго посъва (12/V). 17 іюня созрыль виноградь «Чиляги». 19/VI созръла груша «Маслянная Жифара», японская слива «Ботанъ». 20 іюня на нижней поверхности листьевъ хлопчатника замъчена тля. 5—8 іюля были суховъи (гармели); послъ нихъ началось сильное опаденіе завязей хлопчатника (maximum  $t^0 = 42,5$  Cels). 9 іюля цвътеть машъ. 20 іюля созрѣваеть ранній хлопчатникъ (открылись нервыя коробочки). 9 августа созрѣваетъ кукуруза. 20 августа созрѣлъ машъ. 28 августа начали сборъ ранняго хлонка. Съ 22 августа по 22 сентября съяли озимый ячмень и пшеницу. 2 октября былъ первый осенній морозъ (-- 0,8 С.). 24 ноября выпаль большой снъгъ (на глубинъ 11/2 вершка). Сборъ 3-й хлопка кончили 1 ноября и съ З ноября приступили къ очисткъ сырца на своемъ джинъ; закончивъ очистку 21 ноября, отправили волокно 23 ноября въ Ташкентъ-на заводъ Рубенчика, которому хлопокъ-волокно проданъ по 14 руб. 20 коп. пудъ.

Фенологическая таблица по періодамъ вегетаціи хлопчатника сорта «Тріумфъ» въ 1910 году.

	Мѣсяцъ	отъ ріодъ.	A BE	стебля	й на	2	слові.	я рост	ra :	клопчатни	ка.
Періодъ роста хлопчатника.	и число въ періодъ вегетаціи.	Число дней отъ посъва въ періодъ	Высота стебля сантим.	Толщина сте въ сантим.	Число вѣтвей 1 pacrenie.	Влажность почвы на 10 сант. въ %.	Температура воздуха ° Cels.	Осадн		Облачность.	Сумма тепла въ граду- сахъ С.
	Z 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3								саж.		
1. Время посъва хлопчатника	12 мая	-1	_	_	_	16,6	28,9		ку 6.	0, 6-2, 8	-
2. Время появленія всходовъ	16 »	4	-	9-	_	16,5	29,3		200	7, 0-2, 8	105
3. Появленіе настоящихълистьевъ.	20 »	8	11	0,1	_	_	21,2	-	получилъ	6, 0-2, 8	_
4. Начало образованія вътвей 1-хъ.	2 іюня	20	20	0,2	1	16,3	24,1		луч	6, 0-2, 2	522
тоже 2-хъ	12 »	30	23	0,2	2	16,3	- 1		И	- 4	-
5. Появленіе 1-хъ бутоновъ	21 »	40	29	0,3	7	16,2	-	-	3 pasa	0-2, 2	-
6. Начало цвътенія	2 іюля	50 .	35	0,5	8	_	31,1			1, 6	1.325
7. Полное цвътеніе	12 [n	60	44	0,7	10	14,7	29,0	1,1	ался	3, 6—1, 6	-
8. Полное сформированіе 1-хъ коробочекъ	5 авг.	83	63	0,9	12	_	26,7	0,8	тодо ч	0-2, 1	
9. Начало созрѣванія хлопка, рас- крытіе коробочекъ	7 сент.	115	105	1,3	15	-	22,4	-	Хлопчатникъ орошался	1, 6-2, 8	2.945
				1 11 0,1 20 0,2 1 1 23 0,2 2 1 29 0,3 7 1 35 0,5 8 - 44 0,7 10 1					Хлопу		

### Метеорологическія условія въ 1910 году.

1910 годъ, несомнънно, быль однимъ изъ самыхъ урожайныхъ годовъ для хлопка въ Туркестанъ, и метоорологическія условія его, какт. благопріятныя для хлопчатника, заслуживають самаго внимательнаго изученія. Чтобы охарактеризовать метеорологическія условія года, какъ благопріятныя или неблагопріятныя для нашей главной культуры хлопчатника, мы съ настоящаго года находимъ полезнымъ сравнивать каждый отчетный годъ не только со среднимъ метеорологическимъ годомъ въ Голодной Степи, но также со среднимъ урожайнымъ и неурожайнымъ для хлопка годами; кромъ того, для характеристики всего вегетаціоннаго періода нашихъ полевыхъ растеній мы считаемъ необходимымъ приводить группировку метеорологическихъ элементовъ для главнъйшихъ растеній по отдъльнымъ фазамъ развитія ихъ--въ видъ такъ называемыхъ фенологическихъ таблицъ; и, наконецъ, въ цъляхъ установленія связи отдъльныхъ полевыхъ работъ съ явленіями жизни мъстной природы, нами будутъ дълаться въ интересахъ практиковъ, хотя бы отрывочныя, указанія на время наступленія тъхъ или иныхъ характерныхъ моментовъ въ окружающей природъ и въ полъ (см. табл. 12, фенологическ. и другія наблюденія въ 1910 году), начало главныхъ періодовъ вегетаціи и проч.

Приводя ниже таблицу сравненія метеорологическихъ условій 1910 года съ годами урожайными и неурожайными, мы исходили изъ желанія найти для практики хлопководства хотя бы нікоторыя придержки по предсказанію ожидаемаго урожая хлопка еще весной. Для того, чтобы дать характеристику метеорологическихъ особенностей урожайнаго и неурожайнаго года, мы, разсмотръвъ подробно эти условія для каждаго года и констатировавъ извъстную повторимость однихъ метеорологическихъ условій въ годы урожайные, другихъ-въ неурожайные, попытались сгрупировать эти условія отдільно для плохихъ хлопковыхъ годовъ (1907, 1908 и друг.) и отдёльно для хорошихъ хлопковыхъ годовъ (1909, 1910, 1906 и друг.); полученными метеорологическими данными достаточно ръзко отличаются годы урожайные отъ неурожайныхъ, особенно за періодъ вегетаціи хлопчатника, и простое сравненіе условій даннаго года съ этими отклоненіями даеть возможность впредь отнести его ближе къ тому или иному типу ихъ и, значитъ, нъкоторую возможность предсказать урожай хлопка.

Какъвидно ниже изътаблицы 13, урожайный годъ рѣзко отличается отъ неурожайнаго: средняя температура года выше для урожайнаго почти на 1,0° (14,3° противъ 13,4° С); количество осадковъ—въ два раза больше въ неурожайномъ году, чѣмъ въ урожайномъ (316.0 милл.

противъ 151.0 милл.); весна въ урожайные годы имъетъ температуру воздуха на 1° выше, чъмъ въ неурожайные (18,4° противъ 17,4°), а осадковъ въ неурожайный больше на 55,8 милл.; осень въ урожайные годы теплъе (11,0° противъ 9,9°), почти безъ осадковъ (10,9 милл.), тогда какъ въ неурожайный ихъ 87,0 милл.; облачностъ весны и осени въ урожайные годы на 8,5% меньше, чъмъ въ неурожайные года. По метеорологическимъ условіямъ за отдъльные мъсяца, особо ръзко отличающіе урожайные годы отъ неурожайныхъ, можно слълать такую характеристику тъхъ и другихъ годовъ:

#### Для урожайныхъ годовъ:

типичны: а) высокія t <sup>0</sup> Мая	o C.
Октября	0 ))
b) малое количество осадковъ	
въ Мартѣ	
типичны: а) болъе низкія t <sup>0</sup> Мая	3° » 7° »
b) большое количество осадковъ	
въ Мартѣ	alia isi oqoopi sishica

На основаніи приведенных сводокъ метеорологическихъ наблюденій за годъ, по временамъ года и за вегетаціонный періодъ, легко отвѣтить на вопросъ: каковъ же быль по метеорологическимъ условіямъ 1910 годъ? Мы уже по мартовской и майской погодѣ 1910 года могли бы сказать, на основаніи сравненія ее съ погодой урожайныхъ лѣтъ, что отчетный годъ будетъ благопріятенъ для развитія хлопчатника, и можно было ожидать хорошаго урожая хлопка. Дѣйствительно, если урожайный годъ охарактеризованъ нами выше, какъ годъ съ теплымъ маемъ, сентябремъ и октябремъ, какъ годъ съ малымъ количествомъ осадковъ въ мартѣ, маѣ и проч., то 1910 г.

въ этомъ отношеніи превзошель не только средній урожайный годъ, но и такой отличный, какъ 1909 г.: май въ 1910 г. былъ самымъ теплымъ (26,1° С.) за всв годы существованія опытнаго поля, превосходившій по теплу почти на 1,00 С температуру мая урожайнаго года; въ октябръ 1910 г. температура тоже была на 0,80 выше урожайнаго года и почти на 2,5° выше неурожайнаго; средняя температура за вегетаціонный періодъ хлопка (24,8°) была на 1,2° выше, чъмъ въ неурожайные годы, и на 0,40 выше урожайнаго; осадки въ мав, сентябръ и октябръ были самыми минимальными за послъднія 9 лътъ, кромъ 1909 г., и за весь вегетаціонный періодъ хлопчатника (съ мая по октябрь) ихъ выпало въ 1910 г. всего лишь 2,7 милл, тогда какъ даже въ средній урожайный годъ ихъ выпадаеть 5,8 милл., а въ неурожайный—цълыхъ 68,9 милл,; по длинъ безморознаго періода, продолжавшагося 191 день (61/2 мъсяцевъ) 1910 годъ слъдуеть назвать даже выдающимся. Сумма тепла за вегатаціонный періодъ хлопчатника въ 1910 году была (40420) на 1960 больше, чѣмъ въ неурожайный, и даже на 65° больше урожайнаго года.

По отдъльнымъ фазамъ развитія хлопчатника метеорологическія условія были таковы:

Къ періоду посъва температура воздуха была въ 1910 году гораздо выше (20,30), чъмъ въ средній годъ и даже въ хорошій 1909 г. (19,2), а почва прогрълась довольно хорошо уже къ концу марта, и въ первыхъ числахъ апръля въ степи зацвълъ показатель времени посъва хлопчатника—дикій макъ (Papaver pavoninum); поэтому всходы хлопчатника, посъяннаго 26 марта, появились на 12 день, а еще скоръе (на 6 день) хлопчатникъ Кингъ взошелъ при посъвъ 5 апръля. Сумма температуръ за періодъ отъ поства до всходовъ хлопчатника (14/IV—20/IV) равнялась въ 1910 году въ воздух в 123,1° С., тогда какъ въ 1909 г. только 115,02, а на глубинъ 10 сант. почвы—въ 1909 г. 135,00, въ 1909 г. только 125,00. Осадковъ отъ посъва до всходовъ было въ 1910 г. всего 0,2 милл., и они, конечно, не помъщали появленію всходовъ. Къ сожальнію, вскорь посль всходовъ, дружныхъ прошелъ сильный градъ (25/IV), которымъ на многихъ поляхъ побито до ¾ всходовъ хлопчатника, такъ что пришлось эти поля пересъвать вновь, причемъ новые дружные всходы появились очень скоро и вскоръ догнали въ ростъ ранніе посъвы. Въ теченіе всего слъдующаго періода-отъ всходовъ до цвътенія хлопчатника (20/IV-12/VI), продолжительностью у Кинга въ 53 дня, температура воздуха была равна 24,6° С.; сумма температуръ въ воздухъ за этотъ періодъ была въ 1910 г. около 1303,0° и на 10 сант. почвы 1505°, а въ неурожайный годъ лишь 1170°. Осадковъ выпало съ 20/IV-20/VI всего лишь 9,1 миллим., тогда какъ въ неурожайные годы ихъ выпадаетъ около 52 милл., число дней съ осадками доходить до 13, тогда какъ въ 1910 году ихъ было лишь 9. За періодъ отъ начала цвътенія до созрѣванія первыхъ коробочекъ хлопчатника Кингъ (12/IV—21/VII), продолжительностью 40 дней; средняя температура была въ 1910 году 28,7° и сумма температуръ въ воздухѣ около 1148°, а на глубинѣ 10 сант. почвы около 1305°, между тѣмъ, какъ даже въ урожайный 1909 годъ сумма температуръ за этотъ періодъ достигла лишь 1025° въ воздухѣ и 1242° въ почвѣ.

Неблагопріятно отразились на хлопчатник $^{5}$  въ 1910 году высокіе максимумы  $t^{0}$ , бывшіе съ 5-—8/VII и сопровождавшіеся сухов $^{5}$ нми; они вызвали сильное опаданіе завязей хлопчатника, доходившее до 40% отъ числа вс $^{5}$ хъ коробочек $^{5}$  на куст $^{5}$ , особенно у ранних $^{5}$  пос $^{5}$ вов $^{5}$ .

Сухая, теплая, солнечная осень 1910 г. позволила произвести почти безъ перерывовъ съ 28/VIII по 1/XI 3—4 сбора хлопка, который почти весь пошелъ въ первый сортъ; только волокно, попавшее подъ лессовую бурю (30/IX), было попорчено пылью и расцѣнивалось на 20 коп. дешевле.

Кстати, относительно этихъ лессовыхъ бурь въ Голодной Степи, повторяющихся здѣсь каждый годъ въ сентябрѣ—октябрѣ мѣсяцахъ, слѣдуетъ сказать, что онѣ приносятся почти всегда съ вѣтрами ЮВ и ССЗ, дующихъ тогда съ силой 3—7 метровъ въ секунду; количество переносимой этими бурями желтовой пыли доходитъ, по нашему опредѣленію, до 50—90 пуд. на десятину за нѣсколько часовъ; при наступленіи бури днемъ на нѣсколько часовъ водворяется полный мракъ, приходится зажигать лампы.

Для наглядности разницы условій 1910 года, сравнительно съ неурожайнымъ годомъ, мы вычертили на двухъ діаграммахъ ходъ колебаній температуры и осадковъ за эти годы (см. стр. 24).

Чтобы судить о томъ, какъ развивается кустъ хлопчатника въ различные періодъ, когда и при какихъ условіяхъ наступають у него главные моменты роста, мы приводимъ, въ связи съ фенологическими наблюденіями, подробную таблицу роста одного сорта хлопчатника-Тріумфа, посвяннаго послв всвхъ другихъ. Изъ таблицы 9 (стр. 18) видно, что при влажности почвы около 16,6% и температуръ воздуха около 29,00 С-всходы хлопчатника, посвяннаго 2 мая появляются уже на 4 день, при чемъ требуется всего лишь около 105° тепла; появленіе настоящихъ листьевъ наблюдалось черезъ 8 дней отъ посъва, когда стебель хлопчатника достигаеть около 11 сант. высоты, при толщинъ стебля около 0,1 сант.; начало образованія первыхъ (нижнихъ) вътвей наблюдалось около 2 іюня—на 20 день отъ посъва, когда растеніе достигло высоты 20 сант. и толщины стебля около 0,2 сант.; вторыя вътви появились на 30 день. Появленіе первыхъ цвъточныхъ бутоновъ отмѣчено 21 іюня—на 40 день отъ посѣва, при чемъ стебель достигъ 29 сантиметровъ высоты, 0,3 сант. толщины и имълъ уже 7 боковыхъ вътвей; начало цвътенія хлопчатника наблюдалось 2 іюля на 50 день отъ поства, и тогда стебель его быль около 35 сант. высоты, толіциною 0,5 сант. имфлъ 8 вътвей и около 25 листьевъ, при

чемъ за періодъ отъ посъва до цвътенія онъ получилъ 13250 тепла. Полное цвътеніе отмъчено 12 іюля—на 60 день, когда высота стебля хлопчатника была около 44 сант., а толщина 0,7 сант.; вътвей имълось 10. Полное сформированіе 1-хъ коробочекъ отмічено 5 августа на 83 день-при высотъ стебля въ 63 сант., толщинъ 0,9 сант. и числъ вътвей 12; наконецъ, начало созръванія коробочекъ поздняго хлопчатника тріумфъ наблюдалось 7 сентября—на 115 день—и къ этому моменту онъ имълъ стебель высотою въ 105 сант. (около 11/4 арш.), толщиною 1,2 сант., а вътвей 15 шт., всъхъ листьевъ 75, а коробочекъ 21 шт. (онъ далъ урожай 75 пуд. сырца съ десят.); такимъ образомъ, за весь вегетаціонный періодъ отъ посіва до созріванія коробочекъ потребовалось для этого хлопчатника 29450 тепла, не считая времени отъ открытія 1-хъ коробочекъ до 1-го и 2-го сборовъ хлопка. Наибольшій рость стебля хлопчатника быль со времени полнаго цвътенія до раскрытія первыхъ коробочекъ, когда въ одинъ день высота стебля увеличивалась на 1.2 сант., и стебель удлинился на 61 сант. (въ 55 дней); до этого же періода стебель удлинялся медленные всего мажду образованиемы 1-хы и 2-хы вытвей (0,3 сант.) и дальше до начала цвътенія (0,6 сант. въ день) и за весь періодъ отъ посъва до полнаго цвътенія стебель достигь 44 сант. (въ 60 дней). Большая часть вътвей, наобороть, образованась ко времени полнаго цвътенія—10 штукъ, тогда какъ съ этого момента до начала созръванія коробочекъ вътвей образовалось лишь 5; всъ коробочки (21 шт.) завязались и сформировались въ послъдніе 65 дней со времени цвътеніа хлопчатника.

Метеорологическія условія 1910 года для другихъ полевыхъ растеній, сравнительно съ сухимъ 1909 годомъ и сырымъ 1908 г., отличались такими особенностями:


	1908 г.	1909 г.	1910 г.
	дней / тепла °	дней / тепла °	дней / тепла °
1) По количеству теп	ла:		
озимый ячмень	228 1744	236 2058	245 2072
машъ	97 2553	88 2377	98 2790
люцерна	160 3726	170 4057	218 4490
кукуруза	88 2278	88 2458	113 3024
2) По количеству осад	дковъ (въ ті	llim.):	
озимый ячмень	sagmyer from	329,0 172	78,0
машъ	ran arardan	0,4 8,8	2,3
кукуруза	.e.gxər ifxid	27,0 9,7	10,0
люцерна		68,0 61,0	52,0
3) Безморозныхъ дне	n: /ll armani		
озимый ячмень	BILLIER HEL KILL	130 157	128
машъ	i miningario	97 88	. 97


	кукуруза	88	88	118
	люцерна	160	160	200
4)	Ясныхъ дней:		erenani.	
		56	119	57
	машъ	79	75	65
	кукуруза	58	75	66
	люцерна	91	129	101

По временамъ года метеорологическія условія въ 1910 году были таковы.

Зима 1910 года была болъе тенлой (1,5°), чъмъ средняя за нъсколько лътъ (1,1°) и абсолютный минимумъ t° ея былъ (20,5°) значительно слабъе зимняго минимума за нъсколько лътъ (—24,0), и осенняго (ноябрьскаго) за 1910 годъ; максимумъ температуры зимы былъ 23/XI — + 20,0°С. Снъжный покровъ глубиною до 10—14 сантиметровъ, держался въ декабръ только съ 1 по 13 число и затъмъ съ 29-го, а въ январъ лишь 1—3 числа; кромъ того, небольшой снъгъ выпадалъ еще 11 февраля; всего со снъгомъ въ ноябръ, декабръ и январъ 1910 г. выпало 18,7 милл. осадковъ, а вообще осадковъ за зиму 1910 г. выпало 48,4 милл.—меньше средняго на 26,0 милл. Барометрическое давленіе зимой 1910 г. было очень высокое—745,9 милл.—выше средняго на 2,5 милл.; абсолютный максимумъ достигъ 758,1 милл. 7-го декабря.

Весна. въ 1910 году была очень теплая, сухая, съ малымъ числомъ морозныхъ дней (6). Средняя температура весной была 18,1 на 2,4° выше средней весенней t° за нѣсколько лѣть; абсолютный минимумъ ( $-1,7^{\circ}$ ) былъ 24 марта и посл $^{\circ}$  него  $t^{\circ}$  весн $^{\circ}$ ю ни разу не опускалась до 0,0°; максимумъ t° (38,8°) наблюдался 15 мая. Осадковъ за весну выпало всего 32,0 милл., а въ средніе годы выпадало 100,0 милл.—и это, вмѣстѣ съ высокой to весны, очень быстро изсушило почву степи и посушило тамъ растительность. Почва уже въ концѣ марта имѣла температуру около 150 С.—и, значить, была прогръта вполнъ для посъва хлопчатника, который и начался съ 26/III. Самый важный для поства и всходовъ хлопчатника мъсяцъ-апръль отличался въ 1910 году высокой температурой (18,90), быстро вызвавшей всходы на орошенныхъ поляхъ, ничтожнымъ количествомъ осадковъ (8,8 милл.), не забивавшихъ всходы, отсутствіемъ заморозковъ, значительной облачностью (43%) и относительной влажностью (61%), умърявшихъ дъйствіе солнечныхъ лучей на нъжные всходы хлопчатника. Неблагопріятно отразился на хлопчатникъ градъ 25/IV, которымъ многіе всходы были совершенно побиты и послѣ пересѣяны.











Л в то въ 1910 году было съ меньшей температурой (26,9°), чѣмъ въ средніе годы (28,7°), хотя іюль мѣсяцъ, въ частности, имѣлъ въ 1910 году болѣе высокую температуру (29,6°), чѣмъ въ средніе годы (29,4°); іюньская температура была ниже средней на 4,3°, августовская тоже. Максимумъ температуры лѣтомъ наблюдался 5/VII (42,3°), а минимумъ 30/VIII; максимумъ 5/VII сопровождался легкимъ вѣтромъ съ сѣвера и безоблачностью, а минимумъ —вѣтромъ съ ССВ. Осадковъ за все лѣто выпало въ 1910 году 2,7 милл., а испареніе достигло 390,0 милл.

Наичаще другихъ повторялся лѣтомъ вѣтеръ С со скоростью 0,28 метра въ секунду, при чемъ онъ повторялся больше всего въ іюнѣ со скоростью 0,4 метра и отчасти въ іюлѣ; какъ правило ему сопутствовали и температурные максимумы, достигавшіе  $4^{\rm B}$  0,0° и выше (8 разъ), въ іюлѣ 38—4° (7 разъ) и августѣ 37—40° (6 разъ).

Вътры С и СЗ здъсь считаются лътомъ за суховъи, такъ какъ они приносятъ изъ песковъ Кызылъ-Кумъ горячій воздухъ; имъ-то и приписываютъ опаденіе завязей хлопчатника, которое, дъйствительно, наблюдалось часто въ 1910 году въ іюнъ и іюлъ.

Осень отличалась высокимъ барометрическимъ давленіемъ—744,5 милл., превосходившимъ среднее на 1,2 милл.; особенно высокое давленіе было въ ноябрѣ (747,6 милл.—средн.), достигая почти 760,0 милл. въ нѣкоторые дни, (15  $\rm XI$ ), при чемъ оно сопровождалось и самыми сильными морозами, доходившими до 25,5° того же 15  $\rm XI$  (абсолютный минимумъ  $\rm t^0$  за годъ).

Это максимальное давленіе въ ноябрѣ сопровождалось обычно значительной облачностью и перемѣной вѣтра на СЗ и ЗСЗ. Вообще зима 1910—11 г.г. началась въ ноябрѣ, когда съ 12 числа начались сильные морозы, продолжавшіеся вплоть до конца мѣсяца, съ перерывами отъ 21 до 25 ноября; поэтому почва уже 16 ноября промерзла до глубины 25 сантиметровъ, такъ что вспашку—взметъ полей на зябъ пришлось прекратить до 16/ХІІ, когда вновь наступила оттепель. Ноябрьскіе морозы при голой почвѣ не прошли безслѣдно для озимыхъ посѣвовъ на 1911 г.: озимый ячмень нѣкоторыхъ сортовъ (черный караязскій) и нѣкоторыхъ сроковъ раннихъ (28/ХІІІ) посѣвовъ померзъ почти весь; выдержали лучше только мѣстный оз. ячмень и то главнымъ образомъ посѣянный около 20-го сентября.

Высъянныя осенью, для опытовъ, на дѣлянкѣ опытнаго участка яровыя пшеницы—полтавка, хлудовка и др., а также овсы— немерчанскій, рыхликъ и яровые ячмени—голый, шевалье померзли совершенно. Въ вегетаціонныхъ сосудахъ померзли также люцерна весенняго посѣва и озимая пшеница. На поляхъ озимая пшеница нигдѣ отъ морозовъ не пострадала, даже та, которая посѣяна очень поздно—7 ноября; хотя, правда, она до наступленія морозовъ

и не всходила еще (всходы главнымъ образомъ появились въ февралъ 1911 г.). Эти же ноябрьскіе морозы и отчасти январскіе 1911 г. погубили во многихъ мъстахъ Туркестана плодовыя деревья—преимущественно яблони; такъ, въ саду Голодностепскаго опытнаго поля погибли старыя деревья слъдующихъ сортовъ: Ренетъ Семиренко, Ренетъ Шампанскій и др.

Въ предыдущіе годы минимумъ  $t^0$  въ ноябрѣ никогда не спускался ниже $-7,5^{\circ}$  С.

Средняя температура ноября въ  $1910\,\mathrm{r}$ . была— $1,6^{\circ}$  С., тогда какъ средняя за нѣсколько лѣтъ  $t^{\circ}$  ноября равна +6,7 с.; сентябрь и октябрь, какъ было сказано раньше, наоборотъ, отличается высокой температурой, столь благопріятно отразившейся на созрѣваніи и уборкъ хлопка.

Максимумъ t<sup>0</sup> осенью 1910 г. достигъ 38,2 (6/IX), въ предыдущіе же годы онъ выше 35,5° С. не былъ. Облачность (43%) осенью 1910 г., собственно въ ноябрѣ, была выше средней на 15%. Осадковъ выпало всего 9,1 милл., а въ средніе годы выпадало 44,3 миллиметровъ. Ясныхъ дней на 19 меньше средняго числа и преобладающимъ вѣтромъ осенью 1910 года были С. и СЗ, а въ предыдущіе годы ЮВ и З, притомъ сила вѣтра въ 1910 г. была меньше.

Почвенная температура въ 1910 году на поверхности, почвы достигала за годъ въ среднемъ 20,% С., на глубинѣ же 10 сант. + 15,40 С., на 25 сант. 16% и на 100 сант. 16,1%,—т. е. она была значительно выше средней за нѣсколько лѣтъ; высшая средняя мѣсячная температура на поверхности почвы была въ іюлѣ 39,6%, а максимальная въ іюнѣ (25/VI)—она дошла до 65,8% С., абсолютный годовой минимумъ  $t^0$  на поверхности почвы наблюдался 15 ноября = -22,7% С. На глубинѣ 10 сант. температура почвы ниже -6% не опускалась ни разу, на 25 — ниже -2% С., на 50 сант. — ниже +2, 8% С, а на 100 сант. — ниже +6,9% (16/XII).

Вообще же почвенная температура на глубинѣ 10—100 сант. понижалась зимой 1910 года только до 16 декабря, послѣ же стала подниматься; почва промерзала въ этомъ году лишь до 5-ти вершковаго слоя и то дней на 25 (изъ нихъ 14 въ декабрѣ), почему ее можно было пахать зимою съ перерывами и въ ноябрѣ, и въ декабрѣ, и въ январѣ, не говоря уже про февраль, когда послѣ пахоты могли уже съ 5 числа приступить къ посѣву яровыхъ овсовъ и пшеницы.

Вредителей культурныхъ растеній въ 1910 году на Опытномъ полѣ было мало, не считая обязательныхъ враговъ нашего полеводства—воробевъ, которые съ настоящаго года начали пріучаться выклевывать даже зерна кукурузы изъ початковъ въ оболочкахъ, на корню. Летная саранча только слегка пощипаля хлопчатникъ въ 8-польѣ и сильно оголила яровой ячмень; спугиваніемъ при помощи

протянутой веревки и платками удавалосъ охранить некоторыя делянки хлопка отъ вернаго истребленія.

Поврежденіе коробочекъ хлопчатника и кукурузы гусеницами совки (Heliothis armigera), обычно наблюдавшееся, почти не замѣчалось въ 1910 г., и большая часть завязей опадала отъ суховѣевъ и недочетовъ орошенія.

На люцернъ весной наблюдалось повреждение бутоновъ и верхнихъ листьевъ, производимыхъ долгоносикомъ «Phytonomus denominandis». Въ саду сильно повреждала яблоки и груши гусеница бабочки плодожерки (Carpocapsa pomonella); съ нею довольно удачно боролись наложеніемъ на штамбы деревьевъ ловчихъ колецъ изъ бумаги, въ которыя забирались для окукливанія, опускавшіяся съ плодовъ дерева гусеницы. Бывшій здісь весною 1910 года энтомологъ Россиковъ пытался искать на корняхъ высыхающихъ деревьевъ нашего сада личинокъ хруща, но безуспъшно; причиной усыханія деревьевъ явилось во всёхъ случаяхъ нарушеніе функцій корневой системы отъсильной солонцеватости почвы. Между прочимъ, вмъстъ съ г. Россиковымъ нами были поставлены въ степи опыты по борьбъ съ саранчей разными инсектисидами: парижской зеленью, хлористымъ баріемъ, джепсиномъ и зеленымъ мыломъ; борьба съ саранчей (Мароккской кобылкой) въ 1—3 стадіи—при помощи эмульсіи зеленаго мыла (3—5% растворъ въ водъ) можетъ быть признана весьма дъйствительной, такъ какъ личинки саранчи гибли отъ опрыскиванія мыломъ почти немедленно-черезъ 2-3 минуты; во всякомъ случав, слвдуеть сдвлать попытку удешевленія стоимости зеленаго мыла и ввести его въ практику саранчевой борьбы.

Опыты борьбы съ саранчею при помощи, такъ называемыхъ, го п п е рдозеровъ дали такіе результаты въ Голодной Степи: если керосинъ въ аппаратахъ замънялся мазутомъ, который почти не испаряется и не выливается изъ корыта гоппер-дозеровъ-при протаскиваніи ихъ по земль, затымь заставлять двигаться сразу ньсколько аппаратовъ рядомъ и сзади первой линіи ихъ пускать слідомъ вторые гоппердезеры, —то можно разсчитывать на очень успъшное дъйствіе этихъ аппаратовъ въ нашей ровной степи; личинки, попавъ въ корыто съ мазутомъ и оставаясь въ немъ или выпригивая, скоро погибаютъ цълыми массами. Во всякомъ случав, этотъ способъ въ работв выглядить не хуже примънявшагося въ 1910 году въ Туркестанъ способа сжиганія изъ аппаратовъ, подобныхъ Вермореллевскимъ ручнымъ (съ горящимъ керосиномъ), при чемъ рабочіе, направляя пламя на саранчевыя кулиги и дъйствуя часто въ разбродъ, изъ боязни поджечь другъ друга, разгоняють саранчу, обжигаются сами и свое платье (были случаи ожоговъ всего тъла).

Ниже пом'вщаются метеорологическія таблицы и діаграммы.

#### Метеорологическія условія въ 1910 году въ Голодной Степи, Самаркандской области, Ходжентскаго увзда (по старому стилю).

(По наблюденіямъ станціи Опытнаго Поля).

М ѣ с я ц ы.	Барометрическое давленіе въ mm.					хой те по (	р <b>момет</b> Cels.	ръ	Смо	Эченный	Мини- мумъ.	Макси- мумъ.		
м вся цы.	7	1	9	Средн.	7	1	9	Средн.	7	1	9	Средн.	Mymt.  A6c  -16,7 7,5 -1,7 1,2 8,2 11,8 13,0 7,2 1,1 -2,3 -23,5 -20,5	олютн.
Январь	744,8	744,5	744,6	744,6	-0,2	7,6	2,6	3,3	-1,15	4,4	1,2	1,5	-16,7	17,5
Февраль	745,3	745,3	745,4	745,3	+2,6	9,7	4,1	4,6	-0,4	6,7	2,8	3,08	7,5	20.0
Мартъ	743,2	743,3	743,1	743,2	5,9	13,1	8,6	9,2	5,0.	9,6	7,0	7,2	- 1,7	27,6
Апръль	739,7	739,7	739,7	739,7	14,2	25,0	17,2	18,9	11,9	15,9	13,8	13,9	1,2	32,5
Май	738,9	738,6	738,2	738,6	22,6	32,1	23,6	26,1	17,2	21,1	18	18,8	8,2	38,8
Іюнь	736,8	736,3	735,9	736,3	22,6	34,1	24,3	27,0	16,5	21,6	16,5	18,2	11,8	40,5
Іюль	734,8	734,5	734,2	734,5	24,7	37,6	26,6	29,6	18,2	22,6	19,7	21,6	13,0	42,3
Августь	739,0	738,0	736,5	738,8	18,0	33,0	21,5	24,2	13,6	20,8	16,0	16,8	7,2	40,0
Сентябрь	741,8	741,3	741,6	741,6	10,9	25,9	14,4	17,1	7,6	15,4	10,5	11,1	1,1	38,2
Октябрь	744,8	744,4	744,2	744,5	5,4	18,5	9,1	11,2	3,4	11,3	10,0	8,2	- 2,3	28,0
Ноябрь	747,7	747,3	747,7	747,6	-6,3	5,2	-3,7	-1,6	-7,0	1,4	-4,9	-3,5	~23,5	21,6
Декабрь	748,0	747,7	747,6	747,8	-5,8	0,1	-4,1	-3,3	-5,8	0,75	-4,3	-3,6	-20,5	9,7
Средн. за 1910 г	742,07	741,8	741,5	741,9	9,5	20,1	12,1	13,9	6,6	12,6	8,8	9,35	-23,5	42,3
Средн. за 5 лътъ .	741,2	740,8	741,0	741,1	10,0	19,3	12,6	14,0	7,2	12,8	9,0	9,6	-20,0	42,1

М всяцы.		Нап	рав	лені	е и	сила	вът	p a.	+ 31(k)	Си.	та вѣ	тра.	Облачность.					
	Тихо.	N	NE.	Е.	SE.	S.	SW	W	NW	7	1	9	7	1	9			
Tomoron	1918			5 D. In	3 / 30 /	4			1.00	3,18								
Январь	58/0	15/0	4/0	6/0	18/2,5	-	1	3/0	7/2	22	57	25	7,6	6,4	5,6			
Февраль	59/0	15/0,1	3/0,3	8/0	12/1,5	3/0,6	-	3/0	2/0	20	20	12	6,6	6,4	6,			
Мартъ	51/0	31/0,4	9/0,1	5/0,8	18/2,3	2/3	2/1,5	5/0,4	11/0,2	32	34	16	5,9	6,4	5,9			
Апръль	43/0	25/0,1	4/2	2/0	11/1,3	2/0,5	2/1,5	4/0,7	10/0,7	23	29	-15	4,6	4,1	4,9			
Май	53/0	26/0,4	9/0	12/0,5	12/2,3	2/1	1/0	4/0,7	6/0,7	28	17	25	3,3	3,3	2,0			
Іюнь	63/0	51/0,4	- 3/0	2/0,5	8/2,8	5/0	2/0	6/0	8/0	26	11	11	2,3	2,5	1,			
Тюль	66/0	47/0,1	5/0	1/1	3/2	2/2,5	1/0	2/1,5	10/0,3	12	14	5	1,8	1,2	1,			
Августъ	65/0	30/0,3	3/0,3	1/0	2/0	-	1/0	6/0,5	4/0,2	10	16	11	3,3	1,8	1,:			
Сентябрь	64/0	19/0,1	3/0	6/0,6		-	1/0	6/0	4/0,7	9	23	6	2,9	3,4	2,			
Октябрь	52/0	18/0,05	4/0,5	8/0,3	5/2		2/0	2/0	2/0,5	18	29	13	5,1	5,0	4,			
Ноябрь	53/0	21/0,14	8/0,25	12/0,5	17/1,6	-	1/0	5/1,2	24/0,4	15	24	18	7,0	5,6	4,			
Декабрь	50/0	14/0,14	8/0,5	16/0,25	34/1,5	-	4/0,5	1/1,0	16/0,35	23	28	18	8,6	8,2	6,8			
За 1910 г	677	314	66 0,33	79 0,4	140	16 0,6	17	<u>47</u> 0,4	104 0,5	238	302	175	4,9	4,5	3,			
Средн. за 5 лътъ .	317	120	40	63	222	39	67	89	196	2,1	2,2	1,9	3,1	2,4	2,			

	Влажи	ность.		o.		Ч		и	С	Л	0	д	H	е	й.	
М ѣ сяцы.	Абсолют-	Относит.	Осадки.	Испареніе.	Ясныхъ.	Пасмурныхъ.	Съ осадками.	Со сивгомъ.	Съ дождемъ.	Съ градомъ.	Иней, роса.	Туманъ съ морозомъ.	Съ сильнымъ вѣтромъ.	Съ горными вътрами и грозою.	Послѣдній морозъ весн.	1-й морозъ осенью.
Jekkie w	mm.	%%	mm.	mm.	8	П	Ö	0	0	0	7	E N	OM	O M LI	П	0 1
- , Январь,	4,0	70	15,1	51,1	6	15	5	3	2	-	2 ин.	24 м.	3		_	_
Февраль	4,75	75	17,3	44,2	6	13	4	1	9		8 ин.	21 м.	2	<u> </u>	_	-
Мартъ	6,6	77,3	20,7	38,7	5	12	12	2	11	_	4/7 ин.	6 м.	4	1 гроза	24/III	_
Апръль	10,0	61	8,8	96,7	8	3	6	_	5	1	6	1 т.	1	3 гроза	_	-
Май	12,0	48,7	2,5	136,4	15	2	5	_	5	_	4	-	_	5 гроза	_	_
Іюнь	11,8	44	0,8	142,9	20	2	2	_	2		_	_	3	<u> </u>	_	_
Іюль	14,4	47	1,1	140,4	22	-	1	_	1		2 poca	_	_	2 гор. вѣт. 2 гроза	_	-
Августъ	10,4	47	0,8	107,0	20	2	1	_	1	_	· <u> </u>	_	1	1 гроза	_	_
Сентябрь	7,2	50	0,5	77,4	17	3	1	_	1	_	5 poca	-	2	100 <u>1</u>		_
Октябрь	5,9	59	6,5	52,4	10	10	2	_	2	-	_	11 м.	2	_		2/x
Ноябрь	2,5	62	2,1	30,0	5	9	1	1	_	-	_	28 m. 4 T.	1	_	-	_
Декабрь	3,8	94	16,0	9,0	2	20	4	4	_	_	1 ин.	29 м.	_	_	_	-
За 1910 г	7,7	61,2	92,2	926,2	136	91	44	11	39	1	15 ин. 24 роса	119 м. 5 т.	20	20 гор. вѣт. 11 гроза	24/111	2/x
Средн. за 5 лѣтъ .	6,3	60,5	267,0	842,0	205	40	50	12	24	1,2	64	111	20	36	19/111	1/x

		На	пов	ерх	нос	ти і	почв	Ы.		Н	:	a	r	л	У	б	и	1	H	ъ.		
М ѣ сяцы.	Темп	ерату	ра въ	18.	Мак	сим.	Ми	ним.	10	санти	иметр	овъ.	25	санти	иметр	овъ.	5	0 car	нтиме	тровъ		Примѣчаніе.
	7 y.	1 д.	9 в.	Средняя.	Среди.	Абсол.	Средн.	Абсол.	7	1	9	Средн.	7	1	9	Средн.	7	1	9	Средн.	1 m.	leging (
Январь	0,8	8,3	1,7	3,6	8,3	13,2	_	-5,0	1,4	5,2	3,3	3,3	3,3	3,7	4,4	3,8	5,7	5,6	5,9	5,7	-	Сухая теплая
Февраль	0,4	10,4	3,5	4,8	10,4	19,0	_	-11,0	2,1	7,9	4,6	4,5	4,5	5,5	5,5	11000		6,2				
Мартъ															10,9			9,3			9,5	марта.
Апръль	16,4	38,5	17,1	24,0	38,5	48,5	_								20,4							
Май															28,8							Галлея.
Іюнь	31,5	57,9	29,6	37,3	57,9	65,8	_								31,9							
Іюль											OST TO				33,6							(гарм.).
Августъ	21,9	56,9	19,2	32,7	56,9	65,3	_	7,5	23,0	36,1	27,3	28,8	25,7	28,8	29,5	28,0	26,6	26,5	26,5	26,6	25,4	
Сентябрь								0,6	15,5	25,7	18,8	20,0	18,4	20,8	20,9	20,0	20,9	20,7	20,7	20,8	21,8	30-го сентябр лессовая буря.
Октябрь						34,2		-4,5	9,6	15,5	11,5	12,2	11,9	13,0	13,0	12,6	14,7	14,6	14,5	14,6	17,1	1-й осенній мо розъ 2 октября.
Ноябрь		7516 CY 14 PS				State Telephone		1000		THE PROPERTY OF	1-09 CHOCK	Carrier Control		1.5 (0.5 (0.10 (0.2))		14000000000000000000000000000000000000	Permanage Access	T1800 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100			12,1	
Декабрь	110000000000000000000000000000000000000		PERSONAL PROPERTY.	PROPERTY.	The state of the state of	Section Con-		-18,0		TENNEY THE	17.35 THE		1-37	CONTROL OF THE PARTY.	STEED FOR	W. 275 525		MALES AND A	AT THE REAL PROPERTY.		7,3	Ment Ass
Средн. за 1910 г.	12,7	31,6	11,7	20,0	_	66,5	#   # -	-22,7	12,7	21,4	15,4	16,4	14,7	16,6	14,0	16,0	15,7	15,6	15,7	15,7	16,1	
Средн. за 5 лътъ.			_	18,1	_		_	_	_	-	_	15,4	_	_		15,4	_	_	_	15,4	15,8	

- 31 -

Таблица 11-я. Метеорологическія условія въ Голодной Степи за 1910 годъ по временамъ года.

7						Cels.	4 40		TOTAL	термом	згръ.	Мини- мумъ.	Макси- мумъ.
	1	9	Средн.	7	11111	9	Средн.	7	1 1 1	9	Среди.	Абсо	олютн.
-			745,9	3100 Bg/r	31.43	_	1,5	818 <u></u> 319	26.6.20		0,6725.4	-20,5	20,0
-	922		740,5	6.0_11.6	8729	(9_28	18,1	87-18	802 8	1	89-0	- 1,7	38,8
-	200		736,5		30.513		26,4	/** <u></u>	30 <u>"3</u> 30	1 30 0	10,8 73.0	7,2	42,3
-	-	ar — —	744,55	90-19	3-3	-	8,9	811	n — pa	-	879-02	-23,5	38,2
The state of the same contains to the same same of the same same same same same same same sam				-      -     740,5       -     -     736,5	-     -     -     740,5     -       -     -     736,5     -	- 745,9 — — 740,5 — — — 736,5 — — —	745,9 740,5	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					

Продолжение табл. 11-й.

Время года.		Нап	рав.	теніс	е и с	ила	вът	pa.	PT 238	Си	ла вѣт	гра.	06	лачнос	гь.
былы тода.	Тихо.	N .	NE.	Е.	SE.	S.	sw	W	NW	7	1	9	7	1	9
	FIGE										Сумма		(	Средняя	ı
Зима	169/0	44/0,1	15/0,28	30/0,1	64/1,8	3/0,6	4/0,2	7/0,3	25/0,8		225/0,5			6,8	
Весна	147/0	82/0,3	22,0/0,7	19/0,4	41/2,0	6/1,5	5/1,0	13/0,6	27/0,5		219/0,7	9.062F	,	4,4	
Лъто	194/0	128/0,28	11/0,1	4/0,5	13,0/1,6	7/0,8	4/0	16/0,3	22/0,16		115/0,4			2,0	
Осень	169/0	58/0,1	15/0,25	26/0,45	22/0,5	0/0	4/0	13/0,4	30/0,35		155/0,3	in custon		4,35	. `

ι	C	è
ř.	3	

Ī		Влаж	ность.				Ч		И	С	Л	0	д	н	e	й.	
	Время года.	ж Абсолют- ж ная.	в Относит.	в Осадии.	на Испареніе.	Ясныхъ.	Пасмурныхъ.	Съ осадками.	Со снъгомъ.	Съ дождемъ.	Съ градомъ.	Иней, роса.	Туманъ съ морозошъ.	Съ сильнымъ вътромъ.	Съ горными вътрами и грозою.	Послѣдній морозъ весн.	1-й морозъ осенью.
		1070					1										
İ	Зима	_	_	48,4	105,0	14	48	13	8	5	_	9 ин.	5	7	1 1 100 100	_	_
	Весна	_	_	32,0	271,8	28	17	23	2	20	1	4 ин. 17 poca	1	5	9 гроза	24/111	-
	Лъто	-	-	2,7	390,3	62	4	4	_	4	-	2 poca	_	4	2 гор. вѣт. 3 гроза	-	_
	Осень	-	_	9,1	159,8	32	22	4	1	3	-	5 poca	-	4	-	-	2/x

### Продолжение табл. 11-й.

		На	пов	ерх	нос	ти і	почв	ы.		Н	[	a	Г	Л	у	б	И	1	I	ъ.		
Время года.	Темп	ератуј	ра въ	ГЯ.	Мак	сим.	Мин	ним.	10	санті	иметр	овъ.	25	санті	иметр	овъ.	5	0 cai	тиме	тровт		Примѣчаніе.
	7 y.	1 д.	9 в.	Средняя.	Средн.	Абсол.	Средв.	Абсол.	. 7	1	9	Средн.	7	1	9	Средн.	7	1	9	Средн.	1 м.	
First and first																						
Зима	_	_		2,3	-	19,0		-18,0		=	-	2,4	_	-		3,1	_	-	_	5,1	7,8	
Весна	E	-	-	26,3	-	59,2	_	-13,1	_	-		20,0	-	-	-	18,8	-	-	-	16,1	14,4	
Лвто	-		_	36,5	-	66,5	_	7,5	_	_	-	31,6	_	-	-	30,0		-	_	27,1	25,1	
Осень		-	-	14,9	_	58,0	_	-22,7	_			11,6	_		_	12,0	-	_	_	14,4	17,0	

Метеорологическія условія по періодамъ роста (Къ фенологиче

полевыхъ расгеній на Опытномъ полѣ въ 1910 г. скимъ наблюденіямъ).

			дней іод'в.	Температу	ра на пове и въ возд	ерхности ухъ.		Tem-	глу-	осад-	испа-	Tb.		ло д		
Названіе растеній.	Періодъ роста.	Какой мѣсяцъ.	Число д въ періо		Максим.	Миним.	+	Сумма тел пературы воздуха.	Сумма тем- пературы почвы на глу- бинѣ 10 сант.	Сумма ос ковъ.	Сумма ис	Облачность.	Съ осад-	Ясныхъ.	Безмороз-	Примъчаніе.
	None I			neallost.							ert.		41-	noi,		rocar dungsil
	IV. За весь періодъ ве- гетаціи (отъ посъва до созръванія)	8/11—1/v1	114	19,8/15,5	31,3/22,8	7,5/8,3	1	1.767,0	1,986,6	49,3	313,0	4,9	26	32	94	a som inggotti dila di manusumi.
Яровой овесъ	I. Отъ посѣва до всхо- довъ	8/II—1/III	21	4,9/4,8	10,8/12,7	-3,7/-1,2		100,7	102,9	17,3	36,4	6,9	4	3	6	in manageral if
шведскій.	II. Отъ всходовъ до цвътенія	1/III—20/v	80	21,2/16,7	33,3/23,7	8,5/9,4		1.321,7	1.482,9	31,7	220,7	4,7	21	22	75	arcijanose II. Benjanjoro
	III. Отъ цвътенія до со- зръванія	20/v—1/vi	13	35,1/26,5	51,7/33,7	19,5/17,0		344,6	400,8	0,3	55,9	2,5	1	7	13	Mains I Hothes—dexical
	IV. Весь періодъ	8/II—24/v	106	18,5/14,7	29,5/21,9	6,6/7,6		1.562,3	1.732,1	40.0	074.0		00	0.5	0.0	pao-disentali di
Яровой	І. Посъвъ-всходы	8/11-1/111	21	4,9/4,8	10,8/12,7	-3,7/-1,2		100,7	102,9	49,3 17,3	274,9 36,4	5,1 6,9	26	27	86	
овесъ	II. Всходы—цвътеніе	1/III10/v	70	18,8/15,0	30,2/22,0	6,8/7,9		1.052,1	1.161,7	29,9	171,6	5,1	19	17	65	немина в 1942 - годиналия
рыхликъ.	III. Цвътеніе—созръван.	10/v 24/v	15	35,8/27,3	52,7/34,2	20,1/18,6		409,5	467,5	2,1	66,9	2,9	3	7	15	Assimilar and a second of the
	IV. Весь періодъ	6/1x-11/v	150	15,8/13,8	25,6/22,0	6,0	+	2.071,8	2.233,5	78,5	390,4	4,0	36	57	128	Сумма осадковъ исчислена з
Озимый димико ячмень	I. Посъвъ-всходы	6/1x—13/1x	7	22,7/16,1	41,1/26,8	5,4	->	112,3	138,6	0,0	15,8	1,3	0,0	6	7	весь періодъ съ 6/1х—п/v.  Тоже—при вычисленіи исп ренія.
черный.	II. Всходы—цвътеніе	13/IX—8/IV	109	11,8/11,3	19,5/19,6	3,9		1.234,5	1.307,9	67,6	374,6	4,1	28	40	87	Періодъ покоя съ 15/хі—20
	III. Цвътеніе—созръван.	8/IV—11/V	34	27,3/21,3	42,1/28,5	12,7		725,0	787,0	10,9	124,2	4,1	8	11	34	исключался изъ вегетаціи.
(	IV. Весь періодъ	6/1x-5/v	144	15,0/13,3	24,6/21,5	5,4		1.913,7	2.070,0	76,8	488,4	4,1	35	54	122	The second of th
П	І. Посѣвъ-всходы	6/IX - 12/IX	6	21,5/16,2	41,6/27,2	-5,1	1	970	119,2	0,0	11,3	1,3	0,0	5	6	Въ сумму осадковъ и испар
Ячмень мъстный.	II. Всходы—цвътеніе	12/IX—1/IV	103	11,4/11,2	18,9/19,5	3,7	1	1.150,5	1.214,5	67,6	361,2	4,3	28	39	81	сяцы.
	III. Цвътеніе—созръван.	1/IV-5/V	35	24,4/19,0	38,6/26,3	10,4		666,2	736,5	9,2	115,9	4,3	7	10	35	son australi ili
(	IV. Весь періодъ	18/IX 30/V	157	17,1/15,3	27,9/23,1	7,2		2.401,8	2.483,4	78,9	553,8	3,9	38	52	135	Осадки и испаренія за ве
Красная	I. Посъвъ-всходы .	18/IX—25/IX	7	16.8/15,3	27,8/26,8	4,1	1	106,9	123,6	0,0	15,2	1,2	0	6	7	періодъ.
пшеница озимая.	II. Всходы—цвътеніе	25/ix—29/iv	118	13,5/12,5	21,9/20,2	4,9	- Constant	1.470,0	1.427,1	76,4	400,6	4,3	33	32	96	resurents, I all, Berein-ura
OSHM <b>asi.</b>	III. Цвътеніе—созръван.	29/IV—30/V	32	33,7/25,8	50,1/33,0	16,4		824,9	932,7	2,5	138,0	3,1	5	14	32	Періодъ покоя (зимой) искл
	IV. Весь періодъ	9/11—9/1V	121	20,2/16,4	32,8/23,7		+	1.981,5	2.222,7	50,18	343,3	4,7	28	37	102	чался.
Яровая	I. Посъвъ-всходы		20	5,0/4,8	10,9/12,7		-	95,8	98,9	17,3		6,8	4	3	6	Bros - remoit L. II Hearn - sexe
пшеница (арнаутка.	II. Всходы—цвътеніе.	. 1/mi—5/v	65		28,6/21,1			919,0	1.022,3		5 151,0	5,2	19	15	60	dun-anorod in the man
apnay ma.	III. Цвътеніе—созръван.	5/v—9/vi	36	35,4/26,9	52,7/34,4	18,6/17,3		966,7		2,9		2,7	5	19	36	de des de la lactione de con-
	IV. Весь періодъ	9/11—9/1v	121	20,8/16,4	32,9/23,7	8,3/8,8		1.922,1	2.224,2	50,18	5 343,3	4,8	28	37	102	washen and W. Ben neplozu
Яровая	1. Посъвъ-всходы.	. 9/II—1/III	20	5,0/4,8	10,9/12,7			95,8		17,3		6,8	4	3	6	been - ruccoll II
пшеница Ноэ.	II. Всходы – цвътеніе.	. 1/m—9/v	69		30,0/21,8			1.024,1					19	16	64	recommend if the Boundary-need
1100.	III. Цвътеніесозръван.		32	35,6/27,0	52,8/34,5	19,4/17,7		862,2						18	32	describer and the state of the

govi menangaki								- М-	гм- глу-	осад-	испа-	T.P.	1	сло д		
Названіе		Какой мёсяцъ.	Число дней въ періодъ.	Температу почвы	ура на пов и въ возд	цухѣ.		Сумма тем пературы воздуха.	Сумма тем- пературы почвы на глу- бинѣ 10 сант.	Сумма ос ковъ.	Сумма во	Облачность.	осад-	Ясныхъ.	Безмороз-	Примъчаніе.
растеній.	Періодъ роста.	leagon missings.	Числе въ пе	Средняя.	Максим.	Миним.		Cyr net no3	Cyr neg nog fore	Cyr	Cy	90	Съ	Ac	Без	
	rabar A til D							4,490,9	5.345,5	52,05	746,2	3,5	30	101	200	Послъдній морозъ —1,7° 24/ти
	V. Весь періодъ	10/11—15/1x	218	27,3/20,6	44,2/28,8			928,4	1.192,9	46,8	169,2	5,5	21	16	62	стар. ст.
	I. Первый укосъ	10/11—1/v	80	14,3/11,6	23,9/18,9	1	1	1.178,5	1.350,4	3,35	202,3	3,2	7	22	45	Первый осенній морозъ (-0,8°)
Люцерна.	II. Второй укосъ	1/v—15/vi	45		53,1/33,7			1.153,4	1.349,2	1,1	191,0	1,5	1	29	40	былъ 2/х, а снъгъ 24 ноября.
•	III. Третій укосъ	15/vi—25/vii	40	39,4/23,5				1.230,6	1.453,0	0,8	183,7	2,1	1	34	53	
	IV. Четвертый укосъ .	25/vii—15/ix	53	31,5/23,2	54,9/33,0	10,9/12,5										
		15 - 20/	98	37,3/28,5	58 4/35 8	17,7/17,2		2.790,4	3.136,1	2,3	440,2	1,9	5	65	98	
	IV. Весь періодъ	15/v—20/viii		36,2/28,2				112,7	126,1	0,1	19,4	3,7	1	1	4	
машъ.	I. Посъвъ-всходы .	15/v—19/v	4	37,9/27,5				1.403,2	1.670,2	1,1	243,3	2,1	3	34	51	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	II. Всходы—цвътеніе	19/v—9/vII	51	36,6/29,6				1.274,5	1.339,8	1,1	177,5	1,6	1	30	43	
	III. Цвътеніе—созръван.	9/vii—20/viii	40	30,6/20,6	00,4700,0	129,2,1-1,1		2.519,5	2.846,8	12,5	477,0	2,5	12	55	97	
(	IV. Весь періодъ	19/IV—17/VII	97	34,3/26,0	52,9/33,8	16,9/15,4		133,0	148,1	3,0	20,1	2,4	3	5	7	J. 2.0   e.H   a.H   E.E.   Start
Подсолнеч-	І. Посъвъ-всходы	12/IV—19/IV	7	23,7/19,0	37,9/25,1	11,8/12,8		1.375,0	1.521,8	9,15	288,3	3,4	9	23	55	lagrana an opril
никъ черный	II. Всходы—цвътеніе.	19/IV—13/VI	55			16.7/14,2		1.011,5	1.176,9	0	168,6	1,2	0	27	35	
грызовой.	III. Цвътеніе—созръван.		35		61,2/37,7		+	1.011,5	1.11.0,8	Ü	100,0	1,2	1		00	
de mantouries.	иожимо вымента							2.284,6	2.480,0	12,15	442,2	2,7	12	47	89	A LANGUAGE BAY TO THE RESERVE OF THE PARTY O
	IV. Весь періодъ	. 12/IV—9/VII	89		52,7/33,4		>	133,0	148,1	3,0	20,1	2,4	3	5	7	Taxan Area a see 19
Подсолнеч-	I. Посъвъ-всходы .	12/IV—19/IV	7	23,7/19,0			100	1.108	1.186,5	8,35	238,5	3,5	7	16	45	
маслянич-	II. Всходы—цвътеніе.	19/IV—3/VI	45				1 10204	1.043,4	1.145,4	0,8	183,6	1,8	2	26	37	TERM TO A STATE OF THE PARTY OF
ный.	III. Цвътеніе—созръван.	3/vi—9/vii	37	38,4/28,9	61,2/36,	7 18,1/17,7					100			100		The state of the s
		21/	00	24 7 196 1	53,4/34,	3 17,0/16,5		2.574,2	2.944,9	10,45		2,5	11	55	99	right that the little is the
energencers in 1996	IV. Весь періодъ	. 14/IV—21/VII	99				100	123,1	135,0	0,2	23,1	0,7	1	5	6	
Хлопчат-	І. Посввъ-всходы	14/IV—20/IV	6	THE PROPERTY OF THE PARTY.	6 49,6/32,		1353	1.302,6	1.505,3	9,15		3,4	9	23	53	25/іv быль градъ.
никъ King.	II. Всходы—цвътеніе.	. 20/IV—12/VI	53		7 60,1/37,		1	1.148,5	1.304,6	1,1	189,3	1,7	1	27	40	30/іх была лессовая буря съ пылью.
	III. Цвътеніе—созръван	. 12/vi—21/vii	40	39,0/20,	, 00,1/01,	10,2/10,1		3.481,1	4.018,4	11,25	577,2	2,3	12	. 80	133	ii bidibio.
	IV. Весь періодъ	. 14/IV—24/VIII	133	34,8/26,	2 55,2/34,	7 16,4/16,2		123,1	135,0	0,2	23,1	0,7	1	5	6	La de la
Хлопчат-	І. Посъвъ- всходы	14/rv - 20/rv	6			1 10,9/12,7		1.429,6	1.633,6	9,15		3,5	9	23	57	
никъ Affifi	II. Всходы—цвътеніе.	. 20/IV—16/VI	57			6 16,9/16,1	L	1.928,4	2.249,8	1,9	308,2	1,4	2	52	70	
Египетскій.	III. Цвътеніе—созръван		1 70	37,3/27,	59,9/36	9 16,5/16,5	5	1.020,4	2.210,5	1,0	000,2	1,1	le Ī	02		Pari + ar disco- lammu-na
HOLDINGE (BO10)	пи. цвысто ссерван							3.153,9	3.632,5	10,45	532,0	2,3	11	70	119	
	IV. Весь періодъ	. 14/IV—10/VII	1 119	CHIEF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PART		,8 17,2/16,6	77	123,1	135,0	0,2	23,1	0,7	1	5	6	Total Agent Control of the Control o
Хлопчат-	I. Посъвъ-всходы .	. 14/IV—20/IV	(	3 25,9/20			1 1 1 3	1.403,0	1.601,4	9,15	241,2	3,5	9	22	56	8 4 6.72 30.08 20.08 pergranty av
никъ тузем- ный.	II. Всходы—цвътеніе.	. 20/IV—15/VI	56			,6 16,9/16,0		1.627,8	1.896,1	1,1	263,7	1,2	1	43	57	8 9.8 0,11 0,8 same of the sam
1111111	III. Цвътеніе—созръван	15/ $v_1$ —10/ $v_1$	11 5'	7 38,8/28	,6   60,7/37	,7 18,1/17,5	5	0.00:	0.001	10						
		10/- 0/-	11	28 4 198	,8 55,7/35	17,4/16,8	8	3.024,3	3.601,6	10,25		2,3	10	66	113	regions nerge
	IV. Весь періодъ						1000	156,1	162,6	5,8	29,3	6,0	2	0	7	Auguston.
Кукуруза кутаисскій	I. Посъвъ-всходы .			7   27,1/22		Sale Carrier	100	1.567,7	1.934,2	3,35		2,8	7	31	61	n 2   8 a 2   2 a 4 2 2 a 6 2 3 a 6 2
гибридъ.	II. Всходы—цвътеніе.				CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR		1000	1.300,5	1.504,8	1,1	209,9	1,1	1	35	45	
	III. Цвътеніе—созръвал	н. 26/1v—9/v111	4	5   38,9/28	8,9 60,8/38	0,1 10,0/11,									i	

Табл. 13.

Сравненіе температуры, осадковъ и облачности въ урожайный и неурожайный годъ для хлопка съ 1910 годомъ.

RE-82, 70.21	Tex	перату	pa Cº.	Oca	адки — 1	nill.	Об.	ачнос	ть %.	
За какой періодъ.	Неурожай- ный годъ.	Урожайный годъ.	1910 г.	Неурожай- ный годъ.	Урожайный годъ.	1910 г.	Неурожай- ный годъ.	Урожайный годъ.	1910 г.	Примѣчанія.
		Barrier St.								12 (22)
Январь	- 3,3	- 0,8	3,3	48,6	18,8	15,1	63	48	65,3	
Февраль	2,4	4,0	4,6	24,5	26,0	17,3	52	58	63,6	Для урожайных годовъ типичны:
Мартъ	11,8	11,6	9,2	58,0	18,8	20,7	53	49	60,3	1) высокія t <sup>0</sup> въ
Апръль	18,0	18,6	18,9	28,0	43,0	8,8	37	34	43,0	мав, сентябрв и октябрв;
Май	22,3	25,2	26,1	41,0	9,4	2,5	32	25	28,6	2) t <sup>0</sup> максимумъ въ іюль:
Іюнь	27,8	27,4	27,0	5,3	5,0	0,8	15	27	21,0	з) малое количе-
Іюль	27,7	27,8	29,6	1,3	0,8	1,1	8	12	16,0	ство осадковъ въ мартъ, маъ, іюлъ,
Августъ	24,0	24,4	24,2	0,3	0.	0,8	7	13	21,0	августъ, сентябръ и октябръ;
Сентябрь	16,3	17,7	17,1	21,0	0,5	0,5	27	17	28,3	.4) большое количество осадковъ въ
Октябрь	8,7	10,4	11,2	28,0	4,4	6,5	42	39	47,0	апрълъ.
Ноябрь	4,8	4,8	- 1,6	38,0	6,0	2,1	56	37	55,3	Пнаментоможения
Декабрь	0,25	0,9	- 3,3	21,6	18,4	16,0	53	58	78,7	Для <i>неурожайныхъ</i> годовъ типичны:
			139-1112					1		1) низкія t <sup>0</sup> въ маѣ, сентябрѣ и октябрѣ;
За годъ	13,4	14,3	13,9	315,6	151,1	92,2	37	35	44	2) to максимумъ
9	0.05			0.4.5					0.0	въ іюнъ; 3) большое коли-
	-0,25		+ 1,5	94,7	63,2	48,4	56	55	69	чество осадковъ въ мартъ, маъ, сен-
3 » III-V весна. 3 » VI-VIIIЛЪТО	17,4	18,4	18,1	127,0	71,2	32,0	41	36	44	тябръ и октябръ.
	26,5	26,55	27,5	6,9	.5,8	2,7	10	17	19	41 F 4,108 1 - 6.5
3 » іх-хі осень.	9,9	11,0	8,9	87,0	10,9	9,1	42	31	43	THE THOUSANT OF THE
Заперіодъвеге-			phy (		i	.6			3,700	85.05   \$1.06.8   615°°
таціи хлопчатн. 5 мъс. (IV-30/IX).	23,6	24,4	24,8	68,9	15,7	5,7	18,0	18,8	23,0	
	-,-	,-	-,-		.	,,	,,	,	0.335	11 12 10 11 2
ı						I				

### Полевыя культуры.

Полеводство Опытнаго поля въ 1910 году велось на 50 десятинахъ, въ 7 сѣвооборотахъ, какъ въ 1909 году, съ той лишь разницей, что въ Стебутовскомъ сѣвооборотѣ 1 поле (паровое) совершенно уничтожено, а замѣнено 2-мъ посѣвомъ въ лѣто (послѣ овса) бобоваго маша— на зеленое удобреніе; кромѣ того, арендатору Лежавѣ сдавалось по прежнему 54 десятины—главнымъ образомъ подъ люцерну (изъ 1/8 урожая) и за этотъ участокъ съ него получено въ 1910 году 1228 руб. 64 коп., а затѣмъ на солонцевомъ пастбищѣ ему же было сдано на годъ посѣвъ пшеницы, маша и хлопчатника 12,5 десятины по по 5 рублей за десятину. Опыты съ изученіемъ хлопчатника и другихъ растеній ставились на особыхъ участкахъ—опытномъ и селекціонномъ (2 дес.), въ вегетаціонной будкѣ, построенной въ 1910 г. (см. рис. 1) и на всѣхъ тѣхъ поляхъ сѣвооборотовъ, гдѣ сѣялся хлопчатникъ. Сколько и какихъ посѣвовъ было натопытномъ полѣ въ 1910 году, видно изъ слѣдующей таблицы:

На опытномъ:	полъ.	Пло- щадь.	Урожай съ дес.	Валовой до- ходъ со всей площади.	Посѣвы арендатора.
Хлопчатникъ	onskadbe	14 дес.	75 п.	5500 руб.	7¼ дес.
Люцерна	umuð, þ	11½ »	500 »	2000 »	40 »
Кукуруза		4 »	100 »	400 »	1/ <sub>4</sub> »
Озимая пшеница		1/4 "	70 »	230 »	6 »
Озимый ячмень		3/4 "	98 »	300 "	The state of the s
Машъ		43/4 "	55 »	280 "	1 350 <u>713</u> 03034452
Свекла кормовая		21/2 0	680 »	375 »	REPARTMENT REPART
Яровой овесъ		1 3	72 »	72 »	TERLEMENT ARRESTORY
Подсолнечникъ		1/3 "	35 n	25 "	1/4 »
Кунжутъ.		1/5 »	25 "	. 14 »	ing to <del>ma</del> ke Mana and pine in the sa
Серго-джугара		1/5 »	120 »	24 »	_
Просо		1/5 ))	85 »	17 »	<u> </u>
Новыя растенія		1/2	_		
Подъ паровой обработ			_	1881 <del>-</del> 11 198	

Итого . . . . . 50 дес. 9237 руб. + за  $54^{1}$ /2 дес. -1228 руб.

а всего—10465 руб. Валовой доходъ на 1 десятину, слъдов.—184 руб., а съ десят. арендуемаго участка—чистый—22 руб.

Въ частности, десятина хлопчатника дала валового дохода 390 руб.

Большимъ плюсомъ для полеводства Опытнаго поля въ 1910 году быто устройство администраціей канала Николая I особой подпруды на каналѣ, позволявшей вывести воду для опытнаго поля непосредственно изъ магистральнаго канала у ЮВ границы опытнаго поля, отдъльно отъ крестьянъ.

#### Хлопчатникъ.

Хлопчатникъ въ 1910 году, какъ сказано раньше, пользовался идеальной для него погодой-и съ лихвой вознаградилъ хлоповодовъ за всъ труды и затраты, которыя были положены на уходъ за нимъ, давъ отличный урожай у старательныхъ хозяевъ, что позволило имъ расквитаться съ долгами и убытками 1908 неурожайнаго года. Но этотъ благопріятный хлопковый годъ быль таковымь въ полной мірь, именно лишь для старательныхъ хлопководовъ, такъ какъ хлопчатникъ въ этомъ случав могъ использовать до конца всв зависящіе отъ воли самихъ хозяевъ факторы его роста, какъ-то: удобреніе, мотыженіе, поливки и проч. и развилъ во всю мочь свои сили и продукцію; тогда какъ для плохихъ культиваторовъ-при неумълой поливкъ, отсутствіи удобренія и большой сорности полей-хлопчатникъ былъ только среднимъ и по количеству, и по качеству урожая волокна. Если Кузьма Ретунскій на показательномъ хозяйствъ Голодной Степи или крестьянинъ Иванъ Косыхъ получили на своихъ поляхъ (по зеленому удобренію, при междурядной обработкъ и проч.) по 100-120 пудовъ хлопка-сырца съ десятины и при цѣнѣ его въ 4 руб. 70 к. имъли до 500 руб. валового дохода съ десятины хлопчатника, то рядомъ же съ ними многіе крестьяне-при небрежномъ отношеніи къ удобренію и обработкъ-собрали хлопка не больше 40-60 пуд. съ десятины на кругъ. Въ виду отмъченныхъ обстоятельствъ детальное изученіе вліянія различныхъ факторовъ роста хлопка-удобреній, поливокъ, способа посъва, вспашки, чеканки и проч. въ такой годъ, когда помянутыя условія дійствують при оптимальных метеорологическихъ условіяхъ, является особо необходимымъ; къ счастію въ 1910 г. на опытномъ поле въ Голодной Степи, какъ разъ съ хлопчатникомъ, и были широко поставлены всевозможные опыты. Выше, въ общей части отчета, мы привели уже результаты фенологическихъ наблюденій надъ хлопчатникомъ, а также лабораторныя изследованія семянь и волокна у разныхъ сортовъ хлопчатника урожая 1910 года; теперь обратимся къ полевымъ опытамъ.

Культура хлопчатника на всёхъ поляхъ и опытныхъ дёлянкахъ велась рядовая, съ пропашкой междурядій коннымъ планетомъ; пріемы рядовой культуры хлопчатника, какъ и другихъ пропашныхъ расстеній, обычны: съ осени подъ хлопчатникъ производится глубокая вспашка плугомъ Сакка 7", по возможности, послѣ предварительной поливки поля; ранней весной въ концѣ февраля, въ началѣ марта такія поля лущатся или дискуются бороной Рандаля; далѣе, если посѣвъ хлопчатника производится въ концѣ марта, то поле подъ хлопчатникъ пашется подъ посѣвъ илугомъ Сакка на 3 вершка безъ предпосѣвной поливки; при апръльскомъ же посѣвъ



Рис. 1. Вегетаціонная оранжерея.



Рис. 2. Мотыженіе и пропашка хлопчатника.




Рис. 3. Дълянки хлопчатника на опытномъ участкъ.

поле до вспашки поливается, и по нъкоторымъ просыханіи почвы (до спълаго состоянія) пашется плугомъ Сакка на указанную глубину, затъмъ боронуется въ одинъ слъдъ французской бороной и затъмъ уже съется хлопчатникъ (мочеными 1½ сутокъ съменами) однорядной свялкой Баннера, при чемъ между рядами дается разстояніе въ 1¼ арш., а въ рядахъ, между гнѣздами, 8 — 12 вершковъ и въ каждомъ гнъздъ оставляется при проръживании всходовъ по 3 куста хлопчатника; всходы проръживаются руками спустя 10—15 дней по появленіи; дальнъйшій уходь за хлопчатникомъ состоить въ 2-3 кратномъ мотыженіи сапками въ самыхъ рядахъ хлопчатника (рис. 2), въ 2-3 кратномъ пропахиваніи междурядій коннымъ пропашникомъ Планеть, при чемъ передъ орошеніемъ поля междурядья пропахиваются планетомъ съ отвальчиками и бороздникомъ-для проведенія оросительныхъ бороздъ; орошеніе хлопчатника производится 3—5 разъ за весь вегетаціонный періодъ, главнымъ образомъ въ періодъ цвътенія, и на десятину расходуется около 500 куб. саж. оросительной воды. Другіе пріемы культуры хлопчатника указаны ниже при описаніи опытовъ съ нимъ.

Сорта хлопчатника. Всего въ 1910 году испытывалось на опытномъ полѣ 24 сорта хлопчатника, не считая гибридовъ и отдѣльныхъ, отклонившихся (флюктуировавшихъ по де-Фризу) кустовъ хлопчатника, число коихъ, какъ видно изъ таблицы 10 и 11 и описанія величины коробочекъ и волокна, доходило у насъ (въ результатѣ индивидуальнаго отбора въ 1909 году) до 10.

При селекціи хлопчатника мы задаемся цёлью не созданія новыхъ формъ растенія, а пользуясь свойствомъ выдёленія изъ опредёленнаго сельскохозяйственнаго сорта входящихъ въ него расъ, стремимся фиксировать въ рядё поколёній лучшія—выгодныя для насъ свойства разновидностей.

Новыя формы растенія, какъ извъстно, возникають двумя путями, посредствомъ скрещиванія (гибридизаціи) и мутаціи (по де-Фризу)—гетерогенезиса; что же касается такъ называемыхъ флюктуацій (варіацій), то онѣ не вызывають новыхъ формъ и являются лишь колебаніями въ предѣлахъ данной формы. Относительно возможности у хлопчатника происхожденія новыхъ формъ путемъ гибридизаціи сомнѣваться не приходится, такъ какъ очень многіе теперешніе «сорта» его получились въ результатѣ скрещиванія; что же касается мутацій де-Фриза (гетеро-генезиса Коржинскаго), характеризуемыхъ какъ глубокія качественныя измѣненія иидивидуумовъ, производящія новыя формы, стойко передающія свои качества потомству, то, надо полагать, эти явленія внезапнаго возникновенія рѣдкихъ отклоненій у отдѣльныхъ экземпляровъ также имѣютъ мѣсто для хлопчатника, какъ и для другихъ растеній. Если мутанты могутъ имѣть и полезныя и безполезныя для растеній признаки, и разъ мутація, по де-Фризу,



есть единственный способь образованія новыхь формъ расъ, устойчивыхь въ потомствь, —то селекціонерамъ-хлопководамъ надо зорко слъдить за явленіями мутированія у хлопчатника и даже стараться на ряду съ селекціей флюктуирующихъ формъ, вызвать проявленіе мутаціи, поскольку ей, какъ утверждаетъ Коржинскій, можетъ благопріятствовать одинъ факторъ — хорошее питаніе и вообще оптимальное развитіе растеній. Такимъ образомъ, для созданія новыхъ формъ растенія, мутаціей мы можемъ пользоваться только случайно, гибридизаціей —всегда, хотя и путемъ долгаго и кропотливаго раздъленія въ потомствъ у гибридовъ доминирующихъ признаковъ отъ рецессивныхъ —по закону Менделя; что же касается флюктуацій, какъ результата колебанія формъ, зависящихъ отъ присущей отдъльнымъ растеніямъ измънчивости, вызываемой внъшними условіями и обусловливающей все многообразіе индивидуальныхъ формъ, то на ней, въ сущности говоря, и держится вся современная селекція.

Селенція, допустимая на опытныхъ поляхъ, можетъ быть только индивидуальной, если надо стремиться скоро и върно вывести новый, лучшій «сельскохозяйственный сорть» изъ имінощагося матеріала; валовая же селекція, при которой у хлопчатника, на глазъ, выбираются въ полъ лучшіе кусты и сырецъ съ нихъ смъшивается, можеть практиковаться лишь для поддержанія на изв'єстной высот'в урожая на хозяйственныхъ посъвахъ. Когда выбранъ удачно для данной мъстности сортъ-урожайный, скороспълый, съ хорошимъ качествомъ продукта, то уже въ предълахъ этого сорта и ведутъ обыкновенно индивидуальную селекцію. При индивидуальной селекціи на опытномъ полъ въ Голодной Степи наблюдателемъ на общемъ посъвъ обыкновенно тщательнымъ просмотромъ всъхъ рядовъ хлопчатника, выдъляются предъ началомъ перваго сбора хлопка лучшіе кусты его, развившіеся въ среднихъ условіяхъ поля (отнюдь не въ лучшихъ), и съ этихъ кустовъ отбирается около 10 лучшихъ коробочекъ со среднихъ ярусовъ; эти коробочки складываются въ отдъльные мъшечки, съ каждаго куста подъ особымъ номеромъ, соотвътствующимъ записи и характеристики куста въ тетради, гдф наблюдатель заносить измфренія высоты куста, числа вътвей, коробочекъ, качество съмянъ и волокна, времени посъва, цвътенія, созръванія и проч. Этотъ матеріалъ хранится съ надлежащими предосторожностями до весны слъдующаго года, когда послъ испытанія съмянъ на всхожесть, они высъваются въ отдъльные рядки съ каждаго куста.

Почва селекціоннаго питомника должна быть типичной—средней для данной м'єстности, безъ внесенія обильнаго удобренія, иначе трудно было бы сказать, какъ стали бы развиваться отборные кусты въ обыкновенной обстановк'я; участокъ для питомника долженъ быть открытымъ для солнца, не зат'єненъ деревьями, и ряды хлопчатника должны идти на немъ съ юга на с'єверъ, при чемъ разстоянія между

рядами должны быть не мен'ве 1¼—достаточными для пропашки ихъ коннымъ планетомъ, а гнъзда въ рядахъ—на разстоянія ¾ аршина; при прор'яживаніи всходовъ въ гнъздъ на селекціонныхъ участкахъ необходимо оставлять только по одному растенію (на хозяйственныхъ посѣвахъ—по 3 растенія), при посѣвъ же въ каждую лунку необходимо закладывать по 3—5 моченыхъ сѣмянъ. Длина рядовъ зависитъ, конечно, отъ числа отобранныхъ сѣмянъ, но желательно, чтобы въ цѣляхъ удобства пропашки они были длиною не менѣе 20 саженъ. (Въ Свалефскихъ питомникахъ для селекціонной пшеницы ряды дѣлаются около 3-хъ саженъ длиною); кругомъ селекціоннаго участка должно быть посѣяно по краямъ 2—3 ряда того же сорта хлопчатника, которые, однако, учету не подвергаются.

Самый отборъ въ каждомъ селекціонномъ ряду долженъ быть производимъ преимущественно съ кустовъ, находящихся въ срединъ ряда;
послъ отбора лучшихъ коробочекъ съ лучшихъ кустовъ, съ отмъткой
изъ нихъ скороспълыхъ и урожайныхъ заранъе, производится общій
сборъ со всего ряда и по нему опредъляютъ, какой изъ нихъ далъ
наибольшій урожай сырца, въ переводъ на одинъ кустъ, и на будущій
годъ отборныя съмена на селекціонномъ питомникъ высъваютъ уже
съ этого именно ряда, а затъмъ и съ другихъ, близко къ нему стоящихъ по урожайности; разумъется, съ лучшихъ кустовъ отбираются
сначала тъ коробочки, которыя дали больше сырца съ большимъ выходомъ волокна и тяжеловъсныя съмена.

Уходъ за селекціоннымъ питомникомъ—прорѣживаніе всходовъ, пропашка, поливка и т. д. должны быть обычными, какъ для другихъ полей.

Такъ какъ главнѣйшія особенности хлопчатника—высота стебля, число вѣтвей, коробочекъ, расположеніе ихъ на кустѣ, величина, ширина листьевъ и проч. передаются по наслѣдству, то отбирать лучшія растенія можно было бы уже до сбора коробочекъ, но во всякомъ случаѣ слѣдуетъ селекціонныя коробочки брать лишь съ хорошо развитыхъ стеблей, кустистыхъ, по возможности съ тонкими плодовыми вѣтвями, близко расположенными другъ къ другу и несущими коробочки ближе къ нижнему ярусу и главному стеблю хлопчатника, что важно для скораго созрѣванія.

Оцвика племенныхъ свойствъ хлопчатника должна включать слъдующія свойства его: форму, высоту куста, число вътвей, длину ихъ, число и величину коробочекъ—всъхъ и особенно нижняго и средняго ярусовъ, скоросиълость, однородность, выходъ, цвътъ, длину, тонину волокна, а также цвътъ, величину и въсъ съмянъ. Примъромъ корошо развитыхъ кустовъ хлопчатника можетъ служитъ кустъ сорта Кингъ, а плохого—египетскаго Ашмуни, а изъ упландовъ Russel's. По отборъ лучшихъ коробочекъ съ лучшихъ кустовъ, ихъ продолжаютъ и въ дальнъйшемъ размножать въ племенномъ питомникъ; остальной же

матеріалъ съ лучшихъ рядовъ высѣвается на участокъ размноженія, съ котораго уже получаются сѣмена для посѣва въ хозяйствѣ и ддя продажи; разумѣется, и здѣсь необходимо принять мѣры предосторожности для предотвращенія перекрестнаго опыленія отборныхъ сортовъ другими. Чтобы показать, какъ велика разница между неотборными и отборными индивидуальными кустами въ плодоношеніи и, значить, возможность улучшенія сорта по урожайности, приведемъ нѣсколько примѣровъ изъ отбора 1910 года.

Обыкновенные куст	ы.						оробочекъ на кустъ:
						всѣхъ	
Кингъ					1100	43	15
Кокъ-чигитъ.						45	18
Малля-чигитъ			1	The second		44	13
Тріумфъ						37	6
Руссель						50	15
Туземная гуза						40	8
Селекціонные кусты	[.						
Кипгъ						70	20
Кокъ-чигитъ.						80	22
Малля						77	17
Тріумфъ						50	7
Тріумфъ Руссель	•					60	18
Туземная гуза						52	10

Ведя селекцію даже только въ направленіи повышенія урожайности хлопковаго куста, приходится при учетв выхода и длины волокна констатировать большія отклоненія у разныхъ кустовъ одного и того же ряда въ смыслъ качества волокна; пользуясь этимъ, легко вести улучшение и по урожайности, и по качеству волокна. Въ приведенной ниже таблицъ качества волокна (стр. 47) нами указаны данныя измъреній волокна у разныхъ кустовъ многихъ селекціонныхъ сортовъ съ отдъльныхъ рядовъ; изъ таблицы видно, что сортъ Кингъ, напримъръ, выдълилъ три фракціи: у одной кусты были съ 4-хъ створчатыми коробочками, каждая въсомъ сырца въ 4,2 грамма и съ огромнымъ выходомъ волокна-около 36,7%; у другой, отмъченной присутствіемъ розоватыхъ пятенъ у основанія лепестковъ цвътка, коробочки были 5-ти створчатыя, каждая съ въсомъ сырца по 5,5 грамма и съ выходомъ волокна лишь 32,5%; у сорта Руссель были кусты съ выходомъ волокна 35%, но были и съ 28% волокна; Аунсболъ былъ съ выходомъ волокна 31,6% — при длинъ волокна 0,9 дюма, но былъ съ выходомъ въ 34,6% и длиною волокна 0.8 дюйма. Въ той же

таблицѣ (14-й) приведены измѣренія волокна у гибридовъ перваго поколѣнія, полученныхъ нами искусственнымъ опыленіемъ сорта Карачигить—Кингомъ и Кокъ-чигита—Русселемъ, а также египетскаго хлопчатника Афифи — упландомъ Кокъ-чигитомъ; тѣ гибриды, которые имѣютъ сырецъ (волокно и сѣмя) смѣшаннаго типа (отцовскаго и материнскаго кустовъ), дали при измѣреніи волокна и проч. такія уклоненія отъ родительскихъ кустовъ: гибридъ Кингъ-кара имѣль 4-хъ створчатыя коробочки и сырецъ каждой коробочки вѣсилъ по 6,4 грамма съ выходомъ волокна 34,9%, при длинѣ волокна болѣе 0,9 дюйма, между тѣмъ, родительскіе кусты имѣли: Кингъ—выходъ волокна 35,3%, длину волокна—0,8 дюйма, а Кара-чигить—выходъ 28,5%, и длину волокна—0,8 дюйма, а произведшіе его—Кокъ-чигить имѣлъ выходъ 33%, длину волокна—0,9 дюймовъ, а Руссель—выходъ 35,2 и длину волокна—1 дюймъ.

Изъ всѣхъ 24 сортовъ хлопчатника, указанныхъ въ нижеприведенной таблицѣ (кромѣ гибридовъ и селекцированныхъ въ особые ряды варіантовъ), испытывавшихся на опытномъ участкѣ (рис. 3) и 2-мъ полѣ основного сѣвооборота (при посѣва 14/IV), гдѣ каждому сорту было отведено по 100 кв. саж.,—самый большой урожай сырца въ 1910 г. далъ сортъ Кокъ-чигитъ—175 пуд. на десятину; вторымъ по урожайности оказался Аунсболъ—160 пуд., третьимъ—Русселъ—157 пуд. и только уже на четвертомъ мѣстѣ оказался знаменитый по урожайности сортъ Кингъ—130 пуд.; самый низкій урожай изъ старыхъ сортовъ далъ Ташкенскій упландъ—100 пуд.; а также—туземный—79 пуд. и египетскій—Ашмуни—70 пуд. и Афифи—60 пуд.

Изъ новыхъ сортовъ наибольшій урожай даль Allen-King-127 пуд., затъмъ Excelsior Prolific и Blue Ribbon - по 120 пуд., а самый низкій-Mells Select Egyptian-35 пуд.; наконецъ, 3 новыхъ американскихъ сорта, (полученныхъ отъ г. Гнъсина), чрезъ Управленія Земледьлія, дали такой урожай (при посывы 3/V): Кингъ американскій— 80 пуд., Тріумфъ-75 пуд. и Кукъ-35 пуд. Въ общемъ такого высокаго урожая сырца многіе сорта не давали даже въ хорошій 1909 годъ; сбавилъ урожай почему-то лишь извъстный сортъ Кингъ. Что касается вохода волокна и длины его у разныхъ сортовъ, то выходъ у большинства былъ въ 1910 г. уменьшенъ, а волокно короче, но кръпче средняго; наибольшій выходъ при массовой очисткъ сырца на джинъ дали новые сорта-Тріумфъ-37% и Кингъ американскій—36,8%, тогда какъ Кингъ опытнаго поля далъ выходъ 34,4%; удовлетворительный выходъ дали — Ташкентскій упландъ — 33% и Малля-чигить—32,9%; Египетскіе же сорта, давшіе въ 1909 г. 33—33,5%, въ настоящемъ году—лишь 30—32,9%; наименьшій выходъ быль у Mells Select Egyptian—26% и у Туземной гузы—29,8%. По длинъ волокна выдълялись сорта: Флоридоръ—1,5 дюйма, Southern Hope—1,2 дюйма, Excelsior—1,15, затъмъ Афифи—1,1 д., Кингъ 0,8 д. и короче всего волокно было у Туземной красной гузы—0,75 дюйма.

Процентъ перваго сбора выше всего былъ у Blue Ribbon-63%, затъмъ у Кинга — 62,4, Кара-чигита — 64%, а ниже всего у Mells Select Egyptian—33% и Кукь—24%. Наибольшій урожай сухого стебля (гуза-пан. см. рис. 5) былъ, въ процентномъ отношеніи къ въсу сырца, у египетскаго Афифи-66%, а изъ упландовъ у Hawkin's-50%, а наименьшій у Кинга—39% (83 пуд. на десятину). Измъреніе ширины волокна, дълавшеесся подъ микроскопомъ съ микрометрическимъ объективомъ и окудяромъ, показало намъ, что ширина волокна уже не такъ сильно колеблется у разныхъ сортовъ хлопчатника, чтобы говорить о ней, какъ о ръзко отличающемъ ихъ признакъ; большее значеніе, повидимому, при опредъленіи кръпости и вообще качества волокна имбють толщина ствнокъ и ширина канала волокна; какъ видно изъ табл. 11, наибольшая ширина волокна была у Кокъ-чигита 3-го сорта— 0,025 милл. и у Туземной Гузы— 0.024 милл., а наименьшая у Кара-чигить и у Аллен-кинга — 0,0185 милл.; толще всего стънки волокна были у Туземной гузы 0,0085 милл., у Аунсбола-0,007 милл., а тоньше всего у Афифи 1 сорта — 0,004 милл. и др.,; наибольшая ширина канала была у Афифи 0,01 милл. и у Русселя—0,008 милл., а наименьшая—у Аллен-кинга и Ташкентскаго упланда—0,006 милл.

Что касается длины вегетаціоннаго періода у разныхъ сортовъ хлопчатника, то она была такова: короче всего у Кинга, потребовавшаго отъ посъва до созръванія 1-хъ коробочекъ 97 дней и зацвътшаго на 60-й день, а длиннъе всего у египетскаго Афифи—128 дней до созръванія и Кука—126 дней; въ среднемъ же созръваніе у большинства сортовъ наступило на 104—110 лень отъ посъва. Всходы у большинства сортовъ появились на 7 день—при посъвъ 14 апръля, а цвътеніе—на 58—63 день, при чемъ самый укороченный періодъ отъ цвътенія до созръванія былъ у Кинга—33 дня, затъмъ у Карачигита—38 дней, Малля-чигита—41 день и у Русселя—42 дня, а самый длинный—у египетскаго Афифи—62 дня, Mells Select Egyptian—54 дня и у Туземной гузы—53 дня.

Наибольшее количество сформировавшихся коробочекъ на одномъ кустѣ (среднее изъ просчета на 50 кустахъ у каждаго сорта) было въ 1910 г. у Southern Hope—30 штукъ, у Египетскаго Ашмуни—37 шт., а наименьшее у новаго американскаго сорта Кукъ—19 шт. Средняя высота стебля у большинства сортовъ хлопчатника была 1 арш. 9 верш., наибольшая—у сорта Наwkin's—1 арш. 11 верш. и египетскаго Афифи—1 арш. 11 верш., а наименьшее у Туземной желтой гузы—1 арш. 6 верш. и Кукъ—1 арш. 4 верш.

Качество волокна, форма, величина, въсъ коробочекъ и съмянъ у разныхъ сортовъ хлопчатника, въ 1910 г.

Complete officers because	Oı	писані			некъ и сѣм гника.	анкі				Оп	ис	апі	e	в о л	окна	а хл	опка.	
Названіе сорта		а. метр. <sup>1</sup> ).		асъ	въ gram.	съмянъ.	створокъ.	%.		а вол		,,,	сѣмя				2000 23 1.5 12 4.5 1.5 12	
хлопчатника.	орма.	Величина въ сантиметр.	Всей коро- бочки.	Сырца.	Сѣмянъ.	Число с	число ст	Выходъ %	Средняя.	Боковыхъ волоконъ.	Концевы волоконт	Верхняго.	Средпяго.	Нижняго.	Голщина ²).	Крѣпость.	Цвѣтъ.	Нѣжность.
Remarkable of the section of	0 Ф		Одн	ОЙ	коробоч	к и.		Вы	- 15			имет	рахъ.	1 21 1	To.	Kp	ПВ	H
Туземный хлопчатникъ-гуза бълая	Я.	2,3,	5,6	4,3	3,0 сѣрыя.	36	5	30,0	18,8	19,4	18,3	19,0	19,3	18,3	Толстое.	Среднее.	Бѣлое.	Грубое.
Туземный—гуза красная	ута	$\frac{2,2}{3,3}$	5,8	4,6	3,з сѣрыя.	33	4-5	29,3	15,1	11,8	18,4	18,0	19,0	17,0	»	Слабое.	» .	»
Туземный—гуза желтая (малля)	10 С Н	$\frac{2,1}{3,2}$	3,8	2,9	2,2 желтыя.	26	4	22,1	14,5	14,0	15,0	15,0	17,3	13,4	»	»	Желтое.	»
Mells Select Egyptian—селек- ціонный	спло	2,7	6,8	4,4	3, <b>2</b> желтыя.	22	4	26,4	22,0	22,1	21,9	22,3	22,5	22,9	Тонкое.	Крѣп- кое.	Бѣлое съ жел- тымъ.	Очень иѣжио шелко
Гоже—съ опытнаго участка	пая	$\frac{3,9}{3,8}$	7,3	5,3	3,8	39	4-5	28,9	22,6	22,1	23,2	22,7	23,2	22,15	»	»	Желтое.	висто »
Египетскій хлопчатн. Ашмуни (гибридъ съ зелеными сѣ- менами)	К. р у.г.	$\frac{2,1}{2,7}$	5,5	4,1	желтыя. 2,7 зеленыя.	20	4	35,3	18,0	18,8	17,2	24,3	23,1	22,1	))	n	Бѣло- вато- желтый.	"
Египетскій—Афифи (гибридъ съ зелеными съменами)	]	$\frac{2,5}{3,2}$	5,7	4,2	3,2 зеленыя.	25	4	23,0	25,7	25,4	26,1	27,4	26,7	25,1	»	»	»	n

<sup>1)</sup> Величина коробочки: верхнія цифры обозначають ширину, а нижнія—длину коробочки.

<sup>2)</sup> Ширина волокна приведена въ особой таблицъ.

	Oı	гисані			екъ и сѣм. тника.	апъ						ні			окна	хло	пка.	
		p.	Вѣ	съ в	ъ gram.	HP.	OKB.		Длина	а воло	кна.	Длина	воло Вмян	окна				
Названіе сорта хлопчатника.	Форма.	Величина въ синаиметр.	о Всей коро- бочки.	о Сырца.	Сравну.	я Число съмянъ.	Число створокъ.	Выходъ %%.	Средняя.		концевыхъ волоконт.	дтэмг Верхняго.	Средняго.	Нижняго.	Толщина.	Крвпость.	Цевть.	Нѣжность.
, Египетскій—Ашмуни (съ се- лекціоннаго участка)	Я.	$\frac{2,2}{3,2}$	3,8	2,5	1,5 черныя го- лыя.	18	3-4	42,2	22,1	20,5	23,8	25,2	25,4	23,6	Очень топкое.		Бѣлое съ желтымъ оттѣн- комъ.	Очень нѣжное шелко- вистое.
Египетскій—Афифи (съ селек- ціоннаго участка)	нута	3,2	4,7	3,5	2,4 черныя го- лыя.	20	3-4	30,6	23,6	21,5	25,8	26,7	27,7	23,5	»	» (2016)	».	»
Египетскій — 5-ти гнъздный, мало волокнистый	плюс	$\frac{2,3}{2,9}$	6,1	4,6	3,5 черныя го- лыя.	30	5	25,0	15,6	12,7	18,5	20,1	20,9	18,3	Тонкое.	»	Бѣлое.	Нѣжное и шелко вистое.
Флоридоръ-селекціонный.	я с г	$\frac{2,7}{4,0}$	7,9	5,8	4,3 сѣрыя.	39	4-5	26,4	29,1	26,4	33,6	26,1	26,1	23,3	»	>>	»	Очень нѣжное шелко-
Флоридоръ — съ опытнаго участка	ругла	2,9	7,9	5,9	4,2 свътло-ко- ричневыя.	37	5	29,6	26,2	26,5	25,9	26,1	28,0	25,1	»	»	Вълое съ желтымъ оттън- комъ.	
Tindal—съ опытнаго участка	R	$\frac{3,1}{3,9}$	8,3	6,8	4,1 сѣро-бурыя	35	5	36,0	20,2	20,0	20,5	20,9	19,8	19,0	»	))	»	»
Gold Standard — съ опытнаго участка		$\frac{2,4}{3,2}$	7,1	7,7	3,4 коричнев.	32	4-5	38,6	19,6	19,0	20,2	19,5	20,6	18,5	»	Среднее	Бълое.	»

	A \								4							A			
	Y							Y		ilizolo:				162150	25500	1		1	
	Blue Ribbon — съ опытнаго участка	сплюснутая.	3,7	6,5	4,8	3,1 еѣрыя.	36	5	35,5	24,1	22,2	26,0	23,0	23,7	22,7	Тонкое.	Крѣп- кое.	Бѣлое.	Очень нѣжное шелко-
24	Тоже-селекціонный		$\frac{2,5}{4,0}$	7,4	5,8	3,6 сѣрыя.	34	4-5	31,3	19,9	20,5	19,3	19,0	20,7	18,0	»	Слабое.	»	вистое.
	Southern Hope — съ опытнаго участка	Круглая	$\frac{2,7}{3,4}$	6,9	5,2	3,4 съ́ро-бурыя	32	4	34,4	23,9	23,0	24,8	24,9	23,7	23,6	»	Крѣп- кое.	»	»
	Southern Норе—селекціонный	Kp	$\frac{2,6}{4,2}$	7,1	5,0	3,5 сѣрыя.	39	4-5	30,4	24,6	24,8	25,4	24,6	25,2	23,7	»	»	Бѣлое съ жел-	»
	Excelsior prolific—селекціонн		$\frac{2,7}{3,4}$	7,5	5,6	3 ,7 темно- сѣрыя.	33	4-5	32,5	23,1	22,9	23,4	23,2	23,6	22,2	))	,,	тымъ. Бѣлое.	»
	Тоже—съ опытнаго участка	Я.	3,3	6,6	5,0	3,5 темно- сврыя.	35	4-5	31,1	22,3	21,4	23,2	22,7	23,0	21,8	»	»	n	Нъжное и шелко вистое.
	Moss Improwed—селекціонный.	ಣ	$\frac{29}{3,6}$	8,3	6,3	4,0 сърыя.	32	4	36,2	19,1	19,3	18,9	19,7	19,9	17,4	»	Среднее.	Бѣлое съ жел- тымъ.	»
	Тоже—съ опытнаго участка	H .I	$\frac{3,1}{4,2}$	14,6	8,1	4,8 сѣрыя.	36	5	41,4	18,2	18,9	17,6	19,6	20,7	15,8	»	Крѣп- кое.	Бѣлое.	»
	Allen King-селекціонный	'n	$-\frac{1,2}{3,1}$	6,4	4,8	3,1 сфро-жел- товатыя.	29	4-5	34,9	21,9	22,1	21,7	22,7	22,8	21,0	»	»	»	»
	Allen King—съ опытн. участка	к р	$\frac{2,8}{3,8}$	8,3	6,0	3,8 сѣроватыя.	36	5	37,5	23,7	22,0	25,4	22,0	23,6	21,5	»	»	Бѣлое съ желтымъ оттѣнк.	»
	Тріумфъ—съ опытнаго участка.		$\frac{3,2}{4,5}$	12,3	9,6	6,0 желто-сѣ- рыя.	39	5	37,2	20,9	20,9	21,0	20,1	21,7	20,9	»	»	Бѣлое.	»
-	» селекціонный		$\frac{1,1}{3,2}$	10,8	8,4	5,3 съ́роватыя.	37	4-5	36,8	20,1	20,3	19,9	20,7	20,6	19,5	»	n	Бѣлое съ жел- тымъ.	Очень нъжное шелко- вистое.

- 49 -

.» ceachtionana		Onneal			екъ и съм тника.	i i i i b	1-2		(	Эпп	са	піс	9 1	3 О Л	окна	а хл	о и к а	
Названіе сорта		ичина		съ г	въ gram.	Число семянъ.	Число створокъ.	.%%		а вол		7	а вол съмян	ъ.				
хлопчатника.	8	Величина	Всей ко	Сврца.	Сѣмяшъ.	сло с	сло с		Средияя.	Боковыхъ волоконъ.	Концевыхъ волоконъ.	Верхняго.	Средияго.	Нижняго.	ша.	CTb.		ость.
Villa part — Normal San	0 D M 3.	-				THE STATE OF		Выходъ	ر ا ا			Name and Address of the Owner, where the Owner, which the		Hu	Голщина.	Крвпость.	Цвѣть.	Нѣжпость.
	ю	1	Одн	ой	коробоч	ки.		) M		Въ	милл	иметр	ахъ.			34	Н	
Тріумфъ новый американс	кій.	$\frac{2,8}{3,4}$	10,9	8,3	5,2 сѣроватыя.	35	4-5	37,4	22,4	21,8	23	22,7	22,2	22,9	Тонкое.	Слабое.	Бѣлый.	Нѣжное.
Кингъ новый америкапскі	i . E	2,0		5,7	3,5 съроватыя.	34	4-5	37,8	18,7	19,1	18,4	18,7	19,3	18,8	'n	»	,,	Грубоват.
Кукъ новый американскій		2,5	10,9	8,0	4,9 съроватыя.	39	4-5	36,7	21,9	21,3	22,5	22,15	21,9	22,5	>>	,	n	Нѣжное.
Кингь— селекціонный		3,5		5,8	3,4 сѣро-бурыя	35	5	35,8	16,0	16,2	15,9	17,0	15,2	15,8	))	»	»	Нѣжное шелко- вистое.
» урожайный	Tolib-	3,6	7,5	5,6	3,6 сърыя.	34	5	35,8	18,5	18,5	18,0	16,7	19,8	18,1	>>	Среднее.	n inglesses	»
» скороспълый	Tpey	$\frac{2,8}{3,0}$		4,2	2,6 сѣрыя.	26	4	36,8	18,4	18,9	17,8	18,8	18,1	17,3	,,	Крѣп. кое.		,)
Кингъ съ пятнами на ле	· ·     6			5,5	3,7 сѣрыя.	32	5	32,5	18,8	19,4	18,2	19,2	19,8	17,1	»	» -	n	»
Кингь—тоже		$\frac{2}{3}$	7,7	5,7	3,5 сѣрыя.	35	5	23,9	17,9	18,6	17,2	17,7	18,7	17,3	))	»	'n	n Distriction
Кокъ-чигить ранній	.    =	$\frac{2,4}{3,4}$		5,1	3,з зеленыя.	29	4	33,9	21,2	21,4	21,1	20,6	21,8	20,9	»	)	))	»
Аунеболъ ранній	HARRIST STATE OF THE STATE OF	2		6,7	4,7	38	5	31 /	17	18	16	0 18,5	18	16,	6 »	Среднее	Вълое	»
Aynoons pannin		3	4	, 0,,	свро-бурыя			31,0	1.,	0 10,	10,	0 10,3	10,	10,	0 "	ореднее	съ жел-	
» урожайный		$\frac{2}{3}$		6,1	3,9 сърыя.	32	4	34,	18,	1 18,	5 17,	7 18,3	19,	2 17,	8 »	Крѣп- кое.	Бѣлое.	,,
» скороспѣлый.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3		5,8	3,9 сѣрыя.	25	4	31,	18,	9 20,	4 17,	3 20,2	20,	8 18,	6 »	,,	»	n
Ранній Руссель		$\frac{1}{3}$	$\frac{0}{8}$ 7,6	7,8	4,2 сърыя— зеленыя.	31	4	26,	20,	6 20,	5 20,	7 19,9	22,	0 19,	6 »	n	»	,,,,,,,
Руссель урожайный		$\frac{2}{3}$	$\frac{7}{6}$ 6,8	5,4	3,5 сѣрыя.	29	5	35,	18,	1 18,	6 18,	2 18,2	19,	18,	0 "	Среднее	. »	>>
» скороспѣлый	1000	$\frac{2}{2}$		4,6	2,9 сърыя.	28	4	37,	19,	7 19,	7 19,	7 19,8	19,	7 19,	9 »	Слабое.	,,	»
Гибридъ Русселя—велено мянный	-съ   }	$\frac{3}{3}$	6 8,5	6,4		. 38	5	28,	17,	4 18,	2 16,	6 17,4	18,0	16,	7 »	Крѣп- кое.	n	»
Малля-чигитъселекціон	іый.	$\Rightarrow \frac{2}{3}$		4,5	2,9 желто-бу- рыя.		4-5	35,	19,	3 19,	2 19,	5 18,9	18,	19,	5 »	Слабое.	"	Грубоватое.
» ОПЫТНАГО	уч	$\frac{2}{3}$		5,8		34	5	33,	17,	18,	0 17,	1 17,0	18,	17,	3 »	Крѣп- кое.	,	Нѣжное и шелко- вистое.
» скороспѣл	ый	$\frac{2}{3}$	$\frac{8}{4}$ 7,	5,7		32	4	35,	7 15,	2 15,	6 14,	9 16,0	17,	5 14,	8 "	»	n	»
» урожайны	й	$\frac{2}{3}$		5,8	3,8 желто-бу-	33	5	33,	19,	0 19,:	2 18,	8 19,3	19,	18,	4 »	Среднее	. "	»
Кара-чигить—ранній		$\frac{2}{3}$	$\frac{8}{4}$ 7,1	5,3	рыя. 3,8 черныя го- лыя.	36	5	28,	17,	0 16,	0 17,	7 19,8	19,:	3 17,	9 »	»	»	»

1 |

	0:	писан			чекъ и сѣ тника.	анкм			(	и п (	c a	ніє	) ]	в о л	окна	хл	опка	.7
Названіе сорта хлопчатника.	Форма.	Величина въ сантиметр.	Всей коро-	Сырца.	дат. Срадина Сробо	я Число съмянъ.	Число створокъ.	Выходъ %%.		Боковыхъ волоконъ.	Концевыхъ волоконъ.	Верхняго.	Средняго.	Нижняго.	Толщина.	Крѣпость.	Цевтъ.	. Нъжность.
Ташкентскій упландъ ранній.		2,6	6,7	5,1	3,5 сѣрыя.	30	4-5	30,8	21,5	21,0	21,9	22,3	22,1	20,1	Тонкое.	Крѣп- кое.	Бѣлое.	Нѣжное и шелко-
Ферганскій ранній		$\frac{2,5}{3,2}$	6,7	4,9	3, <b>4</b> сѣрыя.	26	4	30,3	18,4	17,7	19,0	24,5	18,0	17,5	»	»	»	вистое.
Hawkin's ранній	Я.	$\frac{2,5}{3,0}$	6,5	4,9	3,0 сѣрыя.	28	4-5	37,7	18,0	18,3	17,8	19,4	19,4	15,7	»	))	»	»
Гибридъ Кингъ-кара	па	$\frac{3,4}{3,5}$	8,5	6,4	4,2 грязновато- сърыя.	33	4	34,9	19,4	19,2	19,6	19,6	19,8	19,0	))	))	»	»
» Кокъ-Руссель	y r	$\frac{2,5}{3,3}$	7,0	5,3	3,5 зеленовато- сърыя.	29	4	33,3	18,9	18,0	19,8	19,1	19,7	20,0	))	))	»	))
Кокъ-чигить съ солонцовъ	p	$\frac{2,5}{3,6}$	5,9	4,0	2,9	26	4	26,7	15,1	14,7	15,6	19,4	19,5	19,9	Толстое.	))	»	Грубое.
Кокъ-нижняго яруса	R	$\frac{3,2}{4,1}$	5,8	4,4	3,26	28,6	4	26,0	18,9	19,2	18,7	-		18	_	-	_	_
» средняго яруса		$\frac{3,1}{3,7}$	6,2	4,65	3,26	31	4	30,0	18,8	19,0	18,5	_	-	146	_	-	_ /	_
» верхняго яруса 3-й сортъ.	j = =	$\frac{3,7}{4,2}$	6,7	4,7	3,5	30	4,2	25,7	19,1	19,5	18,8		_	_		p. 688	E STATE	

Таблица 15.

Ширина волоконъ, толщина стѣнокъ и ширина канала волокна хлопка у разныхъ сортовъ хлопчатника.

Названіе сорта.	Ширина волокна. Мил	Толщина стѣнокъ волокна.	Ширина канала волокна.	Примѣчаніе объ окраскѣ волокна и пр.
Кокъ-чигитъ, 1 сорта	0,02	0,006	0,0065	Подъ микроскопомъ
» 3 »	0,025	0,002	1 (1)	волокно окрашено при
Афифи 1 сорта	0,019	0,004	0,010	разсматриваніи въ водѣ:
Руссель.,	0,02	0,006	0,008	1) стънки его-слегка желтоватымъ цвътомъ,
Тріумфъ	0,02	0,0065	0,007	а каналъ—съроватымъ.
Аунсболъ	0,021	0,007	0,007	2) въ хлорцинкіодъ —
Руссель 2 сорта	0,02	0,006	0,0075	ствики — синимъ цвъ-
Кара-чигитъ	0,019	0,006	0,008	томъ, каналъ-коричне-
Малля-чигитъ	0,019	0,0065	0,0065	вымъ. 3) въ реактивъ Визнера — стънки жел-
Кингъ	0,02	0,0065	0,0065	торозоватаго цвъта, ка-
Алленъ-кингъ	0,0185	0,007	0,006	налъ съроватого, а кор-
Hawkin's	0,02	0,0065	0,0065	ковое вещество — тем-
Excelsior prolific	0,019	0,0065	0,0065	наго цвъта.
Moss Improwed	0,02	0,0065	0,0075	
Ташкентскій упландъ	0,02	0,007	0,006	
Туземная гуза	0,024	0,0085	0,0065	
			(Stab )	

Большая часть волоконъ у большинства сортовъ хлопчатника при изслѣдованіи подъ микроскопомъ (въ водѣ и хлорцинкіодѣ) была безъ извитковъ или со слабой извитостью; больше всего извитковъ отмѣчено у сорта Excelsior prolific, затѣмъ у Кара-чигита, Малля-чигита, Наwkin's, Moss Improwed Тріумфа; мало ихъ у Флоридора, Русселя, Афифи и почти нѣтъ у Аунсбола, Кокъ-чигита, Кинга, а совсѣмъ нѣтъ у туземной гузы.

Кончикъ волокна у всѣхъ почти сортовъ тонкій, на концѣ закругленъ; толщина его равна: у сорта Афифи — 0,001 милл., Аунсбола—0,002, Кокъ-чигита—0,003, Кинга—0,002, Эксцельзіоръ—0,0015, туземной гузы — 0,002, у 1-го сорта Кокъ-чигита — 0,003, а у 3-го сорта — 0,005.

# - 5

## Результаты опытовъ въ 1910 году съ сортами хлопчатника.

		В	p e	М	я.	Уро	жай	на де	есятину вт	191	0 г.	кай года	Чис	ло ді	іей.	- 6	,	Кор	обоче	къ.
	Какой сортъ хлопчатника.	Посъва.	Цвътенія.	Созрѣванія.	I-ro cóopa.	Сырца.	% 1-ro cóopa.	Чистаго во- локна.	% волокна.	Стебля.	% сырца къ стеблю.	Средній урожа за 4 прежніе	Отъ посъва до всходовъ.	Оть посъва до цвътенія.	Оть поства	Длина волокна.	Высота куста.	Всѣхъ.	Сформиро- ванныхъ.	Опавшихъ.
+						пуд.		пуд.		пуд.		пуд.				въ ½0 дюйма.	верш.	4 .		
	Старые сорта.																			
1	Кокъ-чигитъ	14/IV	10/vi	26/vII	7/IX	175	60,0	551/2	31,8	132	53,7	82	7	58	103	21,2	1—10	24	21	16
2	Аунсъ-болъ	» ·	»	27/VII	»	160	50%	51½	32,3	109	60	50	7	58	104	18,0	1-10	24	22	13
	Russel's	,	11/vi	24/v11	))	157	58,2	51%	33,0	94	62	60	7	59	101	20,1	1- 9	27	23	13
4	Кингъ	»	12/vi	20/v11	»	130	62,4	44	35,5-34,4	83	61	77	7	60	97	18,5	1—10	23	20	16
5	Hawkin's	»	»	26/vII	n	117	54,8	38	32,5	114	50,8	52	7	60	103	18,0	1—11	26	22	18
6	Ферганскій	'n	14/vi	25/v11		116	57,5	37	32	95	55,2	68	7	62	102	18,4	1—10	26	24	14
7	Кара-чигитъ	n	»	23/vII	» ·	114	64,0	36	32,0	106	52	62	7	62	100	17,0	1-11	24	24	15
8	Мадля-чигить	»	13/vı	25/vII	,,,	110	56,3	36	32,8	91	55	69	7	61	102	19,3	1 8	23	21	16
9	Ташкентскій упландъ.	»	12/vi	25/vII	»	100	60,7	33	33,0	81	55	-	7	60	102	21,5	1- 9	22	19	18
0	Туземный—гуза бълая .	'n	17/vi	10/vIII	27/1x	74	_	22	29,8	50	59	60	7	65	118	18,8	1-11	26	18	14
1	Египетскій Афифи	»	18/vi	20/vIII	29/IX	60	_	19%	32,9	212	24	40	7	66	128	23,6	1—11	29	19	1
2	» Ашмуни	>>	16/vi	15/viii	»	70	_	21,0	30,0	151	31,8	45	7	64	123	22,1	1- 9	37	20	
	1, 1		ed Section 1	Lilea oa	Edward								1		ighti	1		1		
	Новые сорта.																			
13	King's американскій .	. 3/v	30/v	23/v	111 27/1	x 8	0 4	1,0 29	36,8		_   .			6 5	8 11	18 18,	7 1—	8 2	2 16	3
14	Тріумфъ			1 28/v				2,0 28			_   _	_ 7	0	6 5	7 12	21 22,	4 1—	6 2	1 16	3
15	Кукъ		5/VI	1 30/v:	III »	3	5 24	k,o 18	36,0		_   _	_   _	_	6 6	3 12	26 22,	1 1 -	4 1	9 18	3
16	Allen-king		v 15/v	1 27/v	11 24/1	x 12		7,0 42			_   _	- 11	0	7 6	3 10	04 21,	9 1—	8 2	5 2	1
17	Exelsior prolific	))	16/v			12	0 56	3,5 38	31,8		-   -	_ 8	0	7 6	4 10	07 23,	1 1—	7 2	9 20	()
18	Blue Ribbon		17/v	71 27/v	II »	12	0 63	3,0 32	32,2	_	-   -	- 10	00	8 6	5 10	04 19,	9 1—	9 2	5 2	2
19	Southern Hope	. »	20/v	71 5/VI	11 »	11	5 45	5,0 37	32,5		-   -	_ 7	5 1	0 6	8 11	2 24,	6 1—	8 3	0 10	6
20	Moss Impowed		18/v	71 29/v	11 »	7	7 60	0,0 26	3 33		_   _	_   _	_   ,	9 6	6 10	06 19,	1 1—	9 2	4 17	7
21	Флоридоръ		20/v	71 8/VII	« II	7	0 40	0,0 21	30		-   -	-   -	- 10	6	8 11	5 29,	1 1-1	10 2	6 14	4
22	Mells Select Egyptian.		23/v	18/v	III »	3	5 33	3,0	26	-	-   -	-   -	_ 10	7	1 12	25 22,	0 1-1	0 2	4 14	1
23	Туземный — гуза крас	3-	18/v	71 12/v	ш 27/1	x 6	7 -	- 20	30	-	-   -	-   -	-   '	7 6	6 11	9 15,	1 1—	8 2	6 26	3
24	Туземный—гуза желта (малля)	я	19/v	71 10/v	ıII »	6	2 -	- 20	32	-		-   -	-   8	8 6	7 11	7 14,	5 1—	6 2	8 28	3
24		. "	19/v	71 10/v	) »	6	2 -	_ 20	32	-	-   -	-   -	-   8	8 6	7   11	7 14,	5 1—	6 2	8 2	8
T	Ілина волокна у сортовъ	хлопчя	тника		y	план	ла –	- 1.1	дюйм.	Er	ипетс	жихэ	_1	4 дто	йм	Type	тхинм	_ 0	<b>7</b>	ÜN
1000	Зыходъ волокна %	SP HORA				»			7%		»			3%		1,786	»	911971	, дю ,1	. M.
														-//						

Вліяніе качества сѣмянъ хлопчатника. Опыты съ вліяніемъ сѣмянъ поставлены были въ 1910 году на ½ дес, селекціоннаго участка; посѣвъ былъ поздній—3 мая, созрѣваніе хлопчатника началось въ среднемъ 14 августа, а первый сборъ сдѣланъ 27 сентября. Какъ видно изъ таблицы 17-й, особенно разнились урожаи на дѣлянкахъ съ сѣменами 1-го и 2-го сбора, на дѣлянкѣ съ протравленными формалиномъ сѣменами и проч.; такъ, сѣмена 1-го сбора дали урожай сырца на десятину 65 пуд., а 2-го лишь 57 пуд., при чемъ созрѣваніе 1-го сорта началось съ 10/ущ, а 2-го—15/ущ.

При посъвъ сухими съменами получено 25 пуд. съ десятины, а мочеными однъ сутки 45 пуд., такъ какъ значительная часть сухихъ съмянъ не взошла, хотя съмена съялись въ очень влажную политую почву,—всходившія растенія развивались очень медленно; при протравливаніи съмянъ предъ посъвомъ въ формалинъ (0,2% растворъ) урожай сырца получился 67 пуд., а безъ протравливанія лишь 47 пуд. хлопка-сырца, при чемъ всхожесть у протравленныхъ съмянъ была 99%, а у не протравленныхъ—95%.

При посъвъ хлопчатника рано—3/пі, когда температура была еще около 6,7° С.—при средней мартовской t° въ 9,2° С., хлопчатникъ началъ всходить лишь 29 марта, да и тогда всходы были вялые, болъзненные, почему и урожай на этой дълянкъ получился низкій—25 пуд., тогда какъ при посъвъ 3 апръля, когда t° была уже 12°—при средней апръльской 18,9° С., дружные, здоровые всходы появились уже на 8-й день и урожай сырца получился въ два раза больше—50 пуд. съ десятины.

Очень интересную картину представляла дѣлянка съ опытомъ вліянія обсыпки моченыхъ сѣмянъ предъ посѣвомъ суперфосфатомъ, сѣрнокислымъ каліемъ и жмыховой хлопковой мукой: въ періодъ всходовъ, появившихся и на 7-й день, самые лучшіе, густые ряды были на дѣлянкъ съ суперфосфатомъ и отчасти съ сѣрнокислымъ каліемъ, на дѣлянкъ же со жмыхомъ всходы были рѣдкіе, слабые, вялые; однако, послѣ первой поливки и мотыженія хлопчатникъ на жмыховой дѣлянкъ началъ развиваться лучше и лучше и въ концѣ вегетаціоннаго періода онъ выглядѣлъ значительно лучше сосѣднихъ дѣлянокъ—кусты на этой дѣлянкѣ несли по 52 коробочки, тогда какъ по сѣрнокислому калію—лишь 37 коробочекъ; урожай на жмыховой дѣлянкъ получился въ 130 пуд. на десятину, а по суперфосфату— 100 пуд. и по сѣрнокислому кали лишь 60 пуд.

Вліяніе предшествовавшей посѣву хлопчатника обработки почвы видно изъ опыта съ глубиной весенней предпосѣвной вспашки (послѣ поливки). На ½ десятины во 2-мъ полѣ восьмиполья, въ одной половинѣ была произведена вспашка на глубинѣ  $2^{1/2}$  вершковъ плугомъ Сакка 7 д., а на другой—на 4 вершка тѣмъ же плугомъ; дальнѣйшій уходъ былъ одинаковъ на той и другой дѣлянкѣ: посѣвъ 3/v сѣялкой Бан-



Рис. 4. Опыты съ удобреніями (ближайшая дълянка удобрена кровяной мукой).



Рис. 5. Уборка стеблей хлопчатника (гузапаи).

	В	р е м	я.	da Ta	Вы	сота	. Чис	сло коробоч	екъ.
наименованіе опытовъ.	Посѣва.	Созр'вванія.	1-го сбора.	Урожай сырца (въ пудахъ).		Вершк.	Всѣхъ.	Сформиро- вавшихся,	Опавшихъ.
Посъвъ съменами 1-го сбора	3/v	14/viii	27/ix	65	1	7	50	30	5
» » 2-ro »	»	))	»	57	1	9	46	27	7
» » обсыпанными жмыхомъ	))	))	))	130	1	7	52	. 25	8
» суперфосфатомъ	<b>)</b>	»	»	100	1	8	48	23	9
» » сърнокислымъ кали	»	))	<b>»</b>	60	1	5	37	19	8
Съмена моченыя 1 сутки	))	»	»	45	1	6	42	22	7
» 2 сутокъ	n	))	»	42	1	7	41	20	5
» » 3 »	»	))	»	60	1	4	41	22	7
Сухія съмена	'n	))	».	25	10	- <u></u>			-
Протравленныя въ формалинъ	<b>)</b>	))	))	67	1	5	40	20	4
» въ мъдномъ купоросъ	»	))	» =	55	1	7	41	23	7
Не протравленныя	»	»	n	47	1	6	37	21	10
Крупныя съмена	))	»	»	69	1	9	46	25	6
Мелкія »	»	»	»	61	1	5	47	20	5
Количество съмянъ 4 пуда на десятину	»	»	»	47	1	6	31	18	7
» 2 » » -»	3/v	14/vIII	27/IX	52	1	5	33	16	9
Посъвъ 3 марта	3/111	24/vII	10/1x	25		3 to to		-	_
» 3 апръля	3/IV	25/vII	10/ix	50	-	-	_		

нера сорта хлопчатника Аунсъ-болъ, пропашка коннымъ планетомъ, 4 поливки. Всходы появились одновременно—9 мая, хотя по мелкой пахотъ нъсколько ръже, созръваніе началось 14/viii на объихъ, но шло быстръе на дълянкъ съ мелкой вспашкой, и къ первому сбору хлопка (16/іх) сырца получено по мелкой вспашкъ 60%, а по глубокой 50% отъ всего сбора; однако, весь урожай былъ выше по глубокой вспашкъ—77 пуд., чъмъ по мелкой—64 пуда.

Опыть со способами постава хлопчатника быль поставлень на выпаханномь, слегка осолоненномь 4-мь поль андижанскаго ствооборота, кътому же поставь быль сдълань довольно поздно—29/гу (сорть Кокъчигить); результаты этого опыта, на первый взглядъ, довольно неожиданный: выше, чты на сартовскихъ грядахъ (49 пуд.) получился урожай на дълянкъ съ разброснымъ поствомъ (54 пуд.), самый же низкій урожай даль ручной поставь на узкихъ грядахъ, сдъланныхъ окучникомъ, а высшій, какъ и прежде, рядовой поставь сталкой Баннера—59 пуд.

Чтобы объяснить пониженный урожай на грядахъ, по сраненію съ разброснымъ, надо припомнить, что на солонцеватыхъ почвахъ Голодной Степи, въ условіи средняго увлаженія (4 поливки), соли концентрируются именно на гребняхъ грядъ, и, разум'вется, растенія на нихъ уже съ момента всходовъ начинають страдать оть избытка солей,—тогда какъ при разбросномъ пос'яв он'я на гладкой поверхности поля распредъляются бол'яе или мен'яе равном'ярно, не концентрируясь, при чемъ скоро наступающее стъсненіе почвы зд'ясь густыми всходами тоже въ н'якоторой м'яр'я замедляеть притокъ солей къ поверхности почвы. Поэтому то, в'яроятно, сарты солонцеватыхъ раіоновъ Кокандскаго у'язда, съ близкими грунтовыми водами, почти исключительно с'яють хлопчатникъ въ разбросъ, не на грядахъ, и орошають его около двухъ разъ напускомъ, прим'яняя въ то же время поверхностное 2—3-хъ кратное мотыженіе поля.

Вліяніе числа поливонъ (сорть Кокъ-чигитъ). При взлядѣ на таблицу 18-ю, можно подумать, что въ 1910 году не замѣчается рѣзкаго вліянія числа и времени поливокъ на урожай хлопка: дѣйствительно, на одной дѣлянкѣ съ 5-ю поливками (1—3—1) получился высокій урожай хлопка 119 пуд., а на другой—съ тѣмъ же числомъ поливокъ и одинаковымъ распредѣленіемъ ихъ по періодамъ роста хлопчатника— урожай былъ только 72 пуда; далѣе на дѣлянкѣ съ 3-мя только поливками (1—1—1)—и то при одной лишь поливкѣ въ стадіи цвѣтенія, когда мы считаемъ нужнымъ рекомендовать, на основаніи прежнихъ опытовъ, самое большое число поливокъ для хорошаго урожая хлопка (3—4), урожай былъ почти одинаковый (71 пуд.) съ урожаемъ на упомянутой же дѣлянкѣ съ 5-ю поливками (1—3—1). Однако, во-первыхъ потъ той же таблицы видно, что максимальный урожай все-таки получился именно на дѣлянкѣ, политой во время цвѣтенія 3-4 раза (0—

## Вліяніе числа и времени поливокъ (цвътеніе 23—25 іюня).

Число поливокъ по главиванимъ	В	рем	я.	Уроз на дес		Проп	енты.	тво ороси- воды на у (въ куби- саж.).	Вы	сота	Числ	ю коробо	чекъ.
періодамъ роста (1-й до цевтенія, 2-й время цевтенія и 3-й—со- зрѣванія).	Посѣва.	Созрѣванія.	1-ro ccopa.	Сырца (въ пудахъ).	Стеблей.	1-ro céopa.	Сырца къ стеблю.	Количество с тельной вод десятину (въ	8 E	Вершк.	Всѣхъ.	Сформиро- вавшихся.	Опавшихъ.
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	29/IV	2/viii ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	10ix  )  )  )  )  )  )  )  )  )  )  )  )  )	82 88 78½ 89½ 71½ 66 81½ 72 72 73 84 86 74 62 97 83 130 67 71 73 85	52 38 58 62 54 59 65 36 78 71 56 57 65 76 55 69 83 56 77	45 60 60,5 50 48 57 61 66 67 57,4 56 47,3 50 46,4	58,6 69,8 57,3 58,9 48,8 52,8 52,5 66,9 51,9 54,8 56,9 52,1 62,2 56,1 62,2 54,9 50,7 46,8 60,3 60,7	552 473 317 464 425 547 611 782 700 650 523 635 671 585 567 414 519 437 449 561 624		0 5 3 4 0 3 2 7 5 2 4 3 4 3 5 7 2 4 6 3 4 6 6 7 2 4 6 6 7 2 4 6 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 4 7 4 7 2 4 6 7 7 2 4 6 7 7 2 4 6 7 7 2 7 2 4 7 7 2 7 2 4 7 2 7 2 4 7 7 2 7 2	38 46 40 40 29 21 33 36 25 29 27 29 31 37 41 33 27 33 30	20 25 23 24 18 16 22 24 18 20 20 19 15 19 24 23 22 21 19 18	22 44 77 122 144 188 189 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

3-0 и 1-3-1), въ общемъ-130 пуд. и 119 пуд.; а во-вторыхъ, указанныя несоотвътствія урожая съ числомъ поливокъ на упомянутыхъ выше дълянкахъ, объясняется тъмъ, что для разныхъ дълянокъ, хотя въ однимъ числомъ поливокъ въ одномъ и и томъ же періодъ, при орошеніи, давалось различное количество кубическихъ сажень воды и въ различные сроки, близкіе или удаленные отъ основного періоданачала цвътенія: такъ, оказывается, что если давать поливки во всъ періоды, но умъренныя (по 80-96 куб. саж. на поливку десятины), ограничивая число ихъ для перваго періода (до цвътенія) одной поливкой, для третьяго (созръванія) тоже одной и для второго (цвътенія) — увеличивая ихъ до 3-хъ, то получается наибольшій урожай хлопка; если же въ каждую поливку давать воды много (120 и болъе куб. саж. на десятину), при чемъ до цвътенія (16/v1) ограничиться лишь одной поливкой, при цвътеніи (17/уп) тоже одной и, наконецъ, одной при созрѣваніи хлопка (18/vm), то урожай получается плохой. Поэтому то въ 1910 г., какъ видно изъ таблицы, хорошій урожай получился и при 414 куб. саж. воды въ три поливки, и при 624 куб. саж. воды на десятину — въ 5 поливокъ, кромъ предпосъвной, а плохой урожай получился и при 5-ти поливкахъ съ 782 куб. саж. и при 3 поливкахъ съ 700 куб. саж., при чемъ здёсь вредно отозвалось на урожав, повидимому, не только отсутствие поливокъ при цввтеніи, но и обильная поливка до цвътенія (360 куб. саж.), а также одна обильная поливка въ первые двъ недъли цвътенія (172 куб. саж. 10/vII).

Повидимому, частыя, но умъренныя поливки при цвътеніи дають импульсь къ правильному развитію полныхъ коробочекъ на сформировавшемся уже кустъ хлопчатника, почему въ этихъ случаяхъ и число опавшихъ (отъ суховъя) коробочекъ не превышаетъ 23%, тогда какъ въ случать обильныхъ и ръдкихъ поливокъ % опавшихъ завязей достигаетъ 41—76%.

Вліяніе удобреній (рис. 4). Опыты съ удобреніями подъ хлопчатникъ въ 1910 году поставлены были на сравнительно богатомъ по азоту полѣ, недавно вышедшемъ изъ подъ люцерны, на основномъ сѣвооборотѣ; мы нарочно выбрали такое поле, чтобы выяснить дѣйствіе тѣхъ или иныхъ удобреній при хорошихъ почвенныхъ условіяхъ.

По закону минимума, если въ почвъ не хватаетъ хотя одного элемента (N, P или K), то другіе элементы замънить его для растенія не могутъ, сколько бы ихъ не вносили въ почву—при одинаковыхъ условіяхъ влажности и проч. Разсматривая табл. 19-ю по вліянію удобреній, можно подумать, что въ минимумъ нашей почвы будетъ азотъ и калій, такъ какъ хлопчатникъ отозвался на внесеніе этихъ удобреній сильнымъ повышеніемъ урожая—165 пуд. при сърнокисломъ каліи (противъ 130 пуд. на контрольной дълянкъ) и 150 пуд. при внесеніи селитры и замънявшихъ ее азотистыхъ удобреній—кро-

вяной мукъ, жмыха, при чемъ превышеніе урожая на дълянкъ съ азотистымъ удобреніемъ надъ контрольной достигало 10—26 пуд. сырца на десятину. Однако, такое заключеніе было бы не совсъмъ правильнымъ: повышеніе урожая хлопка наблюдалось только по той дълянкъ съ калійнымъ удобреніемъ, гдъ былъ внесенъ сърнокислый калій, тогда какъ каинитъ далъ даже пониженіе урожая (98 пуд.); поэтому объясненій для дъйствія сърнокислаго калія надо, повидимому, искать въ его физіологической кислотности, значитъ, въ косвенномъ вліяніи этого удобренія на почву, о чемъ я уже подробно говорилъ въ очетъ 1907 года.

Таблица 19. Вліяніе удобреній (сорть Кокъ-чигить).

	В	рем	я.	ца	Выс	сота	Ко	робоч	екъ.	66, 97-1 × 2 9 0 0 0
Наименованіе опытовъ.	la.	Зозрѣванія.	1-го сбора.	Урожай сырца (въ пудахъ).	PP	ста.	<b>.</b>	Сформиро- вавшихся.	пихъ.	Примъчаніе.
	Посѣва.	Cospi	1-ro	Урож (въ п	Apm.	Верш.	Bchxb.	Сфорд	Опавшихъ.	
Контрольная	27/IV	5/v111	18/ix	130	1	8	30	18	8	Всъ удобренія вно- сились 7-го марта 1910 г.
Томасшлакъ	))	»	))	150	1	7	32	22	8	30 пуд. на десят.
Суперфосфатъ	))	. ,)	))	102	1	5	25	15	7	12 » » »
Гипсъ		» »	)) )) j)	144 98 165	1 1 1	10 8 9	34 33 33	18 20 19	6 6 9	(двойной), 20 пуд. на десят. 24 » » »
Селитра	))	3)	))	150	1	8,	37	22	6	12 » » »
Сърнокислый амм.	>>	>>	))	146	1 1	7	40 30	26 20	9	12 » » » » 24 » » »
Костяная мука	))	))	))	150 140	,1	8	37	20	6	00
Жмыховъ (½ колич.) Кровяная мука	))	)) ))	))	156	1	10	41	26	8	23 " " " " " " "
Мясо-костная мука		))	. ))	143	1	10	39	24	10	27 » » »
Жмыхъ-суперфос.		))	"	174	1	10	51	30	10	40+6 пуд. на десят.
Навозъ 2.400 пуд.	))	· ))	))	175	î	10	46	27	8	2.400 пуд. на десят
N	))	))	))	120	_	_	_		_	
P	))	»	))	105		_	_	_	_	
K	))	>>	))	90	_	_	_	-	-	
N+K	))	n	))	130	-	-	-	-	-	
N+P	))	>>	))	115	-	-	-	-		
P+K	))	))	»	80	-	177	-	-	-	
N+P+K	))	>>	))	110	-		_	-	-	the asset Mi
Контрольная	))	))	))	100	-	-	-	-	-	

Во всякомъ случав, и опыты этого рода подчеркивають лишній разь то, что и на лучшихъ поляхъ у насъ имвется недостатокъ въ почвв азота и гумуса, и что въ нашихъ почвенныхъ условіяхъ двй-

ствують лучше не минеральныя удобренія (селитра, сфрнокислый аммоній и др.), а такія азотистыя, какъ жмыхъ, кровяная мука, навозь—вообще содержащія и гумусъ. Наибольшій урожай дала дфлянка съ навозомъ—175 пуд., столько же почти дала дфлянка со жмыхомъ — суперфосфать—174 пуд., при чемъ хлопковый жмыхъ (съ 7% N) вносился въ видъ мелкой муки, въ разбросъ, въ количествъ 40 пуд. на десятину, а суперфосфатъ, смъщивавшійся съ нимъ, въ количествъ 10 пуд. Далъе, высокій урожай дала также дълянка съ сърнокислымъ каліемъ—165 пуд., съ кровяной мукой—156 пуд., при чемъ мука вносилась въ количествъ 24 пуд. на десятину, затъмъ селитра—150 пуд.; наименьшій урожай полученъ по суперфосфату—102 пуда и каиниту—98 пуд. Всъ удобренія вносился до вспашки, и задълывались бороной Зиг-загъ; количество удобреній указано въ таблицъ.

Вліяніе способа и количества внесенія удобреній (сорть Кингь).

Таблица 20.

	В	рем	я.	ща	Выс	сота		Число робоче		
Наименованіе опытовъ.	Посъва.	Созръванія.	1-ro c6opa.	Урожай сырца (въ пудахъ).	му	Верш.	Всѣхъ.	Сформиро- вавшихся.	Опавшихъ.	Примѣчаніе.
Контрольная	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	14/VIII  "" "" "" "" "" "" 2/VIII 4/VIII 6/VIII 5/VIII	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	103 70 75 80 80 88 89 85 80	1 1 1 1 	7 7 8 11 10 — 9 7 7 6 7 6 7	33 34 44 40 — 38 30 32 31 30	17 20 26 28 22 — 24 17 18 19 18	14 14 	12 п. на дес. 13 » » » 20+12 п.надес. 48 п. на дес.

Примъчание. Урожай хлопка на дълянкахъ со жмыхомъ получился чиже, чъмъ по суперфосфату, потому что эти дълянки находились въ тъни, подъ деревьями, сильно угнетавшими ростъ хлопчатника: вслъдствіе этого приводимыя цифры урожая имъютъ только относительное значеніе.

Раньше всего созрѣваніе хлопка наступило по жмыху — суперфосфать, при чемь вы первомы сборѣ получено хлопка 69% оты всего урожая; затѣмы шли кровяная мука—52,2%, томасшлакь—61,4%, каинить—61,1%, жмыхь—59% и позже всего началь созрѣвать хлопокы по навозу—44% вы первомы сборѣ. Вопроса о рентабельности всѣхы этихы удобреній вы нашихы условіяхы мы касались вы отчетѣ 1909 года и теперы, вы виду сходныхы результатовы опыта 1910 года, мы могли бы повторить то же самое; о значеніи зеленаго удобренія, какы главнаго нашего удобренія, скажемы при описаніи опыта вы 2-польномы сѣвооборотѣ.

Чтобы отвътить на вопросъ, какъ и когда вносить удобренія подъ хлопчатникъ, нами были поставлены съ удобреніями еще два опыта—на 2-мъ полъ 8-мипольнаго съвооборота съ кровяной и мясокостной мукой (сортъ Кингъ), а другой—на 4-мъ полъ андижанскаго съвооборота со жмыхомъ и съ суперфосфатомъ (сортъ кокъ-чигитъ); результаты этихъ опытовъ сведены въ табл. 20-й и 21-й.

Таблица 21. Вліяніе времени внесенія удобреній.

	F BRESORY D	В	рем	я.	у р	ж о	ай.
Наименованіе	опытовъ.	Посѣва.	Созрѣ- ванія.	1-го сбора.	По жмыху.	По суперфос- фату.	По контроль- ному.
До поства	разбросъ рядовой	29/iv	2/viii	10/1x »	48 пуд. 62 »	1900 - 1900 1900 - 1900	48 пуд. —
% 1-го сбора		ili <u>u</u> ms		815 <u>—</u> 151	46%	e personal de la companya della companya de la companya della comp	47%
При посъвъ {	разбросъ рядовой въ лунки.	20/IV »	2/VIII » » '	10/ix »	70 пуд. 66 » 50 »	68 пуд. 50 » 94 »	60 нуд. 60 » 60 »
% 1-го сбора	as ilimeoty	<u>, 11</u> 013	104 0141	<u> </u>	46%	50%	45,8%
При прорижиси- вании 14/v	разбросъ рядовой въ лунки.	20/iv »	2/vIII »	10/ix »	40 пуд. 36 » 52 »	74 пуд · 82 » 62 »	62 пуд. 62 » 62 »
% 1-го сбора		- 3	-		50%	63%	70%
При цвътеніи 27/vi	разбросъ рядовой въ лупки	20/iv »	2/viii	10/x1 "	44 пуд. 47 » 24 »	90 пуд. 68 » 88 »	68 пуд. 68 » 68 »
% 1-го сбора		11_13/			68%	74%	60%
Въ сред посъвъ	немъ при	При п При п	осѣва. посъвъ проръжи проръжи	 ваніи .	55½ нуд. 62 » 43 » 35 »	70 пуд. 73 » 82 »	48 пуд. 60 » 62 » 68 »

При внесеніи кровяной муки 12/III, какъ и другихъ удобреній, наибольшій урожай даль хлопчатникъ (посъва 6/у) на дёлянкъ съ рядовымъ удобреніемъ, внесеннымъ съялкой Баннера,—103 пуд. сырца на десятину, тогда какъ на дълянкъ съ разброснымъ удобреніемъвсего лишь 88 пуд., при чемъ во второмъ случай вносилось полное удобреніе на десятину (24 п.), а въ первомъ-половинная (12 пуд.); контрольная дёлянка дала только 66 п.; слёдующій по величинё урожай дала дълянка, удобренная мясокостной мукой, внесенной въ разбросъ (въ колич. 26 пуд.)—84 пуд., далѣе-по кровяной + костяной мукъ-85 пуд., затъмъ-по кровяной мукъ+суперфосфать 80 пуд. и меньшій урожай—по половинному количеству жмыха и ½ костяной муки-75 пуд. Такимъ образомъ, внесеніе въ рядки легко разложимыхъ удобреній, какъ кровяная мука, за полтора-два мъсяца до посъва, даже въ половинномъ количествъ даетъ лучшій результатъ, нежели внесеніе ихъ въ разбросъ въ полномъ количествъ; трудно же растворимыя удобренія, повидимому, не совствить раціонально вносить подъ растенія (върядки), ихъдля скоръйшаго разложенія необходимо смъщивать съ большимъ количествомъ почвы (бороньбой при разбросномъ высѣвѣ), особенно же жмыхъ и мясокостную муку, во избѣжаніе вреднаго ихъ дъйствія на съмена и всходы хлопчатника, о чемъ говорилось выше. Впрочемъ, если жмыхъ вносить въ рядки до посъва значительно раньше (въ концъ февраля), то урожай и по нему получается больше, чёмъ при разбросномъ удобреніи, какъ показываетъ таблица 21-я, въ которой сведены результаты опыта по внесенію удобренія разными способами въ связи съ періодами вегитаціи хлопчатника. Этоть послодній опыть нельзя назвать особенно демонстративнымъ, такъ какъ результаты его въ значительной степени затушевываются плохими качествами почвы, солонцеватой, и вліяніемъ стъсненія на хлопчатникъ-отъ расположенныхъ съ южной границы дълянокъ деревьевъ; все же результаты опыта позволяють опредъленно сказать, что лучшій способъ внесенія удобренія жмыха въ моментъ посъва-разбросной, урожай сырца по нему-70 пуд. на десятину (при контрольной 60 пуд.), хуже рядовое внесеніе-66 пуд. и еще хуже внесеніе удобренія въ лунки, непосредственно подъ съмена - 50 пуд.; въ тоже время суперфосфатъ, наобороть, лучше всего дъйствоваль на хлопчатникъ при посъвъ, когда его вносили въ лунки и хуже — при рядовомъ внесеніи; въ дальнышемъ, жмыхъ дыйствовалъ хуже и особенно при внесеніи его въ періодъ цвътенія подъ кусты (при мотыженіи кетменемъ); суперфосфать же дъйствоваль удовлетворительно и въ стадіи проръживанія всходовъ (черезъ 2 недѣли послѣ посѣва), особенно при рядовомъ внесеніи его и еще лучше при внесеніи его въ періодъ цвътенія, когда онъ вносился въ разбросъ-90 пуд. хлопка, а отчасти гнъздо, около кустовъ, ниже всего урожай по суперфосфату получился при внесеніи его рядками—68 пуд., т. е. столько же, сколько и безъ удобренія.

Вліяніе плодосмѣна. Старый нашъ опыть съ вліяніемъ чередованія растеній на урожай хлопчатника въ двухпольномъ сѣвооборотѣ, былъ въ 1910 г. нѣсколько видоизмѣненъ на дѣлянкѣ по черному пару: одна половина ея была удобрена навозомъ (1200 пуд. на десятину), а а другая по прежнему не удобрялась. Результаты этого опыта, сведенные въ таблицу 22-ю, въ общемъ сходны съ данными прошлыхълѣтъ, только урожай по пшеницѣ въ 1910 году понизился, а по джугарѣ и машу повысился.

Таблица 22. Вліяніе предшествующихъ хлопку растеній.

Наименованіе опытовъ.		Время.			Высота		Число коробочекъ.			
		ванія.	ванія.		куста.		100000 0113 X	иро-	HXT.	
nkonskapen maako skus manus maar uuson maal	Посъва.	Созръванія.	1-ro c6opa.	Урожай сы (въ пудахъ)	Арш.		Всѣхт.	Сформировавшихся.	Опавшихъ	
ng pangualik anang ang dangan Sangarang ang ang ang	n drog n den	u du	BECAR					(TELLY)		
По кунжуту	27/IV	23/vII	30/vIII	60	1	4	16	10	13	
» озимой пшеницъ	))	))	»	71	1	4	16	10	12	
» хлопчатнику	»	»	»	77	1	6	19	11	16	
» кукурузъ	»	))	»	78	1	5	18	11	15	
» просу	>>	»	»	85	1	4	16	10	14	
» джугаръ	,,	»	»	86	1	4	15	10	12	
» машу	»	»	»	87	1	4	23	13	15	
» свеклъ	»	»	»	89	1	3	15	11	10	
» черному пару	))	»	»	117	1	5	20	12	18	
» зеленому удобренію	»	»	, » ,	125	1	7	23	13	15	

Наибольшій урожай дала дѣлянка по зеленому удобренію— 125 пуд. на дес.—и по черному пару 117 пуд., а самый меньшій— по кунжуту 60 пуд. Въ стремленіи приблизить къ практикѣ Туркестанскаго полеводства, не знающей почти посѣва маша первымъ растеніемъ въ лѣто, какъ у насъ въ основномъ сѣвооборотѣ, и отводящей ему мѣсто второго въ лѣто посѣва (пожнивное растеніе послѣ озимой пшеницы и ячменя), выводы нашихъ опытовъ съ плодосмѣномъ, говорящіе за желательность культуры хлопчатника при чередованіи его пропашными и машемъ,—заставляютъ насъ, принявъ всѣ

детали вопроса о съвооборотъ для хлопчатника (если онъ не можетъ быть поставленъ въ чередование съ люцерной), рекомендовать следующій съвообороть, сходный съ практикующимся въ нъкоторыхъ районахъ Америки: 1) озимая пшеница (или ячмень)+машъ на зеленое удобреніе, 2) хлопчатникъ, 3) хлопчатникъ-удобр. ½ жмыхомъ, 4) кукуруза или сорго-машъ на зерно (въ междурядьяхъ кукурузы, какъ это практикуется американцами съ коровьимъ горошкомъ). Выгоды такого съвооборота несомнънны: 1) онъ является и промышленнымъ, и кормовымъ, съ 50% площади хлопчатника, 2) плодородіе и хорошое строеніе почвы при немъ поддерживается внесеніемъ зеленаго удобренія и половиннаго количества жмыха, 3) хлопчатникъ по хлопчатнику, два года подъ рядъ, позволяетъ разсчитывать на меньшую сорность полей и лучшую подготовку почвы для хлопчатника, 4) машъ на зерно, не занимая особаго поля, свется между рядами кукурузы Кутаискаго гибрида и Бессарабской, когда послъдняя достигнеть высоты около аршина-предъ началомъ выбрасыванія мужскихъ метелокъ (у Бессарабской кукурузы); сама кукуруза при этомъ развивается хорошо, не угнетается машемъ, если развитіе между рядами ея дълается до 2-хъ и болъе аршинъ, а самъ машъ, въ свою очередь, хорошо стъсняеть почву междурядій, оставшуюся при незанятыхъ междурядьяхъ сухой, трескающейся—послъ послъдней поливки. Выгоды такой культуры и этого съвооборота мы уже провърили 2-лътними опытами посъва кукурузы съ машемъ въ междурядьяхъ ея и потому съ 1911 г. ръшили ввести указанный съвообсротъ вмъсто андижанскаго, сходнаго съ нашимъ основнымъ съвооборотомъ, и 3-хъ польнаго съвооборота, сходнаго со Стебутовскимъ.

Таблица 23. Вліяніе чеканки (сорть Кокъ-чигить).

Наименов. опытовъ.       гін до до да	SELECT SALES SELECTION AND AND ASSESSED.		Время.			Урожай.			Высота		Коробочекъ.		
1       Не чеканенный		Наименов. опытовъ.	Посѣва.	Созрѣванія.		. Сырца (въ пудахъ).	Волокна (въ пудахъ).	1-ro c6opa (Bb %).			Bchxs.	Сформиро- вавшихся.	Опавшихъ.
1       Не чеканенный	40	THE ACCOUNT OF THE	711	7 (1011	4,7,160	10,91	OIL	ATT		4, 1	i Sine		
Чеканенный рано—3/vi 3/v   14/viii   »   61   19   24   —   —   —   —   —   4екан. при цвът.—9/vii   »   »   84   27   47   1   3   49   27	OH	Чеканен. въ нач. цвът	27/IV	5/VIII	18/1x	50	16	60	1	_	_	_	
2 Чекан. при цвът.—9/vп » » 84 27 47 1 3 49 27	1	Не чеканенный	»	»	»	48	15	59		_		_	
4 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.311	Чеканенный рано-3/vi	3/v	14/vIII	»	61	19	24	_	_	_	_	
	2	Чекан. при цвът.—9/vii	) »	»	»	84	27	47	1	3	49	27	4
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	and	Чеканен. поздно—9/viii	»	»	»	77	24	46		THE		130 M	*
Не чеканенный » » » 60 19 32 1 7 33 21	96	Не чеканенный	»	V. 20	»	60	19	32	1	7	33	21	1

Послѣднимъ вопросомъ, разрѣшеніе котораго все еще продолжаетъ требовать постановки опытовъ (см. протоколъ совѣщанія по Опытному сельскохозяйственному дѣлу въ Туркестанѣ, напечатанный въ № 12 Туркестанскаго сельскаго хозяйства за 1909 г.), является вліяніе чеканки и числа растеній хлопчатника въ гнѣздѣ. Мы уже въ 1909 году категорически высказались за возможность рекомендовать только чеканку, произведенную въ періодъ появленія первыхъ цвѣтовъ; однако, во избѣжаніе повторенія упрековъ, которые намъ въ прошломъ голу пришлось выслушать отъ одного спеціалиста, что желанный пріемъ въ рукахъ сел.-хоз. экспериментатора можетъ оказаться всегда лучшимъ,—мы рѣшили произвести и еще разъ опытъ съ чеканкой, надѣясь результатами его убъждать хлопководовъ въ послѣдній разъ.

По отношенію къ чеканкъ опыть было необходимо повторить тымъ болье, что въ печати существуеть противополжное нашему мнъніе-относительно срока, когда ее надо производить. Въ отчетъ С. В. Понятовскаго о д'ятельности опытнаго и показательнаго полей въ Закаспійской области за 1898 и 1899 г.г. на стр. 41 дословно говорится слъдующее: «вторымъ пріемомъ, который было бы желательно ввесть на всъхъ плантаціяхъ, наравнъ съ гладкой культурой хлопчатника (рядовой посъвъ) является чеканка, которую, однако, надо выполнять своевременно. Наилучшее время для чеканки (ощипываніе верхушекъ), безпорно появленіе 3-й пары настоящяхъ листьевъ»..... Это значить та самая ранняя чеканка (25-30 день послів посіва), отъ которой мы все время, на основаніи опытовъ, предостерегали хлопжоводовъ, рекомендуя лишь чеканку среднюю-во время цвътенія (на 55-65 день). Въ 1910 году опыть съ чеканкой быль поставленъ на разныхъ поляхъ и въ разныхъ условіяхъ: при нъкоторомъ затьненіи хлопчатника (вблизи деревьевъ) и на открытомъ — солнечномъ мъстъ: результаты въ томъ и другомъ случав получались въ пользу, главнымъ образомъ, чеканки при цвътеніи, хотя у затьненнаго хлончатника превышение урожая чеканеннаго хлопчатника надъ нечеканеннымъ было всего лишь въ два пуда, тогда какъ у не затъненнагона 24 пуда (сорть кокъ-чигитъ); при ранней чеканкъ (при 3-хъ парахъ листьевъ) получилось, правда, тоже превышение въ одинъ пудъ надъ нечеканеннымъ; но эта прибавка по своей величинъ лежитъ уже въ предълахъ ошибки полевого опыта и за ней, разумъется, гнаться не приходится, тъмъ болъе, что производство чеканки стоитъ денегъ.

Поздняя чеканка въ началѣ созрѣванія (на 90 день отъ посѣва) дала тоже значительное превышеніе предъ нечеканенной дѣлянкой (17 пуд.), но это уже благодаря такой длительной осени съ сухой погодой, которая позволила хлопчатнику вегетировать до конца октября, и намъ пришлось хлопокъ собирать до первой половины ноября. Процентъ перваго сбора больше всего былъ у чеканеннаго при цвѣ-

теніи хлопчатника—47%, дал'є при созрѣваніи—46%, затѣмъ у нече-каненнаго 32% и меньше всего у рано чеканеннаго—24%.

Вліяніе густоты стоянія хлопковых кустовь. Опыть этоть быль поставлень на ½ десятины 4-го поля основного сѣвооборота съ сортомъ Кокъ-чигить: посѣвъ 27 апрѣля, созрѣваніе началось 5-го августа, а первый сборъ хлопка—18/ІХ. Всего было взято 3 дѣлянки и на всѣхънихъ междурядья сдѣланы шириною въ 1¼ арш., въ рядахъ же—на одной дѣлянкѣ разстояніе между гнѣздами давалось въ ½ арш., на другой въ ¾ арш. и на 3-й 1 арш., при чемъ на каждой изъ нихъ⅓ рядовъ была съ однимъ растеніемъ въ гнѣздѣ, ⅓ съ 2-мя и ⅓ съ 3-мя растеніями въ гнѣздѣ.

Таблица 24.

Вліяніе густоты поства (число кустовъ).

			Время. Урожай.					ай.	Выс	сота.	Кој	робоче	къ.
Н	аименов.	опытовъ.	Посѣва.	Созрѣванія.	1-ro cóopa.	Сырца (въ пудахъ).	Волокна (въ пудахъ).	1-ro c6opa (Bb %).	ку ли	Верш.	Bckxs.	Сформиро- вавшихся.	Опавшихъ.
P	язстояніе г	въ рядахъ:						Shirth Shirth					
INE.		рядакь. ( 1 куст	27/1v	5/vIII	18/IX	109	35	50	1	8	17	16	13
арш.	½ арш. {	2 »	»	»	»	190	60	53	1	7	24	20	12
	LETOOT A	3 »	»	»	»	210	66	61	1	7	30	25	16
11/4	BS CHOUS	1 куст	»	))	»	78	25	45	(1	7	20	16	10
BT	¾ арш.	2 »	))	"	»	140	44	58	1	7	23	18	13
цра	1.0825114	3 »	»	»	))	170	54	62	1	8	26	22	20
Междурядья	erenteen d	1 куст	»	»	))	100	32	45	1	7	19	17	14
жДЗ	1 арш. {	2 »	»	»	))	177	56	44	1	8	21	21	13
Me (		3 »	»	»	»	185	58	54	1	10	25	25	20

Примъчание. Число коробочекъ при 2 или 3 кустахъ въ гитадъ показано на всъхъ (2—3 куст.) въ одномъ гитадъ.

Какъ видно изъ таблицы 24-й, наибольшій урожай получился съ дѣлянки съ  $^{1}/_{2}$  арш. разстояніями между гнѣздами въ рядахъ и при 3-хъ кустахъ въ гнѣздѣ—210 пуд. на десятину, а самый меньшій— при 1 арш. разстояніяхъ и при одномъ кустѣ въ гнѣздѣ—100 пуд.; въ то же время и % перваго сбора оказался лучше всего на дѣлянкахъ съ  $^{1}/_{2}$  и  $^{3}/_{4}$  арш. разстояніями и тремя кустами въ гнѣздѣ

(60—62%) и ниже всего при 1 арш. разстояніи и одномъ кустѣ въ гнѣздѣ. По числу коробочекъ и вообще по развитію вегетативныхъ органовъ, одиночные и рѣдко стоящіе кусты были, однако, развиты сильнѣе, на нихъ насчитывалось по 19—20 коробочекъ въ среднемъ, тогда какъ на тройныхъ кустахъ только по 8—10 коробочекъ; но въ суммѣ на 3-хъ кустахъ въ гнѣздѣ получалось всегда по 25—30 коробочекъ, а это по перечисленіи на десятину слагалось въ значительное превышеніе урожая хлопка при густомъ состояніи кустовъ.

Итакъ, по этимъ вопросамъ уже три года къ ряду получаются въ Голодной Степи аналогичные результаты, а потому мы съ полнымъ основаніемъ можемъ считать эти результаты и наши выводы—вытекающими изъ объективныхъ данныхъ, а не функціей «навязчивыхъ идей».

### Яровые посѣвы.

Если мы рекомендуемъ хлопчатникъ съять въ съвооборотъ, то съ одинаковымъ вниманіемъ намъ приходится изучать и тъ растенія, которыя входять, кромъ хлопчатника, въ наши общіе съвообороты; указать лучшіе сорта этихъ растеній при мъстныхъ условіяхъ, лучшіе пріемы куьтуры, и проч.—все это должны мы ставить цълью работъ на Опытномъ Полъ на ряду съ культурой хлопчатника. Поэтому и въ этомъ году, какъ и раньше, нами заложено было довольно много опытовъ съ яровыми и озимыми посъвами.

Сорта пропашныхъ и другихъ яровыхъ растеній. Сорта подсолнечника. На Опытномъ участкъ въ 3-мъ полъ 3-хъ полья (солонцеватыя почвы) нами было высъяно 13/ІУ сортовъ подсолнечника: 3-выписанныхъ отъ Иммера и 3-нашего поля, отобранные по окраскъ съмянъ изъ общаго посвва. Подсолнечникъ получилъ двъ вспашки весной, полебыло бороновано послъ предпосъвной вспашки въ два слъда французской бороной и орошалось послъ всходовъ подсолнечника 3 раза; междурядья пропахивались два раза планетомъ и одинъ разъ подсолнечникъ мотыжился въ рядахъ сапками — при проръживаніи всходовъ; разстояніе между рядами были въ 1 арш., а въ рядахъ, между растеніями-14 вершк. Всходы появились почти одновременно у всъхъ сортовъ-19/ІУ; цвътеніе наблюдалось раньше всего у масличнаго бълаго-3/VI и исполинскаго—4/VI, а позднѣе всего у чернаго и свѣтло-сѣ-раго грызовыхъ—13—15 іюня; созрѣваніе скорѣе всего началось у темносъраго грызового подсолнечника—7/VII и позже всего—у чернаго грызового—17/VII; уборка подсолнечника произведена 28/VIII, а умолоть—15/VIII—посл'в досушки подсолнечника на крыш'в.

Результаты урожая съмянъ подсолнечника, за вычетомъ щуплыхъ, таковы: изъ грызовыхъ большій урожай даль темно-сърый опытнаго поля—62 пуда на дес., затъмъ черный—59 пуд. и, нако нецъ, свътло-сърый—56 пуд.; изъ масличныхъ — исполинскій далъ-48 пуд., масличный бълый—30 пуд., масличный полосатый—28 пуд. на десятину.

По развитію стебля наибольшимъ ростомъ отличался свѣтло-сѣрый грызовой подсолнечникъ—2¾ арш., а наименьшимъ—масличный бѣлый—1 арш. 14 вершк.; по величинѣ шляпокъ больше всего развить былъ свѣтло-сѣрый — 15 сант. діаметръ шляпки, и меньше—масличный бѣлый—12 сант.

Таблица 25.

#### Опыты съ сортами подсолнечника.

idadeidade	В	ре м	я.	r E	Вы	Высота		
Названія сортовъ.	a.	нія.	ванія.	жай зерна пудахъ).	сте	бля.	овна пляпки сантиметрахъ	
erogodonski sumio kusen ga Por azkikomov azemrodki bar	Посъва.	Цвѣтенія	Созрѣванія	Урожай (въ пудз	Арш.	Вершк.	Ширина (въ сант	
						1218 O K		
Темно-сърый грызовой	13/IV	7/vı	7/vII	62	2	10	13	
Исполинскій	»	4/vi	»	48	2	1950	14	
Маслянистый бълый	»	3/vi	9/111	30	1	14	12	
madminordin oblidin								
Маслянистый полосатый	»	5/vi	»	28	2	2	13	
	» »	5/vi 15/vi	» »	28 56	2 2	2 12	13 15	

Примъчание. Всходы подсолнечника появились 19 апръля. Уборка подсолнечника произведена 28 іюля, а умолоть—15 августа.

Сорта нунурузы. Для этого опыта была отведена вся десятина 3-го поля основного съвооборота и  $^{1}/_{2}$  дес. 1-го поля 8-миполья. Посъвной матеріаль быль частью выписанъ изъ Екатеринославскаго Агрономическаго Бюро (американскіе сорта кукурузы), частью быль свой. Высъвались всъ сорта рядовой съялкой Баннера 29/ІІІ; всходы появились 9/ІV; цвътеніе наблюдалось у разныхъ сортовъ съ 15/V по 13/VI, а созръваніе отъ 20/VII по 3/VIII; уборка початковъ у раннихъ сортовъ была произведена 15/VII, а у позднихъ—15/VIII. Подготовка поля и уходъ за посъвами кукурузы были одинаковы для всъхъ сортовъ взметъ поля съ осени, двъ вспашки весной, поливка предъ посъвомъ,

вспашка предпосѣвная плугомъ Сакка на 3 вершка, бороньба французской бороной въ одинъ слѣдъ, посѣвъ сѣялкой Баннера съ каткомъ, при чемъ разстоянія между рядами кукурузы были для всѣхъ одинаковы—1 арш., а въ рядахъ, во время прорѣживанія всходовъ, между гнѣздами, оставляютъ по <sup>3</sup>/4 арш. (въ гнѣздѣ одно растеніе); поливокъ кукурузѣ было дано 5 (около 500 куб. саж.: на десятину), пропашекъ коннымъ планетомъ 3 и мотыженій сапками (съ окучкой) два.

Таблица 26.

Сорта кукурузы.

Set Exploites a transmitter to \$18-	В	рем	я.	Уро	жай.		яя
Названія сортовъ.	Созрѣванія.	Цвѣтенія.	Посѣва.	Зерна.	Стеблей.	% зерна.	Высота стебля въ вершкахъ.
увотов фоктиональной для посу дын	15JFM	(01) H	MARE OF		anno. Estan		agga m or
Чинквантино	29/111	15/v	20/vi	91	95	49	35
Бессарабская	))	18/v	23/vi	150	150	50	38
Спасовская	))	17/v	21/vi	68	95	42	34
Мотто	))	20/v	26/vi	156	117	57	36
Мъстная.	))	22/v	29/vi	119	137	49	36
Конскій зубъ	))	13/vi	3/vIII	125	600	17	53
Кутаисскій гибридъ	))	4/vi	2/viii	127	435	24	45
Изъ Безенчука «Бессарабская»	))	16/v	23/vi	170	-	-	37
Стерлингъ	))	20/v	30/vi	165	a <u>—</u> 11		46
Лимингъ «Шапошникова»	))	19/v	28/vi	245	1 T 10	-	43
Ранній бълый зубъ	))	26/v	26/vi	140	_	_	39
Нордвестернъ	))	19/v	27/vi	107	_	-1	42
Желтый зубъ	))	18/v	26/v1	228		1719137	37
Лимингъ изъ Небраски	))	20/v	1/vIII	168	-	_	40 35
Диъпровской школы «Бессарабская»	"	19/v	27/vi	85			35
King	),	19/v	28/vi	122	3 43510	airon	37
Грушевская	))	18/v	28/vi	90			40
Броунъ конти	))	23/v	27/vi	87		N. T. H	35
Минезота № 23	))	30/v	30/vi	117		10 10	30

Примъчаніє. Всходы всѣхъ почти сортовъ кукурузы появились 9 апрѣия. Уборка раннихъ сортовъ произведена 15-го іюля, а позднихъ 15 августа.

Какъ видно изъ таблицы 26-й, наибольшій урожай зерна далъ сортъ Лимингъ Шапошникова (Екатеринославскій)—245 пуд. на десятину, къ тому же этотъ сортъ оказалсь довольно скороспѣлымъ—28/VI (на 90 день отъ посѣва); затѣмъ слѣдовалъ американскій сортъ «Желтый зубъ»—228 пуд., «Стерлингъ»—155 пуд., «Бессарабская кукуруза (изъ Безенчука)—170 пуд., далъе—«Лимингъ изъ Небраски»,

«Мотто»—165 пуд. и друг.; Кутаисскій гибридъ Опытнаго поля, по какимъ то причинамъ, далъ довольно малый урожай—127 пуд. и при томъ у него было много пустыхъ початковъ, хотя, впрочемъ, и у многихъ новыхъ американскихъ сортовъ кукурузы съ длинными періодами вегетаціи, это явленіе — неполные початки — наблюдалось тоже довольно часто, особенно у «Стерлинга», «Лиминга» и «Браунконти».

Самымъ скороспѣлымъ сортомъ оказался «Чинквантино», созрѣвшій на 80 день отъ посѣва, и «Спасовская»—на 81 день, позже другихъ созрѣли «Конскій оѣлый зубъ» на 124 день, Кутаисскій гибридъ — на 123 день и «Лимингъ» — на 120 день. % зерна къ вѣсу сухихъ стеблей былъ всего выше изъ нашихъ старыхъ сортовъ у «Мотто» — 57%, Бессарабскій — 50% и «Чинквантино» — 49%, а меньше всего—у Кутаисскаго гибрида —24% и «Конскаго зуба—17%.

Наибольшій рость быль у «Конскаго зуба»—3¹/3 арш., у «Стерлинга»—2 арш. 14 верш., а наименьшій—у «Кинга», «Чинквантино» и «Спасовской»—2 арш. 3 вершк. По поводу урожаєвь нѣкоторыхь изь этихь сортовь, надо сказать, что такіе сорта, какъ «Кутаисскій гибридь», Конскій зубъ дали пониженный урожай, вѣроятно, потому, что по условіямъ опыта эти высоко-стебельные, густые и поздніе сорта не получили оптимальнаго освѣщенія и достаточнаго простора въ почвѣ: разстоянія 16 х 14 верш., достаточныя для мелкихь сортовь— «Чинквантино», Бессарабской—и друг., очевидно, были малы для указанныхъ сортовъ, и они, разумѣется, не могли развить надлежащихъ початковъ; поэтому, для выясненія возможной урожайности разныхъ сортовъ кукурузы, необходимо сначала выяснить оптимальныя для каждаго сорта разстоянія и, сохраняя ихъ, сравнивать уже съ другими сортами.

Обычнаго вредителя початковъ кукурузы-гусеницы совки Heliothis у насъ въ 1910 году почти не наблюдалось, но, какъ сказано выше, многіе початки были недоразвиты, съ пустыми рядами. Изъ всъхъ сортовъ кукурузы отобраны были съ лучшихъ растеній выдающіеся початки, и съмена ихъ, въ порядкъ селекціонированія, будутъ высъяны въ 1911 году въ отдъльные ряды на съмянномъ питомникъ.

Сорта свенлы испытывались на 2-мъ полъ Стебутовскаго съвооборота, при чемъ замоченныя съмена свеклы высъвались 28/IV съялкой Баннера, съ разсчетомъ 1½ пуда на десятину. Поле подъ свеклу получило осеннюю вспашку, лущеніе въ первыхъ числахъ марта дисковой бороной и, послъ поливки 20/IV, оно было вспахано на 3 вершка плугомъ Сакка 7 д., затъмъ забороновано въ 2 слъда французской бороной, слъдомъ за которой шла съялка; разстояніе мелду рядами было одинаковое для кормовой и сахарной свеклы—14 верш., въ рядахъ же всходы, появившіеся 6/V, были проръжены до 6 вершковъ

между гнѣздами; поливалась свекла 7 разъ, мотыжилась 3 раза сап ками въ рядахъ, а междурядья 3 раза пропахивались культиваторомъ Држевецкаго; выкопка бураковъ произведена 10/IX.

Таблица 27.

# Сорта свеклы.

The second of the second secon	В	р е м	я.	Урожай
Названія сортовъ.	Посѣва.	Цвѣтенія.	Созрѣва- нія уборки.	у рожай корней на десят. пуд.
and and analysis (	904		10/	9.4001
1) Кормовая «Эккендорфская»	28/IV	enantical management	10/IX	2.400 1)
2) » «Тріумфъ»	»	-	»	1.554
3) Полусахарная	))	_	))	2.117
4) Сахарная «Каунчинская»	<b>»</b>	16-010	<b>»</b>	1.260
5) » «Клейнванцпебенская»	))		))	1.706

Примъчание. Всходы свеклы появились 6 мая. Уборка свеклы 10 сентября.

Урожай свеклы, хотя и получился не оченъ высокій, но по сравненію съ крестьянскимъ, онь быль почти въ 2 раза большій; это надо приписать, главнымъ образомъ, тому, что въ Стебутовскомъ сѣвооборотѣ поля имѣютъ, благодаря запашкѣ маша на зеленое удобреніе, довольно рыхлую и богатую почву; обработка же свеклы и уходъ за нею, при нашемъ рядовомъ посѣвѣ, были нисколько не лучше крестьянскихъ, такъ какъ крестьяне по условію съ сахарнымъ заводомъ (при станціи Кауфманской) должны были сѣять свеклу на грядахъ руками. Какъ видно изъ таблицы, максимальный урожай дала свекла кормовая Эккендорфская желтая—2.400 пуда на десятину, далѣе—полусахарная—2.117 пуд., затѣмъ кормовая Тріумфъ, сахарная Клейнванцлебенъ—1706 пуд. и сахарная съ Каунчинскаго завода при станціи Кауфманской.

Сорта яровой пшеницы, сѣмена которой были выписаны съ Безенчукской опытной станціи, высѣвались на опытномъ полѣ 9/ІІ въ 2—полномъ сѣвооборотѣ—подъ атмосферную влагу; вспашка была сдѣлана плугомъ Сакка на глубину 3-хъ вершковъ, поле заборонено въ одинъ слѣдъ французской бороной; посѣвъ произведенъ рядовой сѣялкой «крестьянкой», съ разсчетомъ сѣмянъ по б пуд. на десятину, и вслѣдъ за посѣвомъ шла поперекъ рядовъ французская боронакатокъ. Всходы пшеницы появились 28/ІІ, цвѣтеніе, какъ видно изъ

таблицы 28-й, наступило почти у всѣхъ сортовъ около 8—15 мая; созрѣваніе тоже—около 1—9 іюня. Урожай зерна получился больше всего у арнаутки—49 пуд. на десятину, затѣмъ у хлудовской—35 пуд., полтавки—33 п. и, наконецъ, у ноэ—26 пуд.; наиболѣе полное, стекловидное зерно было у арнаутки.

Таблица 28.

# Сорта яровой пшеницы.

District Distriction and the second	В				
Названія сортовъ.	Посѣва.	Цвѣтенія.	Созрѣва- нія уборки.	Урожай зерна.	
Jen Projentigna (pôms ostansy s	CONCLUSION.	13 [10] · 本發生	culations.		
1) Хлудовская	9/11	9 — 15/v	1 — 9/vi	35	
2) Hoə	<b>»</b>	8 — 14/v	»	26	
3) Полтавка	<b>»</b>	9 — 15/v	»	33	
4) Арнаутка	n	8 — 14/v	))	49	

Примъчаніе. Всходы яровыхъ пшеницъ появились 28 февраля; уборка пшеницъ—10 іюня.

Изъ сопоставленія двухъ крайнихъ по урожайности сортовъ— арнаутки и ноэ, сдъланнаго въ таблицъ 12-й, на стр. 34, можно видътъ разницу условій при развитіи этихъ сортовъ.

Сорта ярового овса, какъ и раньше, высѣвались и на 3-мъ полѣ Стебутовскаго сѣвооборота, послѣ свеклы; въ 1910 г. серія овсовъ состояла изъ 8 сортовъ, два изъ которыхъ—Шведскій и Австралійскій— Опытнаго поля, а остальные—Рыхликъ, Немерчанскій, Канадскій, Желанный, Гигантскій и Тріумфъ—были выписаны съ Безенчукской опытной станціи. Посѣвъ овсовъ произведенъ сѣялкой 8/П—подъ атмосферную влагу, и весь уходъ за овсомъ быль одинаковъ съ яровой пшеницей, съ той лишь разницей, что овесъ получилъ три поливки, а пшеница двѣ.

Всходы овсовъ появились на 21 день (29/II), цвътеніе наступило около 7—10 мая, а созръваніе у «Рыхлика» началось 25 мая и у Немерчанскаго—1—2 іюня, а у другихъ сортовъ около 8—9 іюня. Урожай зерна у разныхъ сортовъ ръзко отличный: максимальный былъ у «Рыхлика»—91 пудъ на десятину, затъмъ у Канадскаго—82 и, у Желаннаго—76 п., Немерчанскаго—70, а у поздноспълыхъ сортовъ—Шведскаго лишь 35 пуд., Тріумфа—37 п. и Гигантскаго 37 пуд.

Процентъ зерна къ массѣ соломы самый высокій былъ у Рыхлика—30% и у Канадскаго—38,5%, а самый низкій—у Желаннаго—16% и Тріумфа—21%. Опытъ этого годо какъ нельзя лучше подтверждаетъ наши предсказанія, сдѣланныя въ 1907 году (см. отчетъ за 1907 г., стр. 25) на основаніи разработки вопроса о критическихъ моментахъ роста овса; тогда мы говорили дословно слѣдующее: «для Голодной Степи, очевидно, приходится выбирать скороспѣлые сорта: Рыхликъ, Желанный, Канадскій и Немерчанскій». Изъ таблицы 12-й легко видѣть, какъ различны метеорологическія условія для ранняго сорта Рыхлика и поздняго—Шведскаго овса.

Сорта ярового овса.

Таблица 29.

	В	р е м	я.	Уро	жай.
Названія сортовъ.	Посѣва.	Цвѣтенія.	Созрѣва- нія уборки.	Зерна.	% зерна.
descript 1					
1) Рыхликъ	8/11	7—10/v	1/vi	91	30
2) Канадскій	>>	»	7/vi	82	28,5
3) Желанный	))	>>	8/vi	76	15
4) Австралійскій	n	>>	))	72	25
5) Немерчанскій	))	>>	2/vi	70	27,7
6) Гигантскій	>>	>>	9/vi	38	23,6
7) Тріумфъ	»	>>	8/vi	37	21,0
8) Шведскій	»	»	9/vi	35	21,5
		10,000,00	a section of		(155)

Примъчлніе. Всходы овсовъ появились 29-го февраля по 7 марта; уборка овсовъ производилась 10 іюня, хотя у Рыхлика и Немерчанскаго полная спълость наступила 1 іюня, у другихъ-же къ 7—10 іюня была лишь восковая спълость.

Сорта люцерны: туркестанской, французской и русской, сѣмена которыхъ были выписаны отъ Иммера, испытывались въ 1910 году на опытномъ участкъ. Посъвъ ихъ произведенъ въ разбросъ 4/III послъвспашки дълянокъ плугомъ Сакка на 3 вершка—и вслъдъ за однократной бороновкой спъло-влажной почвы зигзагомъ; задъланы съмена были въ два слъда французской бороной; поливалась люцерна всего 4 раза въ лъто.

Всходы появились 13/III, а цвътеніе (а съ нимъ и укосы люцерны)—въ разные сроки: раньше другихъ у французской люцерны30/VI и 2/VIII, затъмъ у русской—5/VII и 10/VIII и позже всего у туркестанской—10/VII—и 15 августа. Наибольшій урожай съна дала французская люцерна—490 пуд. на десятину, затъмъ русская—460 п. и наименьшій туркестанская—380 пуд. Повидимому, такую низкую урожайность Туркестанской люцерны (давно акклиматизированной здъсь) надо отнести на счетъ того, что въ Туркестанъ никогда и никто почти не занимается отборомъ лучшихъ кустовъ люцерны на съмена, да послъдніе не сортируютъ почти и по въсу и даже не отдъляютъ отъ кускуты, которая въ любой партіи сартовскихъ съмянъ составляеть около 10% отъ числа съмянъ; вся культура съмянъ люцерны, въ сущности, здъсь сводится къ тому, что для нихъ оставляютъ второй укосъ старыхъ люцерниковъ до созръванія съмянъ, ограничивая число поливокъ; затъмъ косятъ, молотять быками и отъвъваютъ на ръшетахъ.

Таблица 30.

# Сорта люцерны.

Location 1	В	р е м	я.	Урожай
Названія сортовъ.	Посѣва.	Цвѣтенія.	Созрѣва- нія уборки.	сухого сѣна.
Туркестанская	4/m	10/уп	1130876	380
Русская	»	5/vII		460
Французская	))	30/vi		490

Примъчаніє. Всходы люцерны—13 марта; уборка — во время цвътенія (2-го укоса)—10 іюля и 15 августа.

Морфологически испытанные сорта люцерны отличаются такими признаками (описаніе сдѣлано 12/VIII передъ вторымъ укосомъ): 1) французская люцерна была высотою 1¼ арш.; стебли ея, буйно развившись, полулежали; самый стебель у этого сорта круглый, голый, толстый; изъ пазухъ листьевъ выходятъ по 2 вѣтви; листья нѣжныя, не зубчатые, ланцетовидные, съ концевымъ шипикомъ; 2) русская люцерна высотою 15 верш.; цвѣтетъ около 1/8 посѣва (у французской же въ моментъ осмотра—12/VIII цвѣло 3/4 растеній); стебель 4-хъ гранный, полый, толстый, голый; листья нѣжные, узко-ланцетовидные, съ зубцами по краямъ, остроконечные; 3) туркестанская люцерна высотою 12 вершк., цвѣтеніе 12/VIII еще не наступило; стебель круглый, изъ пазухъ листьевъ выходитъ по одной вѣтви; листья большія, обратно яйцевидные, зубчатые по краямъ и безъ шипика на концѣ.

#### Вліяніе различныхъ факторовъ на яровые поствы.

Вліяніе удобреніи. Опыть вліянія удобреній на кукурузу и свеклу быль поставлень на ½ дес. селекціоннаго участка, при чемъ удобренія вносились 8/vii въ тѣхъ же количествахъ, что и подъ хлопчатникъ (см. табл. 31-ю и 32-ю) сорть кукурузы быль Кутаисскій гибридъ, а свеклы—сахарная Каунчинскаго завода. Посъвъ кукурузы и свеклы произведень 29/пі съялкой Баннера; дальнъйшій уходъ за посъвами быль одинаковымъ съ указаннымъ раньше (при сортахъ); поливались посъвы—кукурузы 5 разъ, свеклы 7 разъ. Цвътъніе кукурузы наблюдалось около 13/vi, а созръваніе 15/viii; уборка же кукурузныхъ початковъ произведена 10/іх, а бураковъ свеклы 10/х. Изъ таблицы видно, что наибольшій урожай кукурузы получился по удобренію кровяной мукой—180 пуд. зерна на десятину, затъмъ по каиниту—170 пуд., далъе по жмыху—суперфосфатъ 160 пуд. и проч.; на неудобренной дълянкъ получено 120 пуд. съ десятины.

Таблица 31. Вліяніе удобреній на кукурузу.

	В	рем	я.	У	рож	ай.	10B'b.	
Наименованіе опытовъ.	Посвва.	Цвѣтенія.	Созръванія.	Зерна (въ пудахъ).	Стеблей.	% зерна.	Число початковъ	
По суперфосфату	29/111	13/vi	15/vIII	143	233	38	1,1	
» жмыху	»	»	»	151	251	37,5	1,6	
» сърнокислому кали	))	»	»	157	255	38,1	1,7	
» мясокостной мукв	»	»	»	157	285	35,5	1,7	
» жмыху + суперфосфату	n	»	n	160	322	33,2	1,3	
» каиниту	»	»	D	170	300	36,2	1,4	
» кровяной мукв	n	»	»	180	320	35,8	1,6	
» контрольной неудобренной	»	»	**************************************	125	310	28,7	1,8	
DEPENDENT PRINCE STREET	arboard	885	16160480		onarib	donn	4007	

Примъчание. Уборка кукурузы (Кутаисскій гибридъ) произведена 10 сентября.

Наибольшій урожай стеблей дала дѣлянка съ удобреніями жмыхъ — суперфосфать—322 пуд., а наименьшій—по суперфосфату—233 пуд. Проценть зерна быль больше всего по суперфосфату—38,0%, а меньшій на неудобренной дълянкъ—28,7%.

Что касается урожая свеклы, то наибольшій получился съ дѣлянки, удобренной мясокостной мукой—1.781 пуд., затѣмъ по кровяной мукѣ—1.750, довольно высокій по суперфосфату—1.600 пуд. и ниже всего по сѣрно-кислому кали—1.454 пуд., тогда какъ съ контрольной получено 1.487 пуд. на десятину.

Таблица 32. Вліяніе удобреній на свеклу (сахарную).

Чъмъ удобрялось.	Время посѣва.	Урожай (пудовъ).	Вѣсъ 1-го корня въ фунтахъ.
Контрольная (безъ удобренія)	29/111	1.487	1,5
Сърнокислый кали	))	1.454	1,4
Жмыхъ	))	1.537	1,55
Жмыхь + суперфосфать	))	1.600	1,6
Суперфосфатъ		1.600	1,6
Каинитъ	»	1.625	1,6
Кровяная мука	»	1.750	1,75
Мясокостная мука	<b>»</b>	1.781	1,75

Примъчание. Уборка свеклы 10 октября.

Такимъ образомъ, кукуруза отзывалась лучше всего на внесеніе азотистыхъ и калійныхъ удобреній, а свекла—на азотистыя и фосфорно-кислыя удобренія.

Вліяніе удобреній на урожай маша сказалось мало: такъ, машъ по суперфосфату далъ 35 пуда зерна, съ неудобренной дѣлянки получилось 32 пуда на десятину, по сѣрнокислому калію—30 пудовъ и по гипсу 23½ п. Можетъ быть неопредѣленность вліянія удобреній на машъ слѣдуетъ отнести въ данномъ случаѣ на счетъ плохой почвы (бывшей подъ машемъ) — она быда солонцевата, быстро просыхала послѣ поливки и дѣлалась при просушкѣ твердой и плотной.

Удобреніе однольтней люцерны на опытномъ участкі и на бывшемъ питомникі было внесено въ разбросъ 15/пі, а жидкій нитрагинъ Сівверина (Московской бактеріологической лабораторіи имени Феррейна) вносился съ посівомъ сімянъ люцерны, которыя опускались въ смісь нитрагина съ молокомъ. Цвітеніе и укосъ у люцерны были по нитра-

гину и контрольной (посѣва 15/пп)—около 10/vi и 15/vin, а по осталь нымъ удобреніямъ (прошлогодній посѣвъ люцерны) — 20/v, 10/vin, 15/vin; поливались всѣ дѣлянки 5 разъ.

Таблица 33.

Вліяніе удобреній на машъ.

	удобряпось.									В	Урожай			
и й Р									Посѣва.	Цвътенія.	Созрѣва-	зерна (пудовъ).		
Суперфосфатъ	(-Ö .55							XIII	ro	9)	15/v	8/уп	19/vIII	33
Сърнокислый											»	»	»	30
Гипсъ			•								»	))	»	231/2
Контрольная											D	))	n	321/2

Примъчание. Всходы маша 19 мая, уборка 20 августа.

Результаты внесенія удобреній подъ люцерну таковы: высокій урожай дала люцерна, удобренная суперфосфатомъ и каліемъ—1.200 пуд., затъмъ—люцерна по полному удобренію (селитра + суперфосфатъ + калій); остальныя дълянки дали урожай ниже, чъмъ даже контрольная (1.100 пуд.), особенно дълянка съ селитрой и каліемъ—900 пуд.

Таблица 34. Вліяніе удобреній на люцерну.

B	о е м я.	Урожай
Посѣва.	Цвътенія и укоса.	сѣна (иудовъ)
u interes	10.00 DET 10.00 Les	202110011
15/III	10/vн и 15/vн	310
<b>»</b>	»	260
»	20/v, 10/vii, 15/viii	1.040
»	»	980
»	»	1.040
»	»	900
»	) and p	940
<b>»</b>	»	1.200
		1.140
» .	L. OEA - OEALMEL	1.100
	Посѣва.  15/III	Посѣва. Цвѣтенія и укоса.  15/пп 10/vп и 15/vпп

Примъчание. Уборка люцерны съ нитрагиномъ 10 іюля и 15 августа. Уборка люцерны съ удобреніями (3 укоса)—20 мая, 10 іюля и 15 августа.

Въ общемъ, удобренія на люцерну дѣйствовали не особенно эффектно, такъ какъ почва подъ ней была очень богатая и люцерна почти не нуждалась во внесеніи удобреній, развиваясь роскошно и безъ нихъ.

По нитрагину люцерна 1910 г. дала 310 пуд. съ десятины, а безъ него 260 пуд.; дёлянка съ нитрагиномъ выдёлялась отъ контрольной нъсколько больщимъ ростомъ, но въ общемъ выглядъла хуже, чімъ люцерна съ сосідней ділянки, гді быль внесень при посъвъ съ съменами суперфосфатъ (урожай съ этой дълянки не былъ взвѣшенъ).

Вліяніе числа поливонъ на урожай кукурузы и маша. Опыть съ поливкой кукурузы былъ поставленъ на ¼ дес. 5-го поля Андижанскаго съвооборота, раздъленный на 4 палы: одна съ двумя поливками за вегетаціонный періодъ, затъмъ съ 3-мя, 4-мя и 5-ью поливками, при чемъ количество оросительной воды учитывалось по водомъру Фута.

Вліяніе поливокъ на кукурузу.

Таблица 35.

иниваться оже	ECTBO BOAL IT. BE	В	ре м	я.	Урожай	Высота	Число	
Число поливокъ.	Количество оросит. воді на десят. вт куб. саж.	Посѣва.	Цвѣте- нія.	Созрѣ- ванія.	зерна (п <b>у</b> довъ).	стебля въ вершк.	початокъ на стеблѣ	
•	rd a met			0.12 7. 3	HIMRIL	L.		
2 поливки	220	10/v	9/v11	31/vIII	103	49	1	
3	371	»	»	»	118	50	1	
4 »	415	»	»	»	122	52	1	
5 поливокъ	726	n	»	»	135	54	1	
Core le instê	hilmy (it	186	T.		PREMET-	- THE LOUIS	ex call	

Посъвъ кукурузы «Кутаисскій гибридъ былъ произведенъ рядовой съялкой Баннера 10/у; цвътеніе наблюдалось 9/уп, созръваніе началось 31/чи. Результаты ясно говорять за преимущество частыхъ поливокъ, такъ какъ урожай зерна кукурузы при 5-ти поливкахъ получился наивысшій — 135 пуд. съ дес.; хуже всего была кукуруза съ 2-мя поливками — 117 пуд. Количество воды при 5-ти поливкахъ было значительное — 726 куб. саж. на дес.; такую потребность кукурузы «Кутаисскаго гибрида» въ водъ надо объяснить необыкновенно мощнымъ развитіемъ у нея листьевъ, широкія поверхности которыхъ представляють огромную испаряющую площадь. Съ этой точки эрвнія

сортъ «Кутаисскіи гибридъ», хотя и урожайный, разводить не совсѣмъ выгодно, въ виду неэкономнаго расходованія имъ воды. Дѣйствительно, чтобы образовать одинъ початокъ съ вѣсомъ въ немъ зерна около 180 граммовъ, этотъ сортъ достигаетъ роста въ среднемъ до 3¼ арш., несетъ около 19 листьевъ съ общей площадью испаряющей поверхности около 580 кв. вершковъ 1), (или на 1 граммъ зерна—3,3 кв. вершк. лист. поверхности), тогда какъ экономный сортъ «Бессарабской кукурузы», для образованія одного початка съ 88 грамм. зерна вырастаетъ [всего до 2¼ арш. высотою и несетъ 10 листьевъ, съ поверхностью испаренія всего лишь около 160 кв. вершковъ 1) (или на 1 граммъ зерна—1,8 кв. вершк. лист. поверхности).

. — Таблица 36. Вліяніе числа поливокъ на машъ.

				BO 以以 BTb	В	р е м	я.	Урожай
Число	поли	вок	ъ.	Количество оросит, воды на десят. въ куб. саж.	Посѣва.	Цвѣтенія.	Созрѣва- нія.	зерна (пудовъ).
								0 116
2 поливки	all sales			325	19/v	15/v11	28/ <b>v</b> III	40
3 »				410	»	))	»	73
4 »				589	»	>>	))	36
2 »				310	»	»	»	76

Совершенно другія требованія къ водѣ предъявляєть бобовое-машъ, какъ видно изъ результатовъ нашего опыта съ числомъ поливокъ для него (табл. 36-я). Оказывается, что наибольшій урожай зерна машъ даетъ при 2—3 поливкахъ съ общимъ количествомъ оросительной воды въ 310—410 куб. саж. на десятину; 4 поливки уже вредны для маша и онъ, развивая пышную, зеленую массу, даетъ пониженный урожай зерна: при 2—3 поливкахъ зерна получено 73—76 пуд. съ десятины, а при 4 поливкахъ и 589 куб. саж. оросительной воды на десятину—только 36 пуд. Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что эффектъ дѣйствія поливокъ зависитъ, повидимому, и здѣсь не только отъ количества оросительной воды, но и отъ времени орошенія маша: оказывается, напримѣръ, что на двухъ дѣлянкахъ, гдѣ машъ поливался по 2 раза, съ расходомъ почти одного количества воды, на одной дѣлянкъ урожай былъ 70 пуд., а на другой только 40 пуд.;

<sup>1)</sup> Считая только одну сторону листа.

между тѣмъ, разница въ поливкѣ состояла лишь въ томъ, что въ первомъ случаѣ машъ поливался до цвѣтенія (за 30 дней) и при цвѣтеніи, а во второмъ — до цвѣтенія (за 30 дней) и спустя двѣ недѣли послѣ цвѣтенія, почти за мѣсяцъ до созрѣванія. Вообще машъ, по нашему убѣжденію, расходуетъ воду, повудимому, очень экономно, и часто при 2 поливкахъ онъ даетъ (при посѣвѣ въ концѣ мая на зеленое удобреніе) пышную, растителъную массу, сплошь затѣняющую почву.

Опыть съ густотой посѣва маша (табл. 37) даль слѣдующіе результаты: при рѣдкомъ посѣвѣ маша—1 пуд. сѣмянъ на десятину при посѣвѣ рядовой сѣялкой—урожай зерна получился около 55 пуд. на десятину, а при густомъ—съ высѣвомъ 2 пуд. на дес.—только 48 пудовъ зерна.

Таблица 37. Вліяніе густоты посѣва на машъ.

	В	р е м	я.	Урожай		
Высѣяно на десятину.	Посѣва.	Цвътенія.	Созрѣванія.	зерна (пудовъ).		
2 пуда	$15/\mathbf{v}$	8/v11	20/vIII	48		
1 пудъ	))	))	»	55		

Примъчание. Уборка 21 августа.

Вліяніе густоты поства и числа растеніи въ гнтздт на урожай кукурузы. (Кутайсскій гибридь) сказалось зам'тно, но картина вліянія на урожай здіть не такъ ясна, какъ у хлопчатника; съ одной стороны результать опять какъ-бы говорить за выгоды суженія разстояній между растеніями въ рядахъ до 8 вершковъ, а съ другой—суженіе разстояній съ 16 до 12 вершковъ сопровождалось уже пониженіемъ урожая (табл. 38). Любопытно также, что на дітянкахъ съ 2-мя растеніями въ гнтздіт, урожай зерна кукурузы получился самый большой: при 2-хъ растеніяхъ въ гнтздіт съ 8-ми вершк. разстояніями между гнтздами—270 пудовъ зерна съ десятины, а при 12 вершк. разстояніяхъ—208 п.; меньшій урожай дала дітянка съ однимъ растеніемъ въ гнтздіт при 12 вершковыхъ разстояніяхъ между гнтздами—112 пуд.; однако, початки при густомъ поствіт были мелкіе, легкіе и на одномъ стебліт ихъ было 0,8 шт.. тогда какъ у одиночныхъ и рттако стоящихъ

растеній, они были значительно больше и числомъ 1,2 на одномъ стеблъ.

Таблица 38.

Вліяніе числа растеній на кукурузу (Кутаисскій гибридъ).

IN THE PARTY OF STREET AND PARTY OF STREET	В	рег	м. я.	180200		- a
Число растеній въ гнѣздѣ и разстоянія между растеніями.	Посѣва.	Цвътенія.	Созрѣва- нія.	Урожай зерна (пудовъ).	Высота стебля въ вершк	Число по чатокъ на
Въ гнъздъ 1 раст.— 8 верш. въ рядахъ	10/v	9/vII	31/vIII	185	45	1,1
» » 1 » —12 » » »	n	»	»	125	47	1,2
» » 2 » — 8 » » »	»	»	»	270	43	1,0
» » 2 » —12 » » »	»	»	»	208	48	0,8
» и 1 » 12 » » »		».	»	118	46	1,18
Въгнъздъ 1 раст.— 12 верш. въ рядахъ, а междуряд. 12 верш	<b>»</b>	»	»	112	40	1,15

Примъчаніє. Всходы кукурузы 15 мая; уборка кукурузы 5 сентября.

Въ 1910 году быль поставленъ еще одинъ опытъ съ кукурузой — вліяніе подрѣзки верхушекъ стеблей, въ моментъ начала выкидыванія мужскихъ метелокъ; этотъ пріемъ, какъ извѣстно, въ Америкъ рекомендуется производить на всѣхъ селекціонныхъ плантаціяхъ кукурузы, во избѣжаніе самоопыленія. Результаты нашего опыта съ Кутаисскимъ гибридомъ таковы: у рядовъ съ подрѣзанными верхушками получился урожай зерна больше—102 пуд. на десятину, а безъ подрѣзки—только 76 пуд.

Упомянемъ еще о результатахъ небольшого опыта, поставленнаго па опытномъ участкъ съ вліяніемъ времени посъва на урожай кормовой моркови; результаты его (см. табл. 39-ю) таковы: при посъвъ 5/ш морковь дала урожай 1.110 пуд., а при посъвъ 5/и — 768 пуд., а кормовая свекла при посъвъ 5/ш—1.950 пуд., а 5/и — 1.328 пуд., —т. е. ранніе посъвы оказались болъе выгодными.

Въ заключение опытовъ съ яровыми посъвами въ 1910 году приведемъ интересный опытъ культуры риса на солонцахъ.

На 5-мъ полъ основного съвооборота имъется въ одномъ углу, около  $^{1}/_{10}$  дес. солонцеватой почвы, съ выцвътами солей; на этой площадкъ нъсколько лътъ подрядъ, при всемъ стараніи, не удавалось получить

даже всходовъ какихъ-нибудь полевыхъ растеній, вслёдствіе сильной солонцеватости почвы; въ 1910 году, когда оказалось, что посъянный здъсь машъ не взошелъ, мы ръшили, разбивъ солонцеватую площадь на маленькіе дълянки (въ 60 кв. саж.), окруженныя высокими земляными валиками-для равномърнаго напуска воды, -- посъять здъсь болотный рисъ-съ постояннымъ слабымъ токомъ по нему оросительной воды. Этимъ опытомъ, мы хотъли выяснить, возможна ли рентабельная культура риса на солонцахъ и есть ли возможность промыть при ней вредныя соли настолько, чтобы на такихъ безнадежныхъ поляхъ послъ риса могли родиться удовлетворительно другія культурныя растенія. Передъ посъвомъ нами было опредълено содержание воднорастворимыхъ солей въ почвъ солонца и содержание твердаго остатка въ оросительной водъ приводящаго арыка, — то же сдълано было и послъ уборки риса: кром'в того, было опредвлено содержание солей въ сбросной (съ риса) водъ-на третьи сутки послъ начала поливки рисоваго поля. Поствъ риса былъ произведенъ въ разбросъ въ грязь (въ водт) 20/у, при чемъ высъяно 7 пуд. съмянъ на десятину, мокнувшихъ въ водъ 2½ сутокъ; убранъ же рисъ въ зръломъ состояніи 5/іх. До посъва риса солонецъ содержалъ солей въ почвъ на глубинъ 2-10 сант. 1,5%, на глубинъ 10-25 сант. 2,2% солей: послъ же уборки риса солей содержалось на 2-10 сант. только 0,1%, на 10-25 сант. лишь 0,2%. Вода (оросительная) въ приводящемъ арыкъ содержала 0,3 грамма солей въ одномъ литръ; вода же сбросная съ рисовыхъ дълянокъна третьи сутки содержала 1,4 грамма солей на 1 литръ. Такимъ образомъ съ поверхностныхъ горизонтовъ почвы количество солей уменьшилось за періодъ вегетаціи риса почти въ 15 разъ и съ оросительной водой уже въ первое время ихъ уносилось съ солонца до 1,1 грамма въ литръ.

Таблица 39. Вліяніе времени посѣва на кормовую морковь и свеклу.

Наименованіе опытовъ.	Время посѣва.	Урожай (пудовъ).
Consider the state of the state	5/111	1.110
1) Кормовая морковь	5/IV	768
2) Charles	5/111	1.950
2) » свекла	5/IV	1.328

Такая промывка солей солонца отразилась выгодно и на самомъ рисѣ, который развивался довольно хорошо и далъ удовлетворительный урожай зерна, а особенно на послъдующемъ посъвъ—озимой

пшеницы, посѣянной здѣсь 27/іх—послѣ вспашки плугомъ Сакка на 3 вершка, съ задѣлкой разброснаго посѣва въ первый слѣдъ «зигзагомъ», а во-второй французской бороной; всходы пшеницы послѣ риса и послѣдующее развитіе ея были положительно роскошны и превосходили всходы пшеницы на сосѣднихъ дѣлянкахъ (не осолоненныхъ), не бывшихъ подъ рисомъ. Слѣдовательно, гдѣ у хозяевъ имѣется въ распоряженіи много оросительной воды, однолѣтняя культура риса можетъ быть рекомендована какъ почти единственный и надежный способъ для исправленія и выгоднаго использованія солонцевъ (при отсутствіи дренажа).

#### Озимые посъвы.

Сорта пшеницы. На 3-мъ полъ Андижанскаго съвооборота въ 1910 г. испытывались три сорта мъстной озимой пшеницы (всего на  $^{1}/_{2}$  дес.): бълая, красная и саватская, похожая на бълую; посъвъ быль сдъланъ 24/іх рядовой съялкой (6 пуд. на десятину)—послъ предпосъвной поливки и вспашки плугомъ Сакка, съ задълкой посъва послъ рядовой свялки французской бороной-каткомъ (поперекъ рядовъ). Всходы у всъхъ пшеницъ появились 2/х; съ 15/хі, когда наступили морозы, и по 20/п-до послъдняго весенняго мороза - озимыя пшеницы находились въ період'в покоя, почти не двигаясь въ рость; цвътеніе началось у бълой и саватской пшеницы 25/и, а у красной— 27/гу; полное созръваніе зерна наступило почти одновременно у всъхъ пшеницъ-25/у; уборка ихъ произведена 29/у. Въ моментъ уборки высота стебля у пшеницъ была такова: у бълой-88 сант., саватской-84 сант., у красной-80 сан.; кустистость у бълой-2, саватской-1,6 и красной 2,8. Какъ видно изъ таблицы III/1, урожайнъе другихъ оказалась красная ишеница-82 пуда на десятину зерна, затъмъ саватская — 60 чуд. и, наконецъ, бълая 56 пуд. Всъ пшеницы съ осени не орошались (кром'в предпос'вной поливки), а весной каждая изъ нихъ получила по 2 поливки; весна была чрезвычайно сухая, какъ видно изъ метеорологической таблицы.

Таблица 40. Опыты съ сортами озимой пшеницы.

ibecereus aran Custoli de	В	р е м	я.	Vnomoš
Названія сортовъ.	Посѣва.	Цвѣтенія.	Созрѣванія.	Урожай зерна (пудовъ).
Вълая	24/1x	25/IV	-25/v	56
Красная	»	27/IV	»	82
Саватская	»	25/IV	»	60

Примъчание. Всходы озимыхъ пшеницъ 2 октября; уборка пшеницъ 29 мая.

Сорта озимаго ячменя. Замъченная нами въ прошломъ году нъкоторая неустойчивость озимаго чернаго—караязскаго ячменя къ морозамъ—заставила насъ искать другіе сорта ячменя, изъ мъстныхъ озимыхъ, которые бы могли выносить значительные морозы въ условіяхъ Голодной Степи; въ 1910 г. на мъстномъ и Ташкентскомъ базарахъ нами пріобрътены съмена 3-хъ озимыхъ ячменей: мъстнаго 4-хъ-ряднаго, зааминскаго, и букинскаго, которые, почти не отличались другъ отъ друга по строенію колоса (вст они 6-ти-рядные), но ръзко отличались, однако, по высотъ стебля, величинъ зерна, цвъту и проч. Эти ячмени были высъяны нами на 1-мъ полъ Стебутовскаго съвооборота б/лх-рядовой съялкой (по 7 пуд. на дес.); всходы появились дружные, особенно у зааминскаго ячменя, 13/1х.

Какъ видно изъ фенологической таблицы (табл. 12-й), ростъ ячменей осенью происходилъ до 15/хі, а послѣ—и до 20/п, во время морозовъ, они находились въ періодѣ покоя; подъ снѣгомъ всходы находились нѣсколько дней: съ 30/хіі—4/і. Весной раньше другихъ колоситься началъ зааминскій ячмень—28/пі, затѣмъ мѣстный—30/пі, потомъ букинскій и, наконецъ уже караязскій; цвѣтеніе ячменей ниблюдалось: у мѣстнаго—съ 2—7/іv, у букинскаго— съ 1—5/іv, у зааминскаго — съ 30/пі—4/іv и у караязскаго — съ 6—13/іv; созрѣваніе отмѣчено: у зааминскаго—7/v, мѣстнаго—8/v, букинскаго—9/v и чернаго—15/v. Въ моментъ созрѣванія ячмени имѣли такую кустистость и высоту стебля: кустистость у мѣстнаго—4, букинскаго—3,5, зааминскаго—3,2, караязскаго—2,5; высота стебля у караязскаго—90 сант., у букинскаго—80 сант., зааминскаго—75 сант. и мѣстнаго—70 сант.

Таблица 41. Сорта озимаго ячменя.

	В	р е м	я.	Уро	жай.
Названія сортовъ.	Посѣва.	Цвѣтенія.	Созрѣва-	Зерна (пудовъ).	% зерна.
isomos t					
4-хрядный мъстный , .	6/1x	1—7/IV	8/v	115	47,2
» букинскій	»	2—5/1v	9/v	105	48,5
» караязскій	»	6—13/IV	15/v	100	44,0
Зааминскій	»	29/III—5/IV	7/v	98	47,5
W-/					augustes and

Примъчание. Всходы озимыхъ ячменей появились 13 сентября.

Наибольшій урожай зерна получился у м'встнаго ячменя— 115 пуд. съ десятины, зат'вмъ у букинскаго—105 пуд., караязскаго— 100 пуд. и зааминскаго—98 пуд.; самый высокій проценть зерна (по отношенію къ солом'в) при этомъ получился у букинскаго ячменя— 48,5%, меньшій у караязскаго—44%. Такимъ образомъ, въ нашихъ условіяхъ есть смыслъ разводить, главнымъ образомъ, м'встные ячмени, какъ скоросп'влые и урожайные; выгоды пос'вва этихъ ячменей, особенно сказываются въ саранчевые и морозные годы, когда караязскій ячмень, какъ поздносп'влый, можетъ быть съ'вденъ саранчею, а зимой вымерзаетъ.

Вліяніе на озимую пшеницу способовъ постью. Опыть со способами посъва красной озимой пшеницы быль поставлень въ 1910 году на опытномъ участкъ, на которомъ все первое поле было разбито на шесть дълянокъ, соотвътственно слъдующимъ способамъ посъва: 1) ръдкому рядовому-5 пуд. съмянъ на десятину, 2) густому рядовому—10 пуд., 3) разбросному ръдкому—5 пуд., 4) разбросному густому—10 пуд., 5) ленточному ръдкому—строки черезъ 6 вершк. и 6) ленточному густому—черезъ 3 вершка; кромъ того, на дълянкъ съ ленточнымъ посъвомъ произведенъ посъвъ руками на гребняхъ узкихъ грядъ, сдъланныхъ окучникомъ. Поле послѣ орошенія было вспахано плугомъ Сакка 11/хі, заборонено въ 1 слъдъ зигъ-загомъ и 12/хії произведенъ посъвъ пшеницы соотвътственными опытамъ способами. Тогда же быль произведень посвыь по способу генерала Левицкаго въ ямки, но опыть этотъ вскоръ пришлось прекратить, такъ какъ въ большинствъ ямокъ всходы не появились, а въ тъхъ ямкахъ, гдъ они были, однако, послъ заваливанія ихъ землей (какъ полагается по способу Левицкаго), почти въ <sup>3</sup>/<sub>4</sub> всъхъ такихъ ямокъ растенія къ веснъ уже совершенно не вышли изъ подъ земли; наконецъ, въ 3-4 ямкахъ съ сохранившимися растеніями, весьма мало раскустившимися, весной, послъ поливки, пшеница двигалась очень трудно въ ростъ и опыты пришлось прекратить. Всходы пшеницы на всъхъ почти дълянкахъ появились поздно-около 10-15/хи; нормально развиваться стали онъ только весной; до колошенія пшеницы на всъхъ дълянкахъ развивалась болъе или менъе равномърно, но послъ дълянки съ ръдкимъ рядовымъ посъвомъ, ленточнымъ густымъ и ръдкимъ разброснымъ стали быстръе подвигаться къ созръванію, желтъть; на ленточномъ же ръдкомъ посъвъ и особенно на грядахъ пшеница сильно кустилась, росла и долго оставалась зеленой. Цвътеніе наблюдалось раньше всего на разбросномъ посъвъ —30/гу, затъмъ на ръдкомъ рядовомъ—1/v, далъе на густомъ—3—5/v; созръвание наступило у рядовой пшеницы—4/vi—полное, у разбросной—2/vi—полное, у ленточнаго густого — 5/vі — восковая спълость, у ленточнаго ръдкаго — 8/vi — восковая и на грядахъ-15/vi-восковая спълость. Уборку пшеницы пришлось производить въ разные сроки, не дожидаясь созрѣванія пшеницы на грядахъ и др., такъ какъ на созрѣвающую пшеницу сильно нападали воробьи.

Таблица 42. Способы посъва озимой пшеницы.

an arrang top every or passagon on any base	В	р е м	я.	13
какой онытъ.	Посвва.	Цвѣтенія.	Созръванія.	Урожай зерна (пудовъ).
A YOU THE SALES OF		riscent 3		
Рядовой ръдкій—5 пуд	12/ix	1/v	4/v1	54 1
» густой—10 пуд	»	»	»	37
На грядахъ	<b>»</b>	7/v	$12/v_1$	12
Ленточный ръдкій—6 верш	<b>»</b>	5/v	8/v1	16
{» густой—3 »	»	3/v	6/vi	20
Разбросн. ръдкій	»	30/rv	3/v1	20
» густой	»	»	»	80
Густота посъва-5 пуд. на десятину	18/IX	25/rv	30/v	55 <sup>2</sup>
» » —7 » »	»	»	»	53
Съ бороньбой пшеницы весною	))	»	))	55

Примъчание.  $^1$ ) Всходы пшеницы появились 10-15 декабря.  $^2$ ) Всходы пшеницы 23 сентября. Уборка пшеницы 3 іюня.

Урожай зерна пшеницы получился весьма разнообразный: больше всего зерна получено по густому разбросному посъву—80 пуд. съ десятины, затъмъ по ръдкому рядовому—54 пуда, далъе по густому рядовому—37 пуд. и ниже всего — по ленточному ръдкому—16 пуд. и на грядахъ—12 пуд.; однако кустистость пшеницы больше всего была на грядахъ—5, затъмъ по ръдкому ленточному посъву—4, по рядовому—2 и, наконецъ, по разбросному—1,7.

Слъдуетъ сказать, что всъ дълянки поливались три раза весной; на рядовомъ, разбросномъ и густомъ ленточномъ посъвъ никакого другого ухода за пшеницей не было, на ленточномъ же ръдкомъ и на грядовомъ — послъ каждой поливки междурядья пропахивались коннымъ пропашникомъ планетомъ (съ 1—2 лапками). На основаніи этого опыта мы не ръшаемся высказаться за нежелательность ръдкаго ленточнаго посъва съ пропашкой междурядій, въ нашихъ усло-

віяхъ, такъ какъ кустистость и вообще завидное развитіе пшеницы при посъвъ этимъ способомъ говорять за возможность полученія высокаго (хотя бы и запоздалаго) урожая; можетъ быть ранній посъвъ (а не 12/хі, какъ было въ 1910 г.) пшеницы далъ бы совсъмъ иную картину урожайности.

Послъднимъ опытомъ съ озимой пшеницей въ 1910 г. былъ опытъ рядового посъва съ разной густотой (табл. 42), а также съ весенней бороновкою всходовъ; поставленъ этотъ опыть былъ на ½ дес. перваго поля основного съвооборота: на одной дълянкъ рядовой съялкой высъяно съмянъ пшеницы 5 пуд. на десятину, на другой 7 пуд. и на третьей-произведена бароновка всходовъ весной (при 5 пуд. на десятину съмянъ). Всходы этой пшеницы, посъянной 18/ІХ появились 23/ІХ; цвътеніе отмъчено 25/ІV, а созръваніе наступило 30/V; уборка пшеницы произведена 3/VI. Уходъ за пшеницей состояль въ двухъ поливкахъ, а на третьей дълянкъ еще и въ бороновкъ французской бороной (въ 2 слъда), при чемъ образовавшаяся почвенная корка бороной только слегка рыхлилась.

Урожай зерна получился почти одинаковой на всъхъ дълянкахъ, но при ръдкомъ посъвъ все же лучшій—55 пуд. на дес., съ бороновкой—тоже 55 пуд. и хуже всего при густомъ посъвъ—53 пуда.

Опытъ внесенія удобреній подъ пшеницу сдѣланъ въ 1910 г. на второй ½ дес. перваго поля основного сѣвооборота; удобренія вносились поверхностно по сходамъ пшеницы ранней весной (18/II), въ количествахъ, указанныхъ въ опытѣ съ хлопчатникомъ.

Таблица 43. Вліяніе удобренія на озимую пшеницу.

, "1867 tenia.	л/овржванія.	Зерна (пудовъ).	% зерна.
	30/v	73½	33
	30/V	1.)7/2	00
))	))	82	32,5
»	»	50	
»	»	671/2	_
n	))	49	25,3
»	»	62	<u> </u>
»	»	$62\frac{1}{2}$	
n	»		esta a Table
))	))	821/2	25,8 — — — — —
11	415 1010 100 100	98	SER II I
	)) ))	» »	) ) 82½ ) 98

Примъчание. Всходы пшеницы 18 сентября; уборка—3 іюня.

Результаты этого опыта очень сходны съ результатами внесенія удобреній подъ хлопчатникъ и, какъ видно изъ таблицы 43-й, наибольшій эффектъ и на ишеницѣ производятъ у насъ азотистыя удобренія: такъ наивысшій урожай зерна пшеницы получился по селитрѣ—111½ пуд. съ дес., затѣмъ покровянной мукѣ—82 пуда, по сѣрнокислому аммонію—82½ пуда и проч.; между прочимъ, по сѣрнокислому калію урожай быль тоже очень высокій—98 пуд.; контрольная дѣлянка дала 49—77 пуд.

#### Плодовый садъ, виноградникъ, питомникъ и огородъ въ 1910 г.

Маточный плодовый садъ опытнаго поля, заложенный въ 1902 г. начиная съ 1908 г., выглядитъ все хуже и хуже; одни деревъя посыхаютъ частями или цѣликомъ отъ солонцовъ, другія остановились въ ростѣ и у большинства уже въ іюлѣ начинають почти цѣликомъ опадатъ еще не совсѣмъ зрѣлые плоды, и даже сбрасываются листья. Если мы просмотримъ анализы почвы нашего сада, то ничего неожиданнаго въ этой гибели деревьевъ не будетъ: почвовѣдъ Н. А. Димо, не мало видѣвшій солонцовъ въ Голодной Степи, прямо говоритъ о почвѣ и грунтовой водѣ въ нашемъ плодовомъ саду слѣдующее: «ни гдѣ, ни при какихъ условіяхъ мнѣ не приходилось наблюдать въ Голодной Степи такой большой солоности грунтовой воды, какъ въ плодовомъ саду Опытнаго поля».

Дъйствительно, по анализамъ этого почвовъда, на литръ грунтовой воды приходится цълыхъ 26 граммовъ солей, въ томъ числъ на 11,5 граммовъ хлористаго натра (1,15%); въ то же время въ почвъ на глубинъ 100 сант. вредныхъ водно-растворимыхъ солей было 1,3%, а въ поверхностномъ горизонтъ 0,8%, изъ нихъ хлористаго натра 0,2—0,4%. Поэтому, какъ бы корни яблонь не старались избъжать слоя соленосной грунтовой воды (на 100 сант. глубины у насъ въ плодовомъ саду лежитъ уже полужидкій плывунъ, а грунтовая вода стоитъ на 2 арш. 8 вершк.), они все же должны испытывать вліяніе большой концентраціи вредныхъ солей и на той глубинъ, гдъ онъ больше всего располагаются (45 сант.).

Вообще, надо сказать, что для опытнаго поля мъсто выбрано было въ 1900 году, если не худшее въ Голодной Степи, то далеко не оптимальное. За послъдніе три года изъ всъхъ 360 деревъ маточнаго плодоваго сада отъ осолоненія и отчасти отъ морозовъ зимою въ 1910 г. посохло, выбраковано и засажено новыми деревьями 85 штукъ (около 24% всъхъ деревьевъ), при чемъ главнымъ образомъ погибли абрикосы, персики, сливы, яблони: такъ, изъ всего числа яблонь (125 шт., не считая 50 шт. карликовыхъ, подсаженныхъ въ 1908 г.), погибло къ 1-му января 1911 г. 22 яблони (18%); изъ 80 штукъ сливъ погибло 26 (32%); изъ 30 штукъ персиковъ погибло 11 шт. (37%); изъ 24 абрикосовъ—10 шт. (41%); изъ 22 черешенъ, которыя вообще плохо

плодносять здѣсь, ногибло 4 шт. (18%); изъ 22 вишенъ—погибло 5 шт. (23%); груши пострадали меньше другихъ, изъ 150 шт. ихъ—погибло лишь 6 шт, (4%).

Изъ сортовъ яблонь больше всего пострадали-Парменъ золотой зимній, Новое Бернское розовое, Парменъ Клейнгата, Вагнера, Ренетъ Семиренко, Обердика, Р. Ляндсбергскій, Сары синапъ, Ренетъ шампанскій и друг.; изъ грушъ-Шарль Конье, Пас-Крассанъ, Дюшесъ зимняя и др.; изъ сливъ—японскія: Burbank, Ogon, Shirosmomo, а также европейскіе: Королева Мирабелей, Царскій ренклодъ, скороспълка урожайная; изъ персиковъ—Амсденъ, Mignonne, Weisse Früh., Précoce de Hale; изъ абрикосовъ-Ананасный, Слава Оверна, D'Alexandrie и друг. Болъе устойчивыми къ солонцамъ сортами оказались изъ яблонь-Ренетъ Баумана, Ренетъ Кокса, Р. Орлеанскій, Бельфлеръ желтый, Парчевое, Безподобное Лянгтона, Ренетъ Бленгеймскій; изъ грушъ-Оливье де-Серъ, масляная Лигеля, Маріи Гизъ. Сенъ-Жерменъ, Бези-Карэмъ, тающая Тиріо, Тріумфъ Жодуана, слава Віенны, масляная Жифара; изъ сливъ-Королева Викторія, Вашингтонъ, Угорка обыкновенная, Ренклодъ зеленый; изъ абрикосовъ-Королевскій, Душистый; изъ вишенъ-Гріотъ Остгеймскій, скороспълка Англійская и друг.

Въ 1910 году, какъ сказано выше, значительный процентъ плодовъ въ саду оказался въ падалицъ: такъ, у яблонь падалицы было 73% отъ всего урожая, а у грушъ 60%.

Поврежденныхъ плодожоркой плодовъ на яблоняхъ было отъ 10— 90%, а всъхъ деревьевъ, пораженныхъ ею, было-яблонь 50% и грушъ 32%. Сильнъе всъхь были повреждены плодожоркою плоды у яблонь Ренетъ Орлеанскій, ренетъ Ляндсберга (90%), чудо Хельмсфорда, первенецъ Фишера (75%), новое Бернское розов. (70%), затъмъ Ренетъ Шампанскій, Розмаринъ бълый, желтый Бельфлеръ (40%), и меньше всего Алантъ, Кандиль-Синапъ и Варашке; изъ грушъ сильнъе всего поражены плоды Оливье де Серъ, Бере Диля, Лектье, Министръ д-ръ Люціусь (70%) затъмъ у бергамота Санье, Тающей Тиріо, Пасъ-Крассанъ, Шарль-Конье, ПассъКольмаръ, Слава Віенны, (40—50%) и меньше всего—у Бергамота Эсперена, сестры Грегуаръ и др. Кромъ плодожорки, на 22 деревьяхъ яблонь наблюдалась листовая тля, у грушъ тля была на 57 деревьяхъ а у нъкоторыхъ наблюдалась еще медвяная роса (Слава Віенны, Марія Луиза, Министъ Люціусъ, Слава Турнэ, Тающая Тиріо, Лектье и др.). У пяти персиковыхъ деревьевъ также обнаружены были тли, а въ одномъ случав отмвчена курчавость листьевъ, наконецъ, у 10 яблонь на плодахъ наблюдались ожоги, также у 4-хъ грушъ и 10 сливъ.

Цвѣтеніе яблонь въ массѣ наблюдалось около 9/IV, грушъ съ 1/IV, а въ массѣ 4-9/IV, сливы японскія—цвѣли 25/III, а другія съ 1-7/IV; вишни—24-28/IV; абрикосы—12/III и персики съ -19/III.

Созрѣваніе плодовъ растянулся у яблонь съ 15/VII по 15/IX, у грушъ съ 1/VII по 18/IX, у сливъ съ 2/VI—29/VII; айву собирали 10/IX и вишни съ 22/IV—15/V.

Самыми лежкими сортами яблокъ оказались бѣлый Размаринъ и особено Ренетъ Симиренко, долежавшія до конца марта. Большая часть плодовъ была, за ненахожденіемъ покупателей и отсутствіемъ плодохранилища, изрѣзана и высушена на солнцѣ; сливы продавались, впрочемъ, преимущественню въ сыромъ видѣ. Солнечная сушка (на крышѣ) дала слѣдующіе результаты—при сушкѣ около 4—10/VIII: 1) яблоки—падалица дали выходъ сухихъ фруктовъ 25% и сохли 80 часовъ; 2% яблоки, собранные съ деревьевъ, дали выходъ сухихъ 18, 5%—и сохли 25 часовъ; 2) груши падалица дали 24% сухихъ—и сохли 130 час., а груши, собранныя съ дерева, дали 18% сухихъ—сохли 30 час., 3) слива Ажанская дала сухихъ 33%—сохла 240 часовъ.

Что касается новаго молодого сада (посадки 1907 г.), то онъ находится въ прекрасномъ состояніи пока и нѣкоторыя яблони карлики уже плодоносили въ 1910 году, напримѣръ, Ренетъ Симиренко, Ренетъ Шампанскій и бѣлый Размаринъ; къ сожалѣнію, зима 1910 г. была гибельной для нѣкоторыхъ деревьевъ, и у Ренетовъ Симиренко и Шампанскаго померзло нѣсколько деревьевъ или на корѣ остались слѣды—морозобоины.

Питомникъ плодовыхъ деревьевъ перенесенъ въ 1910 году въ междурядья новаго плодоваго сада, а изъ прежняго питомника всѣ саженцы (около 700 штукъ) распроданы крестьянамъ, частью высажены у себя и на показательномъ хозяйствѣ. Выписанныя изъ Геленджика отъ Кавказской флоры для школки сѣянцевъ сѣмена плодовыхъ и лѣсныхъ деревьевъ оказались почти невсхожими, и весной 1910 г. для школки пришлось покупать дички.

Виноградникъ въ 1910 году былъ снова подновленъ новыми чубуками, такъ какъ изъ 384 прежде посаженныхъ кустовъ винограда погибло отъ солонцовъ 134 шт.; а такъ какъ прежними наблюденіями у насъ констатировано, что виноградъ, въ условіяхъ осолоненія почвы лучше выдерживаетъ при затѣненіи его (подъ деревьями) и при содержаніи междурядій подъ люцерной,—то весной 1910 г. на всей нашей десятинѣ виноградника были сначала посажены деревья—акація, ясень, адамово дерево—и послѣ уже около деревьевъ подсаживались виноградные чубуки.

Виноградникъ быль открыть оть зимней защиты 12/III. Распусканіе листьевь у него началось 3/IV, а 17/VI созрѣль уже туземный виноградъ «Чиляги»; цвѣтеніе у разныхъ сортовъ винограда шло въ такомъ порядкѣ: 1/V сильно цвѣли уже «Мальбекъ», слабо «Каберне» и «Опорто»; 3/V цвѣли—«Саперави», Рислингъ, «Мускатъ бѣлый и Венгерскій»; 6/V цвѣли—«Сотернъ», «Шасла бѣлый», «Изабелла»,

«Савиньонъ», туземные—бълый крупный и бълый длинный. Сборъ винограда производился въ полной спълости: 15/VII—у Муската Венгерскаго, Буаки, чернаго Тагоби, 17/VI—Хусайне, Черный круглый, 3/VIII—Мальбекъ и Саперави, 4/VIII—Кабернэ, 6/VIII—Рислингъ, 8/VIII—Опорто, Шасла, Наполеонъ и 12/VIII—Изабелла. Въ общемъ урожай винограда былъ незначителепъ, да и тотъ наполовину былъ попорченъ розовыми скворцами.

Завидныхъ качествъ получился виноградъ Муската Венгерскаго и Хусайне, а отчасти Мальбекъ и Рислингъ. Всего продуктовъ сада, питомника, огорода продано въ 1910 году на 153 рубля 63 коп.

Въ огородъ испытывались сорта смородины, земляники, арбузовъ, дыней, томатовъ, редиса, капуста и проч. Между прочимъ, въ 1910 г. большой урожай далъ сортъ томатовъ «Чудо рынка», на каждомъ кустъ которого въ среднемъ насчитывалось по 41 штукъ зрълыхъ томатовъ, каждый въсомъ по 27 золотн.; урожайнымъ былъ также сортъ Микадо, на каждомъ кустъ имъвшій по 26 томатовъ въсомъ по 33 з. и Коллось—съ 12 шт. томатовъ на кустъ, въсомъ по 72 зол.; ниже другихъ дали урожай карликовые томаты Вишневые, несшіе на кустъ по 70 шт. томатовъ, въсомъ каждый лишь по 2 зол.

На пасѣнѣ опытнаго поля пчелы роились и откладывали медъ въ 1910 году удовлетворительно, но позднею осенью 2 гнѣзда ихъ подверглись нападенію осъ, воровавшихъ медъ и убививавшихъ не мало пчелъ, такъ что остатки этихъ роевъ пришлось посадить въ другія ульи; весной, въ одномъ ульѣ найдено гнѣздо бабочки пчелиной моли, личинки которой безпощадно выѣдали соты.

Три роя въ 1910 году были розданы крестьянамъ и на показательное хозяйство.

Молочное стадо опытнаго поля въ 1910 г. состояло до августа изъ 8-ми дойныхъ коровъ (полуголландской породы), въ августъ одна корова, Зорька, пала отъ маляріи. Взятый вмъсто быка Альгау-хоросана, крывшаго коровъ, прежній молодой быкъ опытнаго поля «Побъдитель», въ первое время тоже оказался неважнымъ производителемъ и потому нъкоторые коровы опять оставались яловыми, вслъдствіе этого стадо дало въ общемъ низкіе удои.

						19	)10 r			1909 г.					
Корова	Уварка	доилась	165	дней	ид	ала	60	ведеръ	молог	кавм:всто	110	водеръ.			
))	Близничика	»	210	))		))	79	))	))	»	87	»			
»	Гранетка	»	300	))		))	144	))	))	» »	158	))			
))	Бълка	))	270	))		»	183	»	))	))	191	»			
))	Калинка	»	240	))		))	153	<b>)</b>	))	»	136	))			
n	Зорька	, »	135	"		))	18	))	))	))	108	'n			
))	Киргизка .	))	255	))		1)	100	))	))	))	_	0			
))	Голубка	))	105	))		1)	33	))	"	0		>>			

Въ лабораторіи опытнаго поля былъ сдѣланъ рядъ опредѣленій жира въ молокъ стада; опредѣленія эти убѣждаютъ, что въ общемъ и въ нашемъ сухомъ климатѣ эта порода сохраняетъ свойственную ей небольшую жирность молока: 1) при пастбищномъ кормленіи скота молоко всего нашего стада содержало отъ 2,8% до 3,9% жира, а въ среднемъ около 3,4% жира (по опредѣленію жира ляктобутирометромъ Маршана); 2) при стойловомъ же содержаніи, когда коровы получали сухую люцерну, кормовую свеклу (частью съ хлопковыми сѣменами 3-го сорта), процентъ жира былъ выше — около 3,7%. Въ частности, у молодой коровы «Киргизки» на седьмой день отъ отела жира въ молокъ было 3,2%, а на шестомъ мѣсяцъ 3,5% при чемъ утромъ было 3,4%, а вечеромъ 3,7%.

Всего молочныхъ продуктовъ въ 1910 году продано на 171 руб. 63 к.

За отсутствіемъ въ ближайшемъ поселкъ и у арендаторовъ производителя, крестьяне все время приводили своихъ коровъ на случку съ быкомъ опытнаго поля, отпускавшимся для этого безплатяо (послъ осмотра приводимыхъ коровъ на состояніе здоровья).

Въ заключение приводимъ денежный отчетъ по опытному полю за 1910 годъ и вѣдомость рабочихъ дней.

I. Оставалось къ 1-му января 1910 г. въ кас	есѣ	
1. отъ продажи продуктовъ		[.
2. Получено въ 1910 г.		
1. По ассигновкамъ Упр. Зем	. 9.168 руб. 50 кол	[.
3. Получено отъ продажи продуктовъ опытн	аго поля:	
а) хлопковаго волокна	5.329 руб. 66 кол	
в) хлопковыхъ съмянъ	144 » 06 »	
с) кукурузы	7 » 98 »	
д) пшеницы	151 » 60 »	
е) маша	118 » 60 »	
ф) подсолнечника	33 » 50 »	
х) соломы машевой	25 » — »	
ц) люцерноваго съна	1.190 » — »	
	1.190 " — " 153 » 63 »	
ч) отъ сада, питомника, огорода		
к) за молочные прокукты	171 » 63 »	
п) за пригульный скоть	13 » 94 »	
у) арендная плата за землю	131 » — »	
Итого	7.470 руб. 60 коп	-

Всего прихода въ 1910 г. 17,412 руб. 02 коп.

- II. Израсходовано по хозяйству опытнаго поля въ 1910 году:
- 1. По авансовымъ счетамъ . . . . . . . . . . . 9.716 руб. 91 коп.
- 2. Сдано въ казначейст. отъ продажи продуктовъ 1910 г. 7.200 » » Всего расхода—16.916 руб. 91 коп.
- III. Оставалось денегь въ кассъ къ 1-му января 1911 года:

Всего оставалось 495 руб. 21 коп.

Какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, весь доходъ отъ продажи продуктовъ опытнаго поля въ 1910 г. исчисляется суммой 7.695 р. 11 к. (7.470 р. 60 к.—224 р. 51 к.), при чемъ самый большой доходъ (73% полученъ отъ хлопчатника: продано волокна и съмянъ на 5.473 руб. 72 к., а также отъ люцерны (16%), которой продано на 1.490 р. Такимъ образомъ, 1 дес. посъвовъ (при 50 дес. всей посъвной площади) дала валового дохода около 154 руб., а десятина хлопчатника около 390 р., не считая продуктовъ, израсходованныхъ въ собтвенномъ хозяйствъ опытного поля (кормъ скоту, съмена).

Въ общемъ, если исключить изъ расходной суммы 1910 года (9,716 р. 91 к.) такіе единовременные расходы, какъ постройка вегетаціонной теплицы, пріобрѣтеніе мебели, волшебнаго фонаря, саранчевыхъ сжигалокъ, и проч. (на сумму 1.348 р. 41 к.),—то опытное поле при годовой доходности (по 1910 году) отъ продуктовъ полеводства въ 7.695 рублей можетъ почти на цѣло покрыть расходы по полю собственными доходами.

Чтобы судить о доходности опытнаго поля за все время его существованія, приведемъ слъдующую справку:

Въ	1901	г.	продано	продуктовъ	на	сумму					666	руб.	90	коп.
))	1902	))	))	»		))					780	n	-	))
))	1903	))	))	»		))					738	))	-	))
))	1904	))	))	))		))					1.122	))	23	))
))	1905	))	))	))		» '					1.584	))	80	))
))	1906	))	))	n		))					2.179	))	70	))
))	1907	))	,)	<b>»</b>		,))					2.085	))	46	))
))	1908	))	n	n		))					2.448	))	88	))
))	1909	))	))	))		"					2.969	))	10	))
))	1910	))	))	»		<b>»</b>					7.695	))	11	))
							-	 -		-				-

Итого за 10 лътъ. . 22.270 руб. 18 коп.

Главный расходъ по хозяйству опытнаго поля составляють платежи рабочимъ-поденнымъ и мѣсячнымъ, служащимъ; всего въ годъ оплачено 4.100 рабочихъ дней, лошади же находились въ работъ 942 дня (въ полъ).

Изъ нижеприводимой въдомости числа рабочихъ на опытномъ полѣ за 1910 г. видно, сколько и какъ распредѣлялись рабочіе по разнымъ отраслямъ хозяйства поля.

Въдомость числа рабочихъ дней по Опытному полю въ Голодной Степи за 1910 годъ.

		яйству : скотовод		По	полеводо	етву.		итомниі цоводств			огој ичести		По	виногј нику.	рад-	]	Ито	) г о	
За какіе мѣсяца.	Мѣсячн.	Поденн.	Лошадей.	Мѣсячн.	Поденн.	Лошадей.	Мѣсячн.	Поденн.	Лошадей.	Мѣсячн.	Поденн.	Лошадей.	Мѣсячн.	Поденн.	Лошадей.	Мѣсячн.	Поденн.	Лошадей.	Всѣхъ.
Январь	42	1½	22	4	_	7	14	1½	1	_	_	_	_	_	_	60	3	30	93
Февраль	$16\frac{1}{2}$	4	7	37	11½	60½	39	18	1	_	_	-	3	. 51/2	-	95½	39	68½	203
Мартъ	14	1	17	46	18½	$42\frac{1}{2}$	441/2	78½	8		-	_	4	8	_	108½	106	$67\frac{1}{2}$	282
Апръль	-	71/2	_	51	149½	69	11	41	1/2	-	11	_	_	_	_	62	209	$69\frac{1}{2}$	3401/
Май	12	18	22	94	549	. 133	5	43	. 4		21	_	_	25	_	111	655	159	925
Іюнь	27	38	56	69	688	85	3	68¾	_	_	2	_	1	12	-	100	806¾	141	1.0473
Іюль	30½	221/2	27	641/2	492	49	7	<b>5</b> 3	_	-	_	_	_	_	-	102	5671/2	76	7451/
Августъ	32½	17	14	77½	$49\frac{1}{2}$	35	4	81/4	-	-	-	_	_	_	_	114	$74\frac{3}{4}$	49	237%
Сентябрь	$11\frac{1}{2}$	51	34	35½	$124\frac{1}{2}$	65	23	2	_		_	_		3	-	70	180½	99 '	3491/
Октябрь	33	80	34	23	60	48	33	$6\frac{1}{2}$	1/2	-	-		_	7	_	89	$153\frac{1}{2}$	821/2	325
Ноябрь	75	113	41	11/2	18	13	30	13½	_	_	_	_	_	21/2	_	106½	146	54	307
Декабрь	82	27	46		3	-	28	-	-	-	-	_	_		_	110	30	46	186
Всего за годъ .	376	380 1.076	320		2.163 3.273	607	241	334 590	15		34	_	8	63	_	1.128	2.971	942	5.041

**-** 96 **-**

# Андижанское опытное поле.

# въ 1910 году.

Отчетъ завъдывающаго опытнымъ полемъ А. Я. Мухина.

Работы Андижанскаго опытнаго поля въ отчетномъ поду сосредочены были, какъ и въ предыдущемъ, главнымъ образомъ, на опытахъ съ хлопчатникомъ. Много вниманія удѣлено было опытамъ по испытанію и сравненію новыхъ сортовъ хлопчатника, каковые предполагается продолжить и въ будущемъ году для окончательныхъ выводовъ о пригодности ихъ для нашего климата.

Поставлены были опыты съ поливками, съ примъненіемъ различныхъ удобреній.

Сравнивались различные способы культуры хлопчатника, машинный и ручной посъвъ, машинная и ручная обработка. Поставлены были опыты съ количествомъ растеній въ лункахъ, съ разстояніемъ между рядами и растеніями въ ряду и съ чеканкой на различныхъ посъвахъ. Начата индивидуальная селекція наилучшихъ сортовъ хлопчатника на ряду съ примънявшимся уже и ранъе масовымъ отборомъ.

Въ текущемъ году существенную помощь въ работахъ опытнаго поля оказали командированные Департаментомъ практиканты по хлоп-ководству г.г. Алешо, Должиковъ и Гамбургеръ.

Практикантамъ было поручено, между прочимъ, производство фенологическихъ наблюденій и обработка метеорологическихъ данныхъ.

# Метеорологическія условія 1910 года.

Текущій годъ, какъ и прошлый, былъ удачнымъ годомъ для хлопководства; теплый сравнительно декабрь прошлаго года и январь текущаго года съ малыми количествами осадковъ дали возможность рано присту пить къ весенней обработкъ полей. Въ февралъ всюду можно

было видъть на поляхъ туземцевъ, приступавшихъ къ вспашкъ; въ мартъ начался кой-гдъ первый посъвъ хлопка, 30 марта по новому стилю высъянъ былъ первый хлопокъ и на опытномъ полъ, но всходы его не появлялись до 16 го 17-го апръля, такъ какъ мартъ былъ сравнительно холодный—средняя температура была 6,1°, тогда какъ въ прошломъ году средняя температура марта была 8,4°. Въ серединъ мая закончены были всв посввы, кой-гдв произведено уже и первое его мотыженіе. Въ серединъ іюня началось цвътеніе хлопчатника, въ началъ августа его созръваніе. Въ концъ августа было кой-гдъ приступлено къ первому сбору его. Отсутствіе осадковъ въ августъ, небольшое количество ихъ въ сентябръ, и теплый сравнительно октябрь дали возможность вызрѣть всѣмъ завязавшимся коробочкамъ хлопчатника, и всъ сборы его попали въ первые сорта. Подробное изложеніе метеорологическихъ условій текущаго года и сравненіе ихъ съ предыдущими годами приводится ниже для каждаго мъсяца въ отдъльности (по новому стилю).

Январь. Среднее барометрическое давленіе января текущаго года было 721,8—ниже средней нормы (723.5) на 1,7 mm. Нормой для сравненія метерологическихъ условій отчетнаго года принятъ средній выводъ изъ данныхъ метеорологической станціи Андижайскаго опытнаго поля за послъдніе 6-ть лътъ. Минимумъ 711,4—наблюдался 6-го января, максимумъ—730 mllm наблюдался 14-го.

Какъ видно изъ приводимой ниже таблицы (таб. 1) барометрическое давленіе за январь было ниже нормы. Средняя температура за январь была—1,3°, выше нормы (—2,5°) на 3,8°. Минимумъ t воздуха—10,5° былъ 18 января, въ то же время на поверхности почвы t упала до—11,5°. Максимальная температура наблюдалась въ воздухѣ 31-го и была—12,5°, а на поверхности почвы 29-го и равнялось +29,9°.

По повторяемости вѣтровъ (смотри прилагаемую въ концѣ главы таблицу вѣтровъ) ихъ можно распредѣлить въ такой послѣдовательности: E-16 разъ, W-13 разъ, ESE-8 разъ, SSW-6 разъ и т. д. по силѣ же (въ суммѣ за отдѣльныя наблюденія) они распредѣляются въ такой послѣдовательности: W-27 метровъ, E-26, SSW-12, ESE-10 и т. д.

Распредъливъ вътры на 4 группы: I—восточные отъ NE—до ESE, куда войдутъ имъющіе направленія: NE, ENE, E и ESE;—ІІ группа—вожные отъ SE до SSW, куда войдутъ вътры съ направленіемъ SE, SSE, S и SSW; — ІІІ группа—западные отъ SW—WNW куда войдутъ SW, WSW, W и WNW и, наконецъ, — IV группа стверные вътры съ направленіями отъ NW до NNE, (NW, NNW, N и NNE), получимъ слъдующую сумму скоростей: для западныхъ—56 метровъ, восточныхъ—41,—южныхъ—20; съверныхъ вътровъ въ данномъ мъсяцъ не было. Самый сильный вътеръ наблюдался 6-го вечеромъ—W въ 7 метровъ въ секунду.

Средняя относительная влажность за данный мъсяцъ составляла 71%, ниже нормы (81%) на 10%. Средняя облачность 57%, ниже нормальной (67%) на 10%. Сумма осадковъ 4,1 миллиметра была ниже нормальной (42,2 м.) въ 10 разъ; всего было 7 дней съ осадками, изъ нихъ 5-ть со снъгомъ 12 января вечеромъ началъ падать первый снъгъ за зиму 1909—1910 года; оброзовавъ 14-го послъ второго наблюденія наибольшій снъжный покровъ 3,5 сантм; продержался онъ на поверхности земли до 20-го.

# Метеорологическія данныя за январь.

Табл. 1.

	Барометрическое давленіе.			t <sup>о</sup> воздуха.			влаж-	.%% ч	)B'b.	t <sup>0</sup> на поверх- ности почвы.			t <sup>0</sup> на глубинѣ.		
годы.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Относительная влаж- ность по гигрометру.	Облачность въ %%	Сумма осадковъ.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	0,25	0,5	1,0
100 PM							0 #								
1900		_			_				_	_		181		_	1991
1901		-	_	-2,8	7,0	-18,5	82	72	31,4	_	-	_	_	_	_
1902	_	_	_	0,9	10,5	-16,4	80	52	64,7	+	-	-	_	_	_
1903	-	-		_	-	_	-	-	_	-	-			_	-
1904	-	-	_	-6,9	6,0	-21,3	_	60	22,9	-	_	-	-	_	_
1905	723,0	733,5	712,6	-3,2	9,2	-25,4	-	83	52,5	_	_	_	_	_	-
1906	725,5	733,6	714,5	-3,9	5,4	-18,1	80	54	19,1	-	-	-	100	-	-
1907	723,3	736,9	714,5	-1,4	7,6	-15,6	78	76	61,6	-	-	-	-	-	-
1908	723,0	728,7	714,7	-0,7	6,8	-14,0	91	82	102,8	0,1	11,0	-13,4	1,3	2,3	5,3
1909	724,6	733,4	709,2	-5,6	6,0	-20,5	81	65	20,8	-3,1	12,0	-15,6	-0,3	1,0	4,6
1910	721,8	730,7	711,4	1,3	12,5	-10,5	7,1	57	4,1	1,8	24,9	-11,5	2,3	3,7	9,9
Среднее .	723,5	732,8	712,8	-2,5	7,9	-17,9	81	67	42,2	-0,4	16,0	-13,5	1,1	2,3	6,6

Сравнивая температуры января мѣсяца текущаго года съ температурами того же мѣсяца другихъ лѣтъ (см. тал. № 1,) видимъ, что въ отчетномъ году январь былъ самымъ теплымъ за разсматриваемый періодъ времени.

Февраль. Средняя температура воздуха въ февралѣ  $3,3^{\circ}$  (табл. 2)—выше нормы  $(+0,7^{\circ})$  на  $2,6^{\circ}$ ; максимумъ  $12,7^{\circ}$  близокъ къ нормальному  $(11,7^{\circ})$  и былъ наблюда емъ 1-го и 2-го; минимумъ $-4,4^{\circ}$  былъ на  $7,6^{\circ}$  выше нормальнаго  $(-12,0^{\circ})$ . Самымъ теплымъ днемъ было 5-е февраля, когда средняя температура равнялась $+6,1^{\circ}$ .

# Метеорологическія данныя за февраль.

Табл. 2.

годы.	Барометрическое давленіе.			t <sup>0</sup> воздуха.			влаж-	въ %%.	Bb.	t <sup>o</sup> на поверх- ности почвы.			t <sup>o</sup> на глубинѣ.		
	Среднес.	Maximum.	Minimum.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Относительная влаж- ность по гигрометру.	Облачность в	Сумма осадковъ.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	0,25	0,5	101
			ryer.		2										has
1901 .				0,6	16,7	- 9,8	73	40	1,0						
1902				1,7	14,2	10000		57	23,7						
1903		_									100			_	
1904		_	_	2,9	16,4	-11,3	_	44	9,6	_	_		_	_	<u> </u>
1905	725,8	733,4	715,5	ASSESSED TO SE	3,7		_		7,6	_	_	1 1 1 1 1	_	_	1
1906	720,8	to the contract of		<b>建建设施设计</b>	8,4	32000	85	82	20,2		_		_		_
1907	721,7	730,2	713,8	0,9	14,2	- 7,7	76	70	1,2	-	-	_	-	_	-
1908	722,5	731,8	709,0	-1,8	8,3	-16,5	86	76	31,2	6,0	22,0	-15,9	1,1	2,0	4,2
1909	723,0	730,2	715,4	0,1	11,0	-16,3	82	60	27,5	2,3	22,0	-17,2	0,4	1,0	3,4
1910	723,1	729,1	711,2	3,3	12,7	- 4,4	73	63	37,1	5,0	25,9	- 7,9	4,4	5,1	10,4
Среднее .	722,8	730,4	712,8	+0,7	11,7	-12,0	78	62	17,7	4,4	23,3	-13,7	2,0	2,7	6,0

Относительная влажность 73%—близка къ нормальной (78%). Облачность 63%—почти ровна нормъ (62%).

Всего выпало осадковъ 37,1 мил., выше нормы (17,7) почти на 20 мил.; дней съ осадками было 8, изъ нихъ со снъгомъ 4; максимумъ осадковъ (снъгъ) былъ 7-го—11,2 мил. Снъжный покровъ легъ на землю слоемъ въ 5 сантиметровъ, но на слъдующій день 8-го, была оттепель (+2,3°), и снъгъ растаялъ. Барометрическое давленіе—723,1—близко къ среднему для этого мъсяца за предшествовавшіе годы (722,8), максимумъ—729,1 и минимумъ 711,2 также близки къ соотвътствующимъ нормальнымъ.

Средняя температура на поверхности почвы за февраль была 5, 0°—близка къ нормальной (4,4°). Максимумъ наблюдался 5-го и равнялся +25,9°; минимумъ — 7,9°—наблюдался 2-го; какъ максимумъ такъ и минимумъ были выше нормальныхъ. Если бы вычертить кривую колебаній температуръ за сутки на поверхности почвы, то она бы пред ставляла ломанную линію съ крутымъ подъемомъ и паденіемъ; для примъра возьмемъ колебанія, наблюдавшіяся 1-го февраля. Утромъ во время 1-го наблюденія температура на поверхности почвы была—6,2°,

въ часъ дня (во время 2-го наблюденія) поднималась до $+25,9^{\circ}$  и вечеромъ (во время 3-го наблюденія) упала до $-4,4^{\circ}$ .

Температура на глубинѣ 0,25 метра колебалась въ предѣлахъ отъ 1,6 $^{0}$  до 5,7 $^{0}$ , въ среднемъ за мѣсяцъ равнялась 4,4 $^{0}$ , выше нормы (2,0 $^{0}$ ) на 2,4 $^{\circ}$ ; на глубинѣ 0,5 метра колебанія были отъ 3,3 $^{0}$  до 5,8 $^{0}$ ,—въ среднемъ 5,1 $^{0}$ ; выше нормы (2,7 $^{0}$ ) на 2,4 $^{\circ}$ ; на глубинѣ же 1 метра колебанія были въ предѣлахъ отъ 9,4 $^{0}$  до 11,2 $^{0}$ —среднее за мѣсяцъ 10,4 $^{0}$ , выше нормы на 4,4 $^{0}$ .

По повторяемости вътровъ на 1-мъ мъстъ нужно поставить Е— 11 разъ, за нимъ слъдуетъ W—7 разъ, слъдующій WSW—6 разъ пт. д.

По силъ на 1-мъ мъстъ стоитъ восточный Е—23 метра; вторымъ WSW—14 метровъ, третьимъ—ESE—13 метровъ и т. д.

Самый сильный вътеръ былъ 19-го вечеромъ Е съсилой 7 метр. въ секунду.

Распредѣливъ вѣтры по повторяемости на четыре группы, мы получимъ слѣдующія данныя за мѣсяцъ: І. восточные—25, ІІ. западные—20, ІІІ. южные—7 и ІV. сѣверные—1; распредѣливъ ихъ по силѣ, получимъ:—І. восточные—49 метр, ІІ. западные — 40 метр., ІІІ. южные—11 метр. и ІV. сѣверные—3 метра.

Мартъ. Среднее барометрическое давленіе—721,3 почти равно среднему (722,0); максимумъ—730,3 равенъ среднему за нѣсколько лѣтъ, только минимумъ—709,2—ниже нормы (712,0).

Температура воздуха въ среднемъ за мартъ— $6,1^{\circ}$ —ниже нормальной на  $1,1^{\circ}$ , максимумъ  $18,0^{\circ}$  ниже нормы на  $3^{\circ}$ ; минимумъ— $4,6^{\circ}$  выше нормы (— $6,2^{\circ}$ ) на  $1,6^{\circ}$ .

Сравнивая температуры нынѣшняго года съ температурой прошлаго года, мы замѣтимъ ея пониженіе для отчетнаго года (см. прилагаемую таблицу № 3).

Относительная влажность—69%—ниже нормы (76%); облачность понизилась (58%) противъ нормы на 6%; всего безоблачныхъ дней было—6. Осадки—101,8 мил. выше нормы (44,3) на 57,5 мил. Всего съ осадками было 13 дней, изъ нихъ два со снъгомъ: снъжный покровъ былъ глубиною 3 сант. и продержался два дня.

Температура на поверхности почвы  $8,2^{\circ}$ , ниже нормы  $(9,2^{\circ})$ —на  $1,0^{\circ}$ , съ колебаніями отъ— $4,5^{\circ}$  до $+28,5^{\circ}$ ; максимумъ  $32,6^{\circ}$  былъ ниже нормы  $(56,6^{\circ})$ ; минимумъ— $7,2^{\circ}$  выше нормы— $8,1^{\circ}$ . Послѣдній весенній морозъ въ воздухѣ—0,7 былъ 21-го марта, температура на глубинѣ 0,25 метра  $7,1^{\circ}$  почти равнялась нормѣ; на глубинѣ 0,5 метра почти равнялась нормальной; на глубинѣ 1-го метра составляла  $11,7^{\circ}$ , превышая нормальную  $(8,2^{\circ})$  на  $3,5^{\circ}$ .

По повторяемости вътровъ на 1-мъ мъстъ стоитъ Е—24 раза; по суммъ скоростей на 1-мъ мъстъ нужно поставить Е—62 метра.

#### Метеорологическія данныя за мартъ.

Табл. 3.

A 18,4	Барометрическое давленіе.			t <sup>0</sup> воздуха.			влаж-	ь %%.	)ВЪ.	t <sup>0</sup> на поверх- ности почвы.			t <sup>0</sup> на глубинѣ.		
годы.	нее.	Maximum.	Minimum.	нее.	Maximum.	Minimum.	Относительная влаж-	Облачность въ	Сумма осадковъ.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	0,25	0,5	,10
rii diili	Среднее.		Mini	Среднее.	Maxi								метра.		
1901	_	n <u>—</u> 10	ъ.	10,3	24,6	- 1,2	81	65	33,1	(1.00 (1.00	_	_	_		_
1902		_	्र <del>द</del> ाक्ष	7,8				58	59,5	_	-	_		-	_
1903	_	_	-	_	_	-	_	_	-	_	_	-	-		-
1904	8877778	- F (2.5) -		9,3	21,8	- 2,0		71	48,0	-	-	_	_	20	-
1905	722,3	729,6	711,6	2,7	15,6	-15,0	72	56	19,0	1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	-		-		-
1906	720,2	727,7	707,7	8,5	22,6	- 3,8	73	58	35,1	-	-	-	_		-
1907	720,9	729,3	709,7	6,7	20,4	- 8,3	76	67	46,0	_	-	_	-	ar uz d	-
1908	724,1	736,0	715,6	5,4	22,0	- 9,5	82	68	20,5	8,9	41,7	-11,4	6,0	5,6	5,7
1909	723,3	730,8	718,3	8,4	23,6	- 1,0	77	70	35,7	10,5	+4		8,0	7,5	7,1
1910	721,3	730,3	709,2	6,1	18,0	- 4,6	69	58	101,8	8,2	32,6	- 7,2	7,1	7,0	11,7
Среднее.	722,0	730,6	712,0	7,2	21,0	- 6,2	76	64	44,3	9,2	36,6	- 8,1	7,0	6,7	8,2

Распредъливъ ихъ на 4 группы, получимъ по повторяемости: І. восточные—29, ІІ. западные—24, ІІІ. съверные—6 и ІV. южные—1; по суммъ скоростей—І. восточные—75 метровъ, ІІ. западные—52 метра, ІІІ. съверные—12 метр., и ІV. южные— 1 м. Самый сильный вътеръ былъ Е—2-го и 10-го и NW 18-го со скоростью 7 метровъ въ секунду.

Апръль. Среднее барометрическое давленіе 718,8 ровняется нормальному; максимумъ 728,5 болѣе на 1,0 противъ нормальнаго; минимумъ—710,1—почти равенъ нормальному. Средняя температура воздуха 14,90 равна нормѣ; максимумъ такъ-же почти равенъ нормѣ; минимумъ понизился на 1,20.

Сравнивая температуру апръля мъсяца нынъшняго года съ температурой того-же мъсяца прошлаго года сказать можно, что данный мъсяцъ нынъшняго года былъ холоднъе.

Относительная влажность 57% ниже нормы на 10% (см. таблицу № 4); минимумъ относительной влажности за данный мѣсяцъ—29% былъ 12-го. Облачностъ 61% почти равняется нормальной (60%). Всего безоблачныхъ дней было 5-ть. Сумма осадковъ 15,0 мм; ниже нормы (27,6) на 12,6 мм.; дней съ осадками было 9-ть.

#### Метеорологическія данныя за апрёль.

Табл. 4

nanus e		метрич авлені		to	возду	xa.	влаж-	۰%% ۹	BF.		а пов ти по		t <sup>o</sup> на	глуб	ійнь.
годы.	Средвее.	Maximum.	Minimum.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Относительная влаж- ность по гигрометру.	Облачность въ	Сумма осадковъ	Среднее.	Maximum.	Minimum.	0,25	0,5	1,0
MIE (84) 1011 - 6111	Cpe	Маэ	Min	Che,	Max	Min	Отно	06.18	Сум	Cpe	Max	Min	м	етр	) a.
6,87,3803	dbali	gos .							9.034	1				ona	n.e.i
len corp		TRACE PER										10100			
1901	80 <u>.</u> 1	1		15,7	28,4	5,0	61	55	26,2	_		_	_	<u>05</u> 17	100
1902 .	-	-	_	13,3	27,3	-0,2	75	76	64,7	-	-		_	E (3.16)	2.
1903	_	-		13,9	27,0	-1,5	-	56	1,0	-		-	<del> </del>	-	-
1904	-1	8	8 4	14,6	28,0	2,5	:)	53	32,7			-		-	_
1905	719,2	728,6	712,5	14,4	27,7	-0,6	-	_	33,0	-	-	-	- 1	_	-
1906	719,2	732,5	708,5	12,8	25,2	-0,9	70	68	32,8	_	-	-	_	-	_
1907	716,1	721,9	707,0	17,3	26,5	5,0	57	70	28,1			-	-	-	-
1908	718,2	724,3	711,3	15,5	28,2	5,5	79	63	18,4	18,0	50,0	3,0	14,3	13,5	11,4
1909	719,8	725,8	710,4	17,6	30,0	6,5	72	40	24,0	19,3	SECTATE STOP	2,0	15,1	14,2	12,8
1910 .	718,8	728,5	710,1	14,9	28,2	1,0	57	61	15,0	19,4	50,0	-0,3	13,9	13,1	15,8
Среднее.	718,5	726,9	709,9	15,0	27,6	2,2	67	60	27,6	18,9	48,8	1,6	14,4	13,6	13,2

Температура на поверхности почвы  $19,4^{\circ}$ —выше нормы (18,9) на  $9,5^{\circ}$ ; максимумъ  $50,0^{\circ}$  — выше нормы  $(48,8^{\circ})$  на  $1,2^{\circ}$ ; минимумъ опускается до— $0,3^{\circ}$ —8-го апръля, ниже нормы на  $1,9^{\circ}$ ; Это послъдній весенній морозъ текущаго года, и такой минимумъ въ апрълъ не наблюдался въ предыдущіе годы. Въ воздухъ минимумъ t ниже +1,0 не опускался. Средняя температура апръля текущаго года на глубинъ 0.25 метра —  $13.9^{\circ}$  — ниже нормальной  $(14,4^{\circ})$  на  $0,5^{\circ}$ ; на глубинъ 0,5 метра— $13,1^{\circ}$ , ниже нормальной  $(13,6^{\circ})$  на  $0,5^{\circ}$ ; только на глубинъ 1,0 метра температура  $15,8^{\circ}$ , повысилась выше нормы на  $2,6^{\circ}$ .

По повторяемости вътровъ на 1-мъ мъстъ нужно поставить Е.— 18 разъ, по суммъ скоростей на 1-мъ мъстъ нужно поставить Е— 32 метра; распредъля вътры по группамъ по повторяемости ихъ и по суммъ скоростей, получимъ: по повторяемости—І. восточные—24 раза, ІІ. западные—15 разъ, ІІІ. южные—12 разъ и ІV. съверные—9 разъ; по суммъ скоростей—І. восточные—39 метр., ІІ. западные—31, ІІІ. южные—28 м. и ІV. съверные—24 метр. Самый сильный вътеръ наблюдался 18-го вечеромъ—SSE съ силою 9 метр. въ секунду; слъдующіе по силъ были S и WSS—7 метровъ въ секунду.

Май. Сравнительно съ предшествовавшими годами май мѣсяцъ этого года былъ болѣе теплымъ.

Средняя температура его  $22,3^{\circ}$ —выше нормальной  $(20,7^{\circ})$  на  $^{\circ}1,6^{\circ}$  (см. табл. 5). Максимумъ поднялся до  $37.8^{\circ}$ , былъ выше нормы на  $5,1^{\circ}$ . Относительная влажность 57%—ниже нормальной (65%). Всего выпало осадковъ 17,5 mil, ниже нормы  $(27.7\,\text{ мм.})$  на  $10,2\,\text{ мм.}$ ; всего дней съ осадками было 8, максимумъ осадковъ былъ 7-го— $6,6\,\text{ мм.}$  Облачность 49%—ниже нормы 54% на 6%; безоблачныхъ дней было 4. Температура на поверхности почвы колебалось отъ  $11,2^{\circ}$  до  $60,8^{\circ}$ , средняя температура  $28,9^{\circ}$ —выше нормы на  $2,8^{\circ}$ , максимумъ  $58,8^{\circ}$  выше нормальнаго  $(55,4^{\circ})$  на  $3,4^{\circ}$ , минимумъ  $4,0^{\circ}$  почти равенъ нормальному  $3,3^{\circ}$ . Температура на глубинъ  $0,25\,$  метра  $21,0^{\circ}$  равна нормальной средней, только на глубинъ  $0,5\,$  метр.—выше нормы на  $0,4^{\circ}$  и на глубинъ  $1,0\,$  метра—выше на  $3,9^{\circ}$ .

#### Метеорологическія данныя за май.

Табл. 5.

	Барог	метрич авлені	еское	to	возду	xa.	влаж-	·%% 9	B'b.		а пов	20	t <sup>o</sup> на	. глуб	инѣ.
годы.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Относительная влаж- ность по гигрометру.	Облачность въ %%-	Сумма осадковъ	Среднес.	Maximum.	Minimum.	0,25	0,5	1,0
	<u> </u>						0 #							GGA.	
n - HLH1)	1.55 1.555(1.	<i>11</i> . 93		714	r Filips	uwai		101123	a ligar				107532	a.	
1901	14		_	19,9	30,8	8,5	64	58	27,5	_	04		_		
1902	121	OTE		21,3	PERMISSION.	10,0	71	55	25,6	4	_		1	<u>-11</u>	( <u>)</u> ()
1903 .	-1	16 <u>—</u> 1	11 <u>- 1</u> 14	19,5		8,0		47	45,0	_	7,4	<u>. 11</u> 7	9236		(3 <u>-0-1</u> )
1904		4-40	_	21,4	34,8	6,3		51	31,0	ш.		g <u>st</u>	1	_	(31.2)
1905	718,2	723,3	710,3	20,1	33,1	7,8	-	59	44,9	ein.	8 <u>62</u> g		12 N	124	( <u>11</u> 1)
1906	716,1	726,6	709,0	20,9	31,0	8,5	67	70	2,7	-				12/_ 1	-
1907	718,6	725,6	710,6	19,1	30,4	6,5	63	67	65,5	12.	1 <u>11</u> ,		-	_	4
1908	718,2	726,4	710,4	20,9	31,2	7,9	62	42	7,5	24,7	54,5	5,1	20,4	19,1	12,8
1909	720,6	728,0	712,6	21,9	35,2	5,3	71	43	9,8	24,6	53,0	0,8	21,6	20,0	17,0
1910	716,3	729,0	709,5	22,3	37,8	8,5	57	49	17,5	28,9	58,8	4,0	21,0	20,1	20,7
Среднее.	718,0	726,5	710,8	20,7	32,7	7,7	65	54	27,7	26,1	55,4	3,3	21,0	19,7	16,8

По повторяемости вътровъ на 1-мъ мъстъ нужно поставить E—24 раза; слъдующимъ идетъ W—9 разъ. По суммъ скоростей на 1-мъ мъстъ нужно поставить E—47 метр, на 2-мъ W—27 метр. Раз-



Рис. 6. Главное зданіе Андижанскаго опытнаго поля.



Рис. 7. Поливка поля передъ вспашкой.

бивъ вѣтры на 4 группы, получимъ: по повторяемости— І. восточные—33, ІІ. западные—16, ІІІ. сѣверные—11 и ІV. южные—10; по суммѣ скоростей—І. восточные—56 метр., ІІ. западные—42, ІІІ. сѣверные—16 и ІV. южные—1,0. метр. Самый сильный вѣтеръ—W наблюдался 4-го съ силой 9 метровъ.

I ю н ь. Среднее барометрическое давленіе—714,1 ниже нармальнаго (714,8); максимумъ 717,8—ниже нормальнаго (7≥0,5) и минимумъ 709,8 равнялся нормальному.

Средняя температура воздуха 25,5°—выше нормы на 0,7°, максимумъ 39,1°—выше нормы (36,0°) на 3,1° и выше максимумовъ прежнихъ лътъ. Минимумъ—14,9°—выше нормы на 2,1°.

Относительная влажность 56% равна нормальной, низшая относительная влажность даннаго мъсяца—31% наблюдалась 13-го. Выпало осадковъ 27,7 мил.,—выше нормы (14,2 м.) на 13,5 мил.; всего было съ осадками 10 дней; сравнивая суммы осадковъ за прошлые года, мы увидимъ, что только одинъ 1901 годъ былъ обильнъе осадками въ іюнъ мъсяцъ, всъ же остальные бъднъе текущаго года. Облачность 47%—выше нормы (42%) на 5%; всего безоблачныхъ дней было 3.

# Метеорологическія данныя за іюнь.

Табл. 6.

	Баром	иетрич авлені	еское	$t^{o}$	возду	xa.	влаж-	.%% ч	)B'E.	t <sup>o</sup> н	а пов ти по	ерх-	t <sup>o</sup> на	глуб	инъ.
годы.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Относительная влаж- ность по гигрометру.	Облачность въ	Сумма осадковъ.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	0,25	0,5	1,0
	Cp	M	Mi	Ср	M.	Mi	Оте	90	Cy	Cp	Ma	Mi	M (	етр	a.
							,								
1901	_	_		22,1	34,0	10,4	59	57	36,3	-		-			_
1902	_	_	_	26,2	38,2	15,3	59	45	12,8		1	+			_
1903	_	-	-	-	-	_	_		-	-	_		-		
1904	_	—	_	24,8	34,4	11,5	_	25	9,6	+	-	_	-	_	_
1905	715,0	721,4	708,1	25.1	35,8	14,0	_	35	4,2	2.5		-	-	_	_
1906	712,7	716,3	708,9	26,3	36,2	15,3	55	50	4,3	_	_	_	_		_
1907	714,8	719,3	709,7	23,0	33,0	12,2	51	47	22,8	26,9	52,6	9,1	23,4	22,4	19,6
1908	715,1	724,3	710,0	25,1	35,4	11,0	57	40	5,3	30,4	62,3	8,1	23,8	22,3	19,1
1909 .	717,1	724,1	712,8	24,8	38,0	10,3	56	32,	5,2	28,6	64,3	9,0	26,2	24,7	21,4
1910 .	714,1	717,8	709,8	25,5	39,1	14,9	56	47	27,7	31,8	58,0	12,2	25,2		24,3
Среднее.	714,8	720,5	709,9	24,8	36,0	12,8	56	42	14,2	29,4	59,3	9,6	24,6	23,3	21,1

Средняя температура на поверхности земли 31,8°, и минимальная температура 12,2° были выше соотвътствующихъ нормъ; максимальная же температура—58,0° была ниже нормы (59,3°) на 1.3°.

Распредъля вътры на 4 группы, мы получимъ: по повторяемости— І. восточные—31 разъ, П. съверные—16, ПІ. западные — 15 и ІV. южные—7; по суммъ скоростей—І. восточные—63 метра, П. съверные—33 метра, ПІ. западные—21 и ІV. южные—9 метр. На 1-мъ мъстъ по повторяемости и по суммъ скоростей нужно поставить восточные съ преобладаніемъ восточнаго вътра, на 2-мъ мъстъ съверные, какъ по суммъ скоростей, такъ и по повторяемости съ преобладаніемъ съверозападнаго вътра. Самый сильный вътеръ наблюдался 29-го NW съ силою 14 метр. въ секунду. Среднія температуры на глубинъ 0,25 метр., 0,5, и 1,0 метра выше нормальныхъ; на глубинъ 0,25, средняя температура 25,20—выше нормальной (24,60) на 0.60; на глубинъ 0,5 метра—выше на 0,50 и на глубинъ 1,0 метра—24,30—выше на 3,20.

#### Метеорологическія данныя за іюль.

Табл. 7.

	Барог	метрич (авлені	еское	to	возду	xa.	влаж-	.%% ч	)BЪ.		а пог		to на	глуб	инъ.
годы.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Относительная влаж- ность по гигрометру.	Облачность въ	ма осадковъ.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	0,25	0,5	1,0
	Сред	Max	Min	Cpet	Max	Mini	Отно	Обля	Сумма	Сред	Max	Min	м	етр	a.
0.1   6.0															
.0.41 7 98	and the second														
1901		-	_	26,0		14,9	48	38	5,4	-			-	-	-
1902	-	-	-	25,5	34,6	10,0	54	35	22,9	<b>-</b>	-	+	—	-	-
1903	-	-	-	25,7	35,9	15,9	-	27	2,5	i —	_	$\perp$	-	_	-
1904	-		_	25,4	35,6	11,7	_	24	1,7	l —	_	_	_	_	
1905	712,2	718,5	707,4	26,5	35,8	16,3	_	33	2,0	-	_	_		_	-
1906	711,5	718,7	707,1	24,7	35,0	11,6	72	47	41,6	_	_	_	_	_	_
1907 .	712.3	716,8	708,4	25,9	34,4	16,7	53	33	1,0	27,1	59,6	12,6	26,2	24,2	21,8
1908	711,3	716,0	707,6	28,0	37,1	15,0	60	15	0,0	35,1	64,0	12,6	27,9	26,9	23,2
1909 .	715,4	719,3	711,0	26,3	38,5	15,0	60	35	2,6	30,9			28,2		24,1
1910 .	710,6	715,3	703,1	28,1	40,2	14.0	59	27	0,5	34,1	59,7		30,6		28,9
Среднее.	712,2	717,4	707,4	26,2	36,2	14,1	58	31	8,0	31,8	61,1	11,8	28,2	26,8	24.5

Іюль. Средняя мѣсячная температура воздуха  $28,1^{\circ}$ —выше нормы  $(26,2^{\circ})$  на  $1,9^{\circ}$ ; максимумъ  $40,2^{\circ}$ —выше нормы— $4,0^{\circ}$ ; минимумъ равенъ

нормъ. Сравнивая среднія температуры прежнихъ лѣтъ, мы видимъ, что въ 1908 году средняя температура этого мѣсяца была равна средней температуръ даннаго 1910 года. Максимальная іюльская температура за разсматриваемый періодъ лѣтъ—наивысшая. Среднее барометрическое давленіе 710,6—ниже нормы (712,2); максимумъ и минимумъ тоже ниже соотвѣтствующихъ нормъ. Относительная влажность 59% равна нормъ. Осадковъ всего выпало 0,5 мил., ниже нормы на 7,5 мил. Облачность 27% ниже нормы (31%); ясныхъ дней 15, пасмурныхъ не было; чистыхъ безоблачныхъ дней—8.

Температура на поверхности почвы—34,1° и минимумъ 10.5°—выше сотвътствующихъ нормъ; максимумъ—59,7°—ниже нормы. Температура на глубинъ почвы 0,25, 0,5 и 1,0 метра много больше нормы и наивысшая за всъ годы.

Распредъливъ вътры на 4 группы, мы получимъ: по повторяемости—І. восточные—20 разъ, ІІ. западные—19 разъ, ІІІ. съверные— 5 разъ, и IV. южные—5 разъ; по суммъ скоростей—І. восточные— 30 метр., ІІ. западные—19 метр., ІІІ. съверные—7 и IV. южные 5 метр.

На первомъ мъстъ, какъ по повторяемости, такъ и по суммъ скоростей, стоятъ восточные съ преобладаніемъ восточнаго вътра; на 2-мъ мъстъ западные и съ преобладаніемъ западнаго вътра.

Самый сильный вътеръ наблюдался 4-го утромъ—Е—5 метр. въ секунду.

Августъ. Среднее барометрическое давленіе—713,2 ниже нормы (714,1); максимальное барометрическое давленіе—721,2—выше нормы (719,7). Температура воздуха 24,9°, выше нормы (24,4°); максимальная температура 36,7°, выше нормы (34,6°) и почти равна максимальной прошлаго года; минимальная температура 11,3°—почти равна нормъ (11,2°); сравнительно по температуръ воздуха августъ нынъшняго года значительно ровнъе августа прошлаго года, когда наблюдались ръзкія колебанія.

Относительная влажность—61%—выше нормы (58%); осадковъ за мъсяцъ не было ни одного миллиметра.

Средняя температура на поверхности почвы  $30,7^0$ —выше нормы  $(28,5^0)$  на  $9,2^0$ ; максимумъ— $57,0^0$  — выше нормы на  $0,4^0$  и минимумъ  $9,3^0$ —почти равенъ нормъ.

Температура на глубинъ 0,25 метра  $30,5^{\circ}$ —выше нормы на  $3,7^{\circ}$  на глубинъ 0,5 метра— $29,9^{\circ}$ — выше нормы на  $3,2^{\circ}$ , и на глубинъ 1,0 метра— $31,3^{\circ}$ —выше нормы на  $5,4^{\circ}$ ; сравнивая эти данныя съ таковыми же прежнихъ лътъ, мы видимъ наибольшую прогръваемость почвы вътекущемъ году.

По повторяемости вътровъ на 1-мъ мъсть будетъ стоять: Е—17 разъ, 2-мъ W—13 разъ; по суммъ скоростей на 1-мъ мъстъ Е—27 метр., на 2-мъ W—21 метр.

Распредъливъ ихъ по повторяемости и по суммъ скоростей на восточные, южные, западные и съверные, мы получимъ по повторяемости: І. западные—25 разъ, ІІ. восточные—19 разъ, ІІІ. южные—9 разъ и ІV. съверные—4; по суммъ скоростей: І. западные—37 метр., ІІ. восточные—29 метр., ІІІ. южные—11 метр. и ІV. съверные—4 метра.

### Метеорологическія данныя за августь.

Табл. 8.

STANKE A		иетрич авленіє		t <sup>o</sup>	возду	xa.	влаж-	.%% 9	BF.		а пов ти по		t <sup>o</sup> на	глуб	инѣ.
годы.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Относительная влаж- ность по гигрометру.	Облачность въ	Сумма осадковъ.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	0,25	0,5	1,0
10.080-03	5	2	Z	D	Z	Z	OH	Ō	2.	0	Z	Z	M	етр	a.
												MAR.			
1901	<u>0</u> 18	<u> 112 (11</u>		23,8	32,6	10,7	50	16	0,0	POT	906	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	V (1)	1150 1150	200
1902	. <u>191</u> 7			24,3	Toller to 1	10,8	52	19	0,0	-130	0333	n <u>ay</u>	123	1	6
1903		_	000	24,7	35,0	10,8	1	32	1,5		_	100	1401	<u>U</u>	
1904	_	_	_	24,5	35,0	11,5		11	4,5	-	_	_			10
1905	714,2	719,2	711,0	23,8	32,8	12,1	67	26	6,1	_	_	<u> </u>		_	_
1906	712,8	720,1	728,7	25,3	34,6	12,2	_	38	5,7	_	1		-		_
1907	713,9	719,9	709,3	23,9	34,6	13,0	66	30	14,2	27,5	53,3	9,6	24,6	24,6	22,9
1908	713,8	718,4	709,8	24,1	33,8	10,5	51	-29	0,9	29,8	60,0	7,1	27,2	26,6	24,5
1909	716,5	720,5	711,5	24,8	36,5	8,7	57	8	0,0	26,1	56,2	11,0	25,1	25,5	24,9
1910	713,2	721,2	709,1	24,9	36,7	11,3	61	12	0,0	30,7	57,0	9,3	30,5	29,9	31,3
Среднее.	714,1	719,7	709,9	24,4	34,6	11,2	58	22	3,3	28,5	56,6	9,2	26,8	26,7	25,9

Сентя брь. Средняя температура воздуха 19,7°—выше нормы (19,4°); максимальная температура 32,2°—выше нормы (31,5°), минимальная температура + 5,5°—ниже нормы на 0,7°. Барометрическое давленіе 717,2—ниже нормы; максимумъ и минимумъ выше соотвѣтствующихъ нормъ.

Относительная вложность 59% — ниже нормы (62%); осадковъ всего выпало за мъсяцъ 2,0 мил. — 6-го; 10 и 18-го выпало только нъсколько капель.

Облачность 26%,—выше нормы (25%) на 1%; всего безоблачныхъ дней 13-ть; въ остальное время небо было покрыто легкими и рѣдкими облачками; посмурныхъ дней было 1—6-го сентября.

Температура на поверхности почвы средняя  $23,7^{\circ}$ —выше нормы  $(21,9^{\circ})$ ; максимумъ  $52,0^{\circ}$  и минимумъ $+3,8^{\circ}$ —превышающіе соотвътствующія нормы.

# Метеорологическія данныя за сентябрь.

Тпбл. 9.

-22,7,1000	Баро	метрич авлені	еское	t <sup>o</sup>	возду	xa.	влаж-	ь %%.	Br.		а пон		to Ha	0,5	инъ.
годы.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Относительная влаж- ность по гигрометру.	Облачность въ	та осадковъ.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	0,25	0,5	1,0
	Сред	Max	Mini	Cpe,	Max	Mini	Отность	06ла	Сумма	Сред	Max	Mini	м	етр	a.
1900				18,8	31,3	1.4		14	0,7						
1900				$ _{19,4}^{10,0}$		1,4 5,6	60	22	3,3		6.04		MEN F		
1902	_	_	_	19,6		7,0	60	29	0,4		_				
1903	_	enquere eq	_	20,2	27.28	7,7	_	31	6,6	_	-		agic second	_	_
1904 .				19,0		4,2	<u></u>	35	23,0	_	0,000 p	<u>-</u>	13410		_
1905	717,4	722,6	709,8	The second	SE 15 17	8,1	66	10	0,0	_	_		_	_	_
1906 .	717,2	723,7	712,1	19,4	32,0	7,5	_	23	0,0	_	-	_	7000	11	4
1907	718,4	725,3	711,9	18,6	29,2	7,5	67	40	3,7	21,2	50,6	4,6	21,1	21,5	21,3
1908	717,6	723,3	712,1	19,5	32,0	7,2	66	23	5,7	23,0	53,2	2,0	22,0	22,6	22,1
1909	717,9	721,3	712,9	19,5	31,6	6,5	58	22	0,0	19,8	50,5	3,0	20,5	21,2	21,3
1910	717,2	726,9	712,7	19,7	32,2	5,5	59	26	2,0	23,7	52,0	3,8	24,3	24,7	28,4
Среднее.	717,6	723,8	711,9	19,4	31,5	6,2	62	25	4,1	21,9	51,6	3,3	22,0	22,5	23,3

Температура на глубинѣ 0,25 метра—24,3°—выше нормы (22,0°) на 2,3°; на глубинѣ 0,5 метра 24,7°—выше нормы на 2,2°; на глубинѣ 1,0 метра 28,4°— выше нормы на 5,1°. Сравнивая температуру почвы настоящаго мѣсяца съ соотвѣтствующими температурами прошлыхъ лѣтъ, мы видимъ опять наибольшую прогрѣваемость почвы, чѣмъ за всѣ прежнія годы.

Разбивъ вътры на четыре группы, получимъ по повторяемости: І. западные—26 разъ, ІІ. восточные—14 разъ, ІІІ. южные—6, и ІV. съверные—4 раза, по суммъ скоростей І. западные—51 метръ, ІІ. восточные—18 метр., ІІІ. съверные—12 и ІV. южные—8 метровъ. Въ восточныхъ вътрахъ преобладаетъ по повторяемости Е—13 разъ со слабой силой его, сумма скоростей равна 17 метр. Въ западныхъ преобладаніе падаетъ на SW—10 разъ съ суммою скоростей 18 метровъ. Самый сильный вътеръ WSW наблюдался 28 разъ съ силою 7 метровъ въ секунду.

Октябрь. Среднее барометрическое давленіе за мѣсяцъ 722,2—равно нормѣ (722,6); максимумъ 732,1 — больше нормы (730,2); минимумъ опустился до 715,2.

Средняя температура + 12,0°—больше нормы (11,7°); максимумъ изъ срочныхъ наблюденій былъ+26,2°, минимумъ-1,5°-16-го октября ниже нормы (1,3°); первое пониженіе t ниже 0 наблюдалось 15-го октября до-0,5°: на слѣдующій день 16-го t упала до - 1,5°, и съ этого дня прекратилась вегетація хлопчатника.

Относительная влажность 66%—меньше нормы (74%); минимумъ относительной влажности за данный мъсяцъ—28 наблюдался 13 и 22-го.

Облачность—35%, ниже нормы (47%) на 12%; всего за мѣсяцъ наблюдалось пасмурныхъ дней — 3, чистыхъ безоблачныхъ — 7, въ остальные же дни небо было покрыто рѣдкими облаками. Дождливыхъ дней было—3, выпало осадковъ 7,6 мил., ниже нормы (14 мил.).

Метеорологическія данныя за октябрь.

Табл. 10.

		метрич авлені		t <sup>o</sup>	возду	xa.	влаж-	.%% ч	)BT.		а пов ти по		t <sup>o</sup> на	ллуб	инѣ.
годы.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Относительная влаж- пость по гигреметру.	Облачность въ	Сумма осадковъ.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	0,25	0,5	1,0
	Ср	M	Mi	රී	Mg	Mi	Оти	90	Cy	Cp	Mg	Mi	M	етр	a.
Accordan															
1900				12,6	23,9	-1,6	-	44	14,8	-	-	_	_	-	-
1901	-	_	(1) <del>(1)</del> (4)	8,8	27,4	-2,2	82	67	90,7	-	-	-	-	- -	_
1902	_	_	-	12,4	26,2	2.9	76	53	47.4	_		-	-	_	_
1903	_	_		13,0	25,8	2,3	-	16	9,2	-	_	_	_	_	_
1904	723,8	728,6	718,8	9,5	23,4	-2,7		33	9,4	_	_	121	_		_
1905	720,5	726,3	716,1	14,5	27,0	3,1	72	25	3,3	_			V.E.	-251	<u> 105</u> 7
1906	721,7	727,1	717,2	13,4	26,4	-3,0	_	35	0,3	0.0			100	_	4_0
1907	723,9	731,9	717,3	10,6	23,2	-1,5	75	. 67	44,2	13,1	42,2	-6,5	13,8	15,1	17,1
1908	723,4	732,8	716,8	10,4	26,2	-3,0	78	49	12,0	12,8	47,5	-6,4	13,6	14,9	17,2
1909	722,4	732,8		15000		-5,6	66	44	.5,8	12,2					18,7
1910 .		732,1		250000		-1,5	66	35	7,6	13,3		-5,5	The state of		23,4
Среднее.	722,6	730.2	717,1	11,7	25,7	-1,3	74	47	14,0	12,8	44,8	-6,3	14,5	15,9	19,1

По повторяемости вътровъ на 1-мъ мъстъ стоятъ: восточные — 17 разъ; слъдующимъ идетъ западный – 8 разъ; по суммъ скоростей на 1-мъ мъстъ стоитъ восточный — 23 метра, на 2-мъ — западный — 16

метр. Самый сильный вътеръ WNW наблюдался 13-го октября со скоростью 14 метровъ въ секунду.

Разсматривая вътры по группамъ, получимъ: по повторяемости І. восточные—19 разъ; ІІ. западные — 10 разъ; ІІІ. южные—8 разъ; ІV. съверные—5 разъ. По суммъ скоростей: І. западные—33 метра, ІІ. восточные—25 метровъ, ІІІ. съверные — 11 метровъ и ІV. южные—8 метровъ. Средняя температура на поверхности почвы 13,3° выше нормы (12,8°), минимумъ—5,5°—выше нормы (—6,3°) на 0,8°. Температура почвы на глубинъ 0,25 метра 16,0°, на глубинъ 0,5 метра 17,4° и на глубинъ 1,0 метра 23,4°— выше среднихъ разсматриваемаго періода лътъ.

Ноябрь. Среднее барометрическое давленіе—724,2 равно нормѣ; максимумъ—737,1—выше нормы (732,0); минимумъ—718,2—выше нормы (716,9). Температура воздуха 5,3°, ниже нормы (6,7°); минимумъ—13,1°—ниже нормальнаго (-4,3°) почти въ 3 раза; это наибольшій минимумъ въ ноябрѣ за 11 лѣтъ; ноябрь текущаго года былъ самымъ холоднымъ изъ предыдущихъ лѣтъ.

# Метеорологическія данныя за ноябрь.

Табл. 11.

, (6) 1 (6)		метрич авлені		t <sup>o</sup>	возду	xa.	влаж- метру.	.%% 9	Въ.		а по		t <sup>0</sup> н	а глуб	инѣ.
годы.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Относительная влам- ность по гигрометру.	Облачность въ	Сумма осадковъ.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	0,25 M	0,5 етр	1,0
Ay, y nosa															eti d
1900 .		· —	_	7,4	20,4	- 4,2	_	. 70	24,5	_	_		_	_	_
1901			7 <b>—</b> 8	7,4	17,0	- 0,4	83	64	26,9	_	_	E	_	-	8 7 11 6
1902	-	-	_	5,5	19,8	- 9,0	86	65	82,2	_	-	-	-		-
1903	_	_	-	5,2	18,6	- 4,8	_	48	22,6	_	-	-		_	_
1904	723,5	730,1	716,5	7,6	21,9	- 2,5	_	32	6,4	_	-	_	-	_	_
1905	724,9	732,1	718,6	7,2	19,6	- 1,5	80	45	20,2	_	-	-	_	_	-
1906	724.7	730,0	717,0	6,8	18,6	- 5,2	_	63	8,8		_	-	-	-	
1907	724,5	732,2	715,1	5,9	22,7	- 1,5	85	80	52,7	6,9	37,5	- 7,1	8,0	9,3	12,5
1908	723,4	732,6	715,5	6,9	19,5	- 3,3	79	45	5,6	6,2	30,5	- 6,9	7,5	9,0	12,1
1909	723,3	729,9	717,2	8,8	22,5	- 3,2	72	39	14,3	7,1	-	- 0,9	9,2	10,6	13,7
1910	724,2	737,1	718,2	5,3	_	-13,1	67	36	4,7	5,5	-	-14,8	7,5	9,9	17,8
Среднее.	724,1	732,0	716,9	6,7	20,0	- 4,3	79	53	24.4	6,4	34,0	- 7,4	8,0	9,7	14,0

Относительная влажность 67%, меньше нормы (79%) на 13%; осадковъ за мѣсяцъ въ видѣ снѣга выпало 4,7 мил., ниже нормы (24,4 мил.); 29 и 30-го снѣжный покровъ былъ глубиною 3 сантиметра. Облачность 36%, значительно ниже нормы (53%), всего пасмурныхъ дней было 5, безоблачныхъ—15, въ остальное время небо было покрыто слабыми облаками.

Средняя за мѣсяцъ температура на поверхности почвы—5,5° ниже нормы (6,4°); минимумъ—14,8° былъ въ 2 раза меньше нормы (—7,4°); температура на глубинѣ 0,25 метра +7,5° ниже нормы (8,0°), на глубинѣ 0,5 метра—9,9° и на глубинѣ 1,0 метра+17,8°—выше соотвѣтствующихъ нормъ. Въ общемъ температура почвы въ ноябрѣ сразу понизилась.

По повторяемости вътровъ на 1-мъ мъстъ стоитъ восточный— 15 разъ, слъдующимъ идетъ WSW съ повторяемостью 11 разъ. Распредъливъ ихъ на группы, получимъ; по повторяемости. І. западные — 26 разъ, ІІ. восточные—26 разъ, ІІІ. съверные—8 разъ и ІV. южные—3 раза; по суммъ скоростей: І. западные—60 метр., ІІ. восточные — 42 метра, ІІІ. съверные—16 метровъ и ІV. южные—3 метра. Самый сильный вътеръ—WSW наблюдался 27-го съ силою 9 метровъ въ секунду.

Декабрь. Средняя температура воздуха— $5,2^{\circ}$ , ниже нормы (+1,0) на 6.2; минимумъ— $23,9^{\circ}$  ниже нормы( $-9,0^{\circ}$ ) на 14,9; сравнивая среднюю и минимальную температуры прошлыхъ лѣтъ, мы увидимъ, что и декабрь текущаго года былъ самымъ холоднымъ изъ всѣхъ (см. табл.  $N_{2}$  12).

Среднее барометрическое давленіе — 727,9—выше нормы (7:24,7) наивысшій въ данномъ м'всяців за всів года минимумъ 721,2 былъ выше нормы (716,3) на 4,9. Относительная влажность—84% выше нормы 81%; сумма осадковъ 20,7 мил.—выше нормы (16,7); число дней съ осадками — 10, изъ нихъ 4 дня съ чуть показавшимся въ воздухъ ръдкимъ снъгомъ; максимумъ осадковъ — 20-го 7,0 мил.; снъжный покровъ доходилъ до 14 сант. и снъгъ держался цълый мъсяцъ; въ концѣ мѣсяца снѣжный покровъ уменьшился до 3 сант.. Облачность— 71%, выше нормы (61%); всего безоблачныхъ дней было 4, пасмурныхъ 18; все остальное время небо было покрыто ръдкими облаками. Температура на поверхности почвы—3,40, ниже нормы (—0,50); минимумъ— 20,5°, ниже нормы (--11,8°). Температура на глубинъ 0,25 метра—0.5°. и на глубинъ 0,5 метра+1,7°, ниже соотвътствующихъ нормъ, температура же на глубин $^{\pm}$  1,0 метра + 10,80—выше нормы (9,50); сравнивая съ температурами почвы предыдущихъ лътъ за этотъ же мъсяцъ мы видимъ сильное ея понижение на глубинъ 0,25 метра.

Изъ вътровъ въ данномъ мъсяцъ по повторяемости и по суммъ скоростей на 1-мъ мъстъ стоитъ WSW. По повторяемости распредъляются они такъ: І. западные — 21 разъ, П. восточные — 21 разъ, ІІІ.



Рис. 8. Вспашка плугомъ.



Рис. 9. Приготовленіе грядъ окучникомъ.



Рис. 10. Устройство джояковъ туземнаго типа.



Рис. 11. Поливка джояковъ.

южные—7 разъ и IV. съверные—3 раза; по суммъ скоростей I. западные—38 метр., II. восточные—33 метра, III. южные—11 метровъ и IV съверные—3 метра.

# Метеорологическія данныя за декабрь.

Табл. 12.

	Баров	тетрич авленіє	еское	t <sup>q</sup>	возду	xa.	влаж- метру.	·%% <b>9</b>	B'B.		и пов		t <sup>o</sup> на	глубі	инъ.
годы.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	Среднее.	Maximum.	Minimnm.	Относительная влаж- ность по гигрометру.	Облачность въ %%-	Сумма осадковъ.	Среднее.	Maximum.	Minimum.	0,25	0,5	1,0
	Cpe,	Max	Min	Cpe	Max	Mini	Отно	<b>1</b> 90	Сум	Cpe	Max	Min	ме	тр	a.
1900 .	-	-		1,1	9,1	- 6,9	-	60	12,5	-	-	_		_	_
1901	-	-	-	1,9	10,7	- 4,5	85	73	11,6		-	_	-	_	_
1902 .	- 1	-	- 1	_	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_	_
1903	_	-	_	-0,6	9,7	-15,7	_	49	8,5	-	_	<u>-</u>	-	-	_
1904	723,2	732,8	712,9	2,7	17,7	- 4,5	-	70	30,7	_	_	-	-	-	_
1905	722,5	730,9	710,9	0,5	10,2	- 8,0	83	52	32,2	-	-		-	-	_
1906	724,2	732,9	716,4	3,5	15,4	- 7,4	78	76	17,0	-	_	_		_	_
1907	725,9	732,1	717,4	1,8	11,5	- 4,5	90	57	22,8	0,7	18.0	- 9,0	2,8	4,4	8,1
1908 .	724,8	731,3	715,1	1,3	13,0	- 8,0	83	64	10,2	0,4	20,5	- 8.4	2,8	4,4	7,9
1909	723.8	732,5	720,2	2,8	14,0	6,2	68	41	0,6	+0,5	-	- 9,5	3,2	5,2	11,4
1910	727,9	737,4	721,2	-5,2	-	-23,9	84	71	20,7	-3,4	-	-20,5	-0,5	1,7	10.8
Среднее	724,7	732,8	716,3	1,0	12,4	- 9,0	81 ,	61	16,7	-0,5	19,2	-11,8	2,1	3,9	9,5

Метеорологическія данныя текущаго года сведены въ приводимыхъ ниже таблицахъ—13 и 14.

Изъ означенной сводки усматривается, что текущій годъ въ метеорологическомъ отношеніи характеризуется теплымъ и безоблачнымъ лѣтомъ, высокой средней годовой температурой, рѣзкими колебаніями барометра и низкимъ среднимъ барометрическимъ давленіемъ, обильными весною осадками и низкой средней относительной влажностью.

	-Ĩ	Т	емпера	атура	воздух	a.	В.	лажн	юсть		0	блач	1-	Ск	opoc	ть			Чис	сло	дн	ей			Mor	. 4800
	барометри- квленіе.		A	бсол	ютнь	гй.			посит ная. По ги	гро-	Н	ость	·. 		ѣтра 						Мор	-		BE.		
М ѣ сяцы.	Среднее бароме ческое давленіе.	Средняя.	Maxim.	Число.	Minim.	Число.	Средняя.	Средняя.	Средняя.	Minim.	7	1	9	7	1	9	Затишье.	Съ осадками.	Ясныхъ.	Пасмурныхъ.	Въ будкѣ.	На поверхности.	Со сивгомъ.	Сумма осадковъ.	Первый осенній.	Послѣдній весений.
Январь	721,8	1,3	12,5	31	-10,5	18			71	36	6.0	6.0	5.0	27	57	26	29	7	6	10	29	30	5	4.1	STEE IN IN	AN IN IN
Февраль	723,1	3,3	12,7	1	- 4,4	Contract of		2	73	38		Unit is	- 3	23		29	29	9		15	16	polici.		37,1		
Мартъ	721,3	6,1	18,0	28/29	- 4,6	6	_	_	69	29				36		43	BARRET .	13		15	12			101,8	1	
Апръль	718,8	14,9	28,2	24	1,0	8	7,3	59	57	29	100			28	Sept.	41.	29	9		12	0			15,0		8
Май	716,3	22,3	37,8	26	8,5	11	10,8	57	57	29	6,0	5,0	4,0	36	54	34	20	8	8	6	_	_	-	17,5	-	_
Іюнь	714,1	25,5	39,1	11	14,9	1	13,6	57	56	31	5,0	3,8	5,3	45	38	43	21	9	6	4	_		_	27,7		_
Іюль	710,6	28,1	40,8	20	14,0	1	15,6	58	59	35	3,4	1,5	3,2	26	25	10	43	3	15	_	_	_	_	0,5	_	
Августъ	713,2	24,9	36,7	6	11,3	30	13,2	58	61	29	1,6	0,7	1,3	25	41	15	36	2	22	_	_	_	_	0,0	_	-
Сентябрь	717,2	19,7	32,2	3	5,5	30	9,1	57	59	24	2,2	2,0	2,9	19	44	25	39	5	16	_	-	_	-	2,0	-	-
Октябрь	722,2	12,0		-	- 1,5		6,1	62	66	28			2,7			33	51	3	10	3	4	11	,	7,6	15	-
Ноябрь	724,2	5,3	-		-13,1	28	_	-	67	38	- Doll		32660	25	COLUMN TO	46	27	4	16	5	16	25	3	4,7	-	-
Декабрь	727,9	5,2	_	_	-23,9	23	_		84	52	7,3	7,2	6,7	23	44	16	41	10	5	18	30	31	8	20,7	-	-
Сумма		_		_				873	_					_	_		_	82	124	88	107	135	22	238,7		
Средняя годовая .	719,2	14,1		_	- 0,2	_	_	_	65	33	4,8	4,4	4,2	28	47	30	33	_		_	_		_	_	-	
Абсолютная за годъ	_	_	40,2	20/уп	-23,9	23/хи	_	_		24	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_		_		
Нормальная годовая (средн. за 6 предш. лѣтъ)	719,4	12,9		1_8	0,3		<u>-</u>	=	69			_	1	_		_	_	67	103	99	105	135	16	238	_	
Абсолютная (за 6 лѣтъ).	_	_	40,2	_	-25,4	No.		_	_	_		-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-

-	-
-	
C	
1	

										-																				1071.		
		1	NI	VE_	N	E	EN	IE	F		E	SE	S	Е	SS	SE_		3_	SS	W	S	W_	WS	W	1	V	WN	W	N	W	N	W
М ѣсяцы. :	Повторяемость.	Сумма скоростей.																														
Январь	_	_		_	_	_	4	5	16	26	8	10	3	5	3	3			6	12	3	7	6	9	13	27	1	1			10	
Февраль	1	3	_		4	7	5	6	11	23	5	3	1	1	2	2	1	1	3	7	4	12	6	14	7	11	3	3				
Мартъ	2	2	1	1	2	8	1	3	29	62	2	2	_		_				1	1	6		11	27	6	100		3	3	9		
Апръль	3	6	3	5	3	4	2	2	18	32		1	2	2	1	9	6	12	3	5	3	9		9				3	3	13	0	
Май	6	8	_	_	8	8		_	24			1	7	7	_		-3	3			6	10		5		15			6	8		
Іюнь	4	4	_		5	7			26	56	_		3	3			4	6		_	7	9		3	6	8	1	1	10	27	2	2
Іюль	2	2		_	2	2	1	1	16	26	1	1			_		3	3	2	2	6	6		1			2	2	3	5		
Августъ	_	_	_	_	_				17	23	2	6	3	3			4	4	2	4	6	8	6	8	13				4	4		
Сентябрь		1	_	_	_	_	_		13			1	3	5	_		3	3		_	10	18		13	9		3	5	3	11	<u> </u>	
Октябрь	1	1	_	_		_		_	17			2	1	1	1	1	4	4	2	2		_	1	3	8	16	1	14	1	3	3	7
Ноябрь	2	2	1	1	1	1		20	15			17	1	1			2	2			4	10	11	37			1	1	4	12	1	1
Декабрь	١.	1		_	3	9	3	3	9		6	8	2	2	_		4	8	1	1	5	8		19				3	2	2		
						-	20,01															Ŭ		10				R				
Итого за годъ	23	30	5	7	28	46	16	20	211	369	38	52	26	30	7	15	34	46	20	34	60	107	60	148	103	187	21	36	39	94	6	10
Средняя скорость вътровъ въ ме- трахъ	_	1,3	_	1,4		1,6	-	1,3		1,8		1,4		1,2	_	2,1	_	1,4	_	1,7	_	1,8		2,5		1,4	_	1,7		2,4	_	1,7

#### Опыты съ хлопчатникомъ.

Сравненіе сортовъ хлопчатника. Опыты съ сортами хлопчатника были поставлены въ 1910 году на двухъ участкахъ: на участкъ № 1 и на участкъ № 9, въ междурядіяхъ промышленнаго сада. Участокъ № 1 былъ вспаханъ съ осени, весною получилъ двъ вспашки (см. рис. 8); послъ послъдней вспашки приготовлены прямыя гряды окучникомъ (рис. 9) высотою 8—10 вершковъ, на разстояніи 1¼ арш. гряда отъ гряды.

Послѣ поливки ихъ пропускомъ воды по арыкамъ, 9 и 10 мая по старому стилю, произведенъ былъ ручной посѣвъ хлопчатника въ срединѣ грядъ на разстояніи 12 вершковъ лунка отъ лунки.

Участокъ предварительно разбить на 37 дълянокъ площадью по 60 кв. с. каждая—нъкоторыя дълянки по краямъ участка были другихъ размъровъ; между всъми дълянками для предохраненія отъ перекрестнаго опыленія сортовъ высъяна была кукуруза «Чинквантино» полосами шириною двъ сажени.

На участкъ высъяны слъдующіе сорта:

Американскіе упланды: Маля желтый, Кингъ изъ общаго урожая; Кингъ, отобранный по цвъту съмянъ, -болъе бълый; Кингъ, отобранный по цвъту съмянъ, болъе зеленый; Кокъ-чигитъ селекціон., Triumph, отобранный по съменамъ безъ черныхъ голыхъ съмянъ, Triumph съмянъ второго сбора; Аунсболъ, отобранный по цвъту,—болье былый; Аунсболь, отобранный по цвыту сымянь, -зеленосымянный, Tindal Select Prolific, съмянъ сбора 13 августа подъ названіемъ «скороспълый»; Tindal Select Prolific, отобранный по съменамъ, бъло-съмянный; Tindal Select Prolific черносъмянный; Hawkins, Christopher Large Big Boll I-го сбора, Christopher Large Big Boll II-го сбора, Allen King съмянъ I сбора; Allen King съмянъ II сбора, Gold Standard съмянъ I сбора, Gold Standard съмянъ II сбора, Mells Select Egyptian съмянъ I сбора, Mells Select Egyptian съмянъ II сбора, отобранный по цвъту волокна, бълый, Mells Select Egyptian съмянъ II сбора, отобранный по цвъту волокна, --желтый, Кара-чигить селекціонный, Кара-чигить, выбранный изъ Кинга, — черныя голыя съмена, Маля-чигитъ селекціонный, Blue Ribbon, Dikson Klark, Russels, Southern Hope, Excelsior Prolific, Pride of Georgia, King Allen, Moss Improwed, Флоридора, Гибридъ Андижанскій и Абаси и египетскіе два сорта: Ашмуни селекціонный и Афифи.

Всв свмена намачивались передъ посввомъ въ водв сутки.

Всему участку за весь вегетаціонный періодъ дано было шесть ноливокъ, три ручныхъ мотыженія и пять конныхъ пропашекъ культи-

ваторомъ. При прорывкъ оставалось по три растенія въ лункъ, какъ на всъхъ другихъ участкахъ.

Всходы появлялись на дълянкахъ очень неравномърно и медленно; на нъкоторыхъ сортахъ запоздавшіе всходы изъ-за образовавшейся послъ дождей 23 и 24 апръля, корки появились только послъ поливки, данной 29 апръля. Первыми появились всходы Кара-чигить (изъ Кинга) и Афифи на седьмой день послъ посъва; послъдними начали появляться всходы y Mells Select Egyptian—на четырнадцатый и даже на 16-ый день послъ посъва; на большей половинъ дълянки на 12-ый день послъ посъва появились всходы у Кинга съмянъ I сбора общаго урожая, у Кинга селекціоннаго болье зеленаго, Кокъ-чигита селекціоннаго, Tindal Select Prolific скороспълаго, Hawkins'a, Карачигита (изъ Кинга) и Афифи; на 13-ый день-у Маля-чигита, на 14-ый день—у Аунсбола селекціоннаго болже бълаго и Triumph безъ черныхъ голыхъ съмянъ; на 15-ый день: у Кинга селекціоннаго болъе овлаго, Аунсбола селекціоннаго зелено-свияннаго, Tindal Sel. Prol. овло-съмяннаго и черно-семяннаго и Christopher Large Big Boll съмянъ II сбора; на 16-ый день: у Флоридора, Russels, Кара-чигить селекціоннаго, Allen King II сбора, Gold Standard II сбора; на 17-ый день: y Meils Select Egyptian I coopa, Allen King I coopa, Gold Standard I сбора, Triumph II сбора и Малля желтый и на 23-ій и 24-ый день послъ посъва на большей половинъ дълянокъ появились всходы: у Pride of Georgia, Excelsior Prolific, Christopher Large Big Boll I coopa и у Mells Select. Egyptian II сбора; въ дальнъйшемъ растенія всъхъ дълянокъ развивались крайне неравномърно.

При осмотръ дълянокъ 25-го мая нъкоторыя растенія сорта Малля желтый достигли уже высоты 22 сант. и имъли боковые побъги (вътви) и цвъточныя почки (бутоны); большая же часть растеній достигла только 14 сант. высоты; тогда же растенія сорта Кіпд изъ общаго урожая достигли 16 сант. и имъли боковые побъги и бутоны; но большая часть, какъ и у сорта Малля желтый, достигла только 14 сант. высоты въ среднемъ.

Кіпд селекціонный, болье былый, достигь въ среднемъ 19 сант., лучшія растенія были 24 сант. съ боковыми побыгами и бутонами. Кіпд селекціонный, болье зеленый, достигь тогда въ среднемъ также 19 сант. высоты, но лучшія растенія были лишь 22 сант. высоты съ очень маленькими боковыми побыгами и бутонами. Лучшія растенія Кокъ-чигить 25 мая достигли высоты 28 сант., боковые побыги появились на нихъ еще 12-го мая, худшія растенія были 25-го мая высотою только 18 сант.

Лучшія растенія сорта Triumph безъ черныхъ голыхъ сѣмянъ были тогда въ среднемъ 19 сант.; нѣкоторые изъ нихъ съ боковыми побѣгами и бутонами; среднія растенія достигали тогда 8 сант. высоты.

Triumph съмянъ II сбора 25 мая достигъ въ среднемъ высоты 9 сант.; боковыхъ вътвей не было еще и на лучшихъ растеніяхъ. У Аунсбола (Ounce Boll) селекціоннаго, бол'є бълаго, лучшія растенія достигали высоты 25 сант. и нъкоторые имъли по 3 боковыхъ побъга съ бутонами, но средняя высота растеній—10 сант. У сорта Аунсболъ селекціоннаго, бол'ве зеленаго, средняя высота растеній-9 сант. съ только появившимися боковыми вътвями. Tindal Sel. Prolific скороспълый достигъ высоты въ среднемъ 19 сант., лучшіе экземпляры съ боковыми вътвями и бутонами. Tindal Sel. Prolific безъ черныхъ голыхъ съмянъ достигъ тогда въ среднемъ только 6 сант. высоты и ни у одного растенія не было боковыхъ вътвей. Лучшія растенія «Hawkins» были высотою 26 сант. съ боковыми вътвями и бутонами. Christopher Large въ среднемъ высотою 8 сант. безъ боковыхъ вътвей; Christopher Large II сбора въ среднемъ 13 сант. высотою и лучшія растенія съ тремя боковыми вътвями. Allen+King I и II сбора достигли въ среднемъ 12-13 сант. На объихъ дълянкахъ попадаются растенія съ красными листьями и стеблями. Pacteнія Gold Standard I сбора въ среднемъ 9 сант. высоты, Gold Standard II сбора высотою въ среднемъ 14 сант. и нъкоторые съ боковыми вътвями. На дълянкахъ Mells Sel. Egyptian растенія въ среднемъ 9-10 сант. безъ боковыхъ вътвей, Кара-чигитъ селекціон. въ среднемъ-14 сант. высоты. Лучшія растенія—18 сант. съ боковыми вътвями и бутонами. Кара чигить (изъ Кинга) въ среднемъ высотою 18 сант. съ боковыми вътвями и бутонами. Растенія Малля-чигить въ среднемъ достигли 15 сант. высоты. Blue Ribbon въ среднемъ высотою 11 сант.; Dikson Klark 25 мая въ среднемъ были 13 сант., Russels—17 сант. высоты въ среднемъ и нъкоторые съ боковыми вътвями. Southern Hope въ среднемъ-14 сант. высоты, нъкоторыя съ боковыми вътвями и бутонами. Растенія сорта Excelsior Prolific и Pride of Georgia— 10 сант. высоты въ среднемъ; растенія King + Allen достигли въ среднемъ 15 сант. высоты, дучшія растенія съ боковыми вътвями и бутонами. Растенія сорта Moss Improwed, Андижанскій Абасси и Ашмуни селекціонный въ среднемъ-14 сант. высоты, у Флоридора средняя высота растеній 9 сант., у Афифи средняя высота растеній 20 сант., и есть растенія съ боковыми вътвями и бутонами. При осмотръ дълянокъ 13 іюня лучшія растенія сорта Малля желтый достигали 46 сант., среднія 36 сант.; лучшія растенія Кинга изъ общаго урожая достигли высоты 52 сант., среднія 38 сант. У Кинга селекціоннаго бол'ве бълаго, средняя высота растеній-36 сант., а у болье зеленаго средняя высота растеній—32 сант. У Кокъ-чигита лучшія растенія высотою 60 сант., среднія 32 сант. Тріумфъ безъ черныхъ голыхъ съмянъ, средняя высота растеній — 30 сант., лучшія растенія высотою 48 сант. Triumph II сбора въ среднемъ 26 сант. съ боковыми вътвями и бутонами. Лучшія растенія Ounce Boll селекціоннаго, болье былаго, достигли 13 іюня въ среднемъ 60 сант.; у селекціоннаго зелено-сѣмяннаго средняя высота растеній—24 сант.

Растенія Tindal Select Prolific скороспѣлаго достигли въ среднемъ 42 сантиметра высоты, а растенія Tindal Select Prolific бѣлосѣмяннаго и черносѣмяннаго достигли въ среднемъ 22—24 сантиметра высоты съ зачатками боковыхъ вѣтвей и бутоновъ.

Лучшія растенія сорта Hawkins достигли 13 іюня высоты 48 сант. а растенія сорта Christopher Large I и II сб. были только высотою 29 и 30 сант. въ среднемъ. Алленъ Кингъ I и II сбора въ среднемъ 28 сантим. высоты, съ боковыми вътвями и бутонами. Gold Standard II сбора въ среднемъ 32 сантим. высоты; Gold Standard I сб. достигъ въ среднемъ высоты 24 сант. съ начинающимися развиваться боковыми вътвями и бутонами.

Растенія Mells Select Egyptian I сбора достигли въ среднемъ высоты 32 сантим., съ боковыми вътвями и бутонами; растенія Mells Select Egyptian II сб. бълаго и желтаго достигли въ среднемъ 24 сант. высоты и только на растеніяхъ высотою 30 сант. есть зачатки боковыхъ вътвей и бутоновъ. Кара-чигитъ селекціонный 13 іюня достигъ въ среднемъ 34 сантим. высоты; Кара-чигитъ изъ Кинга—даже 42 с. Лучшія растенія Малля-чигитъ достигли 38 сант. высоты, нѣкоторыя съ боковыми вътвями длиною 16 сантиметровъ. Растенія сортовъ Blue Ribbon, Dickson Klark и Russels были въ среднемъ 13 іюня 26—27 сант., Southern Hope 36 сантим., Excelsior Prolifis— 24 сант., Pride of Georgia—25 сант., King Allen—39 сант., Андижанское Абасси—34 сант. Moss Improwed—23 сант., Флоридора—26 сант., Ашмуни—40 сан. и Афифи—42 сан. въ среднемъ.

Первые цвѣты появились на участкѣ на сортѣ Ounce Boll селекціонный (болѣе бѣлый) 14 іюня, на 67-ой день послѣ посѣва; затѣмъ зацвѣли Кокъ-чигитъ селекц. и Hawkins 16-го іюня, на 69 день послѣ посѣва. На 70-ый день зацвѣлъ King Allen и Russels, на 71-ый день 18 іюня появились цвѣты на Кингѣ изъ общаго урожая, на Кингѣ селекціонномъ болѣе бѣломъ; 19 іюня на Малля-чигитъ и Кара-чигитъ (изъ Кинга). На 72-ой день зацвѣли Кара-чигитъ селекціонный, Тгіштрһ безъ черныхъ голыхъ сѣмянъ, Кіng селекціонный болѣе зеленый и Ounce Boll селекціонный, болѣе зеленый.

На 73-ій день послѣ посѣва зацвѣли сорта: Gold Standard II сб. и Dicson Klark, на 74-ый—Triumph II сб. и Ашмуни; на 75-ый день Excelsior prolific, Pride of Georgia, Андижанское Абасси, Moss Improwed и Афифи; на 76-ой—Tindale Select prolific скороспѣлый и Флоридора; на 77-ой день Малля желтый Allen King I сб., Mells select Egyptian I сб., Blue Ribbon и Sauthern Hope. На 79 день Christofer Large II сб. Allen King II сб.; на 80-ый день Tindal Select Prolific бѣлосѣмянный и черносѣмянный, Gold Standard I сбора и Mells select Egyp-

Табл. 15.

порядку.	дѣлянокъ саженяхъ.	or extension of the second sec	Бва.	явленія всходовъ.	ей отъ	появленія зъ на боль- ловинѣ.	цвѣ-	цвф-		й отъ цвѣ-	CKPE-	й отъ 10 со-	й отъ ) со-	темпера- ъ посъва довъ.	темпера- отъ всхо- превтенія.	мпера- цвѣте- созрѣ-	мпера- посвва ванія.	Урожа	ий на дес	сятину.
№ по пор	Площадь дѣ въ квадр. са	НАЗВАНІЕ СОРТА.	Время пос	Время появл первыхъ всхо	Число дней посѣва до всз	Время появлен всходовъ на бол шей половинъ.	Начало ц тенія.	Массовое теніе.	Ą	Число дней посвая до г	Начало раскрытія первыхь коробочекь.	Число дней с цвѣтенія до зрѣванія.	Число дней поства до зръванія.	Сумма теми туръ отъ пос до всходовъ	Сумма тем туры отъ довъ до цвѣ	Сумма тем туры отъ л нія до с ванія.	Сумма темпера туры отъ посъвя до созръванія.	I сбора.	II сбора.	I и II сбора.
1	60	Monra morary	апр	вля	1.0	20	іюня	or :					100	204.0	1 001 0	1.074.0	2 204 2	и. ф.	п. ф.	п. ф.
2	60	Малля желтый		20	12	26 апр.		25 іюня	-	77	14 авг. 7 »	51 50	128 121	224,9	1.604,3	1.374,8	3.204,2	26 20 70 —	43 —	69 20
3	60	Кокъ-чигитъ селекціонный		16	8	20 »	18	25 »		71 69		45	114	139,9 139,9	1.500,9	1.291,2	2.932,0 2.755,8	90 —	29 —	99 —
4	60	Triumpf безъ черныхъ голыхъ съмянъ	9	16	8	20 »	16	19 »		72	31 іюля	49	121	139,9	1.451,3 1.526,4	1.164,6	2.932,0	40 20	17 — 34 20	107 —
5	60	Аунсболь (Ounce Boll) селекц. болье былый.	THE RESERVE	16	8	22 »	19	25 » 19 »		67	7 авг. 25 іюля	41	108	139,9	1.325,4	1.063,4	2.598,6		13 20	75 — 75 20
6	60	Tindal Select Prolific (скороспълый)	9	16	8	00	14 23	26 »		76	9 авг.	47	123	139,9	1.635,6	1.279,9	3.055,4	62 — 31 20	24 —	55 20
7	53	Hawkins		16	8	0.0	16	20 »		69	27 іюля	41	110	139,9	1.451,3	1.058.6	2.649,8	71 13	23 8	94 21
8	60	Christopher Large Bic Boll I coopa	9 9	16	13	THE RESERVE	28	3 іюля		81	26 авг.	59	140	247,5	1.696,6	1.656,5	3.600,6	10 —	51 20	61 20
9	60	King's селекціонн. болье бълый		21 20	12	2 мая 24 »		21 іюня		71	20 abr.	44	115	224,9	1.442,2	1.140,5	2.807,6	58 —	34 —	92 —
10	60	» » зеленый		16	8	24 " 20 »	18	20 »		72.	1 »	43	115	139,9	1.526,4	1.115,0	2.781,3	85 —	26 —	111 —
11	60	Triumf II ccopa		21	13	26 »	21	20 »		74	8 »	48	122	247,5	1.499,7	1.235,7	2.982,9	41 —	38 20	79 20
12	60	Ounce Boll селекц. зелено-съмянный	9	20	12	24 »	19	23 »		72	1 »	43	115	224,9	1.467,7	1.115,0	2.807,6	38 —	10 -	48 —
13	60	Tindal Sellekt Prolific бъло-съмянный	9	20	12	24 »	27	30 »	-	80	17 »	51	131	224,9	1.690,4	1.446,0	3.361,3	19 -	3 —	22 —
14	51	» » черно-съмянный	9	20	12	24 »	27	1 іюля		80	22 »	56	136	224,9	1.690,4	1.603,0	3.518,3	9 17	15 11	24 28
15	60	Christopher Large B. B. II ccopa	10	21	12	24 »	27	1 1103131 1 »	4	> 79	22 »	56	135	229,6	1.667,8	1.603,0	3.500,4	45 —	60 —	105 —
16	60	Allen + King's I coopa	9	21	13	26 »	24	3 »	T	77	6 »-	43	120	247,5	1.581,9	1.188,2	3.017,6	29 —	38 20	67 20
17	60	Gold Standard I coopa	9	21	13	26 »	27	1 »	1	80	6 »	40	120	247,5	1.667,8	1.102,3	3.017,6	21 _	20 —	41 —
18	60	» » II »		21	12	26 »	21	1 »	1	73	8 »	48	121	229,6	1.499,7	1.235,7	2.965,0	28 20	16 20	45 —
19	60	Mels Selekt Egyptian I сборъ	9	22	14	25 »	24	28 іюня	8	77	10 »	47	124	269,6	1.559,8	1.285,7	3.115,1	8 20	12 —	20 20
20	60	» » » II » бѣлый	9	24	16	2 »	27	2 іюля		80	10 »	44	124	308,2	1.589,8	1.199,8	3.097,8	12 20	7 20	20 —
21	43	» » » II » желтый	9	22	14	2 »	29	2 »		82	19 »	51	133	269,6	1.685,9	1.383,1	3,338,6	10 18	11 7	21 25
22	60	Allen + King II coopa		20	11	26 »	27	2 »		79	10 »	44	123	207,0	1.690,4	1.199,8	3.097,2	38 —	33 —	71 —
23	60	Кара-чигитъ селекціонный	10	20	11	26 »	20	24 іюня		72	6 »	47	119	207,0	1.493,2	1.216,7	2.916,9	51 20	31 —	82 20
24	60	Малля-чигить	10	20	11	22 »	19	24 »		71	3 »	45	116	207,0	1.467,7	1,167,3	2.842,0	86 —	20 —	106 —
25	60	Blue Ribbon	10	20	11	24 »	25	28 »		77	7 »·	43	120	207,0	1.632,0	1.184,2	3.023,2	40 20	17 20	58 —
26	60	Dicson Klark	10	20	11	24 »	21	28 »		73	8 »	48	121	207,0	1.522,3	1.235,7	2.965,0	17 —	9 20	26 20
27	60	Russels	10	21	12	26 »	18	21 »		70	30 іюля	42	112	229,6	1.419,6	1.088,4	2.737,6	49 —	14 —	63 —
28	43	Southern Hope	10	20	11	24 »	25	29 »		_77	9 авг.	45	122	207,0	1.632,0	1.233,7	3.072,7	25 33	13 38	39 31
29	60	Excelsior Prolific	10	21	12	2 »	23	30 »	1	75	21 »	59	134	229,6	1.554,3	1.553,7	3.337,6	22 —	29 —	51 —
30	60	Pride of Georgia	10	21	12	2 »	23	30 »		75	20 »	58	133	229,6	1.554,3	1.530,3	3.314,2	46 —	40 —	86 —
31	60	King + Allen		20	11	24 »	18	25 »		70	7 »	50	120	207,0	1,442,2	1.291,2	2.940,4	65 —	25 —	90 —
32	60	Андижанское + Абасси		20	11	24 »	23	26 »		75	6 »	44	119	207,0	1.576,9	1.215,8	2.999,7	72 —	19 20	91 20
33	60	Moss Improved		21	12	24 »	23	30 »		75	10 »	48	123	229,6	1.554,3	1.304,4	3.088,3	40 —	31 —	71 —
34	60	Floridora		21	12	26 »	24	2 іюля		76	22 »	59	135	229,6	1.581,9	1.544,6	3.356,1	5 —	6 20	11 20
35	40	Ашмуни селекціонный		21	12	24 »	22	29 іюня		74	20 »	59	133	229,6	1.526,0	1.558,6	3.314,2	7 20	16 20	24 —
36	132	Кара-чигить изъ King'а		16	7	21 »	19	21 »		71	1 »	43	114	122,0	1.526,4	1.115,0	2.763,4	66 15	20 27	87 2
7	33	Афифи	200 0 0 0 0	16	7	21 »	23	2 іюля		75	27 »	65	140	122,0	1.635,6	1.678,5	3.436,1	9 4	27 11	36 15
I													Lapsa							

tian II сбора, бълый; на 81-ый день Christopher Large I сб.; и послъднимъ на 82-ой день послъ посъва зацвълъ Mells Select Egyptian II сб. желтый. Массовое цвътеніе 19 іюня прежде всего началось у Кокъ чигита селекціоннаго и Аунсболъ (Ounce Boll) селекціонного болъе бълаго; затъмъ—Наwkins, King селекціонный болъе зеленный, Карачигить (изъ Кинга), Russels и т. д.

Послъдними зацвъли въ массъ 2-го іюня—Флоридоръ, Mells Select Egyptian II сбора и Афифи; 3-го іюня—Allen King и Christopher Large II сб.

Раскрытіе коробочекъ началось 25 іюня.

Первая коробочка раскрылась на 41-ый день послѣ цвѣтенія 25 іюля у сорта Аунсболъ селекціонный, болѣе бѣлый и 27 іюля у сорта Hawkins. Послѣдними начали раскрываться коробочки у Афифи 27 августа, на 65-ый день послѣ цвѣтенія, у Chrisropher Large I сбора, 26 августа, на 59-ый день послѣ цвѣтенія, у Флоридора и Ашмуни также на 59-ый день послѣ цвѣтенія, у послѣдняго 20 августа и у перваго 22 августа (болѣе подробныя свѣдѣнія приведены въ таблицѣ 15.

Въ концѣ августа и началѣ сеотября произведенъ былъ подсчетъ коробочекъ на растеніяхъ всѣхъ сортовъ, измѣрены ихъ высоты и сосчитано число боковыхъ вѣтвей на растеніяхъ. Результаты подсчетовъ средней величины на 25—60 растеній сведены въ прилагаемой таблицѣ 16.

Какъ видно изъ данныхъ, этой таблицы наибольшей величины--35 вершковъ въ среднемъ—въ концѣ августа и началѣ сентября до-стигали растенія сорта Ашмуни и Excelsior Prolific; 29 вершковъ у сорта Флоридоръ и Southern Hope; 28 верш. у Кингъ Аленъ и Кара чигитъ селекціоннаго; 27 вершк. у Pride of Georgia, Allen King II сб. Mells Select Egyptian желтаго. Среднюю, сравнительно, высоту 21— 22 вершка имъли сорта: Кокъ-чигить селекціонный, Малля желтый, Christopher Large 1 сб., Кингъ зеленосъмянный, Gold Standerd и т. д. Наиболье низкія растенія 16—17 вершк. у сортовъ: Triumph, King селекціонный (болье бълый), Ounce Boll селекціонный, зеленосьмянный, Tindal Select prolific. Наибольшее число боковыхъ вътвей имъють: Кара-чигитъ селекціонный—24 вѣтки и Флоридоръ 21 вѣтвь. Наименьшую вътвистость 14 боковыхъ вътвей имъють Triumph II сб., Christopher Large и Кингъ селекціонный болье былый. По открывшимся въ то время коробочкамъ на первомъ мъстъ стоитъ Кара-чигить селекціоный, имъвшій въ среднемъ по 11,6 открытыхъ коробочекъ на каждое изслъдованное растеніе. Большее число открытыхъ коробочекъ—7,7 имъютъ Russels и Малля-чигить; 6,9 коробочекъ имъетъ Андижанское + Абасси, 6,2—Southern Hope и 4,7—Кокъ-чигить селекціонный. Малое число открытых в коробочек в им вотъ следующіе сорта: Малля желтый—0,7, Tindal Select Prolific—0,8, Triumph II сб.—0,7, Tindal Select Prolific—0,2; Christopher Large II сб.—0,06 и Chiristopher Large I co.—0,08; Gold Standard I co.—0,7 и Mells Select Egyptian—0.8.

# Опыты съ сортами хлопчатника (допол. къ таб. 15).

КУ.		Сре	еднее н	на одно	расте	nie.
№ по порядку	НАЗВАНІЕ СОРТА.	Высота растенія.	Боковыхъ вътвей.	Открытыхъ коробочекъ.	Сформиро- ванныхъ.	Цвътовъ и бутоновъ.
1	Малля желтый	21,2	16,2	0,7	10,9	2,0
2	Кингъ изъ общаго урожая	18,9	15,7	3,9	9,2	2,0
3	Кокъ-чигитъ селекціонный	21,0	17,2	4,7	7,6	2,8
4	Тріумфъ безъ черныхъ голыхъ съмянъ .	16,5	15,5	1,3	7,3	2,3
5	Аунсболъ (Ounce Boll) селекціонный	18,0	16,2	3,7	8,5	2,7
6	Tindal Sel. Р. скороспълый	20,3	16,0	0,8	6,7	4,3
7	Hawkins	18,0	16,0	3,0	4,9	1,9
8	Christofer L	21,8	14,5	0,08	9,8	4,8
9	Кингъ селекціонный, болъе бълый	17,4	14,8	2,5	9,1	1,7
10	Кингь болъе зеленый, селекціонный.	22,2	16,5	2,5	9,1	1,5
11	Triumpf II сборъ	16,4	14,0	0,7	7,1	2,5
12	Аунсболъ (Ounce Boll) селекц. зелено-					
	съмянный	17,5	16,3	3,0	7,6	2,2
13	Tindal безъ черныхъ съмянъ	17,5	15,6	1,1	7,2	2,2
14	» черно-съмянный	20,5	15,8	0,2	7,7	5,8
15	Christofer L. II сборъ	19,2	14,0	0,06	8,1	0,8
16	Алленъ + Кингъ II сборъ	21,3	17,6	1,7	13,3	2,8
17	Gold Standard I сборъ	20,9	16,9	0,7	13,3	4,5
18	» » II »	22,4	17,8	1,8	9,0	4,1
19	Mels Sel. Egiptian I сборъ	21,9	15,4	0,8	9,7	2,3
20	» » » II » бълый	21,6	16,8	1,2	20,3	11,1
21	» » » II » желтый	27,6	19,5	1,5	16,1	13,0
22	Allen + King II сбора	27,6	17,4	3,3	21,1	1,9
23	Кара-чигитъ селекціонный.	28,3	24,0	11,6	37,2	9,0
24	Малля-чигить	22,7	15,9	7,7	7,0	1,6
25	Blue Ribbon	23,8	17,1	3,6	19,5	3,4
26	Dicson Klark	23,4	19,6	1,8	16,9	11,8
27	Russels	21,7	17,4	7,7	24,4	6,3
28	Sauthern Hope	29,0	19,4	6,2	15,5	7,8
29	Excelsior Prl	35,0	20,9	1,2	28,0	10,3
30	Pride of Georgia	27,5	16,0	2,4	16,8	1,9
31	King + Allen	28,7	19,4	9,0	18,2	1,7
32	Андижанское + Абасси	23,6	18,5	6,9	12,2	0,6
33 -	Moss Improwed	22,0	15,2	2,1	16,3	4,6
34	Floradora	29,0	21,7	1,5	26,5	17,0
35	Ашмуни	35,0	15,4	1,0	56,6	22,1
36	Афифи	32,8	21,6	0,07	31,9	18,6
37	Кара-чигитъ (отобранн. изъ Кинга)	27,5	18,0	11,4	22,7	6,4

Наибольшее число сформированных зеленых коробочекъ имѣли тогда слѣдующіе сорта: Кара-чигитъ селекціонный—37,2, Excelsior Prolific—28,0; Флоридоръ 26,5; Russels—24,4; Allen King II сб.—21,1 и Mells select Egyptian II сб., бѣлый,—20,3. Наименьшее число сформированныхъ зеленыхъ коробочекъ имѣли: Hawkins—4,9; Tindal Select Prolific скороспѣлый—6,7; Triumph II сб.—7,1 и т. д.

Обиліемъ бутоновъ и цвѣтовъ на растеніяхъ, какъ и зеленыхъ коробочекъ, особенно отличается египетскій сорть Ашмуни—22,1 бутона; за нимъ идутъ Флоридоръ и Кингъ Алленъ—17 бутоновъ, Mells Select Egyptian II сб. желтый—13,0, Dikson Klark—11,8; Mells Select Egyptian II сбора бѣлый—11,1, и Excelsior Prolgic—10,3. Мало цвѣтовъ и бутоновъ имѣли: Наwkins—1,9, King селекціонный бѣлый—1,7, King селекціонный, зеленый,—1,5; Christopher Large II сб.—0,8 и Андижанскій Абасси—0,6.

Къ общему сбору приступлено было 28 сентября. Второй сборъ, онъ же послъдній произведенъ 3-го ноября. Наиболье урожайнымъ по первому сбору оказался Кокъ-чигить селекціонный—90 пуд. на десятину; затьмъ идуть: Кингъ изъ общаго урожая—70 пуд. на десятину и Кара-чигитъ изъ Кинга—66 пуд. на десятину. Наиболье урожайнымъ по общему сбору оказались Кингъ селекціонный, болье зеленый—111 пуд. на десятину и Кокъ-чигитъ селекціонный—101 пуд. на десятину. Худшими по общей урожайности оказались Tindal Select Prolific бълосьмянный и черносьмянный, давшіе 22 пуда и 24 пуда на десятину; Афифи, давшій 36 пудовъ на десятину, Ашмуни—24 пуда на десятину и Mells Select Egyptian I и II сбора—20 и 21 пудъ на десятину.

Участокъ №9-ый-междурядія промышленнаго сада-вспаханъ быль съ осени. Весною послъ двухъ вспашекъ сдъланы были прямыя гряды окучникомъ. На южной половинъ участка грядамъ дано было направленіе съ Юго-запада на съверо-востокъ, на съверной половинъ-съ востока на западъ, при чемъ на одной части-съвернойбыли высъяны смъсь новыхъ сортовъ и новые сорта съменами болъе ранняго сбора—11—14-го августа; на другой части—южной—высѣяны были тъ же новые сорта съменами болъе поздняго І сбора—31-го августа и II сбора—22 сентября; къ испытывавшимся уже сортамъ съ 1909 года дабавлены въ текущемъ году, взятые въ Ташкентъ съ выставки отъ Генерала Ржепецкаго, два сорта упландовъ Бендересъ и Allend. На съверной части ручной посъвъ произведенъ 15-го апръля во влажную почву, т. е. въ гряды предварительно политыя пропускомъ воды по арыкамъ; на южной части-ручной посъвъ произведенъ въ сухую почву; поливка дана тотчасъ же послъ посъва; всъ съмена намачивались передъ посъвомъ въ водъ въ теченіе сутокъ. Участокъ подъ сорта разбить на дълянки неодинаковой площади; размъры площадей указаны въ приводимыхъ ниже таблицахъ (17, 18 и 19). Разсмотримъ каждую часть участка № 9 въ отдѣльности.

На съверной части участка первые всходы появились на 4-ый день послъ посъва —19 апръля — у Dikson Klark; на 5-ый день послъ посъва — 20-го апръля—появились всходы у слъдующихъ сортовъ: King's, Allen King, Excelsior prolific, Аунсболъ и Кокъ-чигить; на 6-ой день—у Southern Hope и Pride of Georgia; на 7-й день—у Russels, Floradora, King+Allen, Blue Ribbon, Ашмуни, Moss Improwed, Gold Standard, Афифи и Андижанское-Абасси; на 8-ой день появились всходы у Mells Select Egyptian, Tindal Select Prolific и Christopher Large; и послъдними-на 9 день послъ посъва-появились всходы у Trtiumph. За весь вегетаціонный періодъ участку этому дано шесть поливокъ, четыре конныхъ пропашки и два ручныхъ мотыженія. При первомъ мотыженіи и прорывкъ оставлялось по три растенія въ лункъ; произведена она 10 мая, при чемъ до перваго мотыженія участку дано 3 поливки; четвертая поливка произведена предъ цвътеніемъ-5-го іюня, пятая—5-го іюля, шестая передъ началомъ созрѣванія—27 іюля; кромъ того находящимся въ западной части участка въ концъ арыковъ сортамъ Tindal Select Prolific, Kings, Mells Select Egyptian, Triumph, Christopher Lorge, King Allen и Blue Riddon дана была еще лишняя поливка 14 іюня. Бутоны начали появляться на участкъ съ 30-го мая первыми на сортъ Кокъ-чигитъ; 5-го іюня бутоны были уже на всъхъ сортахъ. Первымъ цвъсти началъ 13-го іюня тотъ-же-Кокъ-чигить-на 54-й день послъ всходовъ; послъдними зацвъли Pride of Georgia и Афифи на 64-й день послъ всходовъ; подробныя данныя объ условіяхъ и результатахъ этихъ опытовъ пом'вщены въ таблицъ 22. Тамъ приведены среднія величины изм'єреній растеній и результаты подсчета на нихъ бутоновъ въ началъ цвътенія. Изслъдовалось десять среднихъ растеній каждаго сорта. По высотъ растеній наилучшимъ оказались Excelsior Prolific—17 вершк., затъмъ идутъ Кокъ-чигитъ, Christopher Large и Pride of Georgia—16 вершковъ, Dikson Klark 15 вершковъ; по числу боковыхъ вътвей на растеніи на первомъ мъсть стоить Флоридоръ—14 вътвей затъмъ идуть: Russels, Allen King, Excelsior Prolific, Кокъ-чигить, Pride of Georgia и Gold Standard— 13 вътвей. По количеству бутоновъ на растеніяхъ особенно выдъляется Флоридоръ—44 бутона; затъмъ идуть: Pride of Georgia—30 бутоновъ, Андижанское + Абасси 29 бутоновъ, Excelsior prolific, Кокъ-чигитъ и Moss Improwed 28 бутоновъ. Всъ перечисленные выше сорта съ большимъ количествомъ бутоновъ дали урожай выше ста пудовъ, кромъ сорта Флоридоръ, который отличается пышнымъ своимъ ростомъ, нъжностью и длиною волокна, какъ Египетскіе сорта, но не даетъ надлежащаго сбора и требуеть дольнъйшей его здъсь акклиматизаціи. При появленіе бутоновъ растенія были высотой отъ 4-хъ до 6-ти вершковъ. По началу созръванія всь сорта этого участка располагаются въ такомъ порядкъ: первыми созръли 28 іюля Кокъ-чигить и

Аунсболъ на 104 день со дня посѣва, затѣмъ Allen + King 30-го іюля—на 106-й день послѣ посѣва, Bussels и King—31-го іюля на 107-й день послѣ посѣва; послѣднимъ созрѣли Египетскіе сорта Ашмуни и Афифи на 139 и 140-й день послѣ посѣва. Первый сборъ произведенъ 29-го Сентября, 2-й—19 октября и третій—15 ноября. Наилучшимъ по первому сбору оказался давно уже культивируемый въ Туркестанѣ зеленосѣмянный Кокъ-чигитъ, давшій на десятину 145 пуд. перваго сбора; за нимъ идетъ Аунсболъ (Ounce Boll), давшій 1-го сбора 101 п. на десятину; затѣмъ идутъ Excelsior Prolific, Allen+King и Russels,

Участокъ № 9-съверная часть.

давшіе 1-го сбора 82, 81 и 80 пудовъ на десятину. По общему сбору уражая на первомъ мѣстѣ стоитъ опять тотъ же Кокъ чигитъ, давшій 159 пудовъ на десятину, затѣмъ идутъ: Excelsior Prolific—135 пудовъ Allen—King—133 пуда, Аунсболъ — 126 пудовъ, Moss Improwed—117 пудовъ, Blue Ribbon—114 пуд., Андижанское—Абасси и Russels 108 пуд. и т. д. (см. таблицу № 22). Высѣянная тутъ-же 12-го апрѣля руками на прямыя гряды смѣсь новыхъ сортовъ дала общій урожай на десятину 64 пуда; изъ нихъ І сбора 31 пудъ, II сбора 23 пуда и III-го 10 пудовъ.

Табл. 17.

Опыты съ сортами хлопчатника.

e digon kart lelandade a ibar lenger ar kurtike ibar lenger atsessore	и въ квад- яхъ.	on d		ь посћва	OBE.	ie.	отъ всходовъ	ъ посъва	кој	-0yто- оодоле	къ.	His.	цвътенія	ь посъва	среднихъ темпе- отъ посъва до ія всходовъ.	ихъ темпе- всходовъ до	ь темпе- тенія до	ихъ темпе- посћва до	3	рожай с	сырца на въ пудах	е. десяти ъ.	ину
названіє сорта.	Площадь двлянки въ п ратныхъ саженяхъ.	Посѣвъ.	Всходы.	Число дней отъ до всходовъ.	Появленіе бутоновъ.	Первое цвѣтеніе.	Число дней отт до цвѣтенія.	Число дней отъ до цвътенія.	Высота во время 1-го цвѣтенія.	Количество бу новъ.	Число боковыхъ вътвей.	Начало созръванія.	Число дней отъ до созрѣванія.	Число дней отъ до созрѣванія.	Сумма среднихъ тем ратуръ отъ посъва появленія всходовъ.	Сумма среднихъ ратуръ отъ всход цевтенія.	Сумма среднихъ температурь отъ цевтенія до созръванія.	Сумма среднихъ ратуръ отъ посе созръванія.	І сборъ.	II сборъ.	Іи ІІ сборъ.	III céops.	Итого.
			апрёля			іюня						+						NEW STATES	51 (181)			971416.09	Bayon
King	19		апръла 20	5	4 іюня	20	61	66	9	18	12	31 іюля	41	107	118,7	1.493,2	1.064,0	2.675,9	и. ф. 58 17	и. ф. 22 4	п. ф. 80 21	и. ф. 15-32	и. ф. 96 13
Mells Select Egyptian	22	ю).	23	8	5 »	22	60	68	10	17	9	20 авг.	59	127	184,0	1.457,0	1.558,6	3.199,6	16 15	16 14	32 29	15 —	47 29
Russell	19	H I	22	7	5 »	22	61	68	11	19	13	31 іюля	39	107	163,4	1.477,6	1.086,9	2.727,9	80 21	23 27	104 8	4 29	108 3
Allen + King	70	е <b>м</b>	20	5	5 »	20	61	66	12	17	13	30 »	40	106	118,7	1.493,2	1.037,4	2.649,3	81 17	34 29	116 6	16 28	132 3
Tindal Select Prolific	35	8	23	8	4 »	20	58	66	9	20	8	12 авг.	53	119	184,0	1.401,6	1.358,5	2.944,1	39 17	22 12	61 29	12 34	74 2
Exelsior Prolific	30	2	20	5	3 »	20	61	66	17	28	13	8 »	49	115	118,7	1.493,2	1.264,4	2.876,3	82 —	35 —	117 —	18	135 -
Ounce Boll	19	y I	20	5	3 »	18	59	64	13	19	9	28 іюля	40	104	118,7	1.442,2	1.035,2	2.596,1	101 2	18 38	120 —	6 13	126 13
Triumph	12	H	24	9	6 »	24	61	70	7	14	9	13 авг.	50	120	202,0	1.512,9	1.343,4	3,058,3	20 —	15 —	35 —	5 —	40 -
Кокъ-чигитъ	19	з ж	20	5	30 мая	13	54	59	16	28	13	28 іюля	45	104	118,7	1.281,4	1.169,7	2.569,8	145 11	9 19	154 30	4 29	159 1
Floradora	19	F	22	7	5 іюня	21	60	67	14	44	14	10 авг.	50	117	163,4	1.451,3	1.285,1	2 899,8	23 27	11 2	34 29	18 38	53 2
Christopher Large B. B	16	В	23	8	6 »	23	61	69	16	20	9	18 »	56	125	184,0	1.485,3	1.508,6	3.177,9	18 30	30 —	48 30	16 35	65 2
King+Allen		0.	22	7	5 »	21	60	67	10	19	11	8 »	48	115	163,4	1.451,3	1.235,7	2.850,4	48 —	6 —	54 —	6 —	60 -
Blue Ribbon	10	(B	22	7	5 »	20	59	66	10	15	12	14 »	55	121	163,4	1.422,2	1.402,9	2.988,5	78 —	12 —	90 —	24 —	114 -
Dicson Klark	10	5	19	-4	30 мая	18	60	64	15	25	12	15 »	58	122	98,0	1.462,9	1.476,2	3.037,1	42 —	30 —	72 —	30 —	102 -
Southern Hope	10	H.	21	6	5 іюня	22	62	68	14	27	12	16 »	55	123	141,3	1.499,7	1.469,0	3.110,0	27 —	21 —	48 —	30 —	78 -
Pride of Georgia	0.00000	p ž	21	6	3 »	24	64	70	16	30	13	15 »	52	122	141,3	1.581,9	1.387,8	3.111,0	33 —	30 —	63 —	39 —	102 -
Ашмуни		Ħ	22	7	5 »	24	63	70	9	22	12	1 сент.	69	139	163,4	1.533,5	1.749,5	3.446,4	15 —	36 —	51 <b>—</b>	30 —	81 -
Moss Impowed	10	ದೆ	22	7	5 »	24	63	70	12	28	12	15 авг.	52	122	163,4	1.533,5	1.387,8	3.084,7	48 —	33 —	81 —	36 —	117 -
Gold Standard	10	15-го	22	7	5 »	21	60	67	11	19	13	8· »	48	115	163,4	1.451,3	1.235,7	2.850,4	33 —	30 —	63 —	12 —	75 -
Афифи	10	15	22	7	5 »	25	64	71	12	20	12	2 сент.	69	140	163,4	1.561,0	1.740,4	3.464,8	9 09	30 —	39 <b>—</b>	9 —	48 -
Андижанскій + Абаси	16		22	7	5 »	19	58	65	12	29	12	2 авг.	44	109	163,4	1.396,7	1.141,8	2.701,9	71 10	26 10	97 20	11 10	108 3
				ni					-				- 6 13197				101908	odadeo	an en	1143507	u ero a		la en inte

Опыты сравненія ручного и машиннаго поства дали такіе результаты: посъвъ произведенъ былъ одновременно послъ одной весенией вспашки безъ предварительной поливки 17 марта сортомъ King; сначала всходы лучше шли на машинномъ посъвъ; на ручномъ они страшно запоздали и только послѣ поливки 4-го апрѣля, данной одному ручному посѣву спеціально для выгонки всходовъ, появились всходы и на ручномъ посъвъ. Въ дальнъйшемъ всъ роботы на дълянкахъ велись одновременно и по внъшнему виду не наблюдалось различія между дълянками; объимъ дълянкамъ дано 6-ть поливокъ, два мотыженія и четыре конныхъ пропашки. 10-го мая на объихъ дълянкахъ всюду появилась 3-я пара листьевъ и есть кое гдв 4-я пара листьевъ; 22-го мая лучшія растенія им'єють 7—8 вершковь высоты; 25-го мая зам'єтны сформировавшіеся бутоны на боковыхъ вътвяхъ, на 3-й и на 4-й боковой вътви ихъ больше, чъмъ на другихъ. 7-го іюня появился первый цвътокъ на машинномъ посъвъ; 19-го іюля раскрылась первая коробочка.

Общій урожай на машинномъ посѣвѣ—95 пудовъ на десятину, выше чѣмъ на ручномъ на 11 пудовъ; по первому сбору дѣлянка съ машиннымъ посѣвомъ на много стоитъ выше дѣлянки съ ручнымъ посѣвомъ: на первой получено 1-го сбора 66 пудовъ на десятину, на второй только 47 пудовъ (см. таблицу 18).

Опыты съ сравненіемъ машиннаго и ручного посѣва (на участкъ № 9).

Табл. 18.

	въ квад- саженяхъ.			Ур	ож	ай	на	д	еся	ти	н у.	
#		Названіе дёлянки.	I cб	оръ.	п сб	оръ.	III c	боръ.	IV сборъ.		Итого.	
Ne at	Площадь		п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	л.	ф.
9 E	en e San e				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
		Машинный поствъ:					1213					
		- 47 4 60 1 WI 5- 85 1		loke.	9,50		5,55		6,505			
_1	135	King's	66	27	21	13	7	22	0,50	-1	95	22
			1000		0.99		7,00		8,116	8	\$1	
!		Ручной постью:	1.5		6,78		0,13		6,111			
2	124	King's	47	17	26	5	10	26	2,000 6,000		84	08
	771214	-000 - 00 - 400 -			7. 6		6.55		1.18	10		1

На южной части 9-го участка (въ междурядіяхъ сада съ направленіемъ грядъ съ юго-запада на съверо-востокъ) ручной посъвъ произ-



Рис. 12. Всходы хлопчатника машиннаго рядового посъва.



Рис. 13. Работа культиватора передъ поливкой (проведеніе оросительныхъ бороздъ).



Рис. 14. Первая поливка хлопчатника по бороздамъ (арыкамъ).

веденъ былъ 17-го апръля въ сухую почву въ середину грядъ; поливка дана сейчасъ же послъ посъва, о чъмъ уже упомянуто выше. Всходы дружно появлялись на промоченныхъ хорошо грядахъ. На плохо промочиваемыхъ водою высокихъ грядкахъ всходы запаздывали. Первые всходы появились на 5-й день у Mells Select Egyptian; на 6-й день у Floradora; на 7-й день у Triumph I и II сб., Dikson Klark I и II, Книга селекціоннаго, Gold Standard, Southern Hope, Tindal Select Prolific, King Allen; на 8-й день появились всходы у Allen King, Blue Ribbon, Christopher Large, Allen и Excelsior Prolific, и только на 9-й день у Pride of Georgia и Moss Improwed. Всходы въ дальнъйшемъ шли очень неравномърно; отъ различнаго уклона дълянокъ, грядки смачивались протекающей водою неравномърно; и только слъдующими поливками, второй и третьей, данными 30-го апръля и 6-го мая, удалось выровнять всходы. Въ іюнъ, о чъмъ уже выше упоминалось, дана была четвертая поливка и въ іюль пятая и шестая. Цвътеніе началось 17-го іюня на Кингъ селекціонномъ на 62-й день послъ посъва; 18-го іюня зацвълъ Allen King съмянъ II сбора; 20-го іюня зацвъли Allen King съмянъ I сбора и Excelsior Prolific I сбора и т. д. (см. табл. 19).

Расматривая таблицу 19-ю, мы видимъ, что наибольшей высотой растеній отличались тогда сорта: Christopger Larde—18 вершк., Excelsior. Prolific II сб.—17 вершковъ, Mells Select Egyptian—16½ вершковъ и Southern Hope и King—16 вершковъ. Болѣе низкія растенія были у Moss Improwed у Trimph—11 вершковъ.

По количеству боковыхъ вътвей отличались Exceisior Prolific II сбора и King—15 вътвей; 13 боковыхъ вътвей имъли: Floradora, Pride of Georgia, King — Allen и Allen — King; среди хлоичатника Allen — Кing и здъсь и на дълянкъ съверной половины девятаго участка, какъ и на первомъ участкъ, попадаются растенія съ красными листьями и стеблями; по внъшнему виду растенія Allen — Кing ничъмъ почти не отличаются отъ растеній сорта King — Allen; съ малымъ количествомъ боковыхъ вътвей оказался сорть Blue Ribbon—10 вътвей; по количеству бутоновъ на одномъ растеніи особенно отличаются Кing —52 бутона и Бендересъ—41 бутонъ; наименьшее количество бутоновъ у Triumph—17 и Excelsior Prolific—16.

Первая коробочка раскрылась 28-го іюля у сорта Кіпд селекціоннаго на 103-й день посл'є пос'єва; 3-го августа раскрылись коробочки у Allen — Кіпд II сбора, Southern Норе, Бендересъ и Tindal Select Prolific (см. табл. 19).

Послъдними раскрылись коробочки у Dikson Clark I сбора— 15-го августа на 121-й день послъ посъва и у Christopher Large— 16-го августа на 122-й день послъ посъва. Сборы произведены 30-го сентября, 19-го октября и 15-го ноября. По первому сбору наилучшими оказались: Gold Standard и King селекціонный, давшіе 84 пуда на десятину; за ними идуть: King — Allen 82 пуда и Allen King II сбора — 81 пудъ; плохими по первому сбору оказались: Mells Select Egyptian, давшій перваго сбора 34 пуда и Dikson Clark, давшій перваго сбора только 19 пудовъ на десятину. По суммъ перваго и второго сборовъ на первомъ мъстъ стоить Gold Standard —

112 пудовъ; за нимъ идутъ: Тріумфъ II-го сбора—109 пудовъ, Кіпд селекціонн.—108 пудовъ и т. д.

По общему урожаю на десятину первыми идутъ: Тріумфъ I и II сб.—128 пудовъ и 135 пудовъ; за ними идутъ Gold Standard — 122 пуда, Allen King II сбора—120 пудовъ и Christopher Large, Tindal Select Prolific, King селекціонный, King + Allen, Allen + King I сбора,

Табл. 19.

участокъ № 9-

Южная часть.

	въ квад- ъ.			посъва		всходовъ	въ на-	раскрыв- ъ въ на-	вътвей	, посъва	ıiя.	цвѣтенія	посъва	ихъ темпе- посъва до	темпе-	. темпе- генія до	темпе-	Уро	жай на	десятину	въ пу;	дахъ.
названіє сорта.	Площадь дваянки въ ратныхъ саженяхъ.	Посѣвъ.	Всходы.	Число дней отъ до всходовъ.	Начало цвѣтевія.	Число дней отъ до цвътенія.	Высота растеній чалѣ цвѣтенія (вт. вершкахъ).	Количество не р шихся бутоновъ чалѣ цвътенія.	Число боковыхъ вѣт въ началѣ цвѣтенія.	Число дней отъ до цевтенія.	Начало созр'кванія.	Число дней отъ до созрѣванія.	Число дней отъ до созрѣванія.	Сумма среднихъ ратуръ отъ пос всходовъ.	Сумма среднихъ температуръ отъ всходовъ до цевтенія.	Сумма среднихъ темп ратуръ отъ цвътенія созръванія.	Сумма среднихъ ратуръ отъ пос созръванія.	І сборт.	II céops.	І п П сборъ.	III сборъ.	Итого.
			апрёля		іюня						августа		iber i			n jenat Harata	egatos a Brág as	п. ф.	п. ф.	п. ф.	п. ф.	п. ф.
Allen + King I coopa	53		24	8	20	57	13	25	13	65	5	46	111	168,3	1.383,6	1.271,1	2.823,0	38 20	35 26	74 06	34 21	108 27
» » II »	59	y).	24	8	18	55	13	25	13	63	3	46	109	168,3	1.332,6	1.270,5	2.771,4	81 14	19 13	100 27	19 13	120. —
Floradora	95	д В	22	6	23	62	16	32	13	68	8	46	114	129,7	1.505,9	1.255,0	2.890,6	35 2	17 2	52 4	18 13	70 17
Triumph I coopa	31	0 п	23	7	24	62	11	17	12	69	13	50	119	150,3	1.512,9	1.343,4	3.006,6	65 32	34 4	99 36	28 2	127 3
» II »	42	9	23	7	24	62	11	17	12	69	13	50	119	150,3	1.512,9	1.343,4	3.006,6	68 23	40 28	109 11	25 29	135 —
Dicson Clark I coopa	60	y H	23	7	22	60	121/2	22	11	67	15	54	121	150,3	1.457,0	1.447,7	3.055,0	19 —	22 —	41 —	28 —	69 -
» » II »	53	ух	23	7	22	60	121/2	22	11	67	14	53	120	150,3	1.457,0	1.425,8	3.033.1	43 1	22 3	65 4	13 23	78 2
		0					10	50	1 15	62	поля	4.1	109	150,3	1.326,3	1 197 6	2.614,2	83 34	24 23	108 17	5 91	114
King селекціонный	83	3 P	23	7	17	55	16	52	15	72	28 14	41 48	103	185,6	1.562,9	1.137,6	3.128,5	41 15	18 25	60 —	5 31 23 30	83 30
Pride of Georgia		(B	25	9	27	63	15	24	13	68	14	52	120 120	168,3	1.302,9	1.393,5	3.029,1	51 29	36 8	87 37	12 17	100 1
Blue Ribbon	87	RIL	24	8	23	60	13½	20	10	67	10	49		150,3	1.457,0	1.336,7	2.944,0	84 —	28 —	112 —	10 27	122 2
Gold Standard	45	#	23	7	22	60	13	24	12	66	3		116 109	107,6	1.457,0	1.190,4	2.944,0	76 -	12 —	88 —	6 —	94 -
Бендересъ	15	пр	21	5	21	61	12,5	41	12	67	3	43	109	150,3	1.475,4	1.190,4	2.771,4	42 20	20 27	63 7	9 6	72 1
Southern Hope		ದ	23	7	22	60	16	28	12	68	3	41	109	150,5	1.485,3	1.104,5	2.776,5	68 33	17 26	86 19	18 21	105 -
Tindal Select Prolific № 1	34	17	23	7	23	61	12	30	11	68	3	41	109	150,5	1.485,3	1.140,9	2.776,5	65 —	28 5	93 5	22 20	115 2
» » № 2	96	J.	.23	7	23	61	12		11		16		109	168,3	1.485,3	1.140,9	3.072,3	63 24	28 3	93 12	22 20	115 3
Christopher Large		. н е	24	8	24	61	18	20	. 11	69		53						81 38	18 32	100 30	10 12	111 0
King + Allen		д е	23	7	21	59	14	27	13	66	5	45	111	150,3	1.430,7	1.242,0	2.823,0				9 7	
Moss Imrowed	49	B e	25	9	25	61	11	28	11	70	4	40	110	185,6	1.504,5	1.111,9	2.802,0	39 7	23 35	63 2		72
Allend		co	24	8	22	59	13	30	13	67	13	52	119	168,3	1.439,0	1.403,3	3.010,6	60 —	15 —	75 —	5 —	80 -
Excelsior Prolific. I сбора .	52	0 И	24	8	20	57	12	29	12	65	13	54	119	168,3	1.383,6	1.458,5	3.010,4	40 16	25 38	66 14	18 18	84 3
» » II »	53	Пр	24	8	22	59	17	16	15	67	13	52	119	168,3	1.439,0	1.403,3	3.010,6	75 34	15 34	91 28	12 18	104
Mells Select Egyptian	91		21	5	22	62	161/2	24	12	67	8	47	114	107,6	1.499,7	1.287,3	2.894,6	34 38	18 5	53 3	19 31	72 3

Ехсеlsior Prolific II сбора и Blue Ribbon, давшіе свыше 100 пудовъ. Наименѣе урожайнымъ оказались Флоридоръ, давшій общаго сбора 70 пудовъ на десятину и Dikson Klark I сбора—69 пудовъ; объобщей средней урожайности сортовъ въ текущемъ году по сортамъ и участкамъ данныя помѣщены далѣе въ таблицахъ 23 и 24; данныя-же о среднемъ вѣсѣ сырца изъ одной коробочки, отдѣльно пятигнѣздныхъ и четырехгнѣздныхъ коробочекъ заключаются вътабл. 25. Въ таблицахъ 26 и 27 приводятся данныя о выходахъ и длинѣ волокна различныхъ сортовъ и, наконецъ, въ таблицахъ 16, 17, 19 и 29 сведены данныя о суммахъ среднихъ температуръ, потребныхъ разнымъ сортамъ въ разные періоды ихъ вегетаціи, и общей суммѣ среднихъ температуръ отъ посѣва до начала созрѣванія, за 1909 и за отчетный—1910-й годъ по отдѣльнымъ участкамъ.

Два новыхъ сорта—Gold Standard (какъ наиболъе урожайный въ 1909 году) и Christopher Large (съ крупными коробочками) высъяны были для сравненія на уч. А, съменами І и ІІ сбора, 14 апръля въ прямыя гряды, сдъланныя окучникомъ безъ поливки ихъ предъ посъвомъ или послъ посъва. Поливка (см. рис. 7) дана была всему участку передъ второй весенней вспашкой, послъ которой и произведенъ ручной посъвъ въ гряды на разстояніе 12 вершковъ лунка отъ лунки. 23-го апръля появились всходы Gold Standard I сбора въ большемъ количествъ, чъмъ на Gold Standard II сбора. Christopher Large I сбора далъ всходы только кое-гдъ, а на посъвахъ съмянъ ІІ сбора Сhristopher Large всходовъ еще не было. 24 апръля Gold Standard I сбора далъ всходы по всей дълянкъ; ІІ сбора—почти на половинъ. Всходы Christopher Large II сбора начинаютъ только появляться, а на посъвъ съменами 1-го сбора того-же сорта ихъ уже много.

25 апрѣля всходы были уже по всѣмъ дѣлянкамъ. 1-го мая былъ дождь, давшій 2,1 mm. осадковъ, чослѣ котораго 4-го мая, безъ предварительной поливки, дано всѣмъ четыремъ дѣлянкамъ ручное мотыженіе съ прорывкой—оставлялось по три растенія въ лункѣ. 17-го мая дана первая поливка и послѣ нея 25-го мая произведена работа культиваторамъ. Въ дальнѣйшемъ дано дѣлянкамъ еще четыре поливки, одно ручное мотыженіе и одна конная пропашка.

Цвѣтеніе началось 22-го іюня въ одинъ день для обоихъ сортовъ. 25, 26 и 27-го августа, когда цвѣтеніе уже прекратилось, на всѣхъ четырехъ дѣлянкахъ произведенъ былъ подсчетъ коробочекъ, цвѣтовъ и бутоновъ, опредѣлено число боковыхъ вѣтвей и измѣрена высота растеній, среднія величины 60 растеній каждаго сорта съ дѣлянки 120 кв. с. Данныя эти сгруппированы въ табл. 20, откуда видно, что растенія сорта Gold Standard выше растеній сорта Christopher Larg, имѣютъ большее число боковыхъ вѣтвей и по числу раскрытыхъ и сформированныхъ коробочекъ превосходятъ сортъ Christopher Large.

Опыты съ новыми сортами хлопчатника на участкъ А.

Табл. 20.

		та.	ован- й.	Сре	еднее	на 1	расте	ніе.
ЖЖ ДЪЛЯНОКЪ.	Пазваніе сортовъ.	Время подсчета	Число изсл'ядован- ныхъ растеній.	Высота ра- стенія.	Боковыхъ вътвей.	Разскрыв- шихся коро- бочекъ.	Сформиро- ванныхъ ко- робочекъ.	Цвѣтовъ бу- тоновъ.
						OT BY		CO-S
1	Gold Standard I ccopa	26/vIII	59	24	16	2	11	0,5
2	» » II »	27/vIII	59	23	16	3	10	0,5
3	Christofer L. Л сбора	26/vIII	58	20	13	1,7	7	0,5
4	» » II »	25/уш	52	20	14	0,4	11	1,7
	povinski krajest ini yr 119-1230. Tobar i shumonaech can dri							

Табл. 21. Урожаи новыхъ сортовъ.

	въ квад- саженяхъ.	all manon A min	Урожай на 1 десятину.													
8		Названіе д'влянки.	I <sub>,</sub> cб	оръ.	II сб	оръ.	I и	ı II ръ.	III сборъ.		Итого					
N.W.	Площадь ратныхъ		II.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.				
1	120	Gold Standard I сбора	90	30	20	20	111	10	18	10	129	20				
2	120	» » II »	61	30	25	30	87	20	22	10	110	30				
3	120	Christofer Larg I сбора	59	÷	18	20	77	20	14		91	20				
4	120	» » II ».	10	20	23	30	34	10	31	20	65	30				

По урожайности Gold Standard тоже идеть впереди Christopher Large; въ то время какъ Christopher Large I сбора далъ урожай 91 пуд. на десятину Gold Standard I сбора далъ 129 пудовъ; Gold Standard съмянъ II сбора далъ урожай 110 пуд. на десятину, а Christopher Large II сбора—65 пуд. (см. табл. 21).

При сравненіи результатовъ поства стменами І и ІІ сбора одного и того-же сорта мы видимъ, что съмена первого сбора даютъ больше урожая, чъмъ съмена второго сбора того-же самаго сорта и особенно большая разница въ болъе дорогомъ І сборъ. Въ то время, какъ хлопокъ отъ съмянъ І сбора далъ урожай I сбора 90 пудовъ сырца, у сорта Gold Standard хлопокъ отъ съмянъ 2-го сбора того-же сорта — далъ сырца перваго сбора 61 пудъ, что составить разницу въ 29 пудовъ въ пользу урожая отъ съмянъ болъе ранняго сбора. Для сорта Christopher Lerge разница эта еще болъе— 49 пудовъ. При сопоставленіи данныхъ таблицъ 20 и 21, мы видимъ, что Gold Standard I сбора, имъвшій при подсчеть коробочекь въ концъ августа большее число открытыхъ коробочекъ-три въ среднемъ на 1 растеніе, — далъ наибольшій первый сборъ — 90 пудовъ на десятину; тотъ же сорть отъ съмянъ ІІ сбора, имъвшій при подсчеть двъ открытыхъ коробочки на 1 растеніе, далъ І-го сбора 61 пудъ; сортъ Christopher Large I сбора, имъвшій при подсчеть въ среднемъ на 1 растеніе 1,7 открытыхъ коробочекъ, далъ I сбора 59 пудовъ на десятину, и тотъ-же сорть II сбора, имъвшій при подсчеть въ среднемъ на 1 растеніе 0,4 открытыхъ коробочекъ, далъ І сбора 10 пудовъ на десятину.

На участкъ № 8 (чайрикерскомъ) частью на грядахъ туземнаго образца, частью на прямыхъ грядахъ, сдъланныхъ окучникомъ, 2-го апръля высъяны были два сорта Tindal Select Prolific и Аунсболъ (Ounce Boll) отборный и неотборный. Наибольшій урожай далъ Аунсболъ отборный—141 пудъ на десятину; Аунсболъ не отборный далъ только 100 пудовъ на десятину; и Tindal Select Prolific — 89 пудовъ (см. таблицу 22).

На четвертомъ участкъ 9-го мая на небольшей дълянкъ высъяны были два новыхъ сорта: Тулъ съменами урожая 1908 года I сбора, произведеннаго въ ноябръ, такъ какъ въ октябръ 1908 года еще не было на этомъ сортъ ни одной раскрытой коробочки и Труитъ, такъ же съменами урожая 1908 года I сбора, произведеннаго въ октябръ и II сбора, произведеннаго въ ноябръ. Съмена ноябръскаго сбора того и другого сорта отличались плохою всхожестью, но все же дали ръдкіе всходы и первый сборъ—14 октября.

Сравнимъ теперь испытывавшіеся въ текущемъ году сорта хлопчатника на всѣхъ участкахъ опытнаго поля по среднимъ даннымъ урожайности, скороспѣлости, выходу волокна, длины волокна, вѣсу съмянъ, въсу сырца изъ одной коробочки и суммъ среднихъ температуръ, потребныхъ для каждаго сорта отъ посъва до созръванія за 1909 и 1910 годъ (см. табл. 29).

табл. 22. Опыты съ сортами хлопчатника на участкъ № 8.

ь.	въ квад-		Урожай на 1 десятину.												
-		Названіе сортовъ.	1 сб	оръ.	II c	боръ.	Итого.								
Ne Ne A	Площадь ратныхъ		υ.	ф.	п.	ф.	п.	ф.							
								enii Gud							
1	1.200	Аунсболъ (Ounce Boll) отбор- ный	106	37	34	21	141	18							
2	1.740	Аунсболъ не отборный	70	15	29	30	100	5							
3	660	Tindal Select Prolific	65	27	24	9	89	36							

Наиболье урожайнымъ сортомъ за два года оказался новый сорть—Gold Standard, давшій въ среднемъ урожай сырца 129 пудовъ на десятину; сорть этомъ отличается такъ же и высшимъ сравнительно выходомъ—33,8% въ среднемъ, выше перваго по выходу акклиматизированнаго уже въ Туркестанъ сорта Кіпд, средній выходъ котораго только 32,65%; по длинъ волокна онъ также превосходитъ Кингъ, (см. табл. 29); коробочки его крупнъе Кинга; только по скороспълости пока онъ отстаетъ отъ Кинга: G. Standard созръваеть въ 117 дней, (Кіпд въ 110 дней) и требуеть для созръванія большей суммы среднихъ температуръ воздуха, чъмъ Кіпд; съмена описываемаго сорта среднія по въсу, крупнъе Кинга, по цвъту сърыя, попадаютъ среди нихъ черныя голыя, но очень мало.

Вторымъ по средней урожайности за два года идетъ новый сортъ Allen King, давшій 118 пудовъ на десятину; по выходу (31,9%) онъ ниже Кинга, но по качеству волокна и длинѣ его онъ много превосходитъ King; волокно послѣдняго имѣетъ среднюю длину 22, 15 mm., волокно же Allen King имѣетъ среднюю длину 26,54 mm. и отличается нѣжностью и шелковистостью; сѣмена Allen King средней величины крупнѣе Кинга, сѣрыя съ желтовато коричневымъ оттѣнкомъ; средній вѣсъ сырца одной коробочки больше Кing; но по скороспѣлости онъ уступаетъ Кингу: А. Кing созрѣваетъ какъ и Gold Standard въ 117 дне 1,

но требуетъ для созрѣванія большей суммы среднихъ температуръ, чѣмъ Gold Standard (не говоря уже о Кингѣ), а именно,—2964°, тогда какъ Gold Standard созрѣваетъ при суммъ температуръ 2858,4°, а Кингъ 2690,3°.

Треть имъ по урожайности идеть сорть Аунсболь, (Ounce Boll), культивируемый на опытномъ поль съ 1906 года, обладающій небольшимъ сравнительно выходомъ 30,6%, короткимъ и среднимъ по качеству волокномъ; съмена его среднія, чуть крупнъе Кинга, сърыя съ зеленовато-коричневымъ оттънкомъ; по въсу сырца изъ одной коробочки онъ равенъ Кингу; почти равенъ ему и по скороспълости, созръваеть въ 110 дней и требуеть для созръванія 2686,3° средней суммы температуръ воздуха.

Четвертымъ по урожайности—108 пудовъ на десятину—идетъ Tindal Select Prolific со среднимъ выходомъ волокна 31,8%, со среднею длиною волокна 24,52 mm. и среднимъ въсомъ сырца изъ одной коробочки 1,05 зол., мелкими съменами—темно-съро зеленаго цвъта—съ примъсью черныхъ голыхъ съмянъ; созръваетъ въ 120 дней и требуетъ для созръванія 2961,6°.

Пятымъ по урожайности — 106 пудовъ на десятину — идетъ Christopher Large Big Boll съ крупными коробочками, достигающими средняго въса сырца изъ одной коробочки 1,75 зол. Сортъ этотъ обладаетъ среднею длиною волокна 24,16 mm, хорошимъ выходомъ—33,6%, но поздноспълъ—созръваетъ въ 127 дней и требуетъ для созръванія высокой суммы среднихъ температуръ—3159, 8°; съмена его крупныя, съровато-зеленаго цвъта, волокно средняго качества.

Шестымъ по урожайности—105 пудовъ на десятину—идеть Кокъ-чигить, давно акклиматизированный въ крав сорть, культивируется на Андижанскомъ опытномъ полв съ основанія его. Сорть этоть отличается своей скороспвлостью, созрвваеть въ среднемъ въ 109 дней и требуеть для созрвванія чрезвычайно малой суммы среднихъ температурь—2650,4°; обладаеть низкимъ сравнительно выходомъ волокна, короткимъ и грубымъ волокномъ, но большими сравнительно коробочками, (1,20 зол. средній ввсь сырца изъ одной коробочки); свмена его крупныя темно-зеленыя.

Седьмымъ по урожайности—98 пудовъ—идетъ King+Allen, съ небольшимъ сравнительно выходомъ—31,4%, но длиннымъ—волокномъ 28,37 mm., съ средней величиной коробочекъ (1,10 зол. средній въсъ сырца изъ одной коробочки), средними съменами—темно-съраго цвъта, поздноспълый, созръваетъ въ 121 день и требуетъ для созръванія большой сравнительно суммы температуръ—2805,2°.

Восьмым в по урожайности—97 пудовъ на десятину—идетъ Southern Норе; сортъ съ низкимъ выходомъ волокна—29,5%, но длиннымъ волокномъ, съ средними по величинъ коробочками; въсъ сырца изъодной коробочки 1,17 зол.; средними по величинъ, темносърыми съ




Рис. 15. Хлопковое поле передъ сборомъ.



Рис. 16. Очистка хлопка на джинъ.

зеленоватымъ оттънкомъ съменами, съ небольшой примъсью черныхъ голыхъ съмянъ; отличается поздноспълостью; созръваетъ въ 120 дней и требуетъ для созръванія большой сравнительно суммы среднихъ температуръ—2977,0°.

Девятымъ по урожайности—97 пудовъ на десятину—идетъ сортъ Перховскаго—Андижанскій—Абасси, съ длиннымъ сравнительно волокномъ, но низкимъ выходомъ; съ средними коробочками, средними съменами съро-коричневаго цвъта съ примъсью зеленыхъ и голыхъ черныхъ съмянъ; созръваетъ въ 116 дней, требуетъ 2786,8° суммы среднихъ температуръ.

Только десятымъ по урожайности оказался извъстный уже акклиматизировавшійся въ Туркестанъ сорть Кіпд, съ среднимъ выходомъ волокна 32,65%, мелкими сърыми съ зеленовато-коричневымъ оттънкомъ съменами; длина волокна его 22,15 mm., созръваеть въ 111 дней, требуетъ 2690,3° суммы среднихъ температуръ.

Одиннадцатымъ по урожайности, —95 пудовъ на десятину — идетъ первый повыходу (36,6%), новый сортъ Moss Improwed, съ короткимъ сравнительно волокномъ, средними по величинъ и въсу съменами сърокоричневаго цвъта съ зеленоватымъ оттънкомъ; сортъ сравнительно поздноспълый, созръваетъ въ 120 дней и требуетъ для созръванія высокой суммы среднихъ температуръ—2981,6°.

Двънадцатымъ по урожайности, по даннымъ только одного текущаго года—94 пуда на десятину—идетъ Бендересъ; сортъ этотъ отличается крупными коробочками, средними по величинъ съменами, низкимъ выходомъ и средней сровнительно длиною волокна; созрълъ въ текущемъ году, какъ Кокъ-чигитъ, на 109 день, но требуетъ для созръванія большой суммы среднихъ температуръ, чъмъ послъдній.

Тринаддатымъ по урожайности—93 пуда на десятину—идетъ Pride of Georgia, сортъ съ крупными коробочками, крупными съменами сърокоричневаго цвъта съ зеленоватымъ оттънкомъ; отличается низкимъ выходомъ и поздносиълостью; созръваетъ въ 125 дней, требуетъ для созръванія громадной сравнительно суммы среднихъ температуръ—3129,0°, но обладаетъ хорошимъ по качеству и длинъ волокномъ.

Четырнадцатымъ по урожайности идетъ Кара-чигитъ давно уже акклиматизированный здѣсь сортъ, культивируемый на Андижанскомъ опытномъ полѣ съ основанія его; сортъ этотъ отличается нѣжнымъ волокномъ средней длины—25 mm., низкимъ выходомъ—30,2%; мелкими коробочками и мелкими черными голыми сѣменами; созрѣваетъ въ 114 дней и требуетъ суммы среднихъ температуръ для созрѣванія 2.729°.

Пятнадцатымъ по урожайности,—87 пудовъ на десятину—идетъ новый сорть Mells Select Egyptian; сорть низкій по выходу—28,6%

съ крупными сравнительно коробочками, длиннымъ—28 mm. — нѣжнымъ желтымъ и бѣлымъ волокномъ; сѣмена крупныя, бѣлым съ зеленоватымъ оттънкомъ и желтыя; отсортированы по цвѣту волокна. Сортъ этотъ поздноспѣлый (созрѣваетъ въ 124 дня), требуетъ для своего созрѣванія 3079,2° суммы среднихъ температуръ.

Шестнадцатымъ по урожайности—82 пуда на десятину,—идетъ Малля-чигить, культивируемый на полѣ съ основанія его; сорть съ низкимъ выходомъ волокна—30,3%, средней длины—24,38 mm.—мелкими коробочками, средней величины сѣменами сѣраго цвѣга; созрѣваетъ въ 114 дней, требуетъ для созрѣванія 2752,6°.

Семнадцатымъ по урожайности,—82 пуда на десятину—идетъ Triumph, сортъ съ крупными коробочками (средній вѣсъ сырца изъ одной коробочки доходитъ до 1,89 золотн.), съ высокимъ выходомъ волокна—35,6%; длина волокна 25,65 mm.; сѣмена крупныя, темносърыя съ коричневымъ оттънкомъ и сѣрыя; созрѣваетъ этотъ сортъ въ 118 дней и требуетъ 2890,6° суммы среднихъ темиературъ воздуха.

Дал'ве, 18-мъ идетъ Dikson Klark—урожайностью 82 пуда на десятину; сортъ съ низкимъ сравнительно выходомъ—31,06% коробочки средней величины; съмена крупныя, темносърыя съ зеленоватымъ оттънкомъ, съ небольшой примъсью черныхъ голыхъ съмянъ; созръваетъ въ 118 дней, требуетъ для созръванія 2812, 9° суммы среднихъ температуръ.

19-мъ идетъ Excelsior Prolific, съ средней урожайностью за два года—81 пудъ, сортъ съ низкимъ выходомъ—31,5%, но длиннымъ нѣжнымъ волокномъ—30, 22 mm.; коробочки средней величины, сѣмена мелкія, сѣрокоричневаго цвѣта; сорть поздноспѣлый, созрѣваетъ въ 120 дней и требуетъ 3011,2° суммы среднихъ температуръ.

На двадцатомъ мѣстѣ по средней урожайности за два года—81 пудъ—Наwkins; сортъ съ низкимъ выходомъ волокна, мелкими коробочками, средней длины волокномъ. Сѣмена сѣро-зеленаго цвѣта, съ примѣсью коричневыхъ, средней величины; сортъ сравнительно скороспѣлый, созрѣваетъ въ 114 дней, требуетъ для созрѣванія 2634,8° суммы среднихъ температуръ.

Далъе, 21-мъ идетъ Allend съ урожайностью 80 пудовъ на десятину; сортъ съ хорошимъ выходомъ волокна—32,2% и длиннымъ сравнительно волокномъ—25,94 mm.; коробочки небольшія, съмена среднія; созръваетъ въ 119 дней и требуетъ для созръванія 3010,6° суммы среднихъ температуръ.

22-мъ идетъ Russell съ средней урожайностью 75 пудовъ; сортъ съ низкимъ выходомъ, средней длины волокномъ, крупными сровнительно коробочками и крупными темнозелеными съменами съ примъсью съровато-коричневыхъ; сравнительно скороспълый, созръваетъ въ 114 дней и требуетъ для созръванія 2780,5° суммы среднихъ температуръ.

# Средній урожай различныхъ сортовъ хлопчатника въ 1910 году.

Табл. 23.

названія сортовъ.	Площадь въ квадратныхъ саженяхъ.	сб	I оръ.	Park C	II opъ.	1000	III оръ.		V оръ.	Ит	oro.	Средній упожай на	1 десят.
	Площадь въ квадря саженяхъ	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.
	enterno dos sensos												
Кингъ	8.490	100	121/2	166	201/2	93	81/2	10	19	370	201/2	104	30
Аунсболъ (Ounce Boll)	4.892	142	41/2	75	21/2	7	18	-	_	224	25	110	8
Кара-чигитъ	807	18	29	11	$31\frac{1}{2}$	. 1	10	-	_	31	$30\frac{1}{2}$	94	18
Кокъ-чигитъ.,	351	8	181/2	3	201/2	-	$36\frac{1}{2}$	-	_	12	$35\frac{1}{2}$	88	5
Gold Standard	415	10	23	3	35	2	11	-	_	16	29	96	29
Cristoper Lard. B. B	476	7	25	6	$13\frac{1}{2}$	3	12	-	_	17	$10\frac{1}{2}$	87	1
Mels Select Egyptian	276	2	71/2	1	21	_	$35\frac{1}{2}$	_	_	4	24	40	
Tindal Select Prolific	996	23	27	9	$14\frac{1}{2}$	1	14	_		34	$15\frac{1}{2}$	82	34
Малля желтый	60		261/2	1	3	-	_	_	-	1	291/2	69	20
Triumph	205	4	71/2	3	21/2	-	331/2	_		8	31/2	94	28
Hawkins	53	1	23	-	201/2	_	-	_	_	2	31/2	94	21
Allen + King	302	6	36	4	21/2	1	29	_	_	12	271/2	100	33
Малля-чигитъ	60	2	6	_	20	_	_	_	_	2	26	106	-
Blue Ribbon	157	3	11/2	1	32		22	_	_	5	151/2	82	14
Dickson Clark	183	2	1	1	16	1	5	_	_	4	22	59	27
Russell	.79	1	341/2	-	211/2		11/2		-	2	171/2	74	3
Southern Hope	125	1	34	_	391/2	_	211/2	_		3	15	70	8
Excelsior Prol	195	4	5	2	3	1	7	_	_	7	15	90	31
Pride of Georgia	99	1	311/2	1	14	_	171/2	_	_	3	23	86	27
Кингъ + Алленъ	137	4	111/2	1	7	_	121/2	_	_	5	31	101	7
Андижанскій + Абасси	76	2	11		261/2	_	3	_	_	3	1/2	95	5
Moss Improved	119	2	_	1	16		131/2	_		3	291/2	75	15
Floradora	174	1	28		37	_	35	_	_	3	20	48	11
Ашмуни	50	_	71/2	_	17	_	5		_	_	291/2	35	16
Аффифи	43	-	61/2	_	20	_	11/2	-	_	_	28	39	3
Allend	6	_	6	_	11/2	-	1/2	-	_	_	8	80	_
Бендересъ	15		19	_	3	_	11/2	_	_		231/2	94	_
Смъсь Андиж. опытн. поля.	354	4	26	.3	141/2	1	211/2	_	_	9	22	64	30
Смёсь всёхъ сортовъ съ разныхъ дёлянокъ	G 8	_	_	_		_	-	21	34	21	34	_	_
Итого	7д.2.395 кв. с	359	29	303	36	120	16½	32	13	815	14½		

Цаш	.ovopoulo				Площадь въ квадрат-	Ісб	opa.	II c o	ора.	III c	бора.	lV c o	ора.	Ит	ого.
Паи	менованіе	участко	овъ.		ныхъ саженяхъ.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п,	ф.	п.	ф.
Участокъ	№ 1				2.195	37	21	21	37½	_	-	—	_	59	18
»	№ 6				1.813	34	13	35	10	7	16	_	_	76	39
»	№ 8				3.600	122	22	45	291/2	- A	A - 6	. ,—	·	168	113
»	№ 9			 	2.271	49	38	22	38	14	17	_	_	87	13
»	№ 12				375	10	14½	6	17	101 <del>-</del>	_	-	_	16	31
»	№ 14				901	15	2	13	12	4	28½	-		33	2
»	№ 15			 	1.607	15	26½	36	17½	14	1	-	_	66	5
"	№ A				4.373	50	30½	84	22	50	22	7	39	193	33
»	№ В				2.060	23	21½	37	121/2	29	2	2	20	92	16
Со всъхъ	участковъ	• • • •	• •	 			_	_	_	-	_	21	34	21	34
		Ито	го.		7 д. 2.395 кв. с.	359	29	303	36	120	16½	32	13	815	14

# Средній въсъ сырца одной коробочки.

Табл. 25.

	Recuir necessary	. 1	910 г	о д	ъ.	1909 г.
NºNº	названія сортовъ.	взвѣшан- оробочекъ.	Средні	й вѣсъ в никахъ.	ь золот-	Средній вѣсъ изъ 100 коробочекъ.
	Paramanan Alian mali	Число взвѣшан- ныхъ коробочекъ.	5-ти гнѣзд- ный.	4-хъ гнѣзд- ный.	Смѣшан- ный.	Средній 100 коро
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 23 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	Кокъ-чигить  " " "  " " "  " Aунсболь (Ounce Boll)  " " "  Russell  " " "  Кингь  " " "  Андижанское + Абасси  " " "  Бендересъ  Pride of Georgia. Excelsior Prl.  " " "  King + Allen Triumph  " "  Кара-чигить  " " "  Кара-чигить  " " "  Кара-чигить  " " "  Southern Hope Dickson Clark. Tindal Sel. Ppl.  Анмуни  Moss Improwed Christofer L.  " " "  Малля желтый  Наwkins  Афифи Allen + King Allend  Allend	250 115 392 144 164 379 50 296 665 295 1.536 49 104 125 76 135 115 165 523 20 300 100 152 560 100 220 64 476 81 240 435 — 520 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50	1,19	1,02	0,95 0,35 1,05 0,82 1,30 1,31 1,06 1,07 0,83 0,93 0,93 0,93	1,34 — 1,10 — 1,21 — 1,02 — 1,10 — 1,39 1,00 — 1,39 1,00 — 0,98 1,68 — 0,95 0,97 1,19 — 1,12 1,08 1,03 0,63 1,39 1,54 — 1,07 — 1,23 1,06 0,51 1,19 —

# Выходы волокна въ %%.

Табл. 26.

1000		Сре	дній вы	ходъ въ	%%.
№ №	НАЗВАНІЕ СОРТА.		очисткѣ 9 году.		очисткѣ О году.
	Particular	На чигрикъ.	На джинѣ.	На чигрикѣ.	На джинъ
				, ,	
1	Кингъ	34,3	31,6	33,135	31,44
2	Tindal Sel. Ppl	33,4	31,0	32,824	30,00
3	Mells Sel. Egiptian	31,7	28,7	27,952	26,34
4	Кокъ-чигитъ	31,5	30,3	29,835	28,95
5	Dickson Clark	34,0	32,5	31,067	. 29,44
6	Triumph	38,0	35,37	36,216	32,77
7	Cristofer L	35,3	33,7	34,229	31,28
8	Кара-чигитъ	32,8	29,3	29,080	29,78
9	Blue Ribbon	32,2	31,6	29,933	28,15
10	Excelsior Ppol	34,3	31,7	31,259	28,83
11	Аунсболъ (Ounce Boll)	32,2	30,3	30,514	29,53
12	Gold Standard	36,9	33,8	33,727	31,05
13	Бендересъ	_		31,739	29,00
14	Allen + King	34,6	32,1	31,139	29,99
15	King + Allen	33,6	31,4	31,225	29,65
16	Floradora	29,8	26,4	26,976	25,20
17	Pride of Georgia	32,2	29,2	31,964	29,02
18	Southern Hope	31,2	28,8	30,270	27,77
19	Allend	_		33,043	31,37
20	Russell	32,2	29,4	29,527	28,16
21	Hawkins	31,8	30,6	30,993	29,69
22	Манля-чигить	32,9	30,2	28,306	29,51
23	Андижанское + Абасси	31,6	29,6	28,901	28,40
24	Ашмуни	32,7		_	28,93
25	Малля желтый	28,8	26,1	<u></u>	25,38
26	Moss Impr	38,3	36,9	_	35,58
27	Афифи	32,7	·	_	32,60
28	Смъсь новыхъ сортовъ Андижанскаго опытнаго поля.	_	_	31,610	30,7

# Средиія величины длины волокна разныхъ сортовъ, хлопчатника.

Табл. 27.

Nº Nº	названія сортовъ.	Число измѣ- ренныхъ сѣ- мянъ.	Длина в	олокна въ	. 1910 г.	Средняя длина
1616	HASBAHIM COFTOBB.	Число изи ренныхъ мянъ.	Макси- мумъ.	Мини- мумъ.	Среднее.	волокна въ 1909 г
	MEDICAL DE LES DE LA COMPANION					
1	Russell	100	26,0	15,5	21,84	27
2	Floradora	50	36,6	26,8	32,45	38
3	Андижанское + Абасси	40	33,0	17,0	21,74	29
4	Allen + King	40	30,3	14,1	23,09	30
5	Tindal Sel. Prl	40	30,5	15,5	22,04	27
6	Dicson Clark	40	37,4	22,3	28,11	35
7	Christofer L	50	28,6	19,6	24,16	26
8	Excelsior Prol	70	36,0	21,4	27,45	33
9	Кара-чигитъ	60	30,6	17,7	22,55	28
10	Малля-чигитъ	10	28,6	22,7	24,77	24
11	Малля желтый	10	31,0	25,0	28,71	24
12	Triumpf	100	31,2	19,2	24,30	27
13	Southern Hope	20	37,3	19,6	29,27	31
14	Pride of Georgia	20	29,6	20,8	24,84	26
15	Allend	20	30,3	22,8	25,94	-
16	Hawkins	20	29,4	20,4	23,76	25
17	Аунсболъ	70	28,2	15,0	21,08	_
18	Кингъ	150	29,8	14,0	20,30	24
19	Кокъ-чигитъ	60	28,3	17,7	21,75	_
20	Moss Improwed	20	26,0	17,4	21,69	24
21	Blue Ribbon	30	34,4	22,2	27,45	32
22	King + Allen	30	30,0	20,2	26,74	30
23	Gold Stand	20	27,3	21,1	23,95	25
24	Бендересъ	30	30,0	19,3	23,79	
25	Тулъ	10	25,5	23,6	24,84	
26	Труитъ	10	35,7	32,63	28,9	_
27	Смъсь новыхъ сортовъ Андижан-	1000				
90	скаго опытнаго поля	10	24,3	18,4	21,14	
28	Ашмуни		31,6	22,6	26,13	
29	Афифи		33,3	18,8	28,10	-
30	Mells Sel. Egypt	70	36,5	17,5	26,46	-
31	Гуза мъстная	10	25,5	19,5	22,15	_

Сумма среднихъ температуръ воздуха отъ посъва до созръванія разныхъ сортовъ хлопчатника.

Табл. 28.

		1910	) r o	д ъ.		Средняя
№Nº	названія сортовъ.	Участокъ № 9 <b>-й</b> .	Участокъ № 1-й.	Средняя.	Средняя 1909 года.	1909 и 1910 года
	La deste la material de la la companya de la compan	102		1000 (10)		
1	Allen + King	2.747,9	3.266,9	3.007,4	2.870,6	2.964,0
2	Floradora	2.895,2	3.356,1	3.125,6	2.971,5	3.048,6
3	Triumph	3.023,3	2.957,4	2.990,6	2.790,5	2.890,6
4	Dickson Clark	3.041,7	2.665,0	2.853,3	2.772,5	2.812,9
5	King's	2.645,0	2.840,3	2.742,6	2.638,0	2.690,3
6	Pride of Georgia	3.119,7	3.314,2	3.216,9	3.041,2	3.129,6
7	Blue Ribbon	3.008,8	3.023,2	3.016,0	2 854,5	2.935,5
8	Gold Standard	2.897,2	2.991,3	2.944,3	2.772,5	2.858,4
9	Бендересъ	2.771,4		2.771,4	_	2.771,4
10	Southern Hope	2.940,7	3.072,7	3.006,7	2.943,3	2.977,0
11	Tindal Select Prolific	2.832,4	3.311,7	3.072,0	2.851,3	2.961,6
12	Christophor Larg Bic Bol	3.125,1	3.550,5	3.337,8	2.981,9	3.159,8
13	$King + Allen \dots$ .	2.836,7	2.940,4	2.888,5	2.721,8	2.805,2
14	Moss Improved	2.943,3	3.088,3	3.015,8	2.947,3	2.981,6
15	Mells Select Egyptian	3.047,1	3.187,2	3.117,1	3.041,2	3.079,5
16	Allend	-	_	3.010,6	_	3.010,6
17	Excelsior Prolific	2.965,8	3.337,6	3.151,7	2.870,6	3.011,2
18	Rusell	2.727,9	2.737,6	2.732,8	2.828,3	2.780,5
19	Аунсболь	2.596,1	2.703,1	2.649,6	2.723,0	2.686,3
20	Кокъ-чигитъ	2.569 8	2.755,8	2.662,8	2.638,0	2.650,4
21	Ашмуни	3.446,4	3.314,2	3.380,3	3.358,7	3.369,5
22	Афифи	3.464,8	3.436,1	3.450,4	3.335,9	3.393,2
23	Андижанское + Абасси	2.701,9	2.992,7	2.847,3	2.721,8	2.786,8
24	Малля желтый	I	3.204,2	3.204,2	2.980,7	-3.092,5
25	Hawkins	- i	2.649,8	2.649,8	2.620,9	2.634,8
26	Кара-чигить	_	2.840,2	2.840,2	2,737,9	2.789,0
27	Малля-чигить	86-1	2.842,0	2.842,0	2.663,3	2.752,6

23-мъ идетъ Флоридоръ съ средней урожайностью 71 пуд.; сортъ длинноволокнистый—35,22 mm, но съ низкимъ выходомъ волокна 27,1%; коробочки и съмена средней величины; послъднія съробълаго и бълаго цвъта: созръваетъ поздно въ 122 дня и требуетъ для своего созръванія большой суммы среднихъ температуръ— 3048,1°.

Двадцать четвертымъ по урожайности оказался новый сортъ Blue Ribbon, давшій въ среднемъ за два года 65 пудовъ на десятину; сортъ съ низкимъ выходомъ—30,4%, но длиннымъ сравнительно волокномъ 29,72 mm.; коробочки средней величины; съмена мелкія, темно-сърыя; созръваеть въ 119 дней, требуеть для созръванія 2935,2°.

Наконецъ, идутъ наименѣе урожайные и наиболѣе поздноспѣлые сорта: Малля желтый и Египетскіе Ашмуни и Афифи, давшіе на десятину отъ 45 до 50 пуд., и требующіе для своего созрѣванія болѣе 3000° суммы среднихъ температуръ; Малля желтый отличается крупными коричневыми сѣменами съ примѣсью зеленыхъ и низкимъ выходомъ; имѣетъ средней величины коробочки и среднюю длину волокна; созрѣваетъ въ 126 дней и требуетъ для созрѣванія 3092,5° суммы среднихъ температуръ.

Египетскіе сорта отличаются мелкими трехгнѣздными, по преимуществу, коробочками, мелкими, черными, голыми и тяжелыми сравнительно сѣменами; среднимъ сравнительно выходомъ, но длиннымъ волокномъ; у Ашмуни выходъ 30,8%, длина 29,06 mm.; у Афифи выходъ 32,6%, длина 32,05 mm.; созрѣваетъ Ашмуни черезъ 136 дней, Афифи черезъ 140 дней, и требуютъ для своего созрѣванія наибольшей суммы среднихъ температуръ — Ашмуни—3369,5,°, Афифи — 3393,2°.

Описанные выше сорта по ихъ скороспълости располагаются слъдующимъ образомъ. Наиболъе скороспълыми, требующими для своего созрѣванія суммы среднихъ температуръ менѣе 2700°, будутъ: Кокъ-чигитъ, Кингъ, Аунсболъ и Hawkins, созрѣвающіе въ 109 и 114 дней, далъе идутъ Кара-чигитъ, Russels Малля-чигитъ, Андижанскій + Абасси и Бендересь — требующіе не болъе 28000 суммы среднихъ температуръ и созръвающіе также въ 109 и 116 дней; за ними идуть Gold Standard, Dickson Klark, King+Allen и Trimph, требующіе для созрѣванія не болѣе 2900 суммы среднихъ температуръ и созрѣвающіе въ 117—121 день. Далѣе идуть Allen-King, Tindal Select Prolific, Southern Hope, Moss Improwed и Blue Ribbon, требующіе для созрѣванія не болѣе 3000 суммы среднихъ температуръ и созрѣвающіе въ 117—120 дней, и послъдними, требующими для созръванія болъе 3000° суммы среднихъ температуръ, идутъ: Mells Select Egyptian, Christopher Lorge, Pride of. Georgia, Флоридоръ, Excelsior Prolific, Allend, Малля желтый, Ашмуни и Афифи, созръвающіе 140 дней.

Сводная таблица опытовъ съ сортами

хлопчатника за 1909 и 1910 годъ.

Табл. 29.

№	названія сортовъ.	Урой	кай на тину.	деся-		одъ вол въ %%.		1 ,	ина вол			ь сырца очки въ никах	золот-		1.000 зере ъ въ грам			о дней до созр			средних сотъ посѣ зрѣвапія	ва до со-
2.45	TASBATIST COTTOBB.	1909 г.	1910 г.	Средній.	1909 г.	1910 г.	Средній.	1909 г.	1910 г.	Срединя.	1909 г.	1910 г.	Средній.	1909 г.	1910 г.	Средній.	1909 г.	1910 г.	Среднее.	Средняя.	1909 r.	1910 г.
	kuritan, suntepe 10 1287 k Sirakuan benasa arasah satu			12. 2.	Charte								3.2110		2000			1 2 2 2	1 2 3 270		1.01.01.00	PACTERIAL SAL
		п. ф.	и. ф.	п. ф.										TH 783		G. SET 647		10000	1000	En regióna.		100 100
1	Gold Standard	162-	96-29	129-14	35,3	32,3	33,8	25	23,95	24,47	1.15	1,27	1,21	104,06	108,83	106,44	116	118	117	2.858,4	2.772,5	20110
2	Алленъ — Кингъ	135-30	100-33	118-13	33,3	30,6	31,9	30	23,09	26,54	1,19	1,25	1,22	112,92	114,54	113,73	119	114	117	2.964,0	2.870,6	2.944,3
3	Аунсболъ	125-10	110- 8	117-29	31,2	30,0	30,6	_	21,08	21,08	1,10	0,95	1,02	107,40	102,71	105,06	112	109	110	2.686,3		3.057,4
4	Tindal Sel. Prl		82-34	108-22	32,2	31,4	31,8	27	22,04	24,52	1,03	1,07	1,05	100,40	102,94	101,67	119	121	120	2.961,6	2.723,0 2.851,3	2.649,6
5	Cristofer L	126-30	87- 1	106-35	34,5	32,7	33,6	26	24,16	25,08	1,54	1,67	1,60	136,50	140,64	138,57	124	130	127	3.159,8	2.981.9	3.072,0 3.337,8
6	Кокъ-чигить	122-27	88 5	105-16	30,9	29,39	30,1	_	21,35	21,35	1,36	1,05	1,20	129,62	115,6	122,61	109	109	109	2.650,4		
7	Кингъ — Алленъ	96	101- 7	9824	32,5	30,4	31,4	30	26,74	28,37	0,98	1,22	1,10	104,18	113,02	108,6	126	115	121	2.805,2	2.721,8	2.662,8 2.888,5
8	Southern Hoppe	124-20	70- 8	97-14	30,0	29,0	29,5	31	29,27	30,13	1,12	1,23	1,17	111,76	114,22	112,99	122	118	120	2.977,0		THE PERSON NAMED IN
9	Андижанское + Абасси	97 -10	95- 5	96- 7	30,6	28,6	29,6	29	21,74	25,37	1,10	0,94	1,02	110,28	108,86	109,57	117	114	116	2.786,8	2.947,3 2.721,8	3.006,7
10	Кингъ	86-17	104-30	95-24	32,9	32,29	32,6	24	20,30	22,15	0,02	1,01	1,02	103,32	103,73	103,52	110	112	111			2.850,8
11	Moss Impr	114-30	75–15	95-22	37,6	35,58	36,6	24	21,69	22,84	1,39	_	1,39	112,88	112,38	112,63	122	112		2 690,3	2.638,0	2.742,6
12	Бендересъ		94	94	_	30,3	30,3		23,79	23,79	-	1,41	1,41		112,40	112,00	-	109	120	2.981,6 2.771,4	2.947,3	3.015,8
13	Pride of Georgia	100-20	86–27	93-24	30,7	30,5	30,6	26	24,84	25,42	1,39	1,30	1,34	145,30	133,56	139,43	126				-	2.771,4
14	Кара-чигитъ	81-30	94-18	88-24	31,0	29,43	30,2	28	22,55	25,27	0.95	1,05	1,00	102,08	105,87	103,97	113	125	125	3.129,0	3.041,2	3.216,9
15	Mells Sel. Egypt		40	87-20	30,2	27,14	28,6	30	26,46	28,23	1,19	1,06	1,12	137,66	131,88	134,77	126	116	114	2.789,0	2.737,9	2.840,2
16	Малля-чигить	79-20	106	82–15	31,6	28,9	30,3	24	24,77	24,38	1,13	0,91	0,99	107,6	106,23	106,42	111	122	124	3.079,2	3.041,2	3.117,1
17	Triumph	70-20	94-28	82-24	36,6	34,5	35,6	27	24,30	1 2	1,68	1,75	1,66	127,46	144,06	135,76	116	116	114	2,752,6	2.663,3	2.842,0
18	Dickson Clark	103-20	59-27	81-24	33,2	30,25	31,7	35	28,11	31,56	1,08	1,06	1,00	110,16	125,98	118,07	116	120	118	2.890,6	2.790,5	2.990,6
19	Excelsior Prl	71-10	90-31	81	33,0	30,0	31,5	33	27,45	30,22	1,0	1,09	1,04	99,20	103,93	101,56	119	121	118	2.812,9	2.772,5	2.853,3
20	Hawkins	67-20	94-21	81	31,2	30,2	30,7	25	23,76		1,06	0,9	0,98	115,08	103,92	109,00	109	122	120	3.011,2	2.870,6	3.151,7
21	Аллендъ		80	.80	_	32,2	32,2	_	25,94	25,94		1,15	1,15		115,40	115,40		119 119	114	2.634,8	2.629,9	2.648,8
22	Russell	75-20	74- 3	74-31	30,8	28,8	29,8	27	21,84	24,42	1,21	1,16	1,18	124,66	117,86		190	i	119	3.010,6	-	3.010,6
23	Floradora	93-30	48-11	71	28,1	26,1	27,1	38	32,45	35,22	0,95	1,10	1,10	104,04		121,26	120	109	114	2.780,5	2.828,3	2.732,8
24	Blue Ribbon	48-30	82-14	65–22	31,9	29,0	30,4	32	27,45	29,72	0,95	1,24	1,10		117,62	110,83	123	121	122	3.048,6	2.971,5	3.125,6
25	Малля желтый	31-20	69-20	50-20	27,4	25,38	26,4	24	28,71	26,36	1,23			99,86	109,81	104,83	118	120	119	2.935,2	2.854,5	3.016,0
26	Ашмуни	57-30	35-16	46-23	32,7	28,93	30,8	32	26,13	29,06	0,63	_	1,23	128,46	144,20	136,33	123	128	126	3.092,5	2.980,7	3.204,2
27	Афифи	51	39- 3		32,7	32,6	32,6	36	28,10	32,05	0,65	. Bis	0,63	106,48	131,14	118,81	137	136	136	3.369,5	3.358,7	3.380,3
		A STATE			J=,.	,-,0	0-,0	00	20,20	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,51	-10	0,51	12 Y 102	133,50	133,50	139	140	140	3.393,2	3.335,9	3.450,4
												THE PO	lau de	2 112-1						an Pos	Berry Mr.	

Наиболъе выходными сортами, со среднимъ выходомъ волокна за два года не менъе 32,6%, являются: Moss Improwed, Triumph, Christopher Large, Gold Standard, King и Афифи. Наиболъе длинюволокнистыми сортами, со среднею длиною волокна за два года болъе 25 mm., оказались: Флоридоръ, Афифи, Dikson Klark, Excslsior Prolific, Soutnern Hope, Blue Ribbon, Ашмуни, Mells Select Fgyptian, Кингъ Алленъ, Малля желтый, Allen King, Кара-чигитъ, Christopher Large, Андижанское Аббаси, Pride of Georgia, Triumph, Allend и Труитъ, высъянный въ 1910 году на четвертомъ участкъ въ самомъ незначительномъ количествъ.

Не давая окончательнаго отвъта о пригодности или непригодности для нашего климата описанныхъ выше новыхъ сортовъ, приведенныя данныя все же характиризуютъ каждый изъ нихъ въотдъльности по выше описаннымъ ихъ качествамъ.

**Опыты съ минеральными удобреніями** поставлены были въ текущемъгоду на двухъ участкахъ: № 15 (Сары-куй). и уч. А.

Участокъ № 15 вспаханъ былъ съ осени; весною дано ему двѣ вспашки; передъ второю—предпосѣвною вспашкою участокъ разбитъ на дѣлянки площадью 120 кв. саж., и внесены удобренія. Посѣвъ произведенъ 3-го апрѣля сѣялкою Баннера, сортомъ Кингъ, на принятое на полѣ всюду разстояніе 1 арш 4 верш. между рядами; сѣмена передъ посѣвомъ замачивались въ водѣ двое сутокъ; 28 апрѣля дана была первая поливка пропускомъ воды по арыкамъ (рис. 14), проведеннымъ тогда же культиваторомъ Планетъ (см. рис. 13).

Во весь вегетаціонный періодь дано участку 6 поливокъ, два ручныхъ мотыженія, одна полка и три конныхъ пропашки послѣ поливокъ; 25 мая замѣчено образованіе завязей,—9-го іюня началось цвѣтеніе; 18-го, 19-го, 20-го августа передъ первымъ сборомъ произведенъ былъ подсчетъ коробочекъ на 30-ти растеніяхъ каждой дѣлянки и сдѣланы измѣренія этихъ растеній. Наилучшей оказалась дѣлянка съ полнымъ навознымъ удобреніемъ; растенія на ней достигали въ среднемъ 23-хъ вершковъ высоты, имѣли по 18 боковыхъ вѣтвей, по двѣ раскрытыхъ и по 16 сформированныхъ коробочекъ и по одному цвѣтку или бутону, тогда какъ растенія 3-хъ другихъ дѣлянокъ достигали высоты только 20—17 и даже 16 вершковъ въ среднемъ и имѣли по 12—9 и даже 7 открытыхъ и сформированныхъ коробочекъ въ общей суммѣ (см. табл. 30).

20 августа произведенъ первый сборъ, 2-го октября второй и 6-го ноября—третій. Наибольшій урожай полученъ съ дѣлянки съ полнымъ навознымъ удобреніемъ—120 пуд. сырца.

На участкъ № 15, кромъ машиннаго посъва, произведенъ былъ ручной посъвъ 9-го апръля—на дълянкъ, внъ опыта безъ удобреній, площадью—767 к. с., на гряды, сдъланныя окучникомъ, съ предварительной поливкой ихъ предъ посъвомъ; въ дальнъйшемъ всъ работы

# Опыты съ удобреніями хлопчатника сорта Кіпд на участкъ № 15.

Табл. 30.

.72	квад-		ra.	ован.	Сре	днее	на 1	расте	ніе:		Уро	жай	на	1 де	сяти	тну:	
№ № делянокъ.	Ілощадь въ атг. саж.	Названіе удобреній.	подсчета.	изсл'вдован лунокъ.	a niñ.	JXTb I.	ятыхъ	иро- хъ мекъ	)B'b.	I c	бора	II c	бора	III	сбора	Ито	ого.
New 1	Площа		Время	Число ныхъ	Высота растеній.	Боковыхъ вътвей.	Раскрытыхъ коробочекъ.	Сформиро- ванныхъ коробочекъ	Бутоновъ.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.
1	120	Полное навозное удобреніе 2.400 пуд	20/viii	30	23	18	2	16	1 ·	14	20	64	20	41	_	120	_
2	120	Жмыхи 73 пуда `	18/viii	27	17	14	2	7	0,7	22	20	69	10	26	20	118	10
3	120	Суперфосф. двойного 6 пуд	18/viii	31.	16	11	2	5	_	18	20	57	20	23	10	99	10
4	120	Мясокостной муки 30 пуд	18/viii	30	18	13	3	9	0,3	18	10	57	-	17	_	92	10
5	120	Жмыховъ 40 пуд. и супер- фосфата 6 пуд	19/ун	30	20	16	3	13	0,2	24	20	58	30	14	10	97	20
6	120	Костная мука 20 пуд	20/viii	32	18	14	2	5	0,9	22	20	65	20	18	20	106	20
7	120	Контрольная	20/viii	29	19	16	4	11	3	25	10	54	30	18	_	98	
8	767	Внѣ опыта				- =		100 miles	_	26	7	47	6	19	3	92	16
												2001					

- 149 -

на ручномъ и машинномъ посъвъ велись одновременно; общій урожай на десятину полученъ 92 пуда.

Опыты съ минеральными удобреніями на участ. А. поставлены были въ двухъ серіяхъ; въ первой серіи—по плану уч. № 15—взяты были семь дълянокъ площадью 240 кв. саж.; во второй серін-болье сложнаго плана было 33 дълянки-площадью 24 кв. саж. каждая; разбиты они были въ три ряда-по 11 дълянокъ въ ряду, съ 12-ю контрольными по четыре въ каждомъ ряду. Всему участку дано было двъ весеннихъ вспашки; удобренія внесены были передъ второй вспашкой, кромъ навоза, который внесенъ передъ первой весенней вспашкой, и селитры, которая внесена послъ первой поливки передъ первымъ мотыженіемъ. Посъвъ сортомъ Кингъ произведенъ 11-го апръля съялкою Баннера. Въ дальнъйшемъ участку дано пять поливокъ, два ручныхъ мотыженія и три конныя пропашки. При осмотръ дълянокъ 13-го іюня лучшей была дълянка съ полнымъ навознымъ удобреніемъ; растенія ея отличались болье темной листвой и сильнымъ ростомъ. 29 іюля на ней раскрылась первая коробочка. При подсчеть сформированныхъ коробочекъ въ началь августа, на растеніяхъ этой ділянки было по 18 коробочекъ въ среднемъ, тогда какъ на другихъ было только 16-13 коробочекъ.

По общему сбору 127 пуд. на десятину оказалась наилучшей дълянкой удобренная двойнымъ суперфосфатомъ; за нею—115 пуд. на десятину—идетъ уже удобренная навозомъ (см. табл. 31).

Высокій урожай—121 пудь—дала контрольная дѣлянка; объясняется это тѣмъ, что дѣлянка эта находилась на западной—самой нижней части участка; поливка протокомъ производилась съ востока на западъ; возможно, что удобренія вымывались водою съ дѣлянокъ выше лежащихъ и переносились на контрольную—ниже лежащую; дѣлянка эта и поливалась болѣе обильно, вода тутъ застаивалась; на это указываеть и низкій сравнительно первый сборъ ея—25 пуд. на десятину, тогда какъ другія дѣлянки дали 30 и даже 35 пуд. перваго сбора.

Во второй серіи опытовъ съ удобреніями на уч. № А наилучшее дъйствіе оказалъ сърнокислый калій—7 п. 20 ф. на десятину съ 15% суперфосфатомъ—12 пуд. 20 ф. на десятину; хорошій урожай—137 пуд. на десятину—дала дълянка, удобренная однимъ сърнокислымъ каліемъ, но такой же сравнительно высокій урожай—137, 133 и 132 пуда дали и контрольныя дълянки, (см. таблица 32), а потому отъ выводовъ приходится воздерживаться; дълянки площадью 24 квад. саж. слишкомъ малы; при прорывкъ предполагалось всюду оставлять по три растенія въ лункъ на разстояніи 12 вершковъ лунка отъ лунки; но выполнить это не удалось, всходы были ръдки, много было лунокъ съ однимъ и двумя растеніями, и разстояніе между лунками не вездъ было точно 12 вершковъ; все это при небольшой площади дълянокъ и вычисленій итоговъ на десятину имъетъ большое значеніе; полу-

ченные результаты не являются вліяніемъ только удобреній; учесть же всѣ факторы при ограниченномъ персоналѣ опытнаго поля было невозможно.

Опыты съ минеральными удобреніями подъ хлопчатникъ на участкъ́ А (первая серія).

Табл. 31.

		Площадь	Урожа	й на 1 де	есятину:	
NèN≙	Названіе удобреній.	въ квадр. саж.	I сбора.	Исбора.	III сбора.	Итого
	geran -				3.50	
1	Полное навозное удобреніе (2.400 пуд. на десят.)	240	28-15	53-05	32-25	114-05
2	Жмыхи (73 пуда на десят.)	240	23-15	38-00	19–35	81-10
3	Жмыхи 40 пуд. + двойной су- перфосф. 6 пуд. на десят	240	26-35	36–15	20-05	83-15
4	Мясокостная мука (30 пуд. на десят.)	240	30-10	38-25	21–15	90-10
5	Костяная мука (20 пуд. на десят.)	240	35–15	40-20	25-20	101-15
6	Двойной суперфосф. (6 пуд. на десят.)	240	32–15	55-30	38-25	126-30
7	Контрольная	180	25-33	62-14	33-13	121-20

Опыты со способами постава. Стверная часть участка А отведена была для опытовъ съ числомъ растеній въ лункт. Поставъ произведенъ быль 14-го апрта руками, на принятое на полт разстояніе между растеніями—12 вершковъ, въ прямыя гряды, сдъланныя окучникомъ, безъ предварительной ихъ поливки, такъ какъ 12-го, 13-го и 14-го былъ дождь—(выпало за эти дни 12,1 mm.). Въ дальнтайшемъ дълянки эти политы были шесть разъ. Наибольшій общій урожай полученъ съ дълянки съ 4 растеніями въ лункта (табл. 33). Наименьшій общій урожай дала дълянка съ 1 растеніемъ въ лункта; она же дала наименьшій первый сборъ и наибольшій—третій; много сформированныхъ коробочекь побито было на ней первымъ осеннимъ заморозкомъ въ ночь на 2-ое октября. Опыты съ разстояніемъ растеній въ ряду поставлены были на машинномъ поставть этого же участка; при прорывкта рядовъ оставлялось по три растенія въ лункта на разстояніи гнтало отъ гнтала 16 и 8 вершковъ. Наибольшій общій урожай—

Опыты съ минеральными удобреніями подъ хлопчатникъ на участкъ А (вторая серія).

Табл. 32.

		квад-	Уро	жай на	1 десят	ину:		кай	:aй изъ )къ.	OKT.
Nº Nº	Названіе удобреній.	Площадь въ ратн. саж.	I céopa.	II сбора.	III c6opa.	IV céopa.	Итого.	Средиій урожай по рядамъ.	Средиій урожай изъ всѣхъ дѣлянокъ.	Число лѣлянокъ.
	ROBERT CL. 1 Total Day, No.		п. ф.	п. ф.	п. ф.	п. ф.	п. ф.	п. ф.	п. ф.	
1	Контрольная	24	27-20	51-10	40	15	133-30	140-15	^	15
2	Селитры 15 пуд. на десят	24	25	46-10	45	15	131-10	131-10	95-33	:
3	» 15 пуд. на десят. + сърнокиел. калія 7 п. 20 ф. на десят.	24	20	33–30	28–30	11–10	93–30	93-30	96-26	
4	Конгрольная	24	32-20	53-30	35-00	11-10	132-20	- 1	-	-
5	Селитры 15 пуд. на десят. + сърнокислаго калія 7 п. 20 ф. — суперфосф. 15% 12 п. 20 ф. на десят.	24	20	37 -20	28–30	16-10	102–20	102-20	102-20	
6	Селитры 15 пуд. на десят. —суперфосф. 15% 12 п. 20 ф. на десят.	24	27-20	52-20	42-20	12-20	135	135	135	
7	Контрольная	24	3720	66-10	45	8-30	157-20	_	_	-
8	Каинитъ 12 пуд. на десят	24	25	70	50	11-10	156-10	156-10	156-10	
9	Сърнокисл. калія 7 п. 20 ф. —суперфосф. 15% 12 п. 20 ф. на десят	24	28-30	77-20	50	13–30	170	170	170	
10	Контрольная	24	26-10	66-10	38-30	7-20	138-30	_	_	_
11	Суперфосф. 15% 12 п. 20 ф. на десят	24	16–10	47-20	38-30	8-30	111-10	111-10	111–10	
12	Суперфосф. двойного 5 пуд. на десят	24	17-20	50	56-10		123-30	123-30	96-35	
13	Контрольная	24	18-30	38-30	47-20	-	105	89-15	84 <u></u> 0	-
14	Сърнокисл. калія 7 п. 20 ф. — суперфосф. двойного 5 п. на десят.	24	21-10	40	25	_	86–10	86-10	108-05	
15	Сърнокисл. калія 7 п. 20 ф. на десят	24	20	40	-22-20		82–20	82-20	81-05	
16	Контрольная	24	16–10	26-10	20	_	62-20	4-0	1	
17	Селитры 15 пуд. на десят. суперфосф. двойного 5 п. на десят.	24	11–10	32-20	27-20	_	71–10	71–10	74–13	
18	Сърнокисл. калія 7 п. 20 ф. — селитры 15 пуд.— супер- фосф. двойного 5 пуд. на десят	24	22-20	42-20	45		110	110	81–35	

Продолжение табл. 32-й.

	and secretary and produced the second of the second second second second second second second second second se	квад-	Уро	жай на	1 десяті	ину:		кай	ай изъ экъ.	OKE.
№ №	Названіе удобреній.	Площадь въ ратп. саж.	І сбора.	II c6opa.	Ш сбора.	IV c60pa.	Итого.	Средній урожай по рядамъ.	Средній урожайнзъ всѣхъ дѣлянокъ.	Число дълянокъ.
			п. ф.	п. ф.	п. ф.	п. ф.	п. ф.	п. ф.		
19	Контрольная	24	20	55	40	_	115	_	_	_
20	Селитры 15 пуд. + сърнокисл. калія 7 п. 20 ф. на десят	24	1610	65	41 10	1 — II	122-20	122-20	_	_
21	Селитры 15 пуд. на десят	24	10	46-10	27-20	_	83-30	83-30	_	-
22	Контрольная	24	5	38-30	31-10	_	75	_	_	-
23	»	24	21-10	41-10	33-30	_	96-10	87-10	_	_
24	Селитры 15 пуд. на десят	24	8-30	32-20	31-10	_	72-20	72-20	_	-
25	<ul> <li>» 15 пуд. на десят.</li> <li>+сърнокисл. калія 7 п. 20 ф.</li> <li>на десят.</li> </ul>	24	15	37-20	21-10		73-30	73–30		
26	Контрольная	24	20	38-30	26-10	_	85	_	_	_
27	Селитры 15 пуд. — сърнокисл. калія 7 п. 20 ф. — суперфосф. двойного 5 пуд. на десят	24	13–30	25	15	_	53–30	53-30		_
28	Селитры 15 пуд. — суперфосф. двойного 5 пуд. на десят	24	16-10	33–30	27-20	100 (100) 10 <u>1</u> 0	77-20	77–20	_	_
29	Контрольная	24	17-20	46-10	35	_	98-30	_	_	_
30	Сърнокисл. калія 7 п. 20 ф. на десят	24	25	67-20	45	_	137–20	137–20	_	_
31	Сърнокисл. калія 7 п. 20 ф. — суперфосф. двойного 5 п. на десят.	24	25	65	40	100 **  10 <u>4 </u>	130	130		
32	Контрольная	24	10	33-30	23-30	_	67-20	_	_	_
33	Суперфосф. двойного 5 пуд. на десят.	24	7–20	37-20	25		70	70	·	-
	gengleser norman sammen e Manager-appel - appel som 1879 in t		generali	9 1198h		ELMO.				

139 пуд. на десятину—дала дѣлянка съ разстояніемъ 16 вершковъ лунка отъ лунки и наименьшій—102 пуд.—съ разстояніемъ 8 вершковъ. Параллельно съ этими опытами на участкѣ № 12-й, 28-го апрѣля про-изведенъ былъ машинный посѣвъ сѣялкою Боннера на разстояніе рядъ отъ ряда 1 арш. 8 вершковъ, а не 1 арш. 4 вершка—обычно принятое на полѣ разстояніе при машинномъ посѣвъ. Высѣянъ сортъ Кара-чигитъ замоченными въ теченіе двухъ дней сѣменами, на глубину 6—7 сантиметровъ. 2-го мая появились кое-гдѣ первые всходы;

8-го мая уже всюду ясно обозначились ряды всходовъ, когда и проведены арыки культиваторомъ для первой поливки, произведенной 8-го и 14-го мая; 22-го мая произведена работа культиваторомъ передъ первымъ ручнымъ мотыженіемъ и прорывкой. Оставлялось по три растенія на разстояніи 12 вершковъ. Въ дальнѣйшемъ дано участку 4 поливки, одно ручное мотыженіе и двѣ конныхъ пропашки; 24-го іюня началось первое цвѣтеніе хлопчатника; 30-го сентября произведенъ первый сборъ, давшій 66 пуд. на десятину, 5-го ноября—второй и послѣдній, давшій 41 пудъ на десятину; въ итогѣ за два сбора получено 107 пуд. 17 фун. на десятину.

# Опыты съ количествомъ растеній въ лункъ (участокъ A).

Табл. 33.

HORE.	Площадь въ квад- ратн. саж.		Ур	ожа	н у:	: Итого				
№ № д'Блянокъ.	цадь въ	Названіе опытовъ.	I ce	бора	II c	бора	III c	бора		
2	Площ ратн.		11.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.
1	243	Съ однимъ растеніемъ въ лункъ	8	31	48	25	40	15	97	31
2	243	» двумя	19	5	63	19	23	33	106	17
3	243	» тремя	35	23	61	39	20	28	118	10
4	243	» четырьмя	33	23	69	25	23	8	126	16

На уч. № 14 были высѣяны три сорта хлопчатника—Кокъ-чигитъ, Кара-чигитъ и Кингъ руками въ гряды туземнаго образца, предварительно политыя (см. рис. 10 и 11), на разстояніи 8 вершковъ лунка отъ пунки; посѣвъ произведенъ 4-го апрѣля; всходы шли туго; пришлось дать еще поливку 11-го апрѣли; 30-го апрѣля произведена прорывка,— оставлялось по 3—4 растенія въ лункѣ, и первое мотыженіе послѣ поливки 26-го—27-го апрѣля. Въ дальнѣйшемъ еще дано три ручныхъ мотыженія и пять поливокъ. 25-го мая замѣчено образованіе бутоновъ; 8-го іюня первое цвѣтеніе сорта Кокъ-чигитъ, 11-го іюня—Кинга и 12-го іюня—Кара, чигитъ; 25-го іюля раскрылись первыя коробочки. Передъ первымъ сборомъ 19-го августа произведенъ былъ подсчетъ

сформированныхъ и открытыхъ коробочекъ на растеніяхъ; на всѣхъ сортахъ въ среднемъ оказались въ суммѣ по 8 приблизительно коробочекъ, изъ нихъ половина открытыя. Наибольшимъ ростомъ 16,5 вершковъ отличались растенія сорта Кингъ и Кара-чигитъ, ниже—15 вершковъ въ среднемъ были растенія сорта Кокъ-чигитъ; обиліемъ боковыхъ вѣтвей отличается Кара-чигитъ—13,5 въ среднемъ на каждое растеніе; за нимъ идутъ Кокъ-чигитъ, имѣющій 12 и Кингъ—11,3 боковыхъ вѣтвей на растеніе. По общей урожайности первымъ идетъ Кингъ и послѣднимъ Кокъ-чигитъ (табл. 34).

Ручной посѣвъ въ сартовскія косыя гряды (джіяки) (на участкъ́ № 14)

m	94
Tабл.	34.

Ъ.	квад-	PAR SHOP NO SHARE	уг	ожа	н у:	Итого.					
дѣлянокъ.	дь въ	Названіе сортовъ.	I c	боръ	оръ II сбо		. III c	боръ	11010.		
Ne.Ne. a	Площадь ратн. са	or or undi-	п.	ф.	и.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	
1	389	Кингъ	40	19	42	7	15	39	98	25	
2	272	Кокъ-чигитъ	44	27	26	23	7	29	78	39	
3	240	Кара-чигитъ	34	10	34	20	12	20	81	10	
		CARRESPORT COMPLEXABLE					14				

Опыты съ чеканкой. Опыты эти поставлены были на машинномъ и ручномъ посѣвѣ хлопчатника на участкѣ А; чеканка произведена въ началѣ цвѣтенія; передъ вторымъ сборомъ—16-го сентября произведенъ былъ обмѣръ очеканенныхъ и контрольныхъ дѣлянокъ (табл. 35). Чеканка на обѣихъ дѣлянкахъ повысила урожай только перваго сбора; чеканенныя дѣлянки дали больше контрольныхъ; но [передъ вторымъ сборомъ по числу открытыхъ и сформированныхъ коробочекъ на растеніяхъ очеканенныя дѣлянки были уже ниже контрольныхъ и дали всѣ слѣдующіе сборы ниже контрольныхъ.

Опыты съ поливками. Опыты съ поливками поставлены были на уч. № 6, вспаханномъ съ осени; весной послѣ внесенія удобреній по разсчету на десятину 70 пуд. хлопковыхъ жмыховъ и 12 пудовъ двойного суперфосфата, участокъ вспаханъ 18 марта, и 28-го марта про-

# Опыты съ чеканкой хлопчатника (на участкъ А).

Табл. 35.

ъ.		квад-		ован-	Среднее на 1 растеніе.						
№№ дѣлинокъ.	Обозначеніе опытовъ.	Площадь въ ратн. саж.	Подсчеть.	Число изслѣдован- ныхъ растеній.	Высота растеній.	Боковыхъ вѣтвей.	Открытыхъ коробочекъ.	Сформиро- ванныхъ коробочекъ.			
	а) Машинный посъвъ.	30 AW									
1	Очеканенная	56	16/ix	60	10,6	7,8	4,8	4,0			
2	Контрольная	34	16/1x	65	21,3	10,6	5,5	5,6			
3	Очеканенная	40	16/ix	69	7,5	7,0	8,3	5,0			
	Контрольная	40	16/1x	48	18,7	10,8	7,7	7,6			

## Продолжение табл. 35.

Ъ.		квад-	ers.	цован-	Урожай на 1 десятину.										
дълявокъ.	Обозначение опытовъ.	Площадь въ ратн. саж.		ers.	T.P.	изследован растеній.	сб	Г	100	I оръ		II opъ	11000	V opъ	Сув
Ne.Ne. 11	RECEIVED AND ACTION OF ACTION OF		Подсчетъ	Число ныхъ р	π.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	
98	responsable to the second seco		1971.63												
	а) Машинный посъвъ.														
1	Очеканенная	56	16/1x	60	11	31	52	20	32	28	12	34	109	33	
2	Контрольная	34	16/1x	65	4	16	54	28	42	15	14	5	115	24	
	б) Ручной посъвъ.				1888										
3	Очеканенная	40	16/1x	69	27	30	79	20	24	30	11	10	143	10	
4	Контрольная	40	16/1x	48	23	10	61	20	39	_	21	_	144	30	
	ios, samony family months months unit members of the														

изведенъ посѣвъ сѣялкою Баннера на глубину 6—7 сантиметровъсортомъ Аунсболъ. Первые всходы появились 11-го апръля и 24-го апръля, послѣ дождей гряды всходовъ обозначились по всему полю (рис. 12). Въ теченіе лѣта посѣвы имѣли 2 ручныхъ мотыженія и цять конныхъ пропашекъ. Поливки протокомъ воды по арыкамъраспредѣлялись такъ: дѣлянкѣ съ 4-мя поливками дана одна поливка до цвѣтенія, двѣ во время цвѣтенія и одна во время созрѣванія. Дѣлянкѣ съ пятью поливками дано: одна поливка до цвѣтенія, три во время цвѣтенія и одна во время цвѣтенія и одна во время созрѣванія; дѣлянкѣ съ 6-ю поливками дано: двѣ поливки до цвѣтенія, три —во время цвѣтенія и одна во время созрѣванія. Наибольшій общіи урожай, какъ видно изъ приводимой ниже таблицы 36, дала дѣлянка съ четырьмя поливками.

### Опыты съ числомъ поливокъ (на участкъ № 6).

Табл. 36.

ъ.	квад-		Ур	II m							
дѣлянокъ.	BT.	Число поливокъ.	I cé	боръ П с		боръ	III d	боръ	Итого.		
№№ дѣля Площадь ратн. сая		II.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.		
							No. 1		(9.23)		
1	50	Четыре поливки	56	16	51	24	24	_	132	_	
2	273	» »	40	26	53	38	21	13	115	37	
3	408	» »	45	6	55	20	12	14	113	-	
4	459	Пять поливокъ	44	20	38	2	8	4	90	26	
5	-500	Шесть »	54	3	49	3	3	38	107	4	
6	123	» »	20	39	21	19	_		42	18	

Двухпольный ствооборотъ. Участокъ В, гдт въ 1909 г. былъ разбитъ двухпольный ствооборотъ, былъ удобренъ съ осени навозомъ; запашка навоза произведена въ январт. Весною, послт одной вспашки и бороньбы, 22-го апртя (см. рис. 8) произведенъ рядовой поствъ сортомъ Кингъ; 26-го апртя пущена была для разбивки корки, образовавшейся послт дождей, французская борона; 1-го мая обозначились всюду ряды всходовъ; 11-го мая, послт работы культиваторомъ, дана была первая поливка; въ дальнт шемъ дано участку

два ручныхъ мотыженія, три конныхъ пропашки и четыре поливки. Наибольшій урожай—140 пуд. на десятину—полученъ съ дѣлянки послѣ кукурузы, однако опредѣленные выводы были бы пока преждевре менны. Результаты затемнены внесеніемъ навознаго удобренія не одинаковаго качества—на середину участка дѣлянки № 3—9 внесенъ быль навозъ болѣе соломистый (табл. 37).

Вліяніе на хлопчатникъ предшествовавшаго растенія (двухпольный съвообороть на участкъ В).

Табл. 37.

ъ.	квад-			Уроз	у:								
№М дѣлянокъ.	Илощадь въ квад- ратн. саж.	Какіе опыты производились.	I có	I сборъ		II сборъ		боръ	VI сборъ		Итого		
Ne Ne	Площадь в рати. саж.		п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	
.07		Хлопокъ высѣвался послѣ:				5 (EU)							
1	160	кукурузы	45	15	51	221/2	43	5	_	_	140	21/2	
2	190	джугары	28	·17	49	4	38	8	_		115	29	
3	190	свеклы	29	2	48	12	32	34	-	_	110	8	
4	190	маша на зеленое удоб- реніе	28	11	48	12	32	21	_	_	109	4	
5	190	маша на зерно	32	15	39	31	25	23	-	_	. 97	29	
6	190	чернаго пара	24	32	36	6	28	17	-	_	89	15	
7	190	кунжута	29	34	42	_	27	6	_	-	99	-	
8	190	чумизы	29	15	42	25	34	4	_		106	4	
9.	190	овса	17	2	43	10	34	.17	_	-	94	29	
10	190	хлопчатника	18	25	42	25	38	34	18	25	118	29	
1.1	190	))	21	13	35	27	38	21	12	38	108	19	

Всего подъ хлопчатникомъ на Андижанскомъ опытномъ полѣ въ текущемъ году занято было около восьми десятинъ; общій сборъ болѣе 815 пуд.; средній урожай около 103 пудовъ на десятину (см. таблицу 21).

Расходы по культурѣ одной десятины хлопчатника достигли въ среднемъ 124 р. 70 коп., не считая стоимости внесенія удобреній и сборовъ (см. таблицу № 38).

Стоимость обработки 1 каз. десятины хлопчатника на Андижанскомъ опытномъ полъ въ 1910 году.

	Стог	имость р	работъ в	ъ рубля	хъ на 1	казенн	ую десят	ину.		
	Руч	ной пос	<b>Бвъ</b> :	Pyu	ยดซึ					
Работы по культурѣ хлопка.	на пр гряд	ямыхъ ахъ.	на сар- тов- скихъ джія- кахъ.	маши пост	нный	Машинный посѣвъ.				
	Уч. № 1.	Уч.№9.	Уч. № 14.	Уч. № 15.	Уч. № А.	Уч. № 12.	Уч. № В.	Уч. № 6.		
I. Подготовка почвы къ посъву: вспашка, бо- роньба, проведеніе грядъ, предпосъвная поливка и вспашка .	45,1	36,83	43,77	19,50	28,87	46,08	26,5	10,72		
II. Посъвъ	16,95	13,47	7,33	7,35	6,26	6,4	5,24	4,3		
III. Уходъ за посъвами: поливки, прорывка, полка, мотыженіе и работы культивато- ромъ	87,42	78,42	106,88	79.3	75,18	79,68	78,64	84,32		
Итого стоимость работъ по культуръ хлопка до сбора	149,47	128,72	160,98	106,15	110,31	132,16	110,38	.99,34		
IV. Сборъ хлопка въ сред- немъ на 1 каз. десят.	30	30	30	30	30	30	30	30		
Итого расходовъ на 1 каз. десят	179,47	158,72	190,98	136,15	140,31	162,16	140,38	129,34		

На участкъ № 4 третьяго поля, въ пятипольномъ съвооборотъ (озимь, хлопокъ, пропашное, хлопокъ, бобовое) высъяна была въ текущемъ году свекла кормовая (рис. 18) и кукуруза.

Свекла кормовая для сравненія урожайности высѣяна была въ шести сортахъ: 1) Арнимъ Кривенская—улучшенная, Эккендорфская желтая 2) Обендорфская, круглая желтая 3) Мамутъ, красная длинная 4) Эккендорфская, цилиндрическая красная, 5) Тріумфъ, исполинская цилиндрическая красная и 6) Эккендорфская желтая. Сѣмена первыхъ двухъ сортовъ выписаны были отъ Мейера изъ Москвы; сѣмена послѣднихъ четырехъ отъ Мейера изъ Кіева. Наиболѣе урожайнымъ сортомъ оказалось свекла Мамутъ красная длипная, высѣянная сѣменами Мейера изъ Кіева давшая урожая 1938 пуд. на десятину; за нею идетъ Арнимъ Кривенская (улучшенная эккендорфская желтая), давшая урожай 1321 пудъ на десятину. Далѣе идетъ Эккендорфская, цилиндрическая красная,

давшая урожая на десятину 1212 пуд. Четвертою по урожайности— 1014 пуд. на десятину—оказалась Тріумфъ-исполинская, цилиндрическая красная, пятою—1004 пуд. на десятину—Эккендорфская желтая п послѣднею—960 пуд. на десятину—Обендорфская круглая желтая. Всъ сорта высѣяны были одновременно 10-го мая, и одновременно 9-го ноября убраны. Участокъ вспаханъ былъ два раза осенью и весною. Послѣ весенней вспашки, 10-го мая, произведенъ ручной посѣвъ свеклы и кукурузы въ прямыя гряды, сдѣланныя окучникомъ; 24 и 25-го мая для лучшей выгонки всходовъ дана была первая поливка всему участку; въ дальнѣйшемъ свекла получила два ручныхъ мотыженія, пять конныхъ пропашекъ культиваторомъ и шесть поливокъ; кукуруза получила: два ручныхъ мотыженія, четыре конныхъ пропашки и семь поливокъ; къ сбору приступлено на сортѣ Чинквактино 16-го октября, Кутаискій гибридъ 3-го октября; собрано зерна Кутаискаго гибрида 116 пуд., Чинквантино 105 пудовъ.

На рисункъ 18 изображенъ снимокъ наиболъе крупныхъ корней свеклы. Наибольшимъ среднимъ въсомъ корней—17½ фунтовъ выдълялась Эккендорфская красная и Маммутъ; 13 фунт. достигли корни Тріумфъ; 12½ фунт. въ среднемъ достигали корни—Арнимъ Кривенской желтой и Обендорфской и 8 фунт.—Эккендорфской желтой.

На уч. № 3 перваго поля пятипольнаго съвооборота высъяна была озимая пшеница банатка и озимый ячмень-кавказкій черный; на пятомъ-машъ на зерно, посъвъ озимой пщеницы и ячменя произведенъ былъ 24 и 25 сентября. Весною, 11 марта, озимь проборонена бороною зигъ-загъ въ одинъ слъдъ; 2-го мая, во время цвътенія полить ячмень, 9-го мая—пшеница; 28-го мая произведена уборка ячменя, 2-го іюня пшеницы; собрано на десятину ячменя—131 пудъ, пшеницы—111 пудовъ. Часть урожая уничтожена была воробьями, не смотря на окарауливаніе пшеницы и ячменя (см. рис. 17). Послъ уборки озимыхъ хлъбовъ поле было полито, вспахано и занято машемъ на зеленое удобреніе. Маисъ на зерно высъянъ былъ на участкъ № 5, каковой вспаханъ былъ разъ съ осени и разъ весною, 21-го мая; посъвъ рядовой – съялкою Баннера, и ручной въ разбросъ, произведенъ былъ 24 и 25-го мая; всходы появились 29-го мая; 7 и 9-го іюля дана была первая поливки; 7-го августа-вторая; 22-го сентября приступлено было къ уборкъ; собрано 45 пуд. на десятину чисто отсортированчаго зерна.

Изъ плодоваго питомника (рис. 19) отпущено было въ текущемъ году разныхъ плодовыхъ саженцевъ на 134 руб. 27 коп. Урюковая и айвовая аллея и виноградникъ сданы были въ аренду за 90 рублей. Съ виноградника, начавшаго плодоносить въ прошломъ году, собрано было въ текущемъ году болъе 60 пудовъ винограда съ 500 плодоносящихъ кустовъ.



Рис. 17. Озимая пшеница Банатка.



Рис. 18. Кормовая свекла.



Рис. 19. Плодовый питомникъ опытнаго поля.

# Асхабадское опытное поле \*

# въ 1910 году.

Отчетъ завъдывающаго полемъ инструктора по хлопководству П. А. Козика.

Съвообороты опытнаго поля — старый пятипольный и новый четырехпольный, введенный съ 1909 года, — оставались въ отчетномъ году безъ измъненія; кромъ того, по примъру прежнихъ лътъ, существовало нъсколько участковъ внъ съвооборота, предназначенныхъ главнымъ образомъ для опытовъ съ хлопчатникомъ.

Опыты, выполненные въ 1910 году, располагались по отдъльнымъ полямъ и участкамъ въ нижеуказанномъ порядкъ и имъли цълью разръшение слъдующихъ вопросовъ:

#### I поле-озимая пшеница.

Способы посвва.

- 1. Машинный рядовой
- 2. " ленточный по кунжуту.
- 3. Разбросной ручной
- 4. Разбросной ручной по зеленому удобренію (машъ).

### II поле-хлопчатникъ.

## А. Вліяніе удобреній.

- 1. Лошадиный навозъ-2400 пудовъ на десятину.
- 2. Овечій навозъ—2400 пудовъ на десятину.
- 3. Контрольная дёлянка.
- 4. Жмыхи хлопковые, по разсчету 40 пуд. на десятину, въ разбросъ.
- 5. Жмыхи хлопковые-20 пудовъ на десятину рядками.
- 6. Жмыхи хлопковые-60 пудовъ на десятину въразбросъ.

<sup>\*)</sup> близъ г. Асхабада, Закаспійской области.

- 7. Суперфосфать двойной—15 пудовъ на десятину въ разбросъ.
- 8. Суперфосфатъ двойной—7½ пудовъ на десятину рядками.
- 9. Суперфосфатъ 7½ пудовъ на десятину—20 пудовъ жмыховъ все вразбросъ.
- 10. Контрольная дёлянка.
- В. Вліяніе числа и времени поливокъ хлопчатника—продолженіе опытовъ 1909 г., но въ болъе разнообразныхъ комбинаціяхъ, при чемъ особенное вниманіе удъляется пяти поливкамъ.

#### III поле-пропашныя.

- 1. Кукуруза «Кутаисскій гибридъ».
- 2. Кормовая тыква (смъсь исполинскихъ сортовъ).
- 3. Подсолнечникъ грызовой (а) пасынкованіеb) контроль.

#### IV поле-хлопчатникъ.

Хлопчатникъ по удобренію (2400 пуд. на десятину лошадинаго навозу).

Вліяніе разстояній между растеніями въ рядахъ при ширинъ междурядій въ 1 аршинъ.

- 1. Разстояніе между растеніями въ ряду—8 вершковъ.
- 2. " 12 вершковъ.
- 3. " " 16 вершковъ.

Вліяніе чеканки.

- 1. Чеканка во время цвътенія.
- 2. Контроль.

#### V поле-бобовыя.

1. Чечевица. 2. Машъ. 3. Фасоль. 4. Нутъ:—а) разбросной посъвъ подъ плугъ съ задълкой на глубину  $2^{1}/_{2}$  вершковъ, b) тоже на глубину—3 вершковъ, c) разбросной посъвъ по пласту.

## Четырехпольный ствооборотъ.

Чередованіемъ растеній, какъ и въ 1909 году: 1) паръ, 2) хлопчатникъ безъ удобренія, 3 и 4—шабдаръ.

## На участкахъ внъ съвооборота.

I. Сравненіе сортовъ хлопчатника въ отношеніи скороспѣлости и урожайности: 1) Кингъ, 2) Аунсболъ, 3) Кокъ-чигитъ, 4) Кара-чигитъ, 5) Малля-чигитъ и 6) Ашмуни.

II. Вліяніе чеканки Кинга въ различные періоды его вегетаціи:
 а) до цвътенія, b) во врямя цвътенія, c) послъ цвътенія и d) контроль.

III. Опыть акклиматизаціи Египетскаго хлопчатника— сорта «Ашмуни»—изъ съмянь опытнаго поля, полученныхъ отъ урожая въ 1909 году.

## Люцерна.

На новомъ участкъ, засъянномъ въ отчетномъ году, испытаніе вліянія нитрагина въ слъдующихъ видахъ:

- 1) Русскій нитрагинъ бактеріолого-агрономической станціи а) на жидкой средъ и b) на твердой средъ.
  - 2) Никтробактеринъ профессора Ботомлея.
  - 3) Американскій нитрагинъ д-ра Мооръ.

## Метеорологическія условія.

По сравненію съ предшествовавшимъ, отчетный годъ нужно въ общемъ признать болъе сухимъ и холоднымъ, хотя абсолютные тахітит в какъ въ воздухь, такъ и на поверхности земли въ отдъльныхъ случаяхъ были выше. Средняя годовая температура воздуха въ 1910 году была 16,7°С, тогда какъ въ 1909 году она равнялась 17,5°С; сумма осадковъ, выпавшихъ съ января по декабрь включительно по новому стилю, 150,8 mil., т. е. на 36,2 mil. меньше прошлогодняго. Наибольшій абсолютный тахітит въ возоухь, наблюдавшійся въ отчетномъ году, былъ 44,3°С 18-го н. с. (въ 1909 году 37,5°С-17/IX н. с.), наибольшій абсолютный minimum—15,6°С — 29-го ноября н. с. (въ 1909 году—12,3°С.2/І н. с.). На поверхности наибольшій абсолютный maximum наблюдался въ іюль и достигь 58,5°C, однако средняя мъсячная температура поверхности въ іюль была 36,7°С, тогда какъ въ 1909 году 38,6°С. Съ дождемъ въ отчетномъ году наблюдалось 37 дней и со снъгомъ 11, а въ 1909 году съ дождемъ 52 и со снъгомъ 14. Ясныхъ дней отмъчено въ теченіе года 147 (въ 1909 г. 114) и пасмурныхъ 74 (въ 1909 г. 82).

Распредъление важнъйшихъ метеорологическихъ элементовъ по отдъльнымъ мъсяцамъ было слъдующимъ.

Январь оказался сравнительно теплымъ, средняя мъсячная температура въ воздухъ была 4,5°С, абсолютный maximum 19,5°С и абсолютный minimum—11,9°С; средняя мъсячная температура поверхности земли 5,4°С, при чемъ maximum поднимался до 24,5°С; со снътомъ въ теченіе января наблюдалось три дня, осадковъ въ общей сложности выпало 17,4 mil. Къ концу января настолько установилась теплая погода, что 30-го числа (по старому стилю) зацвъли миндаль и карагачъ и тогда же на цвътущихъ деревьяхъ появились первыя пчелы.

Февраль имълъ среднюю мъсячную температуру воздуха 6,0°С, абсол. тах. 13,9°С и абсол. тіп.—2,1°. Почти ежедневно наблюдались утренники, которые пріостановили начавшееся въ январъ цвътеніе миндаля и повредили раскрывшіеся бутоны. Средняя мъсячная темп. поверхности земли была 8,4°С и тахітит 24,5°; съ дождемъ наблюдалось 5 дней и со снъгомъ 1 день; осадковъ въ общей сложности вынало 16,0 mm.

Въ мартъ средняя мъсячная температура воздуха поднялась до 9,1°С при тах. 25,1°С; 2-го марта наблюдался послъдній и въ то же время самый сильный утренникъ—6,4°С, погубившій всъ образовавшіяся на миндалъ бутоны, вслъдствіе чего урожай миндаля въ отчетномъ году былъ ничтожный.

Средняя мѣс. темп. поверхности земли поднялась до 11,5°С при тах. 36,5°С. Съ дождемъ было 7 дней, снѣгомъ 2 дня и градомъ 2 дня. По количеству выпавшихъ осадковъ—55,6 mm. — мартъ занимаетъ первое мѣсто.

Въ апрълъ осадки были не значительны всего 9,7 mm., выпавшихъ въ теченіе 6 дней, при чемъ наибольшее количество осадковъ было 1-го числа—1,7 mm. Средняя мъсячная температура воздуха—17,1°С, и на поверхности земли 21,5°С. Къ посъву хлопчатника уже вполнъ возможно было приступить съ 1/14 апръля; однако, въ виду значительной влажности почвы и пасмурной погоды (въ апрълъ наблюдалось 9 пасмурныхъ дней и только 5 ясныхъ), появленіе всходовъ было задержано: съмена хлопчатника, намоченныя въ водъ въ теченіе ½ сутокъ, проростали только на 10-ый или 11-ый день послъ посъва. Перепадавшіе незначительные дожди образовали тонкую корку, которая не представляла большой опасности для всходовъ, развивавшихся въ дальнъйшемъ нормально.

Май по количеству осадковъ—34,2 mm.—заняль второе мѣсто; вмѣстѣ съ мартомъ онъ далъ въ общей сложности 89,8 mil., т. е. болѣе половины годового количества осадковъ. Майскіе дожди, являясь въ отдѣльности довольно значительными, благодаря жаркой погодѣ (средняя мѣсячная температура воздуха 24,5°С) и частымъ вѣтрамъ, быстро образовывали—твердую корку, которую приходилось разрыхлять культиваторами.

Въ іюпъ было только два дня съ дождемъ, давшихъ въ общей сложности 8,0 mm. Средняя мъсячная температура воздуха=28,0°С, абсол. maxim. 38,9 и minimum 11,9°С; средняя мъсячная темп. поверхности земли=33,3°С и maximum 58,0°С; въ теченіе іюня наблюдалось 15 ясныхъ дней и частые вътры, между которыми преобладалъ N и NW; со второй половины мъсяца (по новому стилю) начались гармсили, принесшіе значительный вредъ тъмъ полямъ хлопчатника, которыя не были своевременно политы.

Въ і ю л в былъ только одинъ день съ маленькимъ дождемъ въ 1,0 mm.; ясныхъ дней наблюдалось 22, пасмурные совершенно отсутствовали; средняя температура воздуха достигла 32,1°C, а maximum поднимался до 44,3°C; средняя температура поверхности земли 36,7°C и maximum 58,5°C. Преобладающими вътрами были W и NW, которые однако значительной силой не отличались.

Въ августъ осадки совершенно отсутствовали; съ сильнымъ вътромъ наблюдалось три дня, ясныхъ дней отмъчено 25 и пасмурныхъ 2; средняя t<sup>0</sup> въ воздухъ=29,2°C, maximum 37,0°, на поверхности средняя=33,9°C и maximum 58,0°C.

Въ сентябрѣбыль только одинъ день съ дождемъ—28-го числа, давшимъ 2,7 mm.; дождь оказался неблагопріятнымъ въ томъ отношеніи, что сильно загрязнилъ хлопокъ, пропыленный предшествовавшими сильными вѣтрами. Средняя мѣсячная температура воздуха упала до 23,4°, тахітит поднимался до 36,8°С и тіпітит опускался до 10,0°С; средняя мѣсячная температура пов. земли—29,7°С, тахітит 55,5°С.

15-го октября н. с. наблюдался первый осенній утренникъ —1,9°С, повредившій часть второго и третій сборъ хлопка. Температура воздуха колебалась оть—1,9 до 29,1°С, средняя мѣсячная—16,5°С, средняя на поверхности земли—19,4 и maximum—43,9. Осадки почти отсутствовали, быль только одинъ день съ дождемъ 27-го октября н. с., давшій 0,7 mm. Бездождіе само по себъ для качества волокна было благопріятно, однако частые и сильные вътры съ песчаной пылью, (2 сильныхъ) весьма неблагопріятно повліяли на качество волокна второго и третьяго сбора, оказавшагося значительно пропитанными, пылью.

Первая половина ноября простояла теплой, и всѣ озимые посѣвы чуствовали себя прекрасно вплоть до 29-го ноября н. с., когда неожиданно налетѣвшимъ циклономъ, сопровождавшимся паденіемъ температуры до—15,6°С, всходы озимыхъ были почти совершенно уничтожены; циклонъ, кромѣ того, причинилъ немало бѣдствій на Каспійскомъ морѣ и, поднявъ въ воздухъ цѣлыя массы песку, засыпалъ имъ поѣзда Ср-Аз. ж. д., бывшіе въ то время въ дорогѣ. Въ ноябрѣ было два дня съ осадками, которые въ общей сложности дали 1,0 mm. Средняя температура воздуха—9,7°С и на поверхности земли—10,9.

Въ декабръ при четырехъ дняхъ со снътомъ и четырехъ съ дождемъ выпало. осадковъ всего 4,5 mm. Средняя темп. воздуха и на поверхности земли=0,3°С; абсолютный maximum t воздуха=13,5°С и minimum=11,1°С. Ноябрь и декабрь отличались наименьшимъ числомъ вътровъ, между которыми преобладали NE и N, тогда какъ во всъ остальные мъсяцы господствовалъ NW.

Такимъ образомъ, какъ видно изъ вышеизложеннаго краткаго обзора метеорологическихъ условій, 1910-й годъ въ сельскохозяйствен-

номъ отношеній оказался не вполнъ благопріятнымъ, и только небывало высокія цъны на хлопокъ—сырецъ, поднявшіяся осенью до 4 р. 50 к. пудъ, отчасти вознаградили земледъльцевъ.

Опыты съ мъстной озимой пшеницей. Предпосъвная поливка подъ штеницу производилась съ 1-го по 3 октября 1909 года. 7-го и 8-го октября поле было вспахано 7" плугомъ Сакка на глубину 3½—4 вершковъ, а 9-го октября произведенъ посъвъ.

Въ отчетномъ году быль поставленъ опытъ со слъдующими сиссобами посъва: 1) рядовой машинный, 2) ленточный машинный и 3) разбросной ручной, а также испытывалось вліяніе зеленаго удобренія на урожай зерна и соломы.

Дълянки, предназначенныя для машиннаго посъва, послъ вспашки были предварительно проборонованы въ два слъда; на дълянкахъ же съ разброснымъ посъвомъ—послъдній производился по пласту, послъ чего слъдовало боронованіе тоже въ два слъда бороною "зигъ-загъ". Количество зерна на десятину при рядовомъ машинномъ разбросномъ ручномъ способъ равнялось 5 пуд.; для ленточнаго посъва высъвной аппаратъ съялки былъ оставленъ въ такомъ же положеніи, какъ и для сплошного рядового, при чемъ количество высъяннаго зерна при разсчетъ на десятину, оказалось равнымъ 3½ пудамъ. Для рядового посъва разстояніе между рядами было оставленно по 2½ вер.; при ленточномъ посъвъ "въ лентъ" помъщалось по 2 ряда на разстояніи 2½ вершка одинъ отъ другого, а лента отъ ленты раздълялась междурядіями въ 5 вершковъ ширины, которыя впослъдствіи рыхлились ручными культиваторами; такимъ образомъ, здъсь засъянная площадь была вдвое меньше не засъянной.

Появленіе всходовъ наступившими утренниками было задержано и отмъчено только 21 октября. Послъдовавшіе затьмъ сильные холодные вътры оказались также неблагопріятными для произрастанія озими; съмена мъстами выдувались изъ пашни въ особенности на машинномъ посъвъ, вслъдствіе мелкой задълки. Кромъ того, налетъвшія стан галокъ, сильно нападали на озимь, выклевывая не взошедшія и только-что взошедшія зерна, при чемъ особенно зам'єтно пострадали машинные рядовыя поствы, представляющіе, благодаря правильности расположенія высъянныхъ съмянъ, большое удобство для разрушительной работы этихъ въ высшей степени осторожныхъ и хитрыхъ враговъ. Между прочимъ, вредъ, причиняемый птицами, усиливается здъсь еще тъмъ обстоятельствомъ, что посъвы опытнаго поля, будучи расположены вблизи жилья (съ одной стороны аулъ Кеши, а съ другойшкола садоводства) и находясь съ растояніи 4—5 верстъ отъ озимыхъ полей туркменъ, являются почти единственнымъ оазисомъ, на которомъ сосредоточиваютъ свое вниманіе галки и вороны осенью, а воробьи весною; для защиты отъ этихъ хищниковъ приходится нанимать особаго караульщика, что, понятно, вызываеть излишніе расходы.

Табл. 1.

Выводы изъ наблюденій Асхабадской метеорологической станціп за 1910 годъ.

diosolps	Баромет. при 0°.	T	емпера	тура	воздух	a.	Абсолют- ная влаж- ность.	тел	оси- ьпая ность.	Облач-	0 (	садк	и	Температура на поверхности земли.	
м ъсяцы.	Среднее.	Средняя.	Махітит абсолютная.	Число.	Мінітит абсолютная.	queno.	Средняя.	Средняя.	Minimum.	Средняя.	Сумма.	Maximum.	Число.	Средняя.	Maximum.
Aliane and a second						144		4	11				16	70	31
Январь	755,1	4,5	19,5	7	-11,9	15	4,4	72	24	4,7	17,4	8,3	12 .	5,4	24,5
Февраль	754,7	6,0	13,9	13	- 2,1	8	5,1	74	31	7,3	16,0	7,0	23	8,4	24,5
Мартъ	754,7	9,1	25,1	23	. 6,4	2	5,3	63	23	5,3	55,6	24,0	13	11,5	36,5
Апръль	754,7	17,1	33,0	11	3,9	6	6,8	48	-16	5,4	9,7	1,7	1	21,5	47,6
Май	746,3	24,5	37,2	20	12,4	13	9,8	45	12	5,7	34,2	13,4	1	28,9	55,5
Іюнь	742,6	28,0	38,9	11	11,9	25	10,4	40	14	2,7	8,0	6,0	8	33,3	58,0
Іюль	742,8	32,1	44,3	18	25,4	-6	11,2	33	12	1,4	1,0	1,0	25	36,7	58,5
Августъ	745,9	29,2	42,9	16	16,6	20	10,0	34	11	1,4	_		_	33,9	58,0
Сентябрь	752,2	23,4	36,8	20	10,0	10	7,7	37	14	1,2	2,7	2,7	28	28,7	.55,5
Октябрь	756,4	16,5	29,1	21	- 1,9	15	6,4	47	15	2,8	0,7	0,7	. 27	19,4	43,9
Ноябрь	759,6	9,7	27,3	3	-15,6	29	5,3	58	17	3,0	1,0	1,0	29	10,9	30,5
Декабрь	757,0	0,3	13,5	5	-11,1	10	11,3	81	25	5,0	4,5	2,0	13	0,3	16,0
Сумма		200,4			-	15	93,7	632	-	45,9	150,8	67,8	-p	238,9	-
Среднее	751,8	16,7	646	EX.	H S (1)	10 J (	7,8	53	0002	3,8	12,5	5,6	11 33	19,9	,021 p=
														Tass.	5

167 —

Табл. 2. Выводы изъ метеорологическихъ наблюденій Асхабадской станціи за 1910 годъ.

		Т	a	б	Л	и	ц	a	В	Ť	Т	p	0	В	ъ.		
м всяцы.		S	ssw		SW		wsw		W		WNW		NW		NNW		•
Headens E. S.	Число.	Сила.	Число.	Сила.	Число.	Сила.	Число.	Сила.	число.	Сила.	Число.	Сила.	Число.	Сила.	число.	Сила.	Тих
Agranta Casatatona																	
Январь	3	4	1	2	3	6	-	_	9	9	-	-	15	18	7	13	34
Февраль	1	1	-	_	1	1	-	-	2	2	3	- 6	14	15	9	18	30
Мартъ	1	1	2	2	3	4	2	2	1	1	3	5	13	22	6	15	38
Апръль	1	1	3	7	4	7	5	5	3	4	_	-	14	15	5	10	29
Май	3	4		-	6	10	5	7	3	6	2	5	11	12	4	7	32
Іюнь	_	_	_	_	1	2	_	_	6	14	3	10	16	41	10	26	27
Іюль	-		1	2	5	8	_	_	16	34	2	6	20	50	_	-	23
Августъ	4	4	2	3	3	5	3	12	12	30	4	12	15	52	1	2	25
Сентябрь	1	1	_		1	1	_	_	7	9	3	4	15	24	7	17	35
Октябрь	2	2	_	_	_	_	1	2	2	3	_	_	18	23	1	1	38
Ноябрь	1	1	_	_	3	6	3	5	2	2		_	6	6	_		51
Декабрь	. 1	1	Distriction of	_	3	4		_	5	5		_	4	9	2	4	54
За годъ	18	20	9	16	33	54	19	33	68	119	20	48	161	287	52	113	416

Выводы изъ метеорологическихъ наблюденій Асхабадской станціи за 1910 годъ.

		Т	a	б	JI	и	Ц	a	В	ďs	Т	р	0	В	ъ.	
м ъсяцы.	N		N.	NE	N	Έ	E	NE	- 1	Е .	Е	SE	s	SE .	· S	SE
	Число.	Сила.	Число.	Сила.	Число.	Сила.	Число.	Сила.	Число.	Сила.	число.	Сила	Число.	Сила.	Число.	Сила.
Январь	9	10	1 -	-	3	3	-	-	1	1	-	-	5	6	-	-
Февраль	8	9	1	2	4	4	-	-	1	1	1	1	3	3	1	3
Мартъ	6 -	8	3	4	_		1	1	2	2	4	10	5	8	1	5
Апръль	8	12		<b>-</b>	4	4	3	6	1	3	-	_	5	5	3	6
Май	5	9	2	4	2	12	2	3	_	_	-	-	4	6	-	_
lюнь	11 .	14	_	1. The second	5	9	1	2,	3	13	1	2	5	14	-6	_
Іюль	3	5	1	2	11	32	1	2	4	10	-	_	2 -	3	_	_
Августъ	3	5	_	-	5	11	1	2	8	26	_	_	2	5	_	_
Сентябрь	7	7	_		3	4	-		2	4		_	5	12		_
Октябрь	5	7	1	2	3	4	2	4	2	3		_	8	15	-	-
Ноябрь	5	6	1	2	9	12	1	1	2	2	_	_	5	10	-	_
Декабрь	6	6	-	-	_	-		-	3	3	-	_	4	6	-	-
За годъ	76	98	9	16	49	95	12	21	29	68	6	13	53	93	5	14

Выводы изъ метеорологическихъ наблюдении Асхабадской станции за 1910 годъ.

a a . a . q	T.	Ч	И	e c	Л	0	Д	В н	e	й	c	ъ	racij.
мъсяцы.	Осадками.	Сивгомъ.	Градомъ.	Крупой.	Туманомъ.	Грозою.	Сальнымъ вътромъ.	Росою.	Инеемъ.	Яснымъ не- бомъ.	Пасмурнымъ небомъ.	Температура max. ≪ 0°.	Температура min. ≤ 0°.
Январь		3			14	_	1	1	5	9.	6	5	15
Февраль	5	. 1		_ ~	22	_	_	1 2	6	2	16	663	12
Мартъ	1 7	2	2		11	_	- 4	5	3	8	12	_	1 D.D.
в Апръль	6	_		_	21	_	3		1 - 9	- 5	9 .	49	Maj
— Май —	9			_	10	5	9	8	- 4	2	8	,	nelli
Іюнь:	. 1 2	11.	- 0		2		-3	_	1 _ 1	15	. 3		m <u>s</u> i
Іюль	1	81 <u>-</u>	_ =	ī	_ :	1.1	_	1		22	_	,	mail
Августъ		J10	_			1	3			25	2 .	63	grad.
Сентябрь	1	_	_		4	<u>-</u>	4	2.	0 = <u> </u>	23	_	1,1	' فسرو
Октябрь	1	(•		_	16		2	1	ā 3	12	. 3 .	46	303 <u>2</u> 0
Ноябрь	1	1		_ :	19	<u>a</u> 1	2	2	1 1	15	6	4	4
— Декабрь	4	4	· —	1	19	-	<u>-</u>	1	14	9	9 .	6 .	29
м за годъ. Al.	37	111	2	1	138	6	31	13	28.	147	- 74× °	= 15	70

Осень 1909 года была бѣдна осадками и отличалась частыми сухими вѣтрами, которые быстро вытянули изъ верхнихъ слоевъ почвы влагу и такимъ образомъ пріостановили проростаніе сѣмянъ и появленіе всходовъ; поэтому 4-го ноября, въ силу необходимости, пришлось дать озими поливку для укрѣпленія сѣмянъ въ землѣ и ускоренія ихъ проростанія. Хотя въ дальнѣйшемъ погода стояла благопріятная, однако кущеніе озими шло очень туго, т. к. этому препятствовала уплотнившаяся послѣ поливки поверхность почвы; съ наступленіемъ теплыхъ весеннихъ дней съ перыхъ чиселъ февраля озимь стала куститься дружнѣе, и 8-го марта уже необходимо было дать первую весенюю поливку; 2-го апрѣля началось колошеніе, и въ то же время была дана вторая поливка. 1-го мая пшеница вступила въ въ стадію молочной спѣлости и была полита третій разъ. 20-го мая приступлено къ уборкѣ, которая 21-го мая была закончена на всѣхъ участкахъ. Результаты урожая получились нижеслѣдующіе:

№№ Способы чосьн цъля- нокъ пшениц	а озимой ы.	Пло- щадь кв. саж.	Зерн			омы. ф.	Зер	она.	Сол	омы.	Отнош. зерна къ соломъ.
1. Рядовой посъвъ	.disc	200.	3 2	7	5	2	44				1:1,37.
2. Ленточный »	n n	200.	3	9	5	18	38	28	65	16	1:1,68.
3. Разбросной »	,» »	200.	2 3	8	4	4	35	16	49	8	1:1,38.
4. Разбросной по зе	еленому удо- бренію	346.	10 2	6	20	2	75	35	139	3	1:1,88.

Наибольшій урожай дала дѣлянка № 4 по зеленому удобренію.

удобренія на озимомъ полѣ явилось здѣсь чисто случайнымъ, т. к. въ предшествовавшемъ 1909 году часть 5-го поля, занятую машемъ, пришлось вслѣдствіе необходимости перепахать, использовавъ его какъ зеленое удобреніе (см. отчетъ 1909 г.). Болѣе цѣлесообразнымъ явилось бы примѣненіе зеленаго удобренія подъ хлопчатникъ, слѣдующій за озимью, однако введеніе этого существеннаго улучшенія пятипольнаго сѣвооборота останется благимъ пожеланіемъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ увеличено количество воды для надобностей опытнаго поля. Что касается урожая дѣлянокъ № 1, 2 и 3, то онъ во всѣхъ трехъ случаяхъ получился ниже среднихъ урожаевъ опытнаго поля за прежніе годы, что слѣдуетъ приписать неблагопріятной осени, о чемъ уже говорилось выше, а также вліянію предшествующаго растенія—кунжута,—какъ извѣстно, сильно истощающаго почву;

лучшіе результаты даль рядовой посёвь, хуже оказался ленточный и еще хуже разбросной; при этомъ ленточный способъ при сравненіи съ разброснымъ далъ лишь незначительное увеличение урожая (3 п. 12 ф. зерна на десятину), котораго даже не хватить для покрытія расходовъ по производству рыхленія междурядій (дійствительная стоимость двукратнаго рыхленія ручнымъ култиваторомъ на участкъ въ 200 кв. саж. = 50 к., что составить 6 руб. на десятину). Плохой урожай при ленточномъ посъвъ можно еще отчасти объяснить тъмъ, что въ данномъ случав отношение засвянной площади къ незасвянной=1:2 (ширина ленты 21/2 вершка, а полосы, обрабатываемой культиваторомъ, — 5 вершковъ). Между тъмъ, въ 1909 году при одинако, вой ширинъ лентъ и раздъльныхъ полосъ (по 30 сантиметровъ), ленточный посъвъ по сравненію съ разброснымъ (тоже по кунжуту, какъ и въ отчетномъ году) далъ зерна на десятину на 25 пудовъ больше. Опыты со способами поства озими (ведутся на Асхабадскомъ опытномъ полъ съ 1908 года) все время давали противоръчивые результаты, поэтому нуждаются въ дальнъйшей тщательной провъркъ; въ частности ленточный способъ, помимо опредъленія числа рядовъ въ лентъ, требуетъ выясненія наиболье выгоднаго соотнощенія ширины ленть и разд'яльных полось, обрабатываемых культиваторомъ, при чемъ ширина тъхъ и другихъ должна измъняться въ зависимость отъ того, будеть ли вестись обработка ручнымъ или коннымъ культиваторомъ. Кромъ того, принимая во вниманіе, что рыхленіе вообще играеть существенную роль въ дълъ сохраненія почвенной влаги, быть можеть удастся путемъ постановки соотвътствующихъ опытовъ создать такой типъ сплошного рядового посъва, при которомъ возможно будетъ хотя бы однократное сплошное рыхленіе ручнымъ культиваторомъ. Разръшеніе поименованныхъ вопросовъ и составить ближайшую задачу Асхабадскаго опытнаго поля въ отношеніи озимой пшеницы.

**Опыты съ пропашными**. Въ отчетномъ году испытывались слѣдующія растенія: подсолнечникъ грызовой, кукуруза "Кутаисскій гибридъ" и кормовая тыква.

Предпосъвная поливка была начата 28-го марта и 30-го закончилась. Къ вспашкъ приступлено 2-го апръля.

Подсолнечникъ посъянъ 2-го апръля рядовой съялкой Гельферихъ Саде, на аршинномъ разстояніи рядъ отъ ряда, при чемъ на дълянку въ 400 кв. саж. высъяно 5 фунт. сухихъ съмянъ, что составляетъ 30 ф. на десятину. Всходы появились 12-го апръля, 24-го апръля произведена прорывка съ оставленіемъ 12 вершк. разстоянія между отдъльными растеніями. 14-го мая сдълано окучиваніе санками; цвътеніе началось 1-го іюня, а 20-го іюня уже можно было приступить къ пасынкованію. За все время вегетаціи подсолнечникъ получиль 7-мь ноливокъ въ слъдующіе сроки: 6 мая, 3, 11, 17 23 и

30-го іюня и 16 іюля; при этомъ наибольшую потребность въ водъ онъ испытывалъ въ іюнъ мъсяцъ, въ періодъ гармсилей, когда его приходилось поливать еженедъльно. Уборка начата 4-го августа; шляпки, послъ предварительной просушки, были обмолочены ручнымъ способомъ. Результаты урожая получились слъдующіе: дълянка съ пасынкованіемъ въ 200 кв. с. дала 3 п. 35 фунт. съмянъ, что составитъ 46 пуд. 20 ф. на десятину. Съ контрольной дълянки въ 200 кв. саж. получилось 3 пуд. 14 ф. съмянъ, или 40 п. 8 ф. на десятину. Съмена подсолнечника, какъ лакомство, находятъ довольно хорошій сбыть на мъстномъ рынкъ и расцъниваются по 1 р. 80 к.— 2 руб. пудъ. Корни и стебли употребляются на топливо; кромъ того, стебли, достигающіе здъсъ 3-4 арш. длины, прекрасно исполняють роль вышекъ при разбивкъ участковъ опытнаго поля на дълянки.

Кукуруза «Кутаисскій гибридъ» высвяна одновременно съ подсолнечникомъ 2-го апръля; въ цъляхъ примъненія дальнъйшей конной обработки и лучшаго использованія площади, разстояніе между рядами было дано ¾ арш.; посъвъ сдъланъ рядовой съялкой Гельферихъ-Саде-«Крестьянка»; на дълянку въ 400 кв. саж. вышло 15 фунт. сухихъ съмянъ, что составляетъ на десятину 2 пуд. 10 фунтовъ. Всходы появились 12 апръля. Прорывка, съ оставленіемъ 10 вершковъ между отдъльными растеніями въ ряду, произведена 24 апръля. Дальнъйшій уходъ состояль въ троекратномъ рыхленіи междурядій «планетомъ» послъ первыхъ трехъ поливокъ. За время вегетаціи кукуруза получила всего пять поливокъ: 6 мая, 9 и 23 іюня и 15-го и 30 іюля. Уборка произведена 9-го августа; початки, предварительно просушенные, были затъмъ обмолочены спеціальной кукурузной молотилкой. Съ участка въ 400 кв. саж. получилось 9 п. 32 ф. зерна, что соотвътствуетъ 56 пуд. 12 фунт. на десятину. Урожай, въ особенности для «Кутаисскаго гибрида», нужно признать весьма низкимъ; при этомъ необходимо замътить, что многіе початки получились неполными, на нъкоторыхъ было всего лишь по нъсколько зерень; это явленіе возможно отчасти объяснить дъйствіемъ гармсилей, которые неръдко обжигають женскія и мужскія соцвътія прежде, чъмъ произойдеть опыленіе. Сухіе стебли кукурузы находять примънение въ хозяйствъ опытнаго поля отчасти какъ кормъ для овець, частью же идуть на топливо и подстилку. На мъстномъ рынкъ кукуруза спросомъ не пользуется и туркменами почти не воздълывается. Поэтому въ дальнъйшемъ, по всей въроятности, придется отказаться отъ введенія кукурузы въ съвообороть поля, замънивъ ее болъе подходящимъ къ мъстнымъ потребностямъ растеніемъ.

Тыква кормовая (смѣсь исполинскихъ сортовъ) посѣяна предварительно намоченными сѣменами 2 апрѣля; посѣвъ сдѣланъ при помощи сапокъ, ручной, гнѣздовой, въ шахматномъ порядкѣ, на разстояніи 3 аршинъ гнѣздо отъ гнѣзда и рядъ отъ ряда.

Всходы показались 8-го апрѣля и послѣ появленія перваго настоящаго листа были прорѣжены съ оставленіемъ 3—4 лучшихъ экземняяровъ въ гнѣздѣ; одновременно съ прорѣживаніемъ сдѣлано легкое окучиваніе (до сѣмядолей). Цвѣтеніе началось въ первой половинѣ мая, а къ началу іюня нѣкоторые плоды достигали 2 фунтовъ. За время вегетаціи тыква получила одно рыхленіе Коннымъ «Планетомъ», три ручныхъ мотыженія и восемь поливокъ, произведенныхъ въ слѣдующіе сроки: 6 мая, 3, 9, 26 и 30 іюня, 13 и 30 іюля и 10 августа. Къ уборкѣ было приступлено 1-го сентября, при чемъ съ дѣлянки въ 240 кв. саж. получилось—65 пуд., или по разсчету на десятину—650 пудовъ—урожай почти вдвое меньше прошлогодняго. Въ отчетномъ году тыква сильно была поражена «Заразихой», сѣмена которой, по всей вѣроятности, заносятся вмѣстѣ съ поливной водой, кромѣ того, страдала отъ ожога, переходившаго затѣмъ въ гниль; листья въ значительной степени были поражены «мучной росой».

**Опыты съ бобовыми**—на 5-мъ полъ—чечевица бухарская, машъ, фасоль коловая и нутъ.

Вспашка, боронованіе и посъвъ начались 17-го и были закончены 19-го марта.

Посъвъ чечевицы и маша сдъланъ рядовой съялкой «Крестьянкой» съ соблюденіемъ 4-хъ вершковаго разстоянія между рядами для чечевицы и 6-ти вершковаго для маша; чечевицы высъяно по разсчету на десятину  $1^1/_2$  пуда, маша—столько же; съмена чечевицы были предварительно намочены въ теченіе 12 часовъ, а маисъ высъянъ сухими съменами.

Фасоль и нутъ пришлесь съять руками, т. к. высъвной аппарать съядки крупныхъ плоскихъ съмянъ фасоли совершенно не захватываль, а съмена нута, имъющія своеобразную, неправильную форму, сильно дробились вращающимися шестернями. Посъвъ фасоли сдъланъ гнъздовой на разстояніи <sup>3</sup>/<sub>4</sub> арш. между рядами и ½ арш. между гнъздами; въ каждое гнъздо положено было по 2-3 штуки съмянъ, которыя предварительно намачивались въ теченіе 12 часовъ. На дълянку въ 360 кв. саж. вышло 10 фунтовъ съмянъ. Передъ посъвомъ нуть также быль намочень, но въ виду того, что съмена нута быстро набухають, ихъ достаточно было продержать въ водъ только шесть часовъ. На дълянкъ а)-въ 240 кв. саж. былъ сдъланъ разбросной посъвъ нута подъ плугъ, съ задълкой на глубину 2½ вершковъ; на дълянкъ в)—въ 256 кв. саж. —такой-же посъвъ съ задълкой на 3 вершка и дълянка с)-въ 400 кв. саж.-предварительно была вспахана на глубину 4-хъ вершковъ, послъ чего посъвъ произведенъ по пласту, съ двукратнымъ боронованіемъ.

На всѣхъ дѣлянкахъ посѣвъ былъ сдѣланъ по возможности одинаковой густоты, при чемъ на общую площадь въ 896 кв. саж. израсходовано  $\Gamma^{1}/_{2}$  пуда сѣмянъ. 30-го марта вода, прорвавшаяся

цочью изъ сосъдней ръчки Кешинки, затопила двъ дълянки а и в, занятыя нутомъ; это обстоятельство въ дальнъйшемъ чрезвычайно неблагопріятно отразилось на развитіи нута, и поэтому ниже приводятся данныя только по отношенію къ одной ділянкі с, находившейся въ нормальныхъ условіяхъ. 30-го марта показались дружные, равномърные всходы чечевицы, а на слъдующій день маша, въ то же время сталъ кое гдъ появляться и нутъ; фасоль взощла 2-го апръля. 22-го апръля сдълано первое рыхленіе сапками маша и чечевицы, сопровождавшееся уничтоженіемъ сорныхъ травъ и проръживаніемъ въ тъхъ мъстахъ, гдъ это было необходимо; при этомъ, для маша соблюдалось разстояніе 6 верш. въ ряду и для чечевицы 4 вершка; дальнъйшій уходъ состояль въ поливкахъ. Фасоль получила два рыхленія коннымъ культиваторомъ; уходъ за нутомъ, посъяннымъ въ разбросъ, состоялъ въ уничтоженіи сорныхъ травъ и поливкахъ. Цвътеніе нута началось 1-го мая, машъ и чечевица зацвъли 5-го, а фасоль 6-го мая. Наиболъе чувствительными къ жаръ и требовательными къ водъ оказались фасоль и чечевица; фасоль пришлось полить четыре раза:  $^{23}$ /гу,  $^{8}$ /у,  $^{20}$ /у и  $^{2}$ /уг, чечевицу три раза:  $^{8}$ /у, 20/у и 8/ул.

Іюньскіе гармсили окончательно убили и фасоль и чечевицу; нуть и машь прекрасно себя чувствовали и при двухъ поливкахъ: машъ былъ первый разъ политъ 22 мая, т. е. 65 дней спустя послъ посъва и во второй разъ 8-го іюня; нуть первую поливку получиль 8-го мая, т. е.—50 дней спустя послъ посъва и вторую 2-го іюня. Машъ далъ прекрасную, густую листву, и въ этомъ отношеніи не оставляль желать ничего лучшаго; цвътеніе его, однако, было очень слабо, а созрѣваніе неравномърно: въ то время, когда одни стручки созрѣвъ, подъ вліяніемъ жары лопались, другіе - оставались зелеными, и поэтому положительно не было возможности уловить подходящій моменть для уборки урожая. Къ тому же воробьи и розовые скворцы, прилетающіе сюда во время созр'вванія шелковицы, охотно пос'вщали машъ и выклевывали не созрѣвшія, мягкія зерна. Лучше всего во всъхъ отношеніяхъ чувствовалъ себя нутъ: бользней на немъ не наблюдалось, равнымъ образомъ не подвергался онъ нападенію птицъ. Къ уборкъ урожая бобовыхъ приступлено было 1-го іюля; при этомъ чечевица, машъ и фасоль дали настолько плохіе результаты, что едва удалось собрать высвянныя свмена; въ то же время какъ нутъ даль урожай «самъ восемь».

	Площадь кв. саж.	Урожай.	На деситину.
Чечевица	240	$14\frac{1}{2}$ $\phi$ .	3 п. 25 ф.
Машъ	240	11½ »	2 п. 35 »
Фасоль	360	15½ »	2 п. 23 »
Нутъ	400	5 п. 05 »	30-п. 30 »

Какъ видно изъ этой таблицы, данныя, полученныя въ отчетномъ году, говорять противъ чечевицы и фасоли, какъ растеній требующихъ многократныхъ поливокъ и весьма чувствительныхъ къ дъйствію гармсилей; фасоль, и въ особенности коловая, кром'в того требуеть хлопотливаго и дорого стоющаго ухода. Что касается маша, то въ теченіе ряда лъть замъчается прекрасное развитіе его вегетативныхъ органовъ и очень непостоянные урожаи зерна, колеблющіеся отъ 2 п. 35 ф. (въ 1910 году) до 55 п. 20 ф. (въ 1907 году). На первомъ мъстъ какъ зерновое бобовое долженъ быть поставленъ нутъ (Cicer Arietinum), дающій ежегодно болье или менье постоянные урожан зерна отъ 30 до 40 пудовъ на десятину. Кромъ того, культура нута здъсь возможна и совершенно безъ поливки, при раннемъ посъвъ, въ самомъ началъ весны; такіе посъвы, имъвшіе удовлетворительный видъ, намъ неоднократно приходилось наблюдать на поляхъ туркменъ. На мъстномъ рынкъ нутъ имъетъ постоянный сбыть по цънъ около 2 руб. пудъ.

#### Хлопчатникъ.

1. Вліяніе удобреній было испытано на ІІ-омъ полѣ пятипольнаго съвооборота, согласно программы, указанной въ началъ настоящаго отчета. Вспашка на зябь ІІ-го поля была закончена къ концу ноября 1909 года; въ пластахъ поле оставалось до первой половины февраля 1910 года, когда начата была вывозка овечьяго и конскаго навоза на соотвътствующія дълянки. За мъсяць до посьва, въ первыхъ числахъ марта быль запаханъ навозъ, въ то же время были внесены и хлопковые жмыхи; суперфосфать вносился и запахивался непосредственно передъ посввомъ. Во время запашки навоза и хлопковыхъ жмыховъ были также перепаханы и контрольныя дёлянки, дабы поставить ихъ въ одинаковыя условія съ остальными сравниваемыми дёлянками. 30-го марта началась предпосъвная поливка и 1-го апръля была закончена. 5-го апръля уже возможно было приступить къ вспашкъ, боронованію и поству; вст работы были закончены 8-го апртля. Всходы стали появляться 15 апрёля; 18-го и 19-го апрёля выпаль небольшой теплый дождь, который способствоваль дальнъйшему развитію молодыхъ растеній, и уже 23 апрыля дружные всходы покрывали все поле. 24 апръля начато было предварительное, бъглое проръживаніе; 8-го мая сформировалась первая пара настоящихъ листьевъ, 13-го мая произведена окончательная прорывка на разстояніи 8 вершковъ въ ряду между отдъльными растеніями. 1-го іюня были замъчены бутоны; цвътеніе началось съ 8-го іюня. Первая коробочка раскрылась 15-го іюля. Къ первому сбору приступлено 17-го августа, ко второму 20 сентября и къ третьему 1-го ноября. Въ теченіе вегетаціоннаго періода хлопчатникъ получилъ два ручныхъ мотыженія,

главнымъ образомъ для уничтоженія сорныхъ травъ, угнетающихъ хлопчатникъ въ первые недъли его жизни, кромѣ того, три рыхленія коннымъ планетомъ послѣ первыхъ трехъ поливокъ. Первая поливка была дана 24-го мая, т. е. 48 дней спустя послѣ посѣва, затѣмъ хлопокъ получилъ еще пять поливокъ въ слѣдующіе сроки: 16-го іюня, 7-го іюля, 22 іюля, 4 августа и 25 августа. Результаты урожая получильсь слѣдующіе:

N₂N₂		Площадь кв. саж.	1-ый сборъ.	2-ой сборъ.	3-ій сборъ.	Всего.	На десятину пудовъ сырца.
			п. ф.	п. ф.	п. ф.	п. ф.	п. ф.
	Лошадинный навозъ 2400 пуд. на десятину	200	3 21	4 20	1 14	9 15	112 20
2.	Овечій навозъ 2400 пуд. на десятину	ro <u>n</u> g ik	3 08	4 22	1 12	9 02	108 24
3.	Контроль		2 05	3 12	<b>—</b> 36	6 13	75 36
	Жмыхи хлопковые 40 пуд. на				k Thuse		
	десятину вразбросъ		1 33	3 20	- 31	6 04	73 08
5.	Жмыхи хлопковые 20 пуд. на десятину рядками	10 <u>0</u> 10	<b>—</b> 28	2 33	<del>-</del> 30	4 11	51 01
6.	Жмыхи хлопковые 60 пуд. на десятину вразбросъ		1 20	2 20	1 37	5 37	71 04
7.	Суперфосфать двойной 15 пуд. на десятину вразбрось	120	1 06	1 18	<b>—</b> 28	3 12	66 —
8.	Суперфосфать двойной 7½ пуд. на десятину рядками	<u> </u>	— 37	1 30	<b>—</b> 28	3 15	67 20
9.	Суперфосфатъ 7½ пуд. 20 пуд.						00.00
	жмыховъ, все вразбросъ	_	1 07	1 13	<b>—</b> 21	3 01	60 20
10.	Контроль	-	1 16	2 13	— 22	4 11	85 20

Какъ видно изъ приведенной таблицы на участкъ были оставлены двъ контрольныя дълянки, изъ которыхъ одна дала 75 п. 36 ф. на десятину, а другая—85 п. 20 ф., что въ среднемъ составитъ 80 пуд. 28 фун. на десятину. Дълянки, начиная съ № 3 и кончая № 9 дали урожай меньше 80 пуд. на десятину и только на 1 и 2 получилось значительное увеличеніе урожая сырца. Такое ръзкое разграниченіе дълянокъ на двъ группы можетъ быть объяснено слъдующимъ обстоятельствомъ: первые дни іюля отчетнаго года отличались необыкновенно высокой, даже для Закаспійской области, температурой; въ это время было нъсколько случаевъ солнечныхъ ударовъ со смертельнымъ исходомъ съ людьми и животными въ Асхабадъ и его окрестностяхъ 1).

7-го іюля, началась поливка II-го поля, на которомъ испытывалось вліяніе удобреній.

<sup>1)</sup> Въ одинъ изъ самыхъ жаркихъ дней намъ удалось, между прочимъ, выполнить слъдующій опытъ: свъжее куриное яйцо, положенное въ 2 часа дня на поверхность земли, черезъ ½ часа испеклось вкрутую; другое такое-же яйцо, лежало на подоконникъ, обращенномъ къ югу и испеклось черезъ ¼ часа всмятку.

Имъющимся въ распоряжении Опытнаго поля количествомъ воды (3½ литра въ секунду) поле № II, общей площадью въ 1680 кв. саж., поливается въ 2 съ небольшимъ дня, при непрерывной поливкѣ; но въ виду того, что опытное поде получаетъ изъ городской канавы воду только въ теченіе четырехъ сутокъ въ недѣлю, а въ теченіе трехъ остается совершенно безъ воды, перерывы въ поливкахъ бываютъ неизоъжны; такой именно перерывъ и произошелъ при поливкъ ІІ-го поля: 7-го іюля были политы первыя три дѣлянки и небольшая часть четвертой, остальнымь же пришлось ожидать своей очереди въ теченіе трехъ и четырехъ дней; въ виду того, что хлопокъ въ это время сильно нуждался въ водъ, а дать ее во время не было возможности вслъдствіе указанной причины—началось массовое усыханіе листьевъ. а также опаденіе бутоновъ и молодыхъ коробочекъ, которое еще больше усиливалось необыкновенно высокой температурой воздуха, господствовавшей въ этотъ критическій моментъ. Въ результать всь дълянки, удобренныя суперфосфатомъ и хлопковыми жмыхами, дали урожай ниже средней контрольной. Въ лучшихъ условіяхъ оказались первыя три дълянки, получившія во время воду; дълянка № 1, удобренная лошадинымъ навезомъ, по сравненію съ контрольной дѣлянкой № 3, дала увеличеніе урожая на 36 пуд. 24 фун. на десятину; дѣлянка № 2, удобренная овечьимъ навозомъ, дала увеличеніе на 32 пуда 28 фунтовъ; дъйствіе лошадинаго навоза такимъ образомъ оказалось въ данномъ случав болве благопріятнымъ, хотя развитіе отдельныхъ растеній на дълянкъ, удобренной овечьимъ навозомъ было пышнъе и число завязавшихся коробочекъ больше; лошадиный навозъ, благодаря примъси подстилки, былъ болъе соломистымъ, чъмъ овечій, бывшій безъ какихъ либо примъсей. Поэтому, являясь удобреніемъ болье концентрированнымъ, овечій навозъ и вызвалъ усиленное развитіе вегетативныхъ органовъ въ ущербъ плодоношенію и созрѣванію.

2. Вліяніе разстояній между отдъльными растеніями было испытано на IV-омъ полъ пятипольнаго съвооборота. Вспашка на зябь IV-го поля была закончена 4-го декабря 1909 года.

Въ пластахъ поле оставалось въ теченіе двухъ мѣсяцевъ; въ началѣ февраля 1910 года поле было разбито на правильныя клѣтки, послѣ чего началась вывозка навоза съ разсчетомъ 2400 п. на десятину и его запашка. Предпосѣвная поливка производилась съ 6-го по 8 апрѣля; съ 9-го апрѣля приступлено къ вспашкѣ, боронованію и посѣву хлопчатника сорта «Кингъ» рядовой сѣялкой Баннера. Появленіе всходовъ замѣчено было 20-го апрѣля; 27-го апрѣля сдѣлано предварительное, бѣглое прорѣживаніе; къ 8-му мая уже сформировалась первая пара настоящихъ листьевъ и тогда же приступлено было къ окончательной прорывкѣ, на разстояніи 8, 12 и 16 вершковъ между отдѣльными растеніями въ ряду, при аршинной ширинѣ междурядій. Цвѣтеніе началось 8-го іюня, первая коробочка раскрылась

15-го іюля, къ первому сбору приступлено 20-го августа, ко второму 24-го сентября и къ третьему 8-го ноября. Всѣ сравниваемыя дѣлянки получили по два ручныхъ мотыженія, три рыхленія междурядій коннымъ «планетомъ» и по шести поливокъ произведенныхъ въ слѣдующіе сроки: <sup>28</sup>/v, <sup>18</sup>/vI, <sup>12</sup>/vII, <sup>23</sup>/vII, <sup>6</sup>/vIII, <sup>26</sup>/vIII.

Результаты урожая получились слъдующіе:

.№.№	1 - 29 is 129 18-15 18						Площадь кв. саж.	1-ый сборъ.	2-ой сборъ.	3-ій сборъ.	Всего.	На десятину.
								п. ф.	п. ф.	п. ф.	п. ф.	п. ф.
1.	8 вершковъ	въ	ряду				240	3 18	4 9	2 5	9 32	98 —
2.	12 вершковъ	ВЪ	ряду				_	2 34	4 18	2 19	9 31	97 30
3.	16 вершковъ	въ	ряду				_	2 19	4 12	2 22	9 13	39 10

Какъ видно изъ таблицы, по мѣрѣ увеличенія разстоянія между отдѣльными растеніями въ ряду, урожай постепенно, хотя незначительно падаеть; развитіе-же надземныхъ вегетативныхъ органовъ наобороть, постепенно усиливается и число завязавшихся коробочекъ увеличивается.

Высота куста.	Длина боковыхъ вѣтвей.	Число боковыхъ	Число боковыхъ второго	Обшее число коробо-	Число созрѣв- шихъ коробо-
Санти	метры.	вътвеи	порядка.	чекъ.	чекъ.
117	291/2	21	_	$20^{1}/3$	13
112	$38\frac{1}{2}$	23	_	27	24
110	50	$22\frac{1}{2}$	_	40	$39^{1}/_{3}$
	куста. Санти 117 112	Высота боковыхъ вътвей.  Сантиметры. 117 29½ 112 38½	Высота боковыхъ боковыхъ боковыхъ  Сантиметры. 117 29½ 21 112 38½ 23	Высота куста. Вѣтвей. боковыхъ второго порядка.  117 29½ 21 — 112 38½ 23 —	Высота боковыхъ куста. вѣтвей. боковыхъ вѣтрого коробо-  Сантиметры. вѣтвей порядка. чекъ.  117 29½ 21 — 20¹/з 112 38½ 23 — 27

Такимъ образомъ высота куста съ увеличеніемъ разстоянія между сосѣдними растеніями постепенно уменьшается, кусты разростаются въ ширину, даютъ большее количество боковыхъ вѣтвей и расположенныхъ на нихъ коробочекъ; число созрѣвшихъ коробочекъ увели чивается, т. к. отдѣльные кусты, находятся въ лучшихъ условіяхъ ассимиляціи, однако общій урожай сырца на десятину въ данномъ случаѣ обратно пропорціоналенъ числу созрѣвшихъ коробочекъ.

На основаніи вышеизложеннаго можно полагать, что для условій Асхабадскаго опытнаго поля, при аршинной ширинть междурядій и при оставленіи одного растенія въ кустт разстояніе между состадними кустами—8, а также 12 вершковъ, является достаточнымъ; при аршинномъ же разстояніи между кустами число растеній въ кустт должно быть болть одного, въ цъляхъ лучшаго использованія площади.

Разръшение вопроса о наилучшемъ соотношении между величиной разстояний въ ряду и числомъ растений въ кустъ при данной

ширинѣ междурядій составить ближайшую задачу опытнаго поля и войдеть въ программу опытовъ 1911 года.

3. Чеканка. Вліяніе чеканки было испытано на томъже IV-омъ полъ пятипольнаго съвооборота, по отношенію къ сорту Кингъ.

Всѣ работы, начиная отъ вспашки "на зябь" и кончая послѣднимъ сборомъ, были выполнены такъ же и въ тѣ же сроки, какъ это описано выше. Чеканка главныхъ стеблей произведена 22-го іюня, двѣ недѣли спустя послѣ начала цвѣтенія, и дала, какъ и въ предшествующіе годы, положительные результаты.

№ №					лощадь		ый оръ.		-ой оръ.		ій оръ.	Ве	ero		деся-	
					кв. с.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	
1.	Чеканка.			Bell	240.	3	24	6	38	1	12	11	34	118	20	
2.	Контроль				<b>»</b>	3	05	3	06	2	_	8	11	82	30	
	Примвч	аніе	[[]	ириня	межлу	лялі	$\ddot{\mathbf{u}} = 1$	арп	т въ	рял	ахъ	елин	ичн	ые к	сусты	

Примъчаніе.—Ширина междурядій—1 арш., въ рядахъ единичные кусты на разстояніи 12 вершк. другъ отъ друга.

Увеличеніе урожая на десятину—35 пуд. 30 ф., что при цѣнѣ сырца въ 3 рубля пудъ дастъ+107 р. 25 коп.; вычитая изъ этой суммы стоимость производства чеканки—2 рубля на десятину, получимъ чистой прибыли отъ производства этой простой операціи 105 руб. 25 коп. на десятину. Въ отчетѣ за 1909 годъ между прочимъ указывалось, что полезность примѣненія чеканки по отношенію къ Кингу является болѣе или менѣе доказанной; присоединяя къ имѣющемуся по этому вопросу цифровому матеріалу данныя отчетнаго года, мы получимъ слѣдующее среднее увеличеніе урожая за шесть лѣтъ:

Названіе сорта высѣвав-	Годъ.	Время чеканки.	Увеличеніе урожая на десятину.		Среднее увеличеніе на
			п.	ф.	десятину.
	1905.	20 іюня	21	12	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1906.	28 »	. 9	38	
Кингъ	1907.	18 »	32	26	
es. Tantidos os seams (	1908.	15 «	5		24 п. 06 ф.
SECURITY OF SECURITY	1909.	17 »	40	10	
AND THE PART OF TH	1910.	22 » ·	35	30	

При составленіи вышеприведенной таблицы принята во вниманіе чеканка, произведенная во время полнаго цвѣтенія хлопчатника, которое обыкновенно совпадаеть съ двацатыми числами іюня, съ большими или меньшими колебаніями въ ту или другую сторону, въ зависимости отъ хода метеорологическихъ условій даннаго года. Среднее увеличеніе урожая на десятину за шесть лѣтъ равно, согласно подсчета, 24 пул. 6 фун.—цифра, краснорѣчиво подтверждающая вы-

годность примъненія чеканки хлопчатника сорта Кингь въ періодъ его цвътенія.

Увеличеніе урожая вслідствіе приміненія чеканки является результатомъ боліве мощнаго развитія боковыхъ візтвей и образованія на нихъ большаго количества раносозрівающихъ коробочекъ; справедливость сказаннаго подтверждается еще и слідующими данными, представляющими дополненіе двухъ предшествовавшихъ таблицъ:

Названіе сорта.		Высота куста.	Длина боковыхъ вътвей. метры.	Число боковыхъ вѣтвей.	Число боковыхъ второго порядка.	коро-	шихъ	% созрѣв- щихъ ко- робочекъ.
Кингъ (	Чеканка 22/vi 1910 г. Контроль .	70,2 111,8	46,5 35,5	$21\frac{1}{2}$ $22\frac{1}{2}$	4½ —	37 29	34 20½	91,8% 70,6%

Съ цѣлью опредѣленія момента, являющагося наиболѣе выгоднымъ для производства чеканки, въ отчетномъ году былъ поставленъ соотвѣтствующій опыть на участкѣ, не входящемъ въ составъ съвооборота.

Участокъ этотъ предварительно былъ удобренъ овечьимъ навозомъ (2400 пуд. на десятину), затъмъ, послъ поливки, тщательно перекопанъ лопатами; 14 апръля произведенъ ручной гнъздовой посъвъ сорта Кингъ, на разстояніи 1 арш. рядъ отъ ряда и на 12 вершковъ гньздо отъ гньзда. При окончательной прорывкь въ каждомъ гньздь было оставлено по одному лучшему экземпляру. Обработка междурядій все время велась самая тщательная при помощи ручныхъ сапокъ; хлопокъ получилъ пять мотыженій и 6 поливокъ; поливки были даны въ слъдующе сроки: 28/v, 9/vi, 30/vi, 31/vii, 5/viii, и 26/viii. Единичные бутоны стали замъчаться съ 1-го іюня. 9-го іюня была сдълана чеканка на участкъ № 1; цвътеніе началось 15-го іюня, а 20-го іюня сдѣлана чеканка на участкѣ № 2; участокъ № 3 получилъ чеканку 15-го іюля—послъ цвътенія. Первая коробочка раскрылась на дълянкъ № 2—19-го іюля. Къ первому сбору было приступлено 26-го августа, ко второму 25 сентября и къ третьему 6 ноября, при чемъ каждый отдъльный сборъ на всъхъ дълянкахъ производился одновременно.

Результаты урожая сырца, а также развитіе надземныхъ органовъ растеній показаны въ двухъ нижеслѣдующихъ таблицахъ:

		Пло-	1-ый	2-ой	3-ій		На п	есятину	J
$N_2N_2$	Названія опытовъ.	щадь	сборъ	сборъ	сборъ	Bcero.			
	AND COMMENT OF THE PROPERTY OF	кв. саж.	ф.	ф.	ф.		П.	ф.	
1.	Чеканка до цвътенія 9/vi	. 18,2	15	18	1	34	1	12 3	
2.	» во время цвът. 20/vi .	. 17,0	17	15	4	36	12	27 2	
3.	» послъ цвът. 15/vи	. 17,3	16	21	2	39	18	35 10	
4.	Контроль	. 22,0	16	18	3	37	10	00 36	

№№	Названія опытовъ	Высота куста.	Длина боко- выхъ вѣтвей. метры.	Число боко- выхъ вътвей.	Общее число коро- бочекъ.	Число созрѣв- шихъ коро- бочекъ.	% созрѣвшихъ коробочекъ.
1	Чеканка до	Cunta	no.pm.				
1.	цвътенія 9/vi	. 57,5	43,5	17½	28	26	92,85
2.	Чеканка во время						
	цвътен. 20/vi	. 73,8	41	16	27	251/2	94,44
3.	Чеканка послъ						
	цвътенія 15/vп	87,5	45	201/2	28	27	96,42
4.	Контроль	.111	32,5	23½	311/2	251/2	80,95

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, чеканка дала положительный эффектъ во всѣхъ трехъ случаяхъ; при этомъ наибольшее увеличеніе урожая на десятину получилось на дѣлянкѣ № 3, чеканенной послѣ цвѣтенія, однако было бы преждевременно дѣлать заключеніе о томъ, что этотъ моменть является наиболѣее выгоднымъ для производства операціи чеканки; въ практикѣ опытнаго поля наоборотъ — имѣются указанія на то, что поздняя чеканка даетъ отрицательные результаты и что только чеканка въ періодъ цвѣтенія хлопчатника (около 20 іюня) даетъ удовлетворительные результаты (см. отчетъ за 1908 годъ). Поэтому, оставляя пока открытымъ вопросъ о времени, являющемся наиболѣе подходящимъ для примѣненія чеканки, мы все же пока съ увѣренностью можемъ рекомендовать чеканку для сорта Кингъ въ періолъ его цвѣтенія (около 20/v1).

Въ отчетъ за 1909 годъ было, между прочимъ, высказано предположеніе о возможности различнаго отношенія къ операціи чеканки различныхъ сортовъ хлопчатника въ силу ихъ индивидуальныхъ особенностей. Для провърки этого предположенія въ отчетномъ году подвергался чеканкъ кромъ Кинга и Кокъ-чигитъ, посъянный на одномъ изъ участковъ четырехпольнаго съвооборота. Участокъ этотъ совершенно не удобрялся—поэтому урожай Кокъ-чигита иолучился сравнительно не высокій. Посъвъ Кокъ-чигита былъ сдъланъ на пять дней позднъе Кинга, однако впослъдствіи онъ сравнялся въ своемъ развитіи съ Кингомъ; время цвътенія почти совпало, чеканкя была произведена одновременно, 22-го іюня; способы посъва сравниваемыхъ сортовъ были совершенно одинаковы, всъ мъры ухода производились по возможности въ одни и тъ же сроки. Однако Кокъ-чигитъ къ чеканкъ отнесся, какъ и въ прошломъ году, отрицательно.

			Площадь	1-ый	2-ой	3-ій	На		
NºNº	Сортъ.			сборъ	сборъ	сборъ	Beero.	десятину.	
			кв. с.	п. ф.	п. ф.	п. ф.		п. ф.	
1.	Кокъ-чигитъ.	Чеканка 22/vi	330.	1 25	2 23	_ 19	4 27	34 —	
2.		Контроль	324.	2 25	3 5	_ 17	6 7	45 29	

Слѣдовательно въ данномъ случаѣ чеканка вызвала уменьшеніе урожая на 11 пуд. 29 ф. на десятину; въ прошломъ году это уменьшеніе—35 пуд. 13 ф. Опыть примѣненія чеканки по отношенію къ Кокъ-чигиту ведется на Асхабадскомъ опытномъ полѣ съ 1909 года и конечно, данныхъ двухъ лѣтъ, не смотря на ихъ тождественность, слишкомъ малодля того, чтобы дѣлать какіе либо окончательные выводы.

4. Сравнение сортовъ хлопчатника. Этотъ опытъ былъ поставленъ на участкъ, не входящемъ въ составъ съвооборота. Послъ обычной вспашки "на зябь" участокъ лежалъ въ пластахъ до второй половины февраля, когда началась вывозка овечьяго навоза съ разсчетомъ-2400 пуд. на десятину. 12-го марта навозъ былъ запаханъ на глубину 4-хъ вершковъ и участокъ проборонованъ въ одинъ слъдъ (боронованіе необходимо, т. к. въ противномъ случай весенніе в'ятры сильно изсушилибы почву). Послъ предпосъвной поливки, 14-го апръля участокъ былъ вспаханъ на 31/2 вершка, затъмъ проборонованъ въ два слъда и разбитъ на дълянки; посъвъ произведенъ 15-го апръля ручной, гитадовой, въ шахматномъ порядкъ, на разсотянии 1 аршина рядъ отъ ряда и гнъздо отъ гнъзда. Въ каждомъ гнъздъ при окончательномъ проръживании было оставлено по два дучшихъ растенія. Сорта были отділены другъ отъ друга защитными полосами въ 11/2 сажени шириной, густо засвянными смъсью кукурузы (Кутансскій гибридъ) и конопли обыкновенной (Cannabis sativa).

Такая смъсь, какъ оказалось впослъдствіи, дала высокую и густую живую стъну, прекрасно защищающую сосъдніе сорта хлопчатника отъ перекрестнаго опыленія. Всъ дълянки, въ виду небольшихъ размъровъ, обработывались ручнымъ способомъ и получили каждая по два мотыженія сапками и по три рыхленія ручнымъ культиваторомъ; въ теченіи вегетаціоннаго періода каждая изъ нихъ была полита шестъ разъ, въ слъдующіе сроки: <sup>26</sup>/v, <sup>9</sup>/vi, <sup>10</sup>/vii, <sup>23</sup>/viii, <sup>14</sup>/viii и <sup>28</sup>/viii; сборы сырца были сдъланы одновременно на всъхъ дълянкахъ, занятыхъ американскими сортами:—первый 26-го августа, второй 25 сентября и третій 6-го поября; только Ашмуни былъ собранъ въ одинъ пріемъ 1-го поября. Результаты урожая и важнъйшіе моменты развитія сравниваемыхъ сортовъ показаны въ двухъ нижеслъдующихъ таблинахъ.

№№		Пло- щадь.	1-ый	2-ой	3-ій	Bcero.	На десятину.	
	Сорта.	Кв. саж.	сборъ.	сборъ.	сборъ.	beero.		
1.	Кокъ-чигитъ	20	20 ф.	18 ф.	9 ф.	1 п. 07 ф.	141 п.	
2.	Аунсболъ	))	17 »	12 »	9 »	38 »	114 "	
3.	Кингъ	"	16 »	21 »	9 »	1 п. 6 »	138 »	
4.	Кара-чигитъ	.,	13 »	14 »	_	27 »	81 »	
5.	Малля-чигить	»	15 »	13 »	6 ф.	34 »	102 »	
6.	Ашмуни	1)	8 »	<u> 1910 - 1910 - 19</u>		8 »	48 »	

NèNè C o	рта.	Предпосъв- ная поливка	Вепашка.	Посъвъ.	Веходы.	Цвътепіе.	1-я раскрыв- шаяся коро- бочка.	1-ый сборъ.	2-й сборт.	3-ій сборъ.
1. Кокъ-ч	игитъ	10/IV	14/IV	15/rv	23/IV	15/vi	20/vII	26/vIII	25/IX	6/x1
2. Аунсбо	апо	))	))	))	))	16/vi	22/vII	» ,	n	))
3. Кингъ		))	))	))	))	16/vi	20/vII	))	))	))
4. Кара-ч	игитъ .	))	))	))	))	16/vi	28/vII	))	. »	_
5. Малля	. стилир	))	))	))	))	18/vi	24/vII	»	))	))
6. Ашмун	и	))	))	))	»	25/vi	3/ix	1/xI	_	_

Первое мъсто по урожайности между сравниваемыми сортами занимаетъ Кокъ-чигитъ, за нимъ слъдуютъ Кингъ, Аунсболъ, Малля-чигить, Кара-чигить и наконець Ашмуни. Последній сорть, между прочимъ, отличился наиболъе пышнымъ развитіемъ надземныхъ частей и наибольшимъ количествомъ образовавшихся коробочекъ; однако, первая коробочка раскрылась у Ашмуни послъ того, когда у американскихъ сортовъ уже былъ снятъ первый сборъ. Буйный ростъ, свойственный вообще Ашмуни, усиливался въ данномъ случав еще тъмъ, что участокъ, на которомъ сравнивались сорта хлопчатника, былъ хорошо удобренъ такимъ сильно дъйствующимъ азотистымъ удобреніемъ, какъ чистый овечій навозъ. Между тъмъ, тотъ же Ашмуни, высъянный на неудобренномъ участкъ, освободившемся весною отчетнаго года изъ-подъ старыхъ посадокъ абрикоса, развивался вполнъ нормально, напоминая своимъ ростомъ американскій хлопчатникъ; всв раскрывшіяся коробочки были убраны 18 октября и съ участка въ 210 кв. саж. получилось 6 п. 21 ф. сырца удовлетворительнаго качества, что по разсчету на десятину соотвътствуетъ 74 п. 23 ф.

5. Опытъ съ числомъ и временемъ поливокъ. Въ отчетномъ году опытъ этотъ, являясь продолженіемъ аналогичныхъ опытовъ предыдущихъ трехъ льтъ, былъ въ то же время нъсколько расширенъ въ своей программъ. Въ виду того, что среднія данныя за три года (1907—8 и 9 г.г.) въ достаточной степени выяснили наибольшую потребность хлопчатника въ водъ въ первые два періода его вегетаціи—1) до цвътенія и 2) во время цвътенія, при составленіи программы опытовъ на 1910 годъ, это обстоятельство было принято во вниманіе, и всф комбинаціи, въ которыхъ преобладающее количество поливокъ приходится на третій періодъ – періодъ созрѣванія — были исключены; главное вниманіе обращено именно на два первые періода, при чемъ распредъление числа поливокъ сдълано по возможности такъ, чтобы въ достаточной степени обезпечить хлопокъ во время его роста и цвътенія и не затянуть процессъ созръванія излишними поливками въ третьемъ періодф; изъ старыхъ комбинацій оставлены только тъ, которые оказались наиболье удачными для даннаго общаго числа поливокъ; кромъ того, введенно нъсколько новыхъ комбинацій, съ такимъ разсчетомъ, чтобы общее количество поливокъ, которыя получить хлопчатникъ, колебалось въ предълахъ отъ двухъ до семи включительно, не считая предпосъвной поливки. Участокъ для опыта съ поливками былъ выбранъ на ІІ-омъ полъ пятиполнаго съвооборота, и 30-го марта разбить на дълянки, которыя послъ тщательнаго выравниванія, отділялись другь отъ друга крівпко утрамбованными валиками въ 1 аршинъ шириною и 1/2 арш. высотою, предназначенными для возможно полной изоляціи и предохраненія долянокъ отъ вліянія сосъдней поливки; затъмъ каждая дълянка была удобрена овечьимъ навозомъ (2400 п. на десятину) и тщательно переконана лопатами, вторичная перекопка послъдовала 5-го апръла послъ предпосъвной поливки; посъвъ сдъланъ ручной, гнъздовой, подъ сапки, въ шахматномъ порядкъ, на разстояніи 12 вершковъ въ ряду и между рядами; въ каждое гнъздо было положено по 10-15 шт. съмянъ: при первомъ проръживаніи оставлялось 3-4 штуки, а при окончательномъ-по одному лучшему экземпляру въ каждомъ гназда, лишніе же во избъжаніе поврежденія корневой системы оставляемаго, не выдергивались, какъ это обычно дълается, а сръзывались у поверхности земли секаторомъ. Всходы появились на всъхъ дълянкахъ одновременно-16 апръля, цвътеніе началось 9-го іюня; первая коробочка раскрылась на дѣлянкѣ № 1-получившей въ общей сложности двъ поливки—12-го іюля, затъмъ на дълянкъ № 2—13 іюля; всъ же остальныя дълянки въ этомъ отношеніи различій не представляли, и раскрываніе коробочекъ на нихъ началось съ 15 іюля. Всъ сравниваемыя дълянки были поставлены въ одинаковыя условія самаго тщательнаго ухода, состоявшаго въ обычныхъ пріемахъ культуры хлопчатника и отличались только числомъ и временемъ поливокъ, вліяніе которыхъ выразилось въ слъдующемъ:

Ф дѣлянокъ.	пол	Числ ивокт ріода	, 110	бщее число поливокъ.	Площадь.		сборъ / vш		сборъ 2/х.		сборъ /х1.	Вс	Bcero.		На тину.
Ne.Ne	I	II	Ш			ф.	зол.	ф.	30A.	ф.	30Л.	ф.	зол.	Пуд.	ф.
1	1	1		2	8	3	42	_	44	1	6	4	92	37	71/2
2	1	1	1	3	))	6	56	1	56	2	78	10	94	82	133/4
2 3	1	2		3	))	11	90	2'	25		36	14	55	109	111%
	2	1	_	3	))	6	43	1	36		57	8	40	63	05
4 5	1	2	1	4	))	11	93	1	32	_	61	13	90	104	211/4
6	2	1	1	4	))	8		1	74	1	67	11	45	86	05%
7	1	2	2	5	))	8	72	10		1	05	19	77	148	20%
8 9	1	3	1	5	))	10	18	9	22	1	15	20	55	154	11%
9	2	2	1	5	))	10		6	36	1	66	18	06	135	183/4
10	2	3	_	5	))	9	30	.7	75		90	18.	03	135	93%
11	3	2		5	))	7	_	1	58	1	48	10	10	75	311/4
12	1	3	2	6	))	5	72	12	_	4	57	22	.33	167	231/8
13	3	2	2	6	))	6	72	10	40	<del>-</del>	76	1.7	92	134	$27\frac{1}{2}$
14	2	3	1	6	))	14	43	3	39	_	57	18	43	138	143/8
15	3	2	1	6	))	10		1	18	_	90	12	12	90	371/2
16	2	2	3	7	))	8	72	3	74	2	15	14	65	110	31/8
17	2	3	2	7	))	9	19	11	48	1	52	22	23	166	37%
18	3	2	2	7	))	11	12	7	70	-	45	19	31	144	26%
19	3	3	1	7	n	10	-	5	-	6 <del>- 1</del> 6	49	15	49	116	$13\frac{1}{8}$

Разсматривая таблицу, мы видимъ, что наилучшій урожай при

трехъ поливкахъ получился на дѣлянкѣ № 3, при четырехъ поливкахъ на дѣлянкѣ № 8, для шести поливокъ наплучшей оказалась комбинація дѣлянки № 12 и для семи поливокъ комбинація дѣлянки № 17. Во всѣхъ перечисленныхъ сейчасъ пяти случаяхъ распредѣленіе поливокъ по періодамъ сдѣлано такъ, что максимальное число поливокъ приходится на второй періодъ вегетаціи хлопчатника—періодъ цвѣтенія, и такое именно распредѣленіе соотвѣтствуетъ высшему урожаю для даннаго общаго числа поливокъ, — слѣдовательно, уже это одно обстоятельство въ вначительной степени указываетъ на то, что наибольшую потребность въ водѣ испытываетъ хлопчатникъ въ періодъ цвѣтенія.

Для того, чтобы прослъдить измъненіе урожая въ зависимости отъ увеличенія поливокъ по отдъльнымъ періодамъ, разобьемъ предварительно всъ дълянки на группы такимъ образомъ, чтобы онъ имъя одинаковое число поливокъ въ два періода, отличались бы ихъчисломъ въ одинъ изъ сравниваемыхъ періодовъ, и данныя, полученныя путемъ сопоставленія урожайности соотвътствующихъ дълянокъ, соединимъ въ слъдующую таблицу.

Періоды.	Группы.	№№ сравнивае- мыхъ дёля-	Увеличен жая на тин	деся-		Среднее уве- личеніе уро- жая.		
		нокъ.	пуд.	фун.		пуд.	фун.	
	1	2 и 6	+ 3	27	1			
	256	5 и 9	+ 3	37				
÷	144734643	7 и 13	13	33				
<u> </u>	I	8 и 14	<b>—</b> 15	37		- 9	36	
В	1 1	9 и 15	<del>- 44</del>	21	1	- 9	50	
	{	12 и 17	- 00	32				
ď		13 и 18	+ 10	09				
Φ	(	14 и 19	22	01	,			
П	1	5 и 15	— 13	23	1			
	II {	7 и 8	<del>-</del> 3	24	-	- 18	15	
	(	8 и 19	<b>—</b> 37	38				
	1 1	2 и 5	+ 22	08	)			
. <del>.</del>		5 и 8	+ 49	30				
0		6 и 9	+ 49	18				
d	III {	7 и 12	+ 19	03	} +	- 28	27	
	{	9 и 14	+ 2	36				
0		13 и 17	+ 32	04				
H		15 и 19	+ 25	16	)			
В	1 777 (	2 и 8	+ 71	38	1 .	60	0.0	
	IV {	6 и 14	+ 52	14	} +	- 62	06	
i i	(	5 и 7	+ 43	39	)			
eri in decidencia		8 и 12	+ 13	12				
Ĥ		9 и 13	_ 00	31				
o ·	\ V \	13 и 16	- 24	24	1 +	- 19	02	
		14 и 17	+ 28	17				
		15 и 18	+ 53	39				
E .	l vi '	9 и 16	25	15	_	- 25	15	

Въ поясненіе приведенной таблицы необходимо добавить, что всѣ сравниваемыя дѣлянки разбиты, какъ видно, на три періода, соотвѣтственно тремъ періодамъ вегетаціи; каждый періодъ, въ свою очередь, имѣетъ двѣ группы. Взявъ любую пару сравниваемыхъ дѣлянокъ изъ группы № 1, и разсматривая ихъ параллельно съ предыдущей таблицей, мы увидимъ, что онѣ, имѣя по одному и тому же числу поливокъ во второй и третій періоды, въ первомъ періодѣ вегетаціи отличаются другъ отъ друга на одну поливку; подобнымъ же образомъ дѣлянки группы № П, имѣя одинаковое число поливокъ во второмъ и третьемъ періодѣ, отличаются другъ отъ друга въ первомъ на двѣ поливки. По такой же системѣ построены дѣлянки, входящія въ четыре остальныхъ группы и соотвѣтствующія второму и третьему періодамъ вегетаціи.

Такимъ образомъ, при такомъ распредъленіи, мы имѣемъ возможность прослѣдить измѣненіе урожая въ зависимости отъ увеличенія поливокъ въ каждый изъ періодовъ развитія хлопчатника.

Обращаясь къ группъ № I и, разсматривая ее подробно, мы видимъ, что одна лишняя поливка въ первомъ періодъ въ нъкоторыхъ случаяхъ увеличиваетъ общій урожай, въ нъкоторыхъ уменьшаетъ, а въ среднемъ уменьшаетъ на 9 пуд. Зб фунт. на десятину. Группа № II во всъхъ случаяхъ даетъ уменьшеніе урожая, и въ среднемъ двъ лишнихъ поливки въ первомъ періодъ уменьшаютъ общій урожай на 18 пуд. 15 фунт. на десятину. Разсматривая группу № III, во всъхъ случаяхъ замъчаемъ увеличеніе урожая, которое въ среднемъ, при одной лишней поливки во второмъ періодъ, достигаетъ 28 пуд. 27 фунт. на десятину.

Двѣ лишнихъ поливкѣ во второмъ періодъ увеличиваютъ общій урожай на 62 пуда 6 фунтовъ, что видно при сравненіи дѣлянокъ, входящихъ въ группу № IV.

Что касается затѣмъ треьяго періода развитія хлопчатника, (группы № V), то здѣсь одна лишняя поливка въ большинствѣ случаетъ вызываетъ увеличеніе урожая и только въ нѣкоторыхъ случаяхъ уменьшеніе, а въ среднемъ подпимаетъ общій урожай на 19 пудовъ 2 фунта на десятину.

Двѣ лишнихъ поливки въ третьемъ періодѣ оказывають уже вредное вліяніе, уменьшая общій урожай на 25 пуд. 15 фунт. на десятину.

Къ сожалѣнію, въ группу № VI, подтверждающую это обстоятельство, возможно было помъстить только одну пару сравниваемыхъ дълянокъ, за отсутствіемъ въ опытъ отчетнаго года соотвътствующихъ комбинацій съ 8 и 9 поливками. Такимъ образомъ, на основаніи данныхъ, полученныхъ въ отчетномъ году, можно вывести слъдующія заключенія для района опытнаго поля:

1. Наибольшую потребность въ водъ испытываетъ

хлопчатникъ во второй періодъ вегетаціи—періодъ цвътенія, совпадающій съ наиболъе жаркимъ временемъ.

- 2. Съ числомъ поливокъ въ первомъ періодѣ нужно быть осмотрительнымъ; если въ почвѣ содержится достаточное количество влаги, накопившейся отъ предпосѣвной поливки и атмосферныхъ осадковъ, выпавшихъ въ теченіе зимы и весны, то одной поливки въ первомъ періодѣ будетъ вполнѣ достаточно для нормальнаго развитія хлопчатника; излишнія же поливки вызываютъ пониженіе урожая.
- 3. Не менъе осмотрительнымъ съ числомъ поливокъ нужно быть и въ третьемъ періодъ; въ началѣ этого періода неръдки гармсили; которые въ значительной степени могутъ повліять на уменьшеніе урожая, если во время не дана вода; но и лишнія поливки, въ свою очередь, окажутся здѣсь вредными, затягивая процессъ созрѣванія. Поэтому поливки третьяго періода должны располагаться такимъ образомъ, чтобы создать наиболѣе благопріятныя условія для созрѣванія коробочекъ, образовавшихся въ теченіе второго періода.

Въ заключение приводится нижеслъдующая таблица, показывающая средние урожан для нъкоторыхъ комбинацій за четыре года, начиная съ 1907 г., когда впервые были организованы опыты съ числомъ и временемъ поливокъ.

Manage Di	Чис	сло п	-ико	0		H	a	д	e c	н э	T	и	н у	. 476
№№ дѣля-	вокъ	110 1	repio-	число къ.			100	0 -	100		101	0	0	
нокъ.		дамъ		цее твок	190	7 г.	190	8 г.	190	9 r.	191	0 r.	Сред	нее.
	I	II	III	Общее поливо	пуд.	фун.								
1	1	1	_	2	51	_	45	14	52	17	37	7	46	19
2	1	1	1	3	60	_	52	33	59	39	82	13	63	31
3	1	2	1	4	66		50	24	69	15	104	21	72	25
4	1	3	1	5	85	30	85		81	33	154	11	101	28
5	2	2	1	5	78	_	80	20	90	29	135	18	96	6
6	2	2	2	6	117	10	86	06	70	05	134	27	102	02
7	3	3	1	7	102	30	91	14	93	22	116	13	100	39

Какъ видно изъ таблицы, при трехъ поливкахъ, равномърно распредъленныхъ по періодамъ, средній за 4 года — 63 пуд. 31 фунт., что нужно признать вполнѣ удовлетворительнымъ для Асхабадскаго уѣзда. Одна лишняя поливка во второмъ періодѣ (дѣлянки 3 и 2) увеличиваетъ урожай на 8 пуд. 34 фунта, а двѣ лишнихъ поливки въ томъ же періодѣ (дѣлянки 4 и 2) на 37 пудовъ 27 фунт. Одна лишняя поливка въ первомъ періодѣ (дѣлянки 5 и 3) поднимаетъ общій урожай на 23 пуда 21 фун. на десятину, но двѣ лишнихъ поливки (дѣлянки 7 и 4) не только не увеличиваютъ урожая, а наоборотъ уменьшаютъ его.

Такимъ образомъ и среднія данныя за четыре года подтверждаютъ положенія, ранъе высказанныя въ пунктахъ 1 и 2.

## Шабдаръ.

По примъру прошлаго года въ отчетномъ году два участка четырехпольнаго съвооборота были заняты шабдаромъ (Trifolium resupinatum). Послъ предпосъвной поливки, 8-го марта участокъ былъ вспаханъ на 4 вершка 7′′ плугомъ Сакка и затъмъ проборонованъ въ одинъ слъдъ; послъ этого произведенъ ручной разбросной посъвъ, при чемъ на площадь въ 600 кв. саж. употреблено 23 фунта съмянъ, которыя были задъланы бороною въ два слъда. Всходы появились 14-го марта, но затъмъ, послъ дождей 15 и 16 марта, сильно задерживались въ развити образовавшейся коркой.

Первые настоящіе листочки у шабдара появились 27 марта, цвѣтеніе началось съ 1 го іюня и въ періодъ полнаго цвѣтенія, 18-го іюня, начать первый укосъ. Съ участка въ 600 кв. саж. было собрано 24 пуд. 10 фун. сухого сѣна, что по разсчету на десятину соотвѣтствуетъ 97 пудамъ.

Какъ и въ прошломъ году, шабдаръ оказался очень чувствительнымъ къ жарѣ и требовательнымъ къ водѣ; до перваго укоса его пришлось полить четыре раза: <sup>14</sup>/гv, <sup>29</sup>/гv, <sup>18</sup>/v и <sup>7</sup>/vr; въ то же время люцерна, напримѣръ, чувствовала себя прекрасно и при двухъ поливкахъ. Послѣ перваго укоса шабдаръ отросталъ очень туго, въ дальнѣйшемъ многіе кусты его совершенно выгоръли, и ко времени второго укоса значительное преобладаніе оказалось на сторонѣ сорныхъ травъ, между которыми главное мѣсто занимали: выонокъ, лебеда и мышей; поэтому второй укосъ былъ скормленъ въ зеленомъ видѣ овцамъ и козамъ.

Такимъ образомъ, въ концъ концовъ результаты получились такіе же, какъ и въ прошломъ году: шабдаръ, несмотря на прекрасныя качества съна (ароматичность, мягкость и съъдобность), далеко не оправдалъ возлагавшихся на него надеждъ не только въ качествъ двухлътняго растенія, какъ это предполагалось въ началъ, но даже оказался неважнымъ и однолътнимъ растеніемъ, въ особенности при сравненіи съ люцерною, которая въ условіяхъ опытнаго поля даетъ въ среднемъ въ одинъ укосъ 250 пуд. сухой массы на десятину.

### Люцерна.

Въ отчетномъ году люцерна продолжала занимать два внѣпольныхъ участка, общей площадью 600 кв. саж., засѣянныхъ весною 1909 года; кромѣ того, былъ заложенъ еще одинъ люцерникъ на участкѣ, освободившемся осенью 1909 г. изъ-подъ старыхъ посадокъ дикаго абрикоса.

Поливка люцерны посѣва 1909 года началась 12 марта, 2 апрѣля люцерна была полита во второй разъ и 11 апрѣля приступлено къ

первому укосу; въ дальнъйшемъ поливки распредълялись такимъ образомъ, что люцерна получала одну поливку послъ снятія укоса и другую за пять—шесть дней до начала слъдующаго укоса, исключеніе лишь представляли наиболъе жаркіе лътніе мъсяцы—іюнь и іюль, когда, въ силу необходимости, приходилось давать по три поливки между двумя укосами. Изъ вредителей въ отчетномъ году наблюдалась въ концъ марта и первой половинъ апръля гусеница свекловичной совки (Caradrina), которая въ значительной степени повредила первый укосъ; изъ мъръ борьбы противъ этой гусеницы примънлась обильная поливка пораженныхъ участковъ въ тотъ моментъ, когда гусеница уходить въ землю для окукливанія; мъра эта оказалась достаточно дъйствительной.

Въ теченіе весенняго и лѣтняго сезона люцерна посѣва 1969 г. дала четыре укоса и отаву въ 1½ аршина вышины, которая была постепенно скормлена въ зеленомъ видѣ лошадямъ и коровамъ. По количеству сухой массы на первомъ мѣстѣ оказался майскій укосъ, слѣдующіе же укосы постепенно падаютъ; въ общемъ однако четыре укоса дали, какъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы, болѣе тысячи пудовъ сухой массы на десятину.

	1 уг 11 ап	1 укосъ 2 11 апрѣля. 2 п. ф.	2 yr 29	2 укосъ 29 мая.		3 укосъ 5 іюня.		4 укосъ 25 іюля.		Всего.		ину.
	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	II.	ф.	II.	ф.
Площадь 600 кв. саж	65	20	69	20	66	30	50	30	252	20	1.000	_

Новая плантація люцерны была заложена, какъ указано выше, на участкъ, освободившемся отъ посадокъ стараго непривитого абрикоса (по мъстному курага).

Выкопка и корчевка деревьевъ началась осенью 1909 г. и къ январю 1910 г. была закончена. Послъ предварительнаго выравниванія конной лопатой, участокъ быль перепахань на глубину 5 вершковъ, а затъмъ, 20 января, разбитъ на грядки саженной ширины (болъе широкихъ грядокъ дълать было невозможно т. к. участокъ имълъ значительный уклонъ въ одну сторону). Грядки отдълялись другъ отъ друга достаточной ширины и вышины валиками, необходимыми для удобства поливки. 4 февраля была произведена пробная поливка съ цълью опредъленія правильности выравниванія грядокъ, при чемъ всв мъста плохо или неравномърно заливаемыя водою, приводились въ соотвътствующее положение ручными допатами во время самой поливки. Въ концъ февраля была сдълана вторичная поливка-предпосвыная—и 3 марта приступлено къ перекопкв, а 5 марта начатъ разбросной ручной посъвъ, производившійся постепенно, по мъръ подготовки грядокъ; съмена задълывались граблями. Посъвной матеріаль-«туркестанская» люцерна-быль пріобр'ятень у торговаго дома Г. В. Дюршмидть въ Ташкентъ и, предварительно испытанный на всхожесть, далъ 95% взошедшихъ съмянъ. Во время появленія всходовъ 15 и 16 марта стояла благопріятная пасмурная погода; выпавшіе затъмъ дожди также способствовали усиъшному проростанію, однако, образовавшаяся съ наступленіемъ солнечныхъ дней корка, въ дальнъйшемъ сильно тормозила правильное развитіе растеній.

Первые настоящіе листочки появились 27 марта, цв'втеніе началось въ начал'в іюня, и къ первому укосу приступлено было 9 іюня, второй укосъ снять 25—27 іюля; посл'в этого люцерна дала незначительный приростъ и, т. к. не было разсчета убирать ее серпами, то она была на м'вст'в скормлена овцамъ въ зеленомъ вид'ъ. Первый укосъ далъ 37 пуд. 22 фун. сухой люцерны, второй 34 п. 32 фунта, всего въ два укоса 72 пуда 14 ф., что при участк'ъ въ—325 кв. саж. дастъ 534 пуд. 11 ф. на десятину.

Въ отчетномъ году на новомъ участкъ люцерны былъ, между прочимъ, поставленъ опытъ съ различными видами нитрагина полученными отъ Бактеріолого - Агрономической станціи Императорскаго Русскаго Общества акклиматизаціи животныхъ и растеній.

Испытанію подвергались сл'єдующіе четыре вида нитрагина:
1) нитрагинъ Бактеріолого-Агрономической станціи на жидкой среді,

2) тоже на твердой средъ, 3) Американскій нитрагинъ Д-ра Мооръ и

4) нитрабактеринъ проф. Ботомлея.

Отдъльныя грядки съ нитрагиномъ чередовались съ контрольными дълянками саженной ширины, которыя во избъжаніе переноса бактерій, прежде всего и были перекопаны и засъяны. Каждый видъ нитрагина имълъ особое наставленіе къ его употребленію, которое въ точности было выполнено. Въ общемъ, примъненіе нитрагина сводилось къ выполненію слъдующихъ операцій: 1) —приготовленіе культуры, 2) прививка или зараженіе съмянъ и 2) посъвъ зараженныхъ съмянъ; при этомъ для обезпечиванія лучшаго успъха на ряду съ зараженіемъ съмянъ примънялось также и зараженіе почвы, высъваемой вмъстъ съ съменами.

Нитрагинъ Бактеріолого-Агрономической станціи (на жидкой и твердой средѣ) представлялъ то удобство, что являясь уже готовой культурой, тѣмъ самымъ избавлялъ отъ необходимости ея пригототовленія. Нитрагинъ проф. Ботомлея и американскій (д-ръ Мооръ) требовали предварительнаго приготовленія «культуры».

Американскій нитрагинъ быль получень въ трехъ пакетикахъ, обозначенныхъ буквами X, Y, Z; способъ приготовленія культуры состояль въ слѣдующемъ: взявъ ¼ бутылки чистой воды и всыпавши въ нее содержимое пакетика Y, мѣшать до тѣхъ поръ пока все растворится. Затѣмъ находящуюся въ пакетѣ X вату растрепать и положить въ приготовленный растворъ, посуду покрыть отъ пыли и свѣта бумагой или ватой и поставить въ теплое мѣсто на сутки; во избѣжаніе гибели бактерій температура жидкости не должна превышать 37° С. По прошествіи 24 часовъ прибавить содержимое пакета Z, дать постоять еще 24 часа и если послѣ этого жидкость помутнѣетъ, то это доказываетъ ея готовноссь; если же помутнѣнія не произойдетъ, что можетъ явиться слѣдствіемъ неравномѣрной или низкой температуры, то необходимо еще подождать, но не болѣе двухъ дней.

Всѣ необходимые препараты для приготовленія нитробактерина проф. Ботомлея также были получены въ трехъ пакетикахъ, съ которыми нужно было поступить почти такимъ же образомъ, какъ описано выше (для нитрагина д-ра Мооръ):—взявъ хорошо промытый горячей водой сосудъ, налить въ него чистой прокипяченой и остуженой воды 11 фунтовъ, затѣмъ содержимое пакета № 1 растворить въ горячей водѣ и влить въ сосудъ; послѣ этого помѣстить въ растворъ содержимое пакета № 2 (порошокъ съ ватой) при постоянномъ помѣшиваніи, покрыть сосудъ чистой влажной тканью для защиты отъ пыли и свѣта и поставить въ тепломъ мѣстѣ при температуръ не выше 28° С. Черезъ два часа прибавить содержимое пакета № 3, снова перемѣшать и оставить въ тепломъ мѣстѣ до помутнѣнія, которое должно послѣдовать черезъ 24—36 часовъ, если температура будетъ около 21° С.

Нитрагинъ Бактеріолого-Агрономической станціи на жидкой средѣ помѣщается въ стеклянномъ флаконѣ, закупоренномъ въ жестяную, запаянную банку. Нитрагинъ на твердой средѣ помѣщается въ трубочкахъ, закупоренныхъ ватой и залитыхъ сургучемъ; передъ употребленіемъ, съ нимъ, согласно наставленія, надлежало поступить слѣдующимъ образомъ: содержимое трубочекъ извлечь въ чистый сосудъ, каждую трубочку тщательно выполоскать прокипяченымъ и остуженымъ молокомъ и всю массу въ сосудѣ тщательно размѣшать и разбить всѣ комочки.

Прививка съмянъ для всъхъ видовъ нитрагина производилась такимъ образомъ: взявъ порцію съмянъ, необходимую на данную дълянку, полить достаточнымъ количествомъ приготовленной жидкости, тщательно съмена перемъшать такимъ образомъ, чтобы всъ они оказались влажными, затъмъ разсыпать тонкимъ слоемъ въ тъни на чистомъ мъстъ и дать обсохнуть. Послъ просушки посъвъ производился обычнымъ порядкомъ, при чемъ съмена смъшивались для болъе равномърнаго посъва съ достаточнымъ количествомъ земли, взятой съ той же дълянки, на которой производился посъвъ. На ряду съ прививкой съмянъ для большаго обезпеченія успъха производилось, какъ указано выше, и зараженіе почвы, для чего земля, взятая для смъшиванія съ высъваемыми съменами, поливалась растворомъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы послъ тщательнаго перемъшиванія получить рыхлую разыпчатую (а не липкую) массу, удобную для разсъва. Послъ посъва привитыхъ съмянъ вмъстъ съ землей, тотчасъ же производилась задълка граб-

лями, чтобы съмена не оставлять подъдъйствіемъ солнечныхъ лучей, отъ которыхъ бактеріи могутъ погибнуть.

Всѣ дѣлянки съ нитрагиномъ были засѣяны одновременно—7 марта; временемъ появленія всходовъ и цвѣтеніемъ онѣ другъ отъ друга, а также и отъ контрольныхъ дѣлянокъ не отличались. Въ виду того, что люцерна существовала на данномъ участкѣ только первый годъ, возможно было снять только два укоса—18 іюня и 25 іюля, третій же укосъ, не дополучившій воды, которая въ это время необходима была для поливки хлопчатника, далъ настолько слабый приростъ, что не представлялось возможнымъ приступить къ уборкѣ серпами, и поэтому онъ былъ скормленъ на мѣстѣ въ зеленомъ видѣ овцамъ.

Ко времени перваго, а также второго укоса по внѣшнему виду наиболѣе благопріятное впечатлѣніе производила дѣлянка съ нитрагиномъ Бактеріолого-Агрономической станціи на твердой средѣ, отличавшаяся болѣе пышнымъ ростомъ; послѣднее мѣсто въ этомъ отношеніи занимала дѣлянка съ американскимъ нитрагиномъ. Результаты взвѣшиванія сухой люцерны, полученной въ первые два укоса отмѣтили русскій нитрагинъ съ лучшей стороны, что и подтверждается нижеслѣдующей таблицей.

NºNº	William Commence of the Commen	Пло- щадь	1 ук	. «200	2 ук	. агоо	Всего.		На десяти	
		кв. саж.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.
1.	Русскій нитрагинъ на жид-	27,3	2	38	3	21/2	б	1/2	528	22
2.	Русскій нитрагинъ на твердой средъ	26,5	3	24	2	37½	6	211/2	592	03
3.	Никтробактеринъ проф. Ботомлея	25,6	3	6½	2	12½	5	19	513	11
4.	Американскій нитрагинъ д-ра Мооръ	27,5	2	25	2	7½	4	32½	420	_
5.	Контроль (среднее)	25,6	2	34	2	24	5	18 -	510	37

Заканчивая настоящій отчеть, нельзя обойти молчаніемъ вопроса объ увеличеніи площади Опытнаго поля, фактически осуществившагося осенью отчетнаго года, согласно распоряженія бывшаго начальника Закаспійской области ген.-лейт. Евреинова; къ старой площади поля въ 6½ десятинъ присоединенъ новый участокъ, площадью около 9 десятинъ, часть котораго осенью отчетнаго года была выровнена, распахана и засъяна озимымъ ячменемъ. Осенью же на средства, отпущенныя Начальникомъ области, былъ возведенъ вокругъ вновь присоединеннаго участка глинобитный заборъ (дувалъ).

Къ сожалѣнію, количество воды, получаемой опытнымъ полемъ, несмотря на увеличеніе площади, осталось прежнимъ (3½ литра въ секунду); поэтому новый участокъ на первыхъ порахъ вполнъ возможно будетъ использовать только подъ посѣвы озимыхъ хлѣбовъ, программа опытовъ съ которыми будетъ значительно расширена.

### OTHETЪ

## о показательныхъ плантаціяхъ въ Закаспійской области въ 1910 году.

Составилъ земскій инструкторъ Н. С. Нефедьевъ.

Въ отчетномъ году количество показательныхъ плантацій въ Мервскомъ убядъ Закаспійской области вмѣсто прошлогоднихъ 7, поднялось до 10, и распредѣленіе ихъ по площади уѣзда было нѣсколько иное. Была уничтожена плантація на Эрсаріабскихъ карендныхъ земляхъ, находящихся между городомъ Мервомъ и поселкомъ Іолотанью, вслѣдствіе устройства на этихъ земляхъ Гродековскаго русскаго поселка и отчужденія ихъ въ надѣлъ поселянамъ, но зато въ Іолотани площадь плантаціи была доведена до 4½ десятинъ.

На земляхъ города Мерва была закрыта плантація «Казакъ-Еръ», вслѣдствіе крайней необезпеченности ея водою, но зато плантація на Таймазскомъ участкѣ была лучше обезпечена водою и съ будущаго 1911 года всю площадь этой плантаціи въ 6 десятинъ предположено выпланировать и обратить подъ посѣвъ.

На этихъ двухъ участкахъ Іолотанскомъ и Таймазскомъ, расположенныхъ вблизи населенныхъ центровъ, прилегающихъ къ большимъ проъзжимъ дорогамъ, и было сосредоточено главное вниманіе при работъ. Расположеніе ихъ вблизи города и поселка при станціяхъ желъзной дороги, быстрота сообщенія и полученія свъдъній давали полную возможность вести тщательный надзоръ за ними.

Остальные 8 участковъ были расположены на Тезанлійскихъ и Кесе-Ябскихъ карендныхъ земляхъ Тохтамышскаго раіона, на Кызылбайскихъ земляхъ Отамышскаго раіона и, такимъ образомъ, почти прямой линіей переръзали поперекъ низовья оросительной съти Мервскаго оазиса съ востока-юго-востока на западо-съверо-западъ. При этомъ восточный конецъ линіи (на Тезанлійскихъ земляхъ) былъ удаленъ отъ города Мерва на 30 верстъ, а западный—на 70 верстъ.

Вслѣдствіе различія почвъ, неодинаковаго количества воды различныхъ общихъ условій работы, и въ связи съ этимъ и различныхъ урожаевъ, ниже подробно описываются работы по каждому изъ двухъ помянутыхъ участковъ отдѣльно.

#### 1. Участокъ на поселковой землѣ въ Іолотани.

Этотъ участокъ, какъ было сказано выше, занимаетъ площадь въ 4½ десятины. Засъвается онъ сравнительно недавно и пока неудовлетворительно выпланированъ. Окончательное назначение его подъ показательную плантацію состоялось въ мартъ мъсяцъ и думать объ исправленіи этой планировки было уже поздно, тъмъ болье, что Іолотапь отстоить отъ Мерва на 60 верстъ почти прямо къ югу и это даетъ замътную разницу въ томъ отношеніи, что посывъ хлопчатника тамъ начинается дней на 10—14 ранъе, чъмъ въ раіонъ города Мерва.

Предпосъвная поливка была произведена 18 марта. Было ясно п сравнительно тепло, такъ что съ 28 марта явилась возможность приступить къ пахотъ, а вслъдъ затъмъ къ боронованію и посъву. Съверная и южная части участка ръзко разнятся между собою по характеру почвы: на первой почва болъе легкая, болъе проницаемая для воды и скорве просыхающая, а на вгорой-чрезвычайно связанная, очень тяжелая и очень трудно пропускающая воду. Изъ-за этого нахота и посъвъ были начаты съ съверной части плантаціи, хотя вода туда для поливки была пущена полусутками позже. Какъ и всегда, на участкахъ, попадающихъ впервые подъ обработку евронейскими орудіями, почва оказалась сильно засоренной стеблевыми остатками, а главное, корнями и корневищами сорныхъ травъ (верблюжьей колючки, дурмана, чаира и др.); первую вспашку необходимо было сдълать по возможности основательную, и плуги (Сакка 6" и Аксай «Ас») были пущены на глубину отъ 4½ до 5 вершковъ Такая вспашка хорошо очищаеть почву, вырывая на поверхность корни многольтнихъ травъ, которые затъмъ стаскиваются бороною. Что же касается корневищъ чаира, то хотя они и ръжутся плугомъ на части и эти отдъльные куски дають жизнь новымъ растеніямъ, по послѣднія до наступленія пропашекъ не успѣваютъ сильно укорениться и борьба съ ними распашниками уже вполнъ возможна. Во всякомъ случав всв эти условія создали пахоту очень тяжелую, такъ что мъстами въ такіе сравнительно маленькіе плужки приходилось запрягать четверыхъ среднихъ лошадей.

Вслъдъ за вспашкой шли бороны въ два, три и даже четыре слъда, въ зависимости отъ засоренности почвы каждой отдъльной терраски. Посъвъ рядовой (съялками Баннера) производился замоченными въ тече-

ніе полусутокъ сѣменами мѣстнаго урожая, на глубину 1—1½ вершковъ. Было только сдѣлано отступленіе отъ установившагося порядка посѣва, а именно, въ виду недавней эксплоатаціи участка, остатковъ буйной сорной растительности, предполагавшагося достаточнаго плодородія почвы, междурядія вмѣсто обычныхъ 16—20 вершковъ были сдѣланы въ 24.

Посъвъ былъ законченъ 28 марта и весь комплектъ людей, лошадей и орудій былъ передвинуть къ Мерву на Таймазское поле.

4 апръля надъ Іолотанью прошелъ страшный ливень, причинивщій большія бъдствія, такъ какъ прорвался, переполнившись водою, магистральный наналъ всего приставства. Этотъ же ливень, между прочимъ, очень сильно забилъ только-что произведенный посъвъ. На съверной части плантаціи начали уже появлятья всходы, ряды можно было разобрать. а потому были пущены распашники «Планетъ» съ окучивающими лемешками. Послъ работы ихъ междурядія оказались углубенными, а ряды съ ръдкими всходами или совсъмъ безъ нихъ были присыпаны рыхлою землею, что предохранило глубже лежащую уплотненную ливнемъ землю отъ высыханія и затверденія, и всходы на этой части плантаціи впослъдствіи получились очень хорошіе, съ совершенно заполненными рядами.

На южной части плантаціи съ почвой болье связной и холодной всходовь еще не было. Всльдствіе очень мало проницаемой почвы, посль ливня вода стояла слоемь въ 1—1½ вершка, и сльдъ отъ съялокъ исчезъ, и распашники пустить было невозможно. Боронованіе же хотя и было произведено, но не объщало дать желаемыхъ результатовъ, такъ какъ почва была крайне уплотнена, и борона не шла въ землю и на ¼ вершка. Оставалось два исхода: или новый посъвъ, или поливка, Такъ какъ на все время посъва была уже намѣчена программа и ее нужно было точно выполнить, то отъ пересъва пришлось отказаться, такъ какъ движеніе обратно всего комплекта живого и мертваго инвентаря заняло бы не меньше 10 дней, и въ такомъ случаъ пришлось бы отказаться отъ посъва гдълибо въ другомъ мъстъ, между тъмъ здъсь часть участка была уже безусловно обезпечена всходами, и для показательнаго значенія не особенно важна была величина ея.

Къ поливкъ вскоръ посът посъва туркмены не прибъгаютъ почти никогда по очень основательной причинъ: сорныя травы, вырванныя при вспашкъ, завядаютъ нескоро и разъ будетъ дана вода, то онъ опять принимаются и дальнъйшая борьба съ ними при разбросномъ посъвъ почти невозможна. Поливкой имълось въ виду достичь той цъли, что поддерживая еще нъкоторое время поверхность земли во влажномъ, а значитъ, и въ болъе рыхломъ состояни, тъмъ самымъ дать возможность пробиться на верхъ всходамъ растеній.

Туркмены предупреждали не дѣлать этого, но надѣясь, что при рядовомъ посѣвѣ борьба съ сорными травами будетъ легче и по стоимости вполнѣ доступна, поливка была произведена чрезъ 14 дней послѣ посѣва. Кстати, въ это же время появился червь, подъѣдавшій молодые корни растеній, и поливка является наилучшимъ средствомъ противъ этого вредителя.

Результаты поливки получились слѣдующіе: вышеупомянутая сѣверная часть плантаціи съ хорошими всходами занимаеть по площади  $^{1}$ /з участка и южная  $^{2}$ /з. Изъ послѣдней послѣ поливки взошла половина (или  $^{1}$ /з отъ всей площади) наиболѣе ранняго сѣва и  $^{1}$ /з всей плантаціи почти не дала всходовъ. На ней какъ разъ заканчивался посѣвъ, и ливень засталъ сѣмена въ началѣ проростанія, когда они пробить слой уплотненной земли толщиною въ  $1-1\frac{1}{2}$  вершка оказались уже не въ состояніи.

Въ виду того, что дальнъйшія работы по уходу за хлопокомъ и по сбору урожая, работы самыя дорогія, легли только на оставшуюся площадь въ 3 десятины, разсчеть урожая сдъланъ на ту же площадь.

Обычно послѣ посѣва до первой поливки, не считая описанной выше предпосѣвной вынужденной поливки производится прорѣживаніе хлопка, затѣмъ пропашка съ мотыженіемъ въ рядахъ. Прорѣживаніе хлопка было произведено съ 20-го до 25 апрѣля. Дѣйствительно, сорныя травы начали развиваться буйно, и это вызвало въ промежутокъ отъ времени посѣва до 30-го мая, когда была сдѣлана первая поливка, двукратную пропашку съ мотыженіемъ въ рядахъ.

Благодаря хорошей веснъ, хлопокъ развивался отлично и ко времени 1-ой поливки появились уже ръденькие цвъты, но все-таки и послъ первой поливки сказались результаты поливки, данной до нея. Какъ только начала просыхать почва, были пущены распашники, но передъ второй поливкой все-таки пришлось сдълать еще одну пропашку.

Время наиболъе дружнаго цвътенія хлопчатника совпало съ половиной іюня и 25 іюня была сдълана вторая поливка.

Съ этого времени и до 10—12 іюля начались необыкновенныя даже для здѣшнихъ мѣстъ жары, и хлопокъ, обезпеченный водою до 2-ой поливки, росъ прямо на глазахъ. Никакія уже работы на немъ не были возможны, отдѣльные ряды сплелись совершенно и ко времени 3-й поливки, которал была дана 20 іюля, нерѣдко можно было видѣть отдѣльные участки съ хлопкомъ въ 3 арш. вышиною. Развитіе коробочекъ шло тоже очень быстро. Благодаря раннему посѣву, уже въ концѣ іюля появились открывающіяся коробочки, 15 августа была дана послѣдняя поливка. Въ это время коробочекъ, достигшихъ предѣльной величины, была такая масса, что кусты ломались подъ ихъ тяжестью.

Уборка была начата съ конца августа. Но, къ сожалѣнію, невозможность досмотрѣть за этою работою на всѣхъ плантаціяхъ, а съ другой стороны, близость поселка, позволяющаго сбывать недобросовѣстнымъ уборщикамъ собранный хлопокъ, сильно понизили дѣйствительный урожай съ плантаціи. Такую плантацію можно видѣть въ самые благопріятные годы, и то очень рѣдко, на маленькихъ ежегодно удобряемыхъ мюлькахъ, гдѣ хлопокъ по характеру культуры обращенъ почти въ огородное растеніе.

Объ этомъ можно было лишь судить потому, что первый сборъ на этой плаптаціи при личномъ надзорѣ далъ съ половины площади 15 мѣшковъ,

Окончаніе же 1-го сбора и 2-ой сборъ со всей площади безъ непосредственнаго наблюденія инструктора, объ'взжавшаго въ это врема другія девять плантацій, дали всего еще 13 м'вшковъ.

Дальній шій, болбе строгій надзоръ, не могъ уже дать особенныхъ результатовъ, такъ какъ главная масса товара была уже собрана. Хлопокъ былъ проданъ по одной цънъ весь, но съ условіемъ представить его съ подраздъленіемъ по уборкамъ.

Первыя три уборки, законченныя до мороза, были отсортированы на заводё первымъ сортомъ и дали 288 пуд. 12 фун., четвертая уборка, законченная 26 октября, дала 2-ой сортъ въсу 45 пуд., а всего съ плантаціи поступило 333 пуда 12 фунтовъ или 111 пуд. 4 ф. съ десятины.

## 2. Плантація на Таймасскомъ поль, близъ города Мерва.

Эта плантація находится въ 3-хъ верстахъ отъ города Мерва, вверхъ по правому берегу рѣки Мургаба и расположена на берегу послѣдняго. Подъ культурой участокъ лѣтъ около 6-ти и послѣдніе 3 года засѣвался хлопкомъ; общая площадь его 6 десятинъ, но планировка пока очень грубая. Раздѣлены эти 6 десятинъ на 47 площадокъ, и въ результатъ около ½ или ¼ всей площади пропадаетъ. Кромѣ того, есть котловины, на которыхъ хлопокъ вымокаетъ. Лишь съ декабря 1910 года было приступлено къ правильной выпланировкъ всего участка, которая обойдется отъ 350 до 400 рублей.

Почва легкая, быстро просыхающая. Преобладающая сорная трава бълый чаиръ, корневища котораго хотя и не укореняются очень сильно, но зато до крайности живучи.

Работы на этомъ участкъ начались со 2-го апръля непосредственно съ предпосъвной вспашки по политому 29 марта полю. Вспашка на  $3^{1}/_{2}$ —4 вершка, а посъвъ обычнымъ порядкомъ съ междурядіями въ 16—18 вершковъ. Посъвъ былъ законченъ 9 апръля и прошелъ весь при яспой и теплой погодъ. Всходы очень дружные и спльные. Вмъстъ съ нимъ взошли и сорныя травы.

Съ 25 апръля по 1-е мая хлопокъ былъ проръженъ. Разстоянія въ ряду давались въ 10—12 вершковъ. Вслъдъ за проръживаніемъ была сдълана пропашка междурядій и мотыженіе въ рядахъ. Послъ этихъ работъ нъсколько остановленный въ своемъ ростъ хлопокъ началъ очень быстро оправляться, но вскоръ опять появились сорныя травы, и въ концъ мая пришлось сдълать еще одну пропашку. Съ 5-го по 10-е іюня хлопокъ былъ политъ, а затъмъ, какъ только стала просыхать земля, пропаханъ и промотыженъ въ рядахъ. Передъ второй поливкой, бывшей съ 3-го по 9-е іюня, пришлось еще разъ пропахать и изъ-за сорныхъ травъ и изъ-за того, что время стояло очень жаркое, и хлопчатникъ сталъ страдать оть недостатка влаги.

Это же время совпало и съ наиболъе дружнымъ цвътеніемъ воз-

дълываемаго растенія.

Послѣ второй поливки хлопокъ замѣтно оправился и общій видъ имѣлъ хорошій. Было уже много коробочекъ, достигшихъ предѣльной величины. Третья и послѣдняя поливки были даны съ 3-го по 8-е августа. Къ половинѣ августа началось уже замѣтно открываніе коробочекъ, а съ 10 сентября было приступлено къ уборкѣ.

Хлопокъ, благодаря ясной и жаркой погодъ, открывался очень дружно. Первый заморозокъ былъ въ ночь съ 30-го сентября на 1-е октября, но безъ снъга и предшествующихъ дождей и, такимъ образомъ, хотя и остановилъ дальнъйшее развитіе хлопчатника, но на качество волокна вліянія не оказалъ. Вторая уборка была закончена 16 октября, 1-й и 2-й сборы были отсортированы, какъ 1-й сортъ. Собрано было сырца 323 пуда; третья уборка дала 39 пуд. 33 фунта, а всего 362 пуд. 33 фун., что дало 60 п. 19 ф. на десятину общей площади плантаціи, или около 90 пуд. на десятину.

## 3. Плантаціи на карендныхъ земляхъ.

На только что описанных двухъ плантаціяхъ всѣ закультивированные подъ хлопчатникомъ участки въ отдъльности были въ слишкомъ различныхъ условіяхъ и въ этихъ видахъ приходилось останавливаться на каждомъ изъ нихъ отдѣльно.

Всѣ же мелкія плантаціи на карендныхъ земляхъ при описаніи ихъ объединены въ одну группу по такимъ соображеніямъ: всѣ эти плантаціи орошаются за счетъ карендной воды и всѣ находятся въ одинаковыхъ условіяхъ, въ смыслѣ обезпеченія водою.

По окончаніи посѣва на Тармасскомъ полѣ, работы были передвинуты на плантаціи на карендныхъ земляхъ, приближаясь съ 11-го, по 28 апрѣля.

Всѣ работы выполнялись арендаторами-туркменами орудіями и машинами, предоставленными имъ инструкторомъ и по его указаніямъ.

Посъвъ былъ начатъ съ самыхъ верхнихъ участковъ по положенію, такъ какъ на нихъ раньше поступаетъ вода, но все-таки не обошлось безъ неудачъ, и на 3-ей плантаціи опоздали, земля простояла неполитой въ одномъ случать восемь, а въ двухъ шесть дней и слишкомъ пересохла. Порядокъ работъ былъ слъдующій:

- 1) Плантація на Тезанлійскихъ земляхъ Эвелебскаго мирабства— засѣяно 1½ десят.
- 2) Плантація на тѣхъ же земляхъ Хошардыкскаго мирабства засѣяно, вслѣдствіе опозданія, лишь около ½ десятины.
- 3) Плантація на Кесе-Ябскихъ земляхъ Кунгурскаго и Геокчинскаго мирабствъ, засъяно 3 десятины (2 келеме).
- 4) Плантація на тѣхъ же земляхъ Аманшанскаго мирабства—засѣяно, вслѣдствіе опозданія, 1 десятина.
- 5) Плантація на Кызылбайскихъ земляхъ Ахальскаго и Сычмазскаго мирабствъ—засѣяно 1½ десятины (2 келеме).
- 6) Плантація на тѣхъ же земляхъ Берсенскаго и Геокчарскаго мирабствъ—засѣяно вслѣдствіе опозданія 1 десятина.

Посъвъ на всъхъ участкахъ былъ произведенъ обычнымъ порядкомъ: вспашка плугомъ на глубину 3—3½ верш., боронованіе и посъвъ съялками Баннера, замоченными съменами на глубину 1—1½ вершковъ, съ междурядіями въ 16—18 вершковъ.

Весь посъвъ прошелъ при ясной и теплой погодъ, съмена проростали хорошо,—въ концъ апръля уже на четырехъ плантаціяхъ перваго посъва можно было видъть всходы.

Слъдующія работы на плантаціяхъ были начаты съ 20 мая въ томъ же порядкъ по расположенію ихъ. Была сдълана пропашка и проръживаніе хлопка съ выполкой въ рядахъ. По всъмъ плантаціямъ эти работы были закончены къ 5 іюня, а съ 1-го іюня по 8-е была про-изведена первая поливка, а вслъдъ за нею пропашка.

Этимъ и были закончены работы на плантаціяхъ, такъ какъ сорныхъ травъ было мало, хлопокъ развивался очень хорошо, и годъбылъ многоводный. Всего было дано 4 поливки: 2-я съ 28 іюня по 3-е іюля, 3-я съ 25 по 31 іюля и 4-я съ 20-го по 25 августа.

Урожай получился слъдующій:

1-я	Плантація:	1-го	сорт	a.	120	п.	11	ф.	2	сорта	3 п.	20 ф.
2-я	,,	,,	,,		25	,,	29	,,	,,	"	— "	- "
3-я	,,	,,	,,		183	"	10	,,	,,	٠,,	11 "	10 "
4-я	,,	,,	"		62	,,		"	,,	,,	2 "	2 "
5-я	,,	,,	"		129	,,	16	,,	- ,,	, ,,	4 "	22 "
6-я	,,	,,	,,		78	"	23	,,	,,	,,	"	"

что даетъ по разсчету на десятину для первой плантаціи 82 п. 13 ф., для 2-й—51 п. 18 ф., для 3-ей—64 п. 30 ф., для 4-й—64 п. 2 ф., для 5-й 89 п. 12 ф. и для 6-й—78 п. 23 ф.

Распредъленіе хлопка по сортамъ очень удачное. Въ виду того, что хлопокъ былъ отобранъ очень тщательно и отсортированъ по уборкамъ, на торгахъ, когда продавался весь карендный хлопокъ, по просьбъ инструктора хлопокъ показательныхъ плантацій былъ выдъленъ въ отдъльную партію и проданъ по самой высшей цънъ въ уъздъ, по 4 р. 85 к. за пудъ.

Необходимо еще сказать нъсколько словъ уже о болъе или менъе замътныхъ результатахъ показательныхъ плантацій среди туркменъ.

Съ 1 ноября открыто въ Мервъ подъ завъдываніемъ инструктора отдъленіе Асхабадскаго склада земледъльческихъ орудій, и уже получено 5 заказовъ исключительно отъ туркменъ на рядовыя съялки.

Сверхъ того, къ инструктору обращается масса желающихъ работать на предлагаемыхъ имъ условіяхъ, и вообще съ каждымъ годомъ развивается интересъ къ тѣмъ мѣропріятіямъ, которыя дали бы возможность бороться съ сорными травами во время роста хлопчатника, позволили бы довести количество поливокъ до минимума.

Условія прошлаго 1909 года, а особенно отчетнаго, какъ нельзя болѣе содѣйствуютъ этому. Климатическія условія были весьма благопріятны, вредителей почти не замѣтно, а цѣны даннаго года превзощли все, что было до сихъ поръ. Къ сожалѣнію, туркмены хотѣли продать хлопокъ еще дороже, задержали его въ аулахъ, перемѣшали всѣ сорта, и товаръ получился невысокаго качества съ очень низкими выходами. Хлопокъ большими партіями былъ проданъ лишь во второй половинѣ ноября, по установившейся въ то время цѣнѣ около 4 р. 50 к. за пудъ, и давалъ 1 пудъ чистаго волокна изъ 3 пуд. 20—25 фун. сырца.

ими и деприяван диноком ании, канени сеоторо диничником У

# Описаніе способовъ измітренія длины волокна хлопка.


А. Е. Любчонко.

Какъ въ практикъ русскаго хлопководства, такъ и въ спеціальной литературъ ощущается недостатокъ въ болѣе или менѣе точныхъ методахъ изслъдованія волокна хлопка. Идя на встрѣчу этой потребности, полагаю, что своимъ методомъ и описаніемъ американскаго могу нъсколько удовлетворить ее. Работы студентовъ Московскаго С.-хоз. Института подъ моимъ руководствомъ съ графическимъ методомъ даютъ благопріятные результаты. Приборъ, предлагаемый мною для этого, очень простъ, не дорогъ и можетъ быть вездъ сдъланъ безъ особыхъ затрудненій. Возможно, что въ будущемъ придется нъсколько видоизмѣнить его. Такъ, и теперь уже выяснилось, что желательно было бы увеличить его рабочую поверхность и сдълать приспособленіе для болѣе удобнаго сниманія рамки съ доски. Но это конечно сути не измѣняеть.

### Способы измѣренія длины волокна хлопка.

У различныхъ сортовъ хлопка длина волокна различна, и колебанія ея достигають въ нѣкоторыхъ случаяхъ 20 и больше миллиметровъ. Но если ближе присмотрѣться, то мы увидимъ, что даже въ одномъ и томъ же сортѣ, скажемъ больше, въ одной коробочкѣ и даже на одномъ сѣмени находится волокно различной длины: отъ очень короткаго до весьма длиннаго. При опредѣленіи качества волокна какого-нибудь сорта очень важно знать не только его среднюю длину, но и дѣйствительныя колебанія ея отъ самыхъ короткихъ волоконъ до самыхъ длинныхъ. Опредѣленіе это имѣетъ весьма важное значеніе какъ для селекціи, такъ и для хлопковода, ибо длина волокна играетъ большую роль въ его рыночной оцѣнкѣ съ одной стороны и въ промышленности—съ другой.

І. Графическій способъ. Для опредѣленія длины волокна существуетъ много различныхъ способовъ какъ въ Америкѣ, такъ и въ Россіи. Предлагаемый мною способъ измѣренія длины волокна основанъ на стремленіи точно установить колебанія длины не только въ одномъ сортѣ, но въ одной долькѣ и даже въ одномъ сѣмени, что, какъ уже сказано, должно имѣть громадное значеніе и въ вопросахъ селекціи, и само собой разумѣется, въ опредѣленіи качества волокна даннаго сорта. Этотъ способъ даетъ кромѣ maximum'a и minimum'a длины волокна, еще и возможность установить, какія сѣмена въ долькѣ отли-



чаются наименьшими колебаніями длины при ея наибольшей средней, чъмъ можно было бы руководствоваться при улучшеніи сортовъ.

Сущность способа заключается въ слъдующемъ. Берется нъсколько долекъ изъ разныхъ коробочекъ, и изслъдуются всъ съмена каждой дольки въ порядкъ ихъ залеганія въ долькъ, начиная снизу, какъ показано на рис. 1.

Установивъ, какое сѣмя является среднимъ въ долькѣ, отбираемъ отъ сырца возможно большее число долекъ уже разныхъ коробочекъ, не меньше двадцати, и беремъ изъ каждой дольки по одному сѣмени, являющимуся среднимъ для даннаго сорта, и всѣ ихъ изслѣдуемъ. Такимъ образомъ, у насъ получатся изслѣдованія

нъсколькихъ долекъ полностью и свыше двухъ десятковъ единичныхъ (среднихъ) съмянъ изъ разныхъ долекъ. Этого числа изслъдованій достаточно, чтобы судить о длинъ волокна даннаго сорта, хотя, конечно, желательно возможно больше измъреній.

Способъ опредъленія длины. Вынутое изъ дольки съмячко опушено по всей поверхности волоконцами различной длины. Обыкновенно у съуженнаго конца съмени волокно короче, чъмъ у противоположнаго.

Волокно расчесывается по длинъ съмени гребешкомъ, сначала ръдкимъ, потомъ частымъ такъ, чтобы всъ волоконца приняли направленіе, перпендикулярное къ периферіи съмени, какъ показано на рис. 1, и переносится на спеціальный приборъ. Этотъ приборъ состоитъ изъ чернаго бархата, натянутаго на рамки, которыя накладываются плотно на дощечку. На дощечку предварительно кладется листикъ чистой бумаги, покрываемый сверху копировальной. Когда приборъ составленъ и на него положено расчесанное съмячко, волокна послъдняго слегка еще расчесывають на бархать для выпрямленія длины волоконець. Послъ этого отмъчаютъ карандашемъ или иглой концы волоконъ въ точкахъ а, b, с и d, а затъмъ, придерживая съмячко пинцетомъ, обкалывають его иглой, стараясь держать иглу перпендикулярно къ прибору. На листъ бълой бумаги прибора получится отпечатокъ четырехъ точекъ и проэкція съмени (рис. 3). Соединивъ точки а и в, с и д прямыми, а пунктиръ съмячка кривой, получимъ очертание или контуръ съмени и длину его волоконъ по четыремъ направленіямъ, рис. 4. Помощью миллиметровой линейки измъряется длина волоконъ отъ точекъ a, b, c и d до периферіи съмени. Полученныя четыре числа даютъ максимумъ и минимумъ длины волокна, а сложивъ ихъ и раздёливъ на четыре, будемъ имъть и среднюю длину. Одновременно производится изм'вреніе такого числа с'вмянъ, сколько ихъ можетъ умъститься на приборъ. Въ результатъ на листикъ бумаги прибора получится цълый рядъ діаграммъ по числу изслъдованныхъ съмянъ.

На листикъ ставится названіе сорта хлопка, мъстности и годъ урожая, а на оборотъ по желанію можно подписать названіе испытательной станціи, время изслъдованія, имя изслъдователя.


Имъ́я цъ́лый рядъ такихъ діаграммъ можно составлять таблицы и дълать выводы по характеристикъ изслъ́дованнаго сорта. Для удобства и скорости измъренія длины линій діаграммъ къ линейкамъ придъланы ручки.

Одновременно съ измъреніемъ длины волокна можно производить измъреніе и величины съмянъ по тъмъ же діаграммамъ, именно ихъ длину и толщину.

Иногда бываеть, что максимумъ длины волоконъ, окаймляющихъ съмя, не совиадаеть ни съ однимъ изъ указанныхъ направленій по линіямъ ab и cd, тогда его отмъчають на приборъ точкой е, рис. 5,

но при этомъ слъдуеть непремънно отмътить и противоположную ей точку f, чтобы избъжать погръшности въ сторону увеличенія средней длины волокна.

Въ этомъ случаћ, для полученія средней, берутся всѣ шесть измѣреній. Вообще, чѣмъ больше будетъ взято точекъ, тѣмъ точнѣе



получится средняя величина длины, хотя можно съ увъренностью сказать, что вполнъ достаточно ограничиться четырьмя измъреніями, если тахітит совпадаеть съ однимъ изъ нихъ, и шестью—если онъ не совпадаетъ. Мінітит всегда приходится въ сторону точки с,

Рис. 6. а-съмя хлопчатника, в-волокно.

Рис. 5. (Triumph—Андиж. оп. п.).

Итакъ, въ конечномъ результатъ этого способа мы имъемъ графическое изображение съ числовыми данными длины и толщины съ-

мени, тахітит, тіпітит и средней длины волокна, являющимися однимь изъ весьма важныхъ характерныхъ признаковъ испытуемаго сорта хлопка. Конечно, чѣмъ больше будетъ произведено опредѣленій, тѣмъ ближе можно подойти къ истинѣ и тѣмъ болѣе точные выводы можно сдѣлать по характеристикѣ сорта хлопка въ цѣляхъ ли его культуры, и или въ интересахъ хлопководовъ и промышленности.

Если же къ полученнымъ измѣреніямъ добавить еще и опредѣленіе толщины и скрученнности волокна, вѣсъ сырца, сѣмянъ и чистаго волокна и, паконецъ, крѣпость волокна, то тогда уже получится почти полная характеристика сорта.

**ІІ.** Американскій способъ. По послѣднимъ, имѣющимся у насъ литературнымъ свѣдѣніямъ изъ Америки за 1910 годъ, тамъ среди многихъ способовъ опредѣленія длины волокна примѣняется слѣдующій, считающійся наиболѣе точнымъ.

Отъ образчика, подлежащаго изследованію, выбирають отъ 10 до 20 долекъ сырца, и изъ средины каждой дольки берется одно съмячко. Съмячко расчесывается въ видъ бабочки, рис. б. Изъ средины одной стороны выдергивается пучекъ волоконъ и кладется на подушечку изъ чернаго вельветина. Основаніе пучка крѣпко прижимается къ вельветину большимъ пальцемъ, а весь пучекъ расчесывается маленькимъ гребешкомъ. Этимъ достигается выпрямленіе полной длины и устраняется спутанность и перекрывание волоконецъ, могущія дать ложное изм'треніе длины волокна особенно у длинноволокнистыхъ сортовъ. Помощью пинцета проводятся линіи у концовъ пучка, при чемъ уничтожается бахромчатость и уравнивается по возможности средняя длина волоконецъ пучка. Разстояніе между линіями двухъ концовъ пучка изм'яряется помощью миллиметровой линейки. Эти измъренія показывають скоръе среднія, чъмъ крайнія длины и часто бывають меньше, чъмъ обыкновенно измъренія джинированнаго волокна, такъ какъ при измъреніи послъдняго исключаются всъ короткія волоконца и берутся одни только длинныя.

Описанный американскій методъ является одностороннимъ, но правда, болѣе простымъ и скорымъ при опредъленіи одной только средней длины, и ужъ, конечно, не даетъ такой полной характеристики длины хлопковаго волокна, какъ графическій методъ. Употребленіе американскаго метода можетъ съ большимъ успѣхомъ примѣняться при массовыхъ изслѣдованіяхъ сорта хлопка въ интересахъ рынка, тогда какъ графическій будетъ имѣть мѣсто во всякихъ изслъдованіяхъ и прежде всего при селекціонныхъ работахъ.

Въ работахъ студентовъ М. С.-х. Института по сравнительному изслъдованію сортовъ русскаго и американскаго хлопка введены мною оба метода, какъ первый—графическій, такъ и американскій. Послъдній производится на томъ же бархатномъ приборъ вмъсто вельветиновой подушечки, только въ приборъ не закладывается бумага, а получаемыя измъренія заносятся непосредственно въ тетрадь. Потомъ производится сравненіе данныхъ обоихъ методовъ.

Относительно возможной неточности графическаго способа а priori можно сказать, что она не превысить половины иглы, которой обкалывается съмя. О неточностяхъ, вызываемыхъ субъективной оцънкой каждаго изслъдователя, говорить нельзя, а по сравненію съ ними неточность отъ примъненія иглы—ничтожна. Но при навыкъ и болъе тщательномъ проектированіи контура съмени, и этого можеть не быть. Можно было бы рекомендовать вмъсто обкалыванія измъреніе длины и толщины съмянъ особымъ приборчикомъ, употребляющимся въ селекціи съмянъ, и полученныя величины вычитать изъ длины ав и сф. Но это кажется совершенно излишнимъ, тъмъ болъе, что сопряжено съ обдираніемъ волокна отъ съмянъ и, кромъ того, съмена хлопка въ своемъ поперечномъ съченіи не отличаются одинаковостью толщины.

Графическій методъ, какъ пришлось убѣдиться на практикѣ, цѣненъ тѣмъ, что длина хлопковаго волокна фиксируется на бумагѣ и измѣренія приходится дѣлать также на бумагѣ, а не съ натуры. Вслѣдствіе этого всегда есть возможность, во-первыхъ, болѣе точно производить измѣренія и во-вторыхъ—всегда и во всякое время можно провѣрить и возстановить по остающимся діаграммамъ правильность сдѣланныхъ измѣреній. При всякомъ же другомъ способѣ такой возможности уже не представиться за отсутствіемъ измѣренныхъ образцовъ.