0m2 11477 1179



630

# ОТЧЕТЫ

о состоянии и дъятельности

# опытныхъ хлопковыхъ учрежденій

въ Туркестанъ и Закаспійской области въ 1911 году.

- 1. Голодностепское опытное поле, Самаркандской области.
- 2. Андижанское опытное поле, Ферганской области.
- 3. Асхабадское опытное поле, Закаспійской области.

Выпускъ VI.

ПЕТРОГРАДЪ. Типографія Акц. Общ. Тип. Дѣла, 7 рота, д. 26. 1914.





# V 477

# ОТЧЕТЫ

о состояни и дъятельности

# опытныхъ хлопковыхъ учрежденій

въ Туркестанъ и Закаспійской области въ 1911 году.


- 1. Голодностепское опытное поле, Самаркандской области.
- 2. Андижанское опытное поле, Ферганской области.
- 3. Асхабадское опытное поле, Закаспійской области.


Выпускъ VI.



ПЕТРОГРАДЪ. Типографія Акц. Общ. Тип. Дѣла, 7 рота, д. 26. 1914.

# Метеорологическія условія Голодностепскаго опытнаго поля въ 1910 году.





# ОГЛАВЛЕНІЕ.

									CTP.
1. Γο	подностепское Опытное Поле въ 1911 году. Отчет полемъ М. М. Бушуева	ьа	авт	вды	ва	Ю 11	цаі	0.	CII.
	Общій обзоръ дъятельности Опытнаго Поля въ	191	1 г	оду					5
	О культуръ риса								5
	Новый вредитель								9
	Вліяніе заморозковъ				0.1				9
	Метеорологическія условія въ 1911 году								23
	Барометрическое давленіе	Δí,							24
	Вътры	m.							24
	Температура воздуха и почвы								24
	Число часовъ солнечнаго сіянія, облачност	гь,	pa	ıiar	ція				31
	Осадки, испареніе, влажность воздуха.								33
33	Фенологическій календарь за 1911 годъ					,			40
	Лабораторныя работы								47
	Вегетаціонные опыты								58
	Полевые опыты вт. 1911 году								64
	Основной съвооборотъ								65
	1100СТОИ 4-ХЪ-ПОЛЬНЫЙ СВВООООООТЬ								79
	2-хъ польный съвообороть				1	117.			80
	Опыты на поляхъ американскаго 4-хъ-по-	лья				1			81
	Озимая ишеница			٠.	mia.				82
	Машъ		1 VIV						86
	Рисъ		BUIT						87
	Хлопчатникъ								87
	Культура кукурузы				1.				102
	Селекціонный участокъ				0				105
	Стебутовскій 3-хъ-польный съвооборотъ								111
	8-ми-польный промышленный съвооборот:								115
	Опыты по вліянію удобреній на люцерну								117
	Вотаническій питомникъ			Pio	9.4				118
	Плодовый садъ и огородъ								118
	Стадо молочнаго скота								119
	Спунный пункть								120

	Показательное хозяйство кр. Кузьмы Ретунскаго въ 1911 году
	Дъятельность прокатнаго пункта при опытномъ полъ въ Голодной
	Степи въ 1911 году
	Поврежденіе хлопчатника, люцерны, маша, свеклы и др. растеній
	гусеницами карадрины (Caradrina exigua) въ Голодной
	Степи
) A	Андижанское опытное поле въ 1911 году. Отчетъ завъдывающаго по-
. r	лемъ А. Я. Мухина.
	Метеорологическія условія въ 1911 году
	Хлопчатникъ
	Опыты съ удобреніемъ
	Опыты со способомъ посадки
	Опыты съ поливками
	Сравненіе сортовъ хлопчатника.
	Опыты съ чеканкой
	Вліяніе предшествующихъ растеній
	Опыты съ глубиной задълки съмянт
	Опыты съ листеромъ
	Опыты испытанія константности свойствъ разныхъ сортовъ
	хлопчатника
	Продовольственныя и кормовыя растенія
	Кукуруза и свекла
	Машъ
	Озимый ячмень и овесъ
	Люцерна
	Ворсянка
	strong a second control of the second contro
3. F	Асхабадское опытное поле въ 1911 году. Отчетъ завъдывающаго по-
	лемъ П. А. Козика.
	Метеорологическія условія
	Опыты съ пшеницей
	Опыты съ подсолнечникомъ, кормовой тыквой и кукурузой
	Вобовыя
	Шабдаръ
	Люцерна
	Хлопчатникъ
	Сравненіе сортовъ хлопчатника
	Опыты съ разстояніемъ между кустами и числомъ растеній
	въ кустъ
	Вліяніе удобреній
	Опыты съ числомъ поливокъ и временемъ ихъ
	Объясненія къ плану опытнаго поля

## Голодностепское Опытное Поле

въ 1911 году.

Отчетъ завъдывающаго полемъ М. М. Бушуева.

Въ отчетномъ 1911 году Голодностепское Опытное Поле жило повышеннымъ темпомъ по сравненію съ прошлыми годами. Опытныя работы велись значительно больщимъ числомъ лицъ; въ оборудованіи Опытнаго Поля сдѣланы существенныя улучшенія; такъ, устроенъ новый хлопкоочистительный заводъ съ двигателемъ Горнсби и 60-пильнымъ джиномъ Карвера; благодаря экономіи расхода топлива и большей производительности работы этихъ машинъ, очистка хлопка могла производиться быстрѣе и дешевле. Въ концѣ года были отпущены средства (1930 руб.) на постройку лаборагоріи и на оборудованіе ея химическими приборами и матеріалами; для пріобрѣтенія послѣднихъ былъ командированъ въ Москву агрономъ В. С. Малыгинъ.

Нововведеніемъ является также открытіе при Опытномъ Пол'є, на ряду съ отд'єленіемъ склада, прокатнаго пункта, который съ первыхъ же шаговъ началъ хорошо работать, особенно по выдач'є крестьянамъ хлопковыхъ с'єялокъ и пропашниковъ для хлопчатника.

Съ мая мъсяца на Опытномъ Полъ учреждена должность помощника завъдывающаго полемъ, которую занялъ агрономъ В. С. Малыгинъ, хорошо знакомый съ голодностепскими условіями, благодаря участію, въ качествъ почвовъда, въ экспедиціи Н. А. Димо по обслъдованію вновь орошаемыхъ районовъ Голодной Степи. Число временныхъ сотрудниковъ - практикантовъ на Опытномъ Полъ возрасло до 4-хъ (вмъсто прежняго 1-го); каждый изъ нихъ внесъ свою лепту въ общую работу Опытнаго Поля, но особенно должна быть отмъчена энергичная и тщательная

работа практиканта В. К. Смирнова — студента Московскаго сел.хоз. института, не знавшаго устали, проводившаго на поляхъ
цълые дни подъ палящими лучами туркестанскаго солнца,
рисковавшаго на своемъ рисъ (входившемъ въ порученный ему
съвооборотъ) захватить малярію.

Въ концъ практики на Опытномъ Полъ два практиканта В. Г. Черновъ и П. Д. Дерябинъ были назначены инструкторами по хлопководству — одинъ въ Ташкентскій уъздъ, а другой въ Чимкентскій, Сыръ-Дарьинской области.

Въ 1911 году Опытное Поле расширило свою практическую работу, связанную съ агрономической помощью населенію; въ этихъ цъляхъ:

- 1) расширенъ хлопкоочистительный заводъ, для котораго вмъсто 25-пильнаго джина пріобрътенъ новый 60-ти-пильный, системы Карвера и, кромъ того, новый 9-сильный моторъ Горнсби; джинъ обошелся 575 рублей, а моторъ въ 1800 рублей;
- 2) съ февраля мѣсяца открытъ прокатный пунктъ сель.-хоз. машинъ, главнымъ образомъ для машинюй обработки хлопчатника;
- 3) пріобрътенъ для случного пункта жеребецъ рысистой породы;
- 4) увеличенъ ассортиментъ сел.-хоз. орудій, главнымъ образомъ американскихъ, при отдѣленіи склада сельск.-хоз. орудій для продажи крестьянамъ;
- 5) помимо показательнаго крестьянскаго хозяйства, находящагося въ въдъніи опытнаго поля, предположено организовать у сосъдей крестьянъ коллективные опыты съ удобреніемъ хлопчатника;
- 6) составлена смѣта на сѣменную хлопковую плантацію при Опытномъ Полѣ (на землѣ, до сего времени сдававшейся въ аренду) и на школу сел.-хоз. рабочихъ, съ цѣлью подготовки десятниковъ и сел.-хоз. смотрителей для будущаго голодностепскаго хлопковаго района;
- 7) наконецъ, въ связи съ преобразованіемъ Опытнаго Поля въ сел.-хоз. станцію, были испрошены средства на оборудованіе агрономической лабораторіи при опытномъ полѣ; въ счеть этого въ концѣ года было отпущено 1930 рублей на пристройку 2 лабораторныхъ комнатъ.

Въ порядкъ преобразованія метеорологической станціи Опытнаго Поля въ высшій разрядъ и въ цъляхъ производства болъє детальныхъ параллельныхъ наблюденій на такъ называемомъ

наблюдательно-ботаническомъ питомникѣ, съ 1911 года Опытное Поле обзавелось англійской метеорологической будкой, поставленной въ 60 саж. отъ русской будки, и слѣдующими приборами: самопишущимъ-термографомъ, барографомъ, гигрографомъ, геліографомъ Величко; несамопишущимъ анемометромъ и для взятія образцовъ почвы на влажность, кромѣ бура Яновчика, буравомъ Болькена и друг.

Съ увеличеніемъ работы наблюдателя и расширеніемъ денежной отчетности, связанной съ дъятельностью прокатнаго пункта, склада машинъ и проч., Опытному Полю пришлось нанять, помимо наблюдателя, раньше исполнявшаго иногда и обязанности переписчика, особаго конторщика съ жалованьемъ въ 40 рублей въ мъсяцъ.

Въ 1911 году Опытное Поле участвовало экспонатами на двухъ выставкахъ: въ Ташкентъ — по садоводству и огородничеству и въ С.-Петербургъ — по съменоводству (Съвернаго селхоз. Общества); на первой выставкъ, между прочимъ, было впервые экспонировано и тъсколько сортовъ голодностепскихъ винъ (изъ винограда Опытнаго Поля) и плодовое вино, а на второй — главнымъ образомъ продукты хлопчатника съ діаграммами по урожайности различныхъ сортовъ хлопчатника и проч.).

Въ цѣляхъ распространенія свѣдѣній о результатахъ работъ Опытнаго Поля, завѣдывающимъ Опытнымъ Полемъ М. М. Бушуевымъ помѣщены слѣдующія статьи въ журналѣ «Туркестанское сел. хоз.»: 1) Поврежденія хлопчатника, люцерны и проч. гусеницами; 2) О хлопководствѣ у русскихъ крестьянъ въ Голодной Степи; 3) О почвахъ Туркестана и о хозяйствѣ сартовъ; 4) По хлопковымъ районамъ Туркестана; кромѣ того помощникомъ завѣдывающаго опытнымъ полемъ помѣщена въ справочникѣ по выставкѣ статья «О плодоводствѣ въ Голодной Степи».

Въ смыслъ прямого воздъйствія Опытнаго Поля на мъстное хозяйство, слъдуетъ указать на снабженіе крестьянъ съменами хлопчатника лучшихъ сортовъ, отчасти кукурузы, и дъятельность прокатнаго пункта сел.-хоз. орудій и машинъ. Частыя посъщенія Опытнаго Поля крестьянами и другими лицами, а кромъ того письменныя обращенія за совътами по сельскому хозяйству относятся также къ категоріи пропаганды выводовъ Опытнаго Поля.

Разумвется, Голодностепское Опытное Поле не можетъ похвалиться организаціей сколько-нибудь детальныхъ систематическихъ пріемовъ распространенія опытныхъ данныхъ среди населенія; для этого у него не достаетъ средствъ и времени. Въ будущемъ, когда здёсь организуется опытная станція, этоть вопрось должень быть поставленъ серьезнъе. американская система распространенія кажется, OTP сел.-хоз. свъдъній вполнъ отвъчаеть жизненнымъ ваніямъ, и ее слъдовало бы проводить и у насъ. Въ Америкъ, какъ извъстно, спеціальныя знанія пропагандируются при помощи, во 1-хъ, фермерскихъ институтовъ, подъ которыми разум'ьются 3-дневныя лекціи въ различныхъ м'ьстахъ штата, устраиваемыя профессорами агрономическихъ колледжей, сотрудниками опытныхъ станцій и спеціалистами; эти странствующіе лектора обычно приглашаются представителями фермерскихъ сел.-хоз. обществъ, озабочивающихся при этомъ подысканіемъ пом'вщенія для лекцій, разсылкой плакатовъ и объявленій; во 2-хъ, при помощи подвижныхъ школъ по сельскому хозяйству, которыя обычно устраивають курсы по отдёльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства (по сыроваренію, кукурузовъдънію и пр.) и, продолжаясь около 2 недёль, ограничивають число слушателей 10—15 лицами, согласившимися прослушать весь курсъ и пройти относящіяся сюда практическія занятія; эти школы обычно оборудованы необходимыми аппаратами, книгами, пособіями (такое оборудованіе обходится 800—1000 рублей); наконецъ, въ 3-хъ, при помощи выставокъ, и сел.-хоз. чтеній съ туманными картинами, а также устройствомъ коллективныхъ опытовъ съ сортами, удобреніями, способами поства и другими пріемами веденія хозяйства, уже испытанными на опытныхъ учрежденіяхъ и давшими положительные результаты.

Съ осуществленіемъ въ 1913 году проекта преобразованія Голодностепскаго Опытнаго Поля върайонную сельско-хозяйственную станцію, повидимому, могутъ быть предприняты попытки къ осуществленію нѣкоторыхъ изъ указанныхъ пріемовъ распространенія сел.-хоз. данныхъ и въ районѣ дѣятельности опытной станціи (Ходжентскій и Джизакскій уѣзды, Самаркандской обл.).

Осенью 1911 года (съ 1 сентября по 19 декабря) завъдывающій Опытнымъ Полемъ г. Бушуевъ былъ командированъ на Кавказъ и въ Египетъ (вмъстъ съ агрономомъ Н. П. Таратыновымъ) иля изученія культуры хлопчатника, и, несмотря на такой

короткій срокъ эта командировка дала очень цѣнные результаты, позволивъ командированнымъ лицамъ ознакомиться съ нѣкоторыми важными пріемами селекціи хлопчатника, со способами борьбы съ солонцами въ Египтѣ и проч.

## Общій обзоръ д'вятельности Опытнаго Поля въ 1911 году.

Дъ́ятельность Голодностепскаго Опытнаго Поля въ 1911 году слагалась изъ работъ:

- 1) по полеводству съ хлопководствомъ, селекціи и по ботаническому питомнику;
  - 2) лабораторныхъ-съ вегетаціонными опытами;
  - 3) метеорологическихъ и фенологическихъ наблюденій;
  - 4) по саду, огороду, пасъкъ;
- 5) общихъ регистраціонныхъ работъ по хозяйству, съ включеніемъ промышленныхъ сѣвооборотовъ, аренднаго участка, стада молочнаго скота;
  - 6) по прокатному пункту и складу сел.-хоз. машинъ;
- 7) по крестьянскому показательному хозяйству въ Голодной Степи.

1911 годъ, бывшій для всего Туркестана неурожайнымъ по хлопку, отличался значительными особенностями въ отношеніи работъ Голодностепскаго Опытнаго Поля. За этотъ годъ пришлось въ предѣлахъ Опытнаго Поля ближе ознакомиться съ вліяніемъ культуры риса и значеніемъ ея при возникновеніи маляріи; изучить новаго вредителя полевыхъ растеній, явившагося на смѣну саранчѣ, — карадрину; вновь прослѣдить вліяніе на хлопчатникъ раннихъ сентябрьскихъ морозовъ и проч. Всѣ эти вопросы, вслѣдствіе своего большого значенія, заслуживаютъ особаго вниманія, и поэтому они выдѣлены изъ общаго отчета.

О культурѣ риса. Какъ извѣстно, почвы Опытнаго Поля принадлежитъ къ типу осолоненныхъ среднихъ и тяжелыхъ лессовыхъ суглинковъ; въ районѣ Опытнаго Поля еще до орошенія его были, очевидно, первичные солонцы; съ проведеніемъ же канала Императора Николая I и послѣдующаго орошенія поля, какъ всегда бываетъ въ орошаемыхъ районахъ, съ высоко поднятыми грунтовыми водами и отсутствіемъ дренажа, солонцевыя пятна начали, такъ сказать, расплываться, увеличивая площадь непри-

годныхъ для культуры земель. Въ 1911 году, опредъляя на всвхъ поляхъ сввооборотовъ Опытнаго Поля площадь солонцевыхъ пятенъ, мы нашли, что въ общемъ она равна для всвхъ полей около 14%, т. е. на каждую десятину посъва приходится 1/7 дес. солонцевыхъ плъшинъ, незанятыхъ культурами. Примъняя различные способы палліативной борьбы съ солонцами, мы послъ ряда опытовъ пришли къ заключенію, что только выравниваніе повышеній — бугровъ на солонцевыхъ поляхъ при помощи конныхъ лопатъ и послъдующее смывание солей значительнымъ количествомъ воды обезпечиваютъ возможность культуры различныхъ растеній на прежнихъ солонцахъ; самое промываніе приходится пріурочивать или къ поздней осени и зимъ, когда оросительная вода не нужна для посъвовъ, или ко второй половинъ вегетаціоннаго періода, но съ условіемъ занятія поля культурой растеній, выдерживающихъ значительную влажность почвы. Такими растеніями являются рисъ и курмакъ (Parnicum Crus Galli).

Въ 1911 году на Опытномъ Полѣ былъ произведенъ посѣвъ риса на двухъ поляхъ, отличавшихся значительнымъ распространеніемъ солонцевыхъ пятенъ, при чемъ посѣвъ риса былъ пріуроченъ къ началу іюня — послѣ уборки на этихъ поляхъ озимаго ячменя и пшеницы. Слѣдуетъ сказать, что въ Туркестанѣ высѣвается разновидность посѣвного риса (Огуzа sativa), именно болотнаго. Попытка сѣятъ суходольный нагорный рисъ въ Туркестанѣ не увѣнчалась успѣхомъ, такъ какъ оказалось, что онъ требуетъ лишь немного меньше воды, чѣмъ болотный, и даетъ малый урожай. Здѣсь наиболѣе распространены слѣдующіе сорта этой разновидности риса: акъ-шалы, арпа-шалы, кизилъ-шалы и кара-калтыкъ.

Самымъ скороспѣлымъ и урожайнымъ сортомъ является арпашалы, созрѣвающій въ 90 дней, и потому этотъ сортъ можетъ высѣваться вторымъ растеніемъ послѣ снятія озимаго (конецъ мая — начало іюня), тогда какъ остальные сѣются въ концѣ апрѣля. Въ условіяхъ Опытнаго Поля (въ сѣвооборотѣ) возможно было культировать рисъ только послѣ уборки озимаго хлѣба, и потому въ 1911 году посѣянъ былъ исключительно скороспѣлый сортъ арпа-шалы. Рисомъ было занято ½ десят. на 1 полѣ простого 4-хъ-полья по уборкѣ ячменя и ½ десят. 4-го поля американскаго сѣвооборота; на томъ и другомъ полѣ рисъ былъ посѣянъ сѣменами, мочеными 3 сутокъ въ водѣ,

по расчету 7 пуд. на десятину. До посъва поля были вспаханы, проборонены, разбиты валиками на небольшія дълянки, площадью въ 60-80 кв. саж.; предварительно по нимъ два дня пропускалась постоянно оросительная вода (постояннымъ токомъ) со спускомъ первыхъ водъ въ отводящій арыкъ, при посъвъ выходное и приводящее отверстіе закрывались, чтобы съмена риса не сносило водой, и въ такомъ видъ оставляли воду слоемъ въ 2-3 верш., для того, чтобы она впиталась. До появленія всходовъ оросительная вода, въ цёляхъ опыта, напускалась различно на отдёльныя дёлянки, на 1-хъ дёлянкахъ рисъ поливался ежедневно, на 2-хъ черезъ день, на 3-хъ черезъ 2 дня и на 4-хъ черезъ 3 дня. Посъвъ риса произведенъ 4 іюня; всходы появились 9 іюня; цвътеніе началось 3 августа; восковая спълость отмъчена 22 августа, а полная — 28 августа; послъ этого 29 августа вода была спущена, и 10—12 сентября произведена уборка риса серпами. Такимъ образомъ, вегетаціонный періодъ длился для нашего риса 3 мѣсяца.

Урожай риса получился слъдующій (на десятину):

								36	ерна.	Сол	юмы.	<sub>0/0</sub> зерна.
1)	на	дълянк.	СЪ	ежедн.	поливк	ой		49	пуд.	92	пуд.	$53^{0}/_{0}$
2)	"	<b>"</b>	"	поливк.	черезъ	1	день	35	"	74	"	$47^{0}/o$
3)	"	"	"	,,	"	2	дня	103	"	172	"	$60^{0}/o$
4)	"	"	"	,,	,,	3	"	75	"	144	"	$52^{0}/_{0}$
				w Tani j	Въ сред	цне	емъ.	65	пуд.	120	пуд.	<b>53</b> <sup>0</sup> /o

Хотя цифры урожайности на разныхъ дълянкахъ неоднородны и не выражаютъ ясной послъдовательности, все же на основаніи этого опыта можно съ опредъленностью сказать, что, во 1-хъ, на солонцахъ, гдъ никакія другія полевыя растенія не давали никакого урожая, рисъ даетъ хорошій валовой доходъ (болъ 100 руб. на десятину); во 2-хъ, онъ можетъ культироваться съ меньшимъ расходомъ оросительной воды, хорошо произростаетъ не только на поляхъ съ постоянной текучей водой, но и при періодическомъ орошеніи (черезъ 3 дня); въ 3-хъ, наконецъ, при этомъ изъ почвы радикально вымываются вредныя соли, и послъ риса въ будущемъ удается любой посъвъ. Періодическое орошеніе риса (черезъ 3 дня) приводитъ къ слъдующимъ выгоднымъ особенностямъ культуры риса на солонцахъ; обычно въ Самаркандской области, гдъ на десятину риса

расходуется около 1900—2500 куб. саж. оросительной воды, рисовыя поля являются источникомъ маляріи, служа уб'вжищемъ для личинокъ малярійныхъ комаровъ (гл. обр. бълаго «Anopheles pulcherrimus», какъ выяснилъ энтомологъ В. В. Васильевъ); при періодической же (черезъ 3 дня) поливкъ риса расходуется, по нашимъ учетамъ, лишь около 1000 куб. саж. на десят., а при постоянномъ токъ — около 2160 куб. саж., т. е. болъе, чъмъ въ 2 раза. Далъе, періодическое просыханіе почвы подъ рисомъ, оказывается, гибельно вліяеть на личинокъ малярійныхъ комаровъ, какъ показали опыты г. Васильева въ Ташкентскомъ увздв, и, такимъ образомъ, этотъ способъ обезвреживанія рисовыхъ поствовъ отъ маляріи (на ряду съ подливаніемъ въ нихъ керосина въ количествъ 1/2 лота на 1 кв. арш.) убійственно дъйствуетъ, по опытамъ г. Васильева, на личинокъ комаровъ, не вредя рисовымъ посъвамъ. Въ качествъ разсолонителя почвъ, рисовая культура давно считается одной изъ лучшихъ, чему учить и опыть Египта. Такъ, на участкъ американскаго съвооборота, гдф быль поставлень опыть культуры риса на солонцф, даже послъ 2-лътнихъ поливокъ (до посъва риса) почва содержала:

на глубинъ 2—10 сант. — 1,52% раствора солей (изъ нихъ около половины NaCl)

на глубин
$$5 10 — 25$$
 "  $-2,16^{0}$ /о "  $80 — 95$  "  $-1,75^{0}$ /о.

въ концѣ же лѣта послѣ уборки риса въ ней было уже не болѣе 0,16% раствора солей и изъ нихъ Nacl не болѣе 0,01% (почти нормальное количество для голодностепскихъ почвъ). На Опытномъ Полѣ уже въ прошломъ году былъ небольшой опытъ посѣва риса на солонцѣ, и теперь на этомъ мѣстѣ послѣ риса растетъ отличная пшеница, тогда какъ раньше это былъ безплодный участокъ.

Въ виду того, что на Опытномъ Полъ, какъ сказано, довольно много солонцевъ, на поляхъ со значительной площадью послъднихъ приходится практиковать такой съвооборотъ (съ рисомъ): 1-е поле — озимый ячмень, а съ іюня рисъ (на солонцеватыхъ почвахъ) или машъ на зеленое удобреніе (на несолонцеватыхъ почвахъ); 2-е поле — хлопчатникъ по удобренію; 3-е — хлопчатникъ и 4-е ранняя кукуруза + машъ на зерно (въ междурядьяхъ кукурузы — по достиженій кукурузы возраста предъвыкидкой султановъ).

Новый вредитель. Въ 1911 году на поляхъ Опытнаго Поля и всюду въ Голодной Степи появился новый вредитель — гусеница Кагаdrina exigua; по силъ опустошеній, которыя она производила на люцернъ, свеклъ, машъ и особенно на хлопчатникъ, карадрина является не менъе опаснымъ врагомъ, чъмъ, напримъръ, Heliothis armiger. Ниже приводится описаніе этого вредителя, сдъланное въ особой статьъ, помъщенной въ № 8 журнала «Туркестанское сельское хозяйство» за 1911 годъ (см. приложеніе).

Вліяніе заморозковъ. Періодически повторяющіеся ранніе осенніе заморозки въ Туркестанъ, приводящіе къ значительному уменьшенію и ухудшенію качества урожая хлопка, заставляють пересмотръть вопросъ о вліяніи заморозковъ на хлопчатникъ и о границахъ хлопковаго пояса въ Туркестанъ. Какъ извъстно, хлопковый поясъ С. Америки лежитъ между 37° и 30° параллелями съверной широты, спускаясь во Флоридъ и Техасъ до 25° свверной широты, и самому свверному предвлу хлопковой культуры тамъ соотвътствують среднія годовыя Т° около 13,3 до 20° С., а на высотъ 30° параллели 20,5° С. Между тъмъ въ Туркестанъ только самые южные хлопковые районы (Тедженскій и Мервскій — по Мургабу) спускаются до 36° свв. широты; главнвишій же центръ хлопководства (Фергана) лежитъ уже на 40° параллели съв. широты, а съверная граница хлопководства отодвигается (у Чимкента) даже за 42° параллель. Въ этихъ предълахъ (42—36° ств. шир.) средняя температура колеблется отъ 12,5° С. (у Чимкента) до 15,7° С. въ районъ Байрамъ-Али, Закаспійской обл., при 13,9° С. въ районъ Маргелана и 13,6° у Ташкента. Далъе, у съверной границы американскаго хлопковаго пояса безморозный періодъ равенъ 6 м всяцамъ, а на южной (въ Техасъ) даже 8-9 мъсяцамъ; между тъмъ въ Туркестанъ, въ съверномъ районъ хлопководства (Чимкентскомъ) безморозный періодъ не длиннъе всего лишь 41/2 мъс., въ Маргеланъ 6 мъс., въ Самаркандъ равенъ 6 мъс. и въ Байрамъ-Али около 61/2 мѣсяцевъ, принимая, по многолѣтнимъ метеорологическимъ наблюденіямъ, что послъдній весенній заморозокъ во всъхъ этихъ пунктахъ былъ около 23 марта, а первый осенній морозъ около 10 октября (хотя въ 1911 году осенній заморозокъ наблюдался даже 20 сентября). Если прослъдимъ метеорологическія условія Голодной Степи за всъ 11 лътъ существованія при Опытномъ Полъ метеорологической станціи, то окажется слъдующее:

_	ц	есенній	ній	за годъ.	апръля	числа 14 Cels.	Оса	дки.	марта.	апрѣля.	пудахъ, урожай 00 пуд.
Г 0 Д Ы.	Безморозпыхъ дней.	Посл'вдий весений заморозокъ.	Первый осенній ваморозокъ.	Средняя t°	Сумма t° съ по сентябрь.	Съ какого t° была + 1	Посл'вдній весной.	Первый осенью.	Средняя t° 1	Средняя t° г	Урожай въ пудахъ, если принять урожай 1910 г. за 100 пуд. на десятину.
1901	211/193	6/III—2 <b>,</b> 0	7/x—4,0	<u>-</u> 5		съ 24/пі	12/vı—0,5	5/1x—1,2	-		
±1902	217/200	11/m—1,0	19/x-2,0	_	1	17/m—1/w	27/v —5,0	16/x —1,3	_		-a-
1903	188/183	29/III— <b>4</b> ,0	6/x—0,5	_	_	3/1 <b>v</b>	20/vi—3,0	28/ix—7,2	_	-	_
1904	191/168	7/m—0,0	18/1x-1,5	_	3565	15/m –11/w	5/v1—1,6	13/1x—7,2	10,9	17,0	58
1905	196/194	31/III—1,5	16/x—1,0	13,4	3375	23/m— 2/m	2/v1—0,1	10/x —1,5	7,1	18,6	68
1906	187/184	4/IV—1,5	11/x-0,0	14,3	3535	29/m — 7/w	1/vII—4,0	9/ix—1,5 16/xi—4	11,9	16,3	85
1907	204/201	14/m—1,5	8/x—5,0	12,9	3270	17/m	23/v1—1,9	22/x —7	12,3	16,6	55
1908	218/188	27/н —1,0	8/x-4,4	13,9	3540	29/m	3/v1—7	25/1x —1,5	11,4	19,8	58
1909	204/197	9/III <b>—2,</b> 0	3/x - 2,0	15,1	3535	16/m	28/v1—2,4	7/x —3,0	14,1	19,4	90
1910	188/184	24/m-1,7	2/x—0,8	13,9	3570	28/m	2/vII—1	27/1x-0,5	9,2	18,9	100 '
1911	177/176	23/m—1,6	20/1x-3,5	12,8	3375	24/m	22/vi1,5	11/1x - 8	9,2	17,3	60

Помъсячно температура за вегетаціонный періодъ колебалась за послъднія 8 лъть слъдующимь образомь:

	Мартъ.	Апр.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авг.	Сен- тябрь.	Октябрь.	Сред-	
Въ 1904 г	13,0	17,0	25,1	27,3	30,0	26,0	17,0		23,7	21,0
<b>"</b> 1905 .	, i <del>-</del>	18,6	24,6	28,4	28,3	25,3	19,8	16,0 (12)	22,5	21,6
" 1906 .	_	16,3	24,4	29,0	28,8	24,1	18,3	13,0 (9)	23,5	22,0
<b>"</b> 1907 .	14 (12)	16,6	20,3	26,6	28,8	22,8	15,8	12,0 (8)	21,8	19,
" 1908 .	<del>-</del>	19,8	23,3	29,3	27,6	24,8	17,2	12,0 (9)	23,6	22,0
" 1909 .	16 (14)	19,4	25,4	26,5	28,4	24,3	17,0	13,0 (7)	23,5	21,2
<b>"</b> 1910 .	_	18,9	26,1	27,0	29,6	24,2	17,1	_	23,8	-
<b>"</b> 1911 .	16,0	17,3	26,4	26,0	26,1	23,0	19,0	-	22,5	21,6
Средняя —	14,7	18,0	24,9	27,6	28,45	24,3	17,6	13,2	-	0

Но указанія на длину безморознаго періода, въ сущности, не говорять еще о длинъ надежнаго вегетаціоннаго хлопковаго періода, такъ какъ послъдній считается не со времени послъдняго весенняго заморозка, а съ наступленія достаточно теплой погоды, т. к. принято, что хлопчатникъ даетъ нормальные всходы лишь при наступленіи Т° около 14° С.

Дъйствительно, опыты въ Голодной Степи ръзко подчеркиваютъ значение температурныхъ условій для развитія хлопчатника:

При посъвъ хлопчатника «Кингъ» въ разные сроки оказалось, что фазы наступають:

При посѣвѣ.	Всходы.	Цвътеніе.	Созрѣваніе,	1-ый сборъ.	Сумма тепла до раскрытія коробочекъ.	Сумма тепла до 1-го сбора.	Сумма to со времени наступления to выше + 14° Cels.
1/m	4/IV	12/vi	1/vm	30/уш	3.360	4050	3600
28/m	4/IV	11/vi	27/vII	28/vm	2.870	3555	3555
18/IV	23/iv	18/IV	5/vm	3/1x	3.060	3240	3240

Такимъ образомъ, при посъвъ 1 марта (въ холодную почву) и при посъвъ 28 марта хлопчатникъ взощелъ въ одинъ день, пролежавъ безполезно въ 1-мъ случав 30 дней; созрввание его тоже было одновременно съ позднимъ хлопчатникомъ. Въ среднемъ, въ Голодной Степи за 11 лътъ безморозный періодъ равенъ 192 днямъ, доходя до 217 дней въ 1912 году и сокращаясь до 177 дней въ 1911 году; при этомъ последній заморозокъ наблюдается между 27 февраля и 4 апръля (чаще около 23 апръля), а первый осенній — между 18 сентября и 29 октября. Однако, безморозный періодъ еще не указываетъ на продолжительность вегетаціоннаго періода хлопчатника; этотъ посл'вдній сл'вдуеть считать со времени наступленія весной устойчиваго повышенія Т° не менъе, чъмъ до 14° Цельсія (съ какого времени и можно разсчитывать при посъвъ получить дружные и быстрые всходы), и до созръванія нъсколькихъ коробочекъ нижняго яруса хлопчатника или до 1-го осенняго заморозка. Соотв'ятственно съ этимъ, возможный вегетаціонный періодъ хлопчатника оказывается значительно короче безморознаго и для Голодной Степи колеблется отъ 168 дней (въ 1904 году) до 201 дня (въ 1907 году). Въ общемъ и этотъ періодъ превышаетъ необходимый для развитія скороспълаго сорта хлопчатника, т. к. при посъвъ его около 1 апръля черезъ 5 мъсяцевъ (около 1 сентября) у насъ уже возможенъ сборъ сырца. Разумъется, длина безморознаго періода не имъетъ значенія безъ указанія на сумму тепла и свъта, полученнаго за это время хлопчатникомъ; т. е. достаточно ихъ было для развитія хлопчатника или нътъ.

Посмотримъ, какое же количество тепла получалъ хлопчатникъ за указанные 11 лътъ въ Голодной Степи и какимъ урожаямъ соотвътствовали эти количества.

Изъ приведенной выше таблицы видно, что длина періода еще не указываеть на высоту урожая, и въ условіяхъ Голодной Степи при самомъ длинномъ безморозномъ періодѣ (201 день) въ 1907 году былъ, однако, плохой урожай хлопка, и, наоборотъ, при сравнительно короткомъ вегетаціонномъ періодѣ (184 дня) въ 1910 году полученъ высшій урожай; все дѣло въ томъ, что въ 1907 году средняя Т° вегетаціоннаго хлопковаго періода была низкая 21,8° С., тогда какъ въ 1910 году наивысшая за 10-лѣтіе 23,8°, и несмотря на то, что послѣдній весенній заморозокъ въ 1910 году былъ позже 27 марта, а первый осенній

ваморозокъ — раньше (2 октября), чѣмъ въ 1907 году (14 марта до 8 октября), хлопчатникъ созрѣлъ весь, т. к. получилъ за вегетаціонный періодъ (до 1-го осенняго мороза) 4380° тепла или 3570° до 1-го сбора, а въ 1907 году за тѣ же періоды тепла было лишь 3900° и 3270°. Присмотрѣвшись къ таблицѣ 2-й, можно сказать, что рѣшающими были даже не  $T^\circ$  всѣхъ мѣсяцевъ вегетаціи, а главнымъ образомъ  $T^\circ$  іюля, августа и частью сентября; въ 1910 году  $T^\circ$  была въ іюлѣ 29,6°, въ 1907 году — 28,8°; августѣ — 1910 г. — 24,2°, а 1907 г. — 22,8°; сентябрѣ — 1910 г. — 17,1°, а 1907 — 15,8°.

Слъдуетъ отмътить, что различные сорта требуютъ неодинаковое количество тепла до полнаго созръванія, и потому всегда приходится учитывать при сужденіи о вліяніи морозовъ, къ какому сорту относятся данныя. Въ самомъ дълъ, въ 1911 году на Опытномъ Полъ сорта: кингъ, кокъ-чигитъ, ташкентскій упландъ, малля-чигитъ, посъянные 18 апръля, созръли къ 20—25 августа, потребовавъ около 2930° тепла, до начала раскрытія коробочекъ, и около 3373° до перваго сбора, между тъмъ, какъ сорта Flaradora, Excelsior prolific и др. начали созръвать (первыя коробочки) лишь 25 сентября, и для этого потребовалось уже около 3400° тепла, а до 1-го сбора болъе 3550°; наконецъ, египетскіе сорта Афифи и Ашмуни едва начали открываться съ 11 октября, потребовавъ тепла болъе 3600° градусовъ.

Производя ежегодный подсчеть открывшихся коробочекь черезь каждые 5 дней, мы отмътили, что у большинства сортовь, входящихь въ составь такъ называемаго «фергенскаго хлопка» наблюдаются два максимума раскрывшихся коробочекь: одинъ въ августъ и 2-й въ сентябръ (при посъвъ 1 апръля), при чемъ въ годы «урожайные» (какъ 1910), когда высокая То вегетаціоннаго періода наблюдается въ іюлъ, августъ и сентябръ, первый максимумъ раскрытія коробочекъ лежить между 25—30 августа, а второй отъ 5 до 25 сентября, и къ 5—10—15 октября раскрываются уже почти всъ коробочки; между тъмъ, въ годы неурожайные съ низкой То за вегетаціонный періодъ (1907 годъ), тъ же максимумы созръванія коробочекъ отодвинуты: первый къ 20 сентября а 2-й къ срединъ октября, а въ это время какъ разъ наблюдаются уже осенніе заморозки, убивающіе несформировавшіяся коробочки, какъ видно изъ слъдующей таблицы:

	рас- коро-	макен- ъ рас- гія.	ткрыв- 12 ко- ъ.	кси- рас-		раскрывш. соробочекъ.
названіе сорта.	Начало крытія бочекъ.	1-й мал мумъ крытія.	0/00/0 открыв- шихся 12 ко- робочекъ.	2-й макси- мумъ рас- крытія.	1910г. уро- жайн.	въ 1911 г. неуро- жайн.
ki kumandara sang dali Manggalan Silom san			S. O. W.			
Кингъ	25/v11	25/vIII	60º/o	5/1 <b>x</b>	0-0	$8 - 21^{0/0}$
Кокъ-чигитъ	1/viii	25/vIII	500/0	5/1x	0-0	4-160/0
Малля-чигитъ	1/vIII	30/viii	45º/o	15/1x	6-120/0	622º/o
Кара-чигитъ	5/v111	30/vIII	380/0	25/1x	2—100/0	9—400/0
Ташкентскій упландъ	3/vIII	30/vIII	40%	15/1x	2—10	7-22,50/0
of little and then a see	indio at t			N. S.LTS		

Мы видимъ, что въ урожайные годы число открывшихся коробочекъ уже къ 30 августа достигаетъ 40-60%, а до возможнаго перваго октябрьскаго заморозка неоткрывшихся коробочекъ остается не болѣе 10%, да и то не у всѣхъ сортовъ; въ годы неурожайные число нераскрывшихся подмороженныхъ при заморозкѣ коробочекъ достигаетъ 16-40%, и, такимъ образомъ, 1/5-2/5 урожая хлопка получается сильно попорченнаго, малоцѣннаго. Въ первомъ періодѣ коробки созрѣваютъ дружно, въ короткій періодъ, а во 2-мъ — созрѣваніе ихъ, благодаря низкой  $T^c$ , растягивается, и вмѣсто обычныхъ 48-52 дней коробочки созрѣваютъ на 55-63 день послѣ цвѣтенія.

Дъйствіе заморозковъ на коробочки хлопчатника различно въ зависимости отъ періода развитія коробочекъ и силы заморозка, т. к. заморозки бывають, въ 1-хъ глубокіе (съ  $T^{\circ}$  болъ́е— $5^{\circ}$  С) и неглубокіе (съ  $T^{\circ}$  до —1— $5^{\circ}$  С), повторные и однократные, съ дождями и безъ дождей; а во 2-хъ, ранніе (около 20 сентября), когда много коробочекъ еще не вполнъ сформировалось (при посъ́въ 1 апръ́ля) и поздніе (около 5 октября), когда большая часть коробочекъ сформировалась и начинаетъ уже, собственно, усыхать (дозръ́вая).

Какъ же дъйствуютъ всъ эти заморозки на хлопчатникъ? Обращаясь за справками по этому вопросу къ литературнымъ источникамъ, мы, къ сожалънію, не находимъ въ нихъ ничего иди найдемъ одни лишь общія мъста; повидимому, этому во-

просу вообще мало удълялось вниманія, и потому экспериментальныя изслъдованія здъсь замъняются общими соображеніями. Главный потребитель хлопка — Московская биржа, классифицируя волокно, совершенно не выдъляеть качества недозръвшаго волокна, ограничивая бонитировку бълизной и сорностью; ни о длинъ, ни о кръпости (главнъйшія качества его въ стандартахъ) даже не упоминается.

Въ книгъ Вилькенса — «Основы культуры американскаго хлопчатника въ Туркестанъ» «о порчъ» волокна морозами говорится слъдующее: «отъ осеннихъ холодовъ, дождей и морозовъ волокно различныхъ коробочекъ претерпъваетъ въ той или иной формъ и степени; однъ коробочки даютъ дряблый, недозръвшій хлопокъ, въ другихъ онъ при этомъ болъе иди менъе желтъетъ, а въ случаъ сырой осени нъкоторыя коробочки загниваютъ; промежуточный между 1 и 3 сортомъ хлопокъ, смоченный дождемъ и недошедшій отъ недостатка тепла до полной степени зрълости (изъ коробочекъ болъе позднихъ, чъмъ 1 сортъ), не распускается, какъ 1 сортный, и имъетъ болъе короткое волокно; понятно, что такое волокно уже негодно для производства изъ него доброкачественной пряжи и цънится, поэтому, невысоко.

Извъстный знатокъ технологіи волокнистыхъ веществъ проф. С. А. Федоровъ въ своемъ курсъ «хлопкопряденіе» даетъ такія опредъленія разницъ сортовъ хлопчатника: 1) хлопокъ, собранный преждевременно, отличается отъ вполнъ созръвшаго тъмъ, что въ волокнахъ его замъчается меньшая извитость, онъ мягче и слабъе; хлопокъ же, слишкомъ долго остававшійся на плантаціи и успъвшій вслъдствіе этого перезръть, съеживается, вслъдствіе чрезмърнаго испаренія естественной влаги, и отъ этого становится жесткимъ, шероховатымъ, плохо смъщвается съ болъе мягкимъ и болъе гибкимъ волокномъ нормальнаго сбора. Требующаяся для распознаванія качества волюкна способность пріобрътается, по проф., только опытомъ, и лицо, сортирующее на фабрикъ хлопокъ по классамъ и доброкачественности, должно обладать острымъ зръніемъ и весьма чувствительнымъ осязаніемъ.

Тоть же проф. Федоровь въ другой книгъ «Хлопокъ» (ученіс о волокнистыхъ матеріалахъ) говоритъ, что недозръвшія, захваченныя морозомъ волокна— плоски, прозрачны, какъ стекло, жестки, недостаточно гибки и не способны принимать

окраску; внутренній каналь въ такихъ волокнахъ не пустъ, какъ у зрѣлаго, а наполненъ мелкозернистымъ веществомъ оѣлковаго состава; незрѣлое волокно содержитъ меньше клѣтчатки, чѣмъ зрѣлое (85—92%); наконецъ, незрѣлое волокно содержитъ меньше масла. По мнѣнію проф. Федорова, за время лежки хлопка отъ сбора до очистки (1—2 мѣсяца) въ немъ происходятъ нѣкоторые химическіе процессы, напримѣръ, масло нзъ сѣмянъ, всасываясь въ волокно, сообщаетъ ему блѣдно-соломенно-желтоватый цвѣтъ и увеличиваетъ его цвѣтъ.

Въ краткомъ наставленіи «О культурѣ хлопчатника въ Закавказьѣ» агронома Н. П. Таратынова о вліяніи заморозковъ на хлопчатникъ не сказано ни слова, и только въ главѣ о поливкѣ говорится, что послѣднюю поливку не слѣдуетъ давать позднѣе 15 августа, т. к. болѣе поздней поливкой можно «только задержать созрѣваніе, хлопчатникъ не дозрѣетъ и будетъ побитъ раннимъ заморозкомъ». Точно также ничего не говорится о заморозкахъ въ статьѣ агр. С. В. Понятовскаго «Хлопчатникъ», напечатанной въ Туркестанскомъ сел.-хоз. календарѣ.

Болъе всъхъ удълилъ вниманія вопросу о вліяніи на хлопчатникъ морозовъ г. Ротмистровъ — директоръ Одесскаго Опытнаго Поля. До настоящаго времени, говорить онъ въ своей брошюрѣ «Наставленіе къ воздѣлыванію хлопчатника» (1911 г.), полагали, что хлопчатникъ растеніе жаркихъ странъ, но мои опыты показали, что хлопчатникъ можетъ расти и у насъ въ причерноморскихъ губерніяхъ и не только у насъ, но и гораздо сввернве — въ Полтавской, Саратовской губ. Осенью хлопчатникъ морозовъ не боится (напечатано курсивомъ въ той же брошюръ г. Ротмистрова на стр. 2); его волокно не можетъ страдать отъ морозовъ, т. к. оно только высыхаетъ на морозъ, но не погибаетъ; отъ мороза могуть страдать не вполнъ созръвшія зерна, но и это дълу не мъшаеть: зерно пусть погибаеть, но волокно на такомъ незръломъ зернъ или вполнъ готово и пойдетъ въ 1-й высшій сорть или при незначительной недозр'влости — въ низшій, желтый сорть. Для ускоренія сбора подмороженнаго хлопка авторъ рекомендуеть срывать коробочки и переносить въ жилыя помъщенія, а тамъ лущить руками такіе «патроны», какъ называеть авторъ недозръвшія и нераскрывшіяся коробочки; изъ нихъ, по словамъ Ротмистрова, получается еще 1-й сорть хлопка.

Правда, на стр. 6-й указаннаго «Наставленія» говорится, что отъ осеннихъ морозовъ растенія хлопчатника погибаютъ, а при раннихъ сентябрьскихъ морозахъ они могутъ погибнутъ даже въ серединѣ сентября, но при этомъ погибаютъ листья, коробочки, зерна, а не волокно, оно (это авторъ опять подчеркиваетъ) остается цѣлымъ и сохраняется очень хорошо въ замороженныхъ и сухихъ коробочкахъ до конца зимы. Чтобы избѣжать вліянія заморозковъ на посѣвъ, г. Ротмистровъ рекомендуетъ сѣять хлопокъ около 15—20 апрѣля, т. к. до 13 апрѣля въ Одессѣ бывають еще заморозки (1907 г.); но въ виду того, что въ Одессѣ первые осенніе заморозки случаются уже въ началѣ сентября (1906 г.), то тамъ вегетаціонный періодъ для хлопчатника продолжается всего лишь 4½—5 мѣс., съ суммой тепла въ 2720 градусовъ (см. таблицу)!

Среднія температуры за вегетаціонный періодъ въ Одессѣ и для сравненія въ Голодной Степи за нѣсколько ілѣтъ таковы:

#### ОДЕССА.

Апрѣль								8,4 ° C.
Май						٠		16,4
Іюнь .					٠.			20,4
Іюль .								22,8
Августъ								22,3
Сентябрь				•		•		16,8
- 18. to <del>-</del>							100	
		едня						
Cyr	мма	тепа	па					2720
	Ι	ОЛО	ДН	[AA]	. C'	TEI	ΙЬ.	
Апрѣль								18,0 ° C.
Май .				• .	•			24,9
Іюнь .								27,6
Іюль .								28,4
Августъ								24,3
Сентябрь			0.	110	•	٠	•	17,6
	CI	редн	RR					23,4°
Су	мма	теп	ла					3750

Такимъ образомъ, получается такая картина: въ Туркестанъ принимаются всъ мъры къ выведенію скороспълыхъ сортовъ съ цълью полученія вызръвшаго здороваго волокна, въ Одессъ же, въ болъе съверномъ районъ по сравненію съ Туркестаномъ, это оказывается какъ будто излишнимъ.

Не придавая особаго значенія вредному вліянію заморозковь на урожай хлопчатника, г. Ротмистровь рекомендуєть нѣкоторыя мѣропріятія какъ бы съ цѣлью удлиненія вегегаціоннаго періода, не считаясь съ опытомъ коренныхъ туркестанскихъ хлопководовъ, опасающихся этого удлиненія. Такъ, онъ рекомендуєть сѣять египетскій голосѣмянный хлопчатникъ, между тѣмъ этотъ сортъ, отличающійся длиннымъ вегетаціоннымъ періодомъ, не вызрѣваетъ, какъ показали опыты Голодностепскаго Опытнаго поля, даже въ Туркестанѣ. На стр. 14-й авторъ рекомендуєтъ производить чеканку хлопчатника между 6—15 августа, тогда какъ это надо дѣлать въ іюнѣ при появленіи первыхъ цвѣтовъ на плантаціяхъ.

Въ дъйствительности, вліяніе заморозковъ сказывается въ следующемъ. Растенія, подвергаясь, благодаря сильному лучеиспусканію, дъйствію температуры ниже нуля, получають разрывъ клътокъ отъ образующихся въ растеніяхъ ледяныхъ кристалловъ; но болъе въроятной причиной смерти при замерзаніи является вымораживаніе изъ воды (при образованіи льда) органическихъ веществъ, находящихся въ растворъ, а также испареніе и просачиваніе воды, при чемъ, конечно, нарушается физіологическое равновъсіе. Различныя растенія неодинаково чувствительны къ холоду; извъстную роль играеть при этомъ концентрація соковъ: такъ, сухія растенія менте страдають отъ заморозковъ, чъмъ кочныя, водянистыя. Въ силу того, растительные соки представляють собою концентрированные растворы, имъющіе всегда пониженную точку замерзанія, по поэтому и температура замерзанія растеній ниже точки замерзанія воды. Хотя нужно сказать, что растенія страдають оть мороза и при Т° выше 0°, т. к. на листьяхъ, вслъдствіе усиленнаго лучеиспусканія въ ясныя ночи, температура опускается ниже Т° воздуха и ниже точки замерзанія.

Фактически хлопковое волокно совершенно зрѣлыхъ коробочекъ и незрѣлыхъ (подмороженныхъ) рѣзко различно по свойствамъ. По опредѣленіямъ Голодностепскаго Опытнаго Поля разница эта такова:

Какое	Длина волоконъ въ mill.			Толщи	Толщина волокна въ mill.					Число извитковъ на 1 дюймъ.				Крѣпость во- локна въ грамм.			
волокно изслѣдо- валось.	Верхнее съмя.	Среднее съвмя.	Нижнее съмя.	Общ. сред- няя длина.	Верхнее съмя.	Среднее съмя.	Нижнее съмя.	Общая средняя толщина.	Верхнее съмя.	Среднее съмя.	Нижнее съмя.	Общ.средн.	Верхнее съмя.	Среднее съмя.	Нижнее съмя.	Общ. сред- няя кръп.	
Сортъ Кокъ-Чигитъ.																	
1) Вполнѣ зрѣлая ко- робочка	23,5	28,5	26,8	26,3	0,0194	0,0175	0,020	0,019	178	172	168	173	5,6	5,6	5,7	5,63	
2) Незрѣлая коробочка, побитая		25,0						0,0175									

Оказывается, волокно зрѣлыхъ коробочекъ значительно длиннѣе (на 3 почти mill), чѣмъ у незрѣлыхъ; число извитковъ волокна на 1 дюймъ у первыхъ больше, чѣмъ у вторыхъ на 43; крѣпость волокна зрѣлаго значительно больше (5,63 граммъ), нежели у незрѣлаго волокна (5,0 гр.). Подъ микроскопомъ это незрѣлое «мертвое» волокно наполнено мелкозернистымъ веществомъ и даетъ нечистую окраску на клѣтчатку, реагируя на бѣлокъ.

При вычисленіи суммы температурь за вегетаціонный періодъ хлопчатника имъетъ большое значение самый способъ вычисленія этихъ данныхъ; на основаніи нашей практики, мы должны сказать, что обычно практикующійся способь обработки метеорологическихъ данныхъ по мъсяцамъ совершенно недостаточенъ для фенологическихъ цълей, т. к. при немъ стушевываются особенности погоды, имъвшія доминирующее значеніе въ развитіи даннаго растенія. Поэтому въ будущемъ мы різшили вести обработку метеорологическихъ условій съ выводомъ среднихъ по пентадамъ (пятидневіямъ) или хотя бы по декадамъ (десятидневіямъ). По какому способу правильнів вычислять суммы тепла для хлопчатника? При обычномъ способъ вычисленія суммирують всв положительныя температуры за вегетаціонный періодъ, не принимая во вниманіе отрицательныхъ (напр. заморозковъ); такъ поступали и мы. Однако, Габерландтъ предлагаеть считать за положительныя только температуры, лежащія выше низшаго предъла прорастанія и при вычисленіи суммъ

тепла принимать именно эти положительныя То, игнорируя температуры низшія; по этому способу, для хлопчатника слъдуеть брать только температуры выше 10-14° С., т. к., по нашимъ опытамъ, при Т° 7—9° С. хлопчатникъ проростаетъ въ теченіе 26 дней, при 19° С. проросталъ на 8 день, а при 26° С. уже на 41/2 дн. Мы находимъ этотъ способъ болъ правильнымъ, но онъ сложное перваго. Наконецъ, проф. Гофманъ предлагаетъ вычислять сумму тепла лишь по дневнымъ максимумамъ температуръ, полагая, что максимумъ ръдко превышаетъ оптимумъ для развитія растенія и, слідовательно, оказываеть наибольшее вліяніе на него; этотъ способъ имъетъ относительное значение при вычисленіи суммъ тепла для хлопчатника, т. к. максимумъ наблюдается въ теченіе какого-нибудь часа (а не цёлый день) и едва ли примънимъ для овса и проч. растеній, подверженныхъ вредному вліянію сухов'євь и проч. Прим'єняя посл'єдній способъ къ вегетаціонному періоду хлопчатника въ 1911 г., найдемъ, что съ 1 апръля по 20 сентября (первый осенній заморозокъ) хлопчатникъ получилъ 5287° тепла, а по обычному способу вычисленія сумма Т — только 3800°.

Если заморозки имѣютъ такое большое отрицательное значеніе въ хлопководствъ, то является вопросъ о мърахъ борьбы съ ними. Намъ кажется, что всв предлагаемыя обычно мвры для обезвреживанія дійствія заморозковъ мало надежны и очень дороги, если примънять ихъ на большихъ площадяхъ. Принципіальное рішеніе вопроса, по нашему, въ данномъ случай должно базироваться на предупредительныхъ мірахъ чисто агрономическаго характера, именно: 1) если бы всв хозяева коренныхъ районовъ туркестанскаго хлопководства свяли хлопчатникъ между 1 и 10 числами апръля; 2) если бы они разводили достаточно скороспълые сорта хлопчатника (кингъ, кокъ-чигитъ и т. п.); 3) если бы они, наконецъ, придерживались правилъ раціональнаго орошенія хлопчатника и не допускали излишнихъ поливокъ, особенно послъ 15 августа, — то, мы увърены, самые ранніе у насъ сентябрьскіе заморозки (20 сентября) не смогуть значительно понизить урожай хлопка.

Большое значеніе при активной борьб'в съ заморозками им'ветъ возможность предсказанія заморозка, изученіе условій наступленія и интенсивности вреднаго вліянія заморозковъ; это обезпечить возможность ослабленія ихъ д'в'йствія на растенія. Наибол'ве в'врнымъ способомъ предсказанія за-

морозка-утренника съ вечера предыдущаго дня являются способъ Мона и Ланго — по точкъ росы и Каммермана; по первому способу считается, что если точка росы въ 9 час. вечера лежить ниже нуля, то заморозокъ въроятенъ; однако, по В. А. Михельсону ночной морозъ можетъ наступить и тогда, когда точка росы въ 9 час. веч. упадетъ ниже: -2,0° С., но это при безоблачномъ небъ и безвътріи. Проф. Воейковъ предупреждаеть, что при предсказаніяхь мороза по точкі росы ісліздуєть помнить о возможности наступленія заморозка и при точкъ росы выше 0° вечеромъ; въ долинахъ и пониженіяхъ рельефа морозы наблюдаются при точкъ росы въ 3°, и это объясняется опусканіемъ ночью охлажденнаго воздуха на дно долинъ съ бол'є возвышенныхъ мъстъ, слабымъ движениемъ его здъсь (вътеръ, какъ и облачность и значительная влажность воздуха уменьшаютъ опасность наступленія заморозковъ). Поэтому проф. Воейковъ указываеть на возможность предвидёнія заморозковь по смоченному термометру, предполагая, что ночью температура понижается до утра на 4° ниже Т смоченнаго термометра, наблюденной вечеромъ предыдущаго дня.

Пытаясь на основаніи правила Мона-Ланга предсказать наступленіе заморозковь въ Голодной Степи, мы, однако, неоднократно были обмануты имъ; въ 1911 г., напримъръ, первый осенній заморозокъ наблюдался 20 сентября, а вечеромъ 19 сентября мы наблюдали на сухомъ термометр\$+4,2°, а на смоченномъ+2,9° и этой разниц\$ (1,3°) по таблицамъ Реньо соотвътствовала точка госы+0,7, а между тъмъ заморозокъ былъ равенъ-1,5°С. Въданномъ случа\$ было бы правильн\$е руководствоваться вторымъ правиломъ (возможность пониженія за ночь \*T° на \*4 градуса ниже вечерней \*T° по смоченному термометру).

Способовъ борьбы съ заморозками нѣсколько: 1) одни разсчитаны на уменьшеніе лучеиспусканія; 2) другіе — на повышеніе точки росы путемъ увеличенія влажности воздуха; 3) третьи на нагрѣваніи воздуха и 4) четвертые — на перемѣшиваніи слоевъ воздуха. По первому способу, кромѣ устройства искусственныхъ камышевыхъ навѣсовъ надъ виноградникомъ, огородомъ, чаще всего прибѣгаютъ, для уменьшенія лучеиспусканія, къ созданію искусственныхъ облаковъ — дыма, что достигается сжиганіемъ навоза, соломы, дерна, а въ Калифорніи (въ цѣнныхъ плодовыхъ насажденіяхъ) сжигаютъ нефть, равномѣрно распредѣляя ее въ металлическихъ сосудахъ по площади всего сада;

огонь поддерживается посл'в полуночи, т. к. заморозки наступають передъ разсвътомъ. Дъйствительность этого способа при небольшихъ морозахъ внъ всякаго сомнънія, и мы каждогодно убъждаемся въ этомъ на опытахъ съ затъненіемъ нъкоторыхъ дълянокъ хлопчатника: здъсь хлопчатникъ остается всегда зеленымъ, живымъ, въ то время, какъ кругомъ онъ бываетъ побитъ, чернъетъ и сохнетъ; такъ же часто онъ остается неповрежденнымъ и подъ деревьями близъ дорогъ. Повышеніе точки росы путемъ увеличенія влажности воздуха, какъ міра борьбы съ заморозками, повидимому, выполнима въ условіяхъ Туркестана легче другихъ, т. к. путемъ обильной поливки полей съ вечера мы можемъ разсчитывать на образование тумана (при испарении воды), защищающаго почву отъ ночного лучеиспусканія. Способъ непосредственнаго нагръванія воздуха зажиганіемъ костровъ очень дорогь и мало надежень, т. к. нагрътый воздухъ стремится кверху и не держится въ нижнихъ слояхъ, гдъ заморозки сильнъе. Перемъшивание холоднаго низиннаго воздуха съ болъе теплымъ верхнимъ является теоретическимъ средствомъ противъ мороза, на практикъ трудно выполнимымъ.

При учетъ вліянія пониженія t°-ры на хлопчатникъ имъ́етъ большое значеніе, конечно, не только температура воздуха, но и температура почвы — на поверхности ея и на глубинъ 10 сант., гдъ располагается главная масса корней. Обычно температура поверхности почвы всегда въ южныхъ районахъ выше Т° воздуха, точно также, какъ и температура на глубинъ 10 сант. и ниже; въ Голодной Степи, напримъръ, въ 1911 г., средняя годовая температура воздуха была равна 12,8° С., а на поверхности почвы 17,2° и на глубинъ 10 сант. 14,8° С.

Однако, минимальная температура на поверхности почвы въ Голодной Степи въ 1911 г. съ марта по декабрь была ниже таковой же воздуха, а въ декабръ, январъ и февралъ выше; при наступленіи перваго осенняго заморозка (20 сентября) въ 1911 г. минимумъ Т° поверхности почвы былъ 5,0, а воздуха только 18°—1,5° С. Конечно, температура почвы зависить отъ многихъ причинъ, и между ними влажность является одной изъглавныхъ; обычно въ теплое время года температура влажныхъ почвъ ниже, чъмъ сухихъ; однако, влажная почва обладаетъ лучшей теплопроводностью и охлаждается медленнъе сухихъ, почему и температура ихъ болъе равномърна (суточныя амплитуды уменьшены).

## Метеорологическія условія въ 1911 году.

(См. таблицу А).

Метеорологическія условія отчетнаго года были очень не благопріятны для хлопчатника; годь отличался «нехлопковымъ» холоднымъ л'втомъ и осенью, большой облачностью, значительной дождливостью въ весенніе мъсяцы и ранней осенью; наконецъ, онъ отмъченъ раннимъ сентябрьскимъ морозомъ (20 сентября — 1,5°), побившимъ хлопчатникъ. Только 1907 г. за послъднее 8-льтіе, по наблюденіямъ метеорологической станціи Голодной Степи, быль такимъ же неудачнымъ для хлопкахолоднымъ годомъ, — но и то имълъ болъе высокую температуру лъта, чъмъ 1911 годъ (26,1° противъ 25,0° въ 1911 г.), и болъе поздній заморозокъ осенью (8 октября). Собственно, холодъ 1911 г. по наслъдству получилъ еще зимой отъ 1910 г., когда были жестокіе морозы въ ноябр $\dot{b}$  (—23,0° С.) и декабр $\dot{b}$  (—20° С.); уже эти холода, наступившіе при отсутствіи снъжнаго покрова, съвы, а бывшіе въ январъ 1911 г. (2 января—18,6° С.) и февралъ (5 февраля — 16,4°) морозы и совсъмъ доконали ихъ; къ ралъ (5 февраля—16,4°) морозы и совсъмъ доконали ихъ; къ срединъ февраля нами констатировано почти полное вымерзаніе озимыхъ ячменей на всъхъ поляхъ, ихъ пришлось тогда же (15-20 февраля) пересъвать яровыми пшеницами и ячменями, а въ мартъ пришлось убъдиться въ подмерзаніи значительнаго числа плодовыхъ деревьевъ — яблонь, абрикосовъ, сливъ и проч., (какъ извъстно, въ Ташкентскомъ районъ тогда же были побиты морозами многія плодовыя деревья въ садахъ, а особенно пострадали ренеты Симиренко).

Разрушительное дъйствіе морозовъ на озимыя и плодовыя деревья въ 1911 году объясняется значительными амплитудами Т° воздуха и почвы зимой, т. к. наибольшему пониженію Т° ночью (при отсутствіи снъжнаго покрова) сопутствовала значительная продолжительность солнечнаго сіянія и повышеніе Т° днемъ; уже въ декабръ было отмъчено побуреніе озимыхъ отъ морозовъ, а въ февралъ, засохшіе, они вырывались при легкомъ боронованіи. Между прочимъ, озимая пшеница перенесла заморозки лучше, чъмъ ячмени, а изъ послъднихъ наиболъе стойкими оказались посъянные раньше.

По отдъльнымъ метеорологическимъ элементамъ, 1911 г. характеризуется слъдующими данными:

### Барометрическое давленіе.

Среднее годовое давленіе воздуха въ 1911 г. = 740,7 милл., т. е. было почти одинаково съ нормой (741,0) за нѣсколько лѣтъ; наибольшее отклоненіе отъ средней нормы по временамъ года даетъ осень (+2,6 милл.), когда вообще наблюдалось максимальное давленіе за весь 1911 г. (745,9 милл.), а минимальное — лѣтомъ (737,8 милл.); затѣмъ — лѣто (+1,4 милл.), зима — (+0,5) и весна — (+0,1).

Годовой максимумъ давленія 756,4 милл. отмѣченъ 17 ноября, а минимумъ 730,4 милл. наблюдался 2 іюля; такимъ образомъ, годовая амплитуда давленія = 26,0 милл. Помѣсячно наивысшее давленіе падаетъ на ноябрь мѣсяцъ — 748,3 милл. и низшее — на іюль 735,0 милл.

Суточный ходъ давленія въ 1911 г. по временамъ года былъ слѣдующій:

Весной: утромъ высокое; полдень низкое; вечеромъ среднее. Лътомъ: " низкое " высокое " высокое. Осенью: " среднее " среднее " среднее " среднее. Зимой: " высокое " среднее " среднее.

### Вътры.

1911 годъ можно считать маловътреннымъ, т. к. процентъ безвътрія быль около 60%, а обычно онъ = 27,8%. Однако, по силъ вътра онъ можетъ быть названъ бурнымъ, т. к. сила вътра въ 1911 г. была = 6,1 метра въ секунду, а средняя за нъсколько лътъ только 4,8 метра. Наибольшей силы вътеръ достигалъ весной 7,3 метра и наименьшей лътомъ — 4,0 метра; осень тоже отличалась сильнымъ вътромъ — 6,7 метр. въ секунду (при средней многолътней 3,3). Преобладающимъ вътромъ (по повторяемости) въ 1911 г. былъ вътеръ SE, какъ и всегда (111 разъ); онъ же и дулъ съ большой силой 5,4 метра въ секунду; ръже всего дулъ южный вътеръ S съ силой лишь 0,7 метра.

### Температура воздуха и почвы.

Температура воздуха въ 1911 г. значительно отличалась отъ ногмы въ сторону уменьшенія. Средняя годовая температура +12,8° С.— ниже средней за нъсколько лътъ на 1,4° С., при чемъ по временамъ года особенно сильное отклоненіе отъ нормы

наблюдалось лѣтомъ и осенью, какъ видно изъ слѣдующей таблички:

		Зима.	Весна.	Лѣто.	Осень.
Средняя Т° за 1911 годъ.		. 0,8° C.	17,6° C.	25,0° C.	6,6° C.
Средняя норма за 8 лѣтъ		. 0,8	16,7	26,8	9,4
Отклоненіе отъ нормы .	1.19	. 0°	+0,9	-1,8 -	-2,8

Осенняя температура въ 1911 г. была ниже нормальной на  $2.8^{\circ}$  и лѣтняя на  $1.8^{\circ}$ ; весенняя же была выше на  $0.9^{\circ}$ .

Изъ отдёльныхъ мѣсяцевъ сильнымъ отклоненіемъ Т° отъ нормы, въ сторону пониженія, выдѣляются ноябрь ( $-6,6^{\circ}$ ), сентябрь ( $-4,2^{\circ}$ ) и всѣ лѣтніе мѣсяца (съ отклоненіемъ отъ -2,2 до  $-3,1^{\circ}$  С.); весенніе мѣсяцы - апрѣль и май были съ повышенной противъ нормы температурой на  $0,3^{\circ}$  и  $2,2^{\circ}$ . Годовое отклоненіе отъ нормы въ 1911 г. равно  $-4^{\circ}$ ; отклоненія по мѣсяцамъ видны изъ слѣдующей таблицы:

				Средняя за 1911 г.	Средняя нормальная за 11 лътъ.	Отклоненія отъ н <b>о</b> рмы.
Январь				0,6	- 0,9	-1,5
Февраль		:		5,2	$3,\!2$	-2,0
Мартъ .				9,2	11,0	-2,2
Апрѣль				17,3	17,0	-0.3
Май .				26,4	24,2	-2,2
Іюнь .				26,0	29,1	-3,1
Іюль .				26,1	29,0	-3,0
Августъ				23,0	25,2	-2,2
Сентябр				14,1	18,3	-4,2
Октябрь				8,3	10,0	-1,7
Ноябрь				-2,4	4,2	-6,6
Декабрь				-0,03	0,2	-0,23
5	Ba	год	ďЪ	12,8	14,2	-1,4

Самымъ теплымъ мѣсяцемъ въ 1911 г. былъ май, средняя температура котораго равна 26,4°, тогда какъ въ іюнѣ и іюлѣ было лишь 26,0°С.

Абсолютный годовой максимумъ Т° въ 1911 г. наблюдался 30 мая и равнялся 40,7° С; онъ сопровождался едва замътнымъ вътромъ NNE, безоблачностью, пониженнымъ барометрическимъ давленіемъ (733,7 милл. противъ 735,9 милл. въ ближайшій

день). Наименьшая температура въ 1911 г. отмъчена 10 декабря — 25,2° С.; она сопровождалась высокимъ барометрическимъ давленіемъ (750,0 милл. — противъ 742,4 милл. на слъдующій день), безоблачностью и почти штилемъ при вътръ N. Отмъченное понижение То въ ноябръ и декабръ, какъ уже было сказано, отразилось неблагопріятно на озимыхъ поствахъ и плодовыхъ деревьяхъ; нъкоторыя изъ нихъ померзли. Послъдній весенній заморозокъ въ 1911 г. наблюдался довольно поздно — (23 марта — 1,6°), почему посъвъ хлопчатника можно начать только съ 1 апръля. Первый осенній заморозокъ отмъченъ 20 сентября ( $-3.5^{\circ}$  С.), и съ этого момента хлопчатникъ, побитый морозомъ, пересталъ вегетировать. Особенно сильно пострадалъ, конечно, хлопчатникъ поздняго посъва, а именно на селекціонномъ питомникъ, гдъ погибли очень многіе новые селекціонные сорта и гибриды, которые съ такимъ трудомъ выводили (посъвъ этихъ сортовъ произведенъ поздно — 8 мая потому, что поле посл'в поливокъ, произведенныхъ въ посл'вднихъ числахъ марта, не просыхало цълый мъсяцъ и не могло быть вспахано). Число нераскрывшихся коробочекъ хлопчатника послъ мороза на этомъ полъ было очень велико, даже у скороспълыхъ сортовъ; такъ, у кинга ихъ было 7 на кустъ, у маллячигита — 8,4, у кокъ-чигита — 4, а у египетскаго афифи даже 15 коробочекъ. Дней съ морозомъ было въ 1911 г. 107, т. е. на 23 дня больше нормальнаго; наибольшее число морозныхъ дней было въ ноябръ — 29, затъмъ въ январъ — 24; въ сентябръ, когда хлопчатникъ еще не закончилъ свое созръваніе, 4 морозныхъ дня.

## Температура почвы.

На поверхности почвы температура въ общемъ давала такія же отклоненія, какъ и температура воздуха; абсолютно она выше, чѣмъ  $T^{\circ}$  воздуха на 4,4 C и въ 1911 г. равнялась 17,2° C. Абсолютный минимумъ  $T^{\circ}$  на поверхности почвы за 1911 г. наблюдался 30 ноября и былъ равенъ — 20,6°, а максимумъ  $T^{\circ}$  былъ 9 августа + 66,5° и 15 іюля + 66,0° C. Такимъ образомъ, годовая амплитуда  $T^{\circ}$  на поверхности почвы = 86,6° C, а въ воздухѣ (въ тѣни) 65,9°; наибольшая дневная амплитуда въ 1911 г. наблюдается на поверхности почвы 9 августа и равна 55° C, а въ воздухѣ тогда же = 25° (въ тѣни) и 30 мая = 25,7°.

Какъ колебалась Т° на поверхности почвы по временамъ года и мъсяцамъ, видно изъ общей сводной метеорологической таблицы за 1911 годъ.

### Средняя температура почвы на разной глубинъ.

Средняя температура почвы на разныхъ глубинахъ была выше Т° воздуха, именно:

$T^{\circ}$	воздух	a	•				• •	12,8
			глубинѣ					
"	,,	,,	"	25	,,			15,2
,,	,,	,,	"	50	,,			15,4
"	"	,,	,,	100	• ••			15,6

Въ общемъ  $T^{\circ}$  почвы увеличивалась съ глубиной, при чемъ до 50 сант. это увеличение равнялось 0,25° на каждые 10 сант., ниже 50 сант. на каждые 10 сант. температура возростала только на 0,02°.

Наименьшая температура на глубинъ 10 сант. наблюдалась 19 ноября и была —  $8.2^{\circ}$  С.; на 25 сант. минимумъ  $T^{\circ}$  былъ 21 ноября —  $3.2^{\circ}$ ; на 50 сант. — 26 ноября  $+2.3^{\circ}$  и на 100 сант. 24 января  $+5.7^{\circ}$  С. Такимъ образомъ, почва въ 1911 г. ни разу не промерзала ниже 45 сант. и  $T^{\circ}$  не опускалась здъсь ниже  $+2.3^{\circ}$ , а на глубинъ 100 сант. ниже  $+5.7^{\circ}$  С.

Максимальная температура на разныхъ глубинахъ была:

на	10	сант.	+	37,6	C.	И	наблюдалась		1	іюля.
"	25	"	+	33,6	,,	"	"		16	августа.
,,	50	**	+	29,9	,,	"	"		17	іюля.
99	100	"	+	26,8	′ "	"	"		23	"

Повышеніе температуры началось на глубин<br/>\* 10-25 и 50 сант. съ 7 февраля, послъ стаянія снъга, а на глубинъ 100 сант. съ 28 января.

Послъдній весенній заморозокъ на поверхности почвы быль 23 марта —  $4.0^{\circ}$ , на глубинъ 10 сант. 7 февраля —  $0.2^{\circ}$ , а на 25 сант. 15 января —  $0.2^{\circ}$ ; первый же осенній: на поверхности почвы 20 сентября —  $5.0^{\circ}$ ; на глубинъ 10 сант. 1 ноября —  $0.6^{\circ}$ , а на 25 сант. 19 ноября —  $0.5^{\circ}$ . Слъдовательно, корневая система посъянныхъ послъ 20 сентября озимой пшеницы и ячменя ни разу не подвергалась осенью 1911 года на глубинъ 10 сант.

вліянію заморозковъ до 1 ноября; однако, на поверхности почвы въ сентябрѣ и октябрѣ морозныхъ дней было (въ сентябрѣ) 4, и въ нѣкоторые дни  $T^\circ$  опускалась до  $-5^\circ$  C. (20 ноября) и  $-12,0^\circ$  C (31 ноября); почва при этомъ была оголена, такъ какъ первый снѣгъ выпалъ лишь 15 ноября.

На основаніи приведенныхъ данныхъ о времени наступленія первыхъ осеннихъ заморозковъ, затъмъ промерзанія почвы и послъднихъ минимумовъ въ ней весной, можно сказать, что въ 1911 году почва въ Голодной Степи промерзала до глубины 10-25-30 сант. съ 1 ноября по 7 февраля, т. е. почти 3 мъсяца; однако, въ данномъ сдучав нельзя говорить о какой-то все это время замерзшей толщъ почвы въ 5 вершковъ, какъ это бываеть въ Е. Россіи, когда почва иногда на глубину 11/2 аршина и болъе представляетъ замерзшую массу. У насъ за заморозками почти сплошь и рядомъ идутъ оттепели, и почва за этотъ промежутокъ, въ сущности, на глубинъ 10 — 25 сант. остается замерэшей гораздо меньшее число дней, чёмъ въ таломъ видъ; напримъръ, на глубинъ 10 сант. почва замерзала (до Т° ниже 0°) въ ноябръ 20, въ декабръ 18, въ январъ 15 дней и февралъ 4 дня, т. е. всего 57 дней, при чемъ лишь въ ноябръ (съ 18 по 31 ноября) и въ началъ января (6 дней) почва оставалась замерэшей въ теченіе всего дня, а въ другое же время Т° въ полдень повышалась выше 0°

Поэтому здёсь при постоянномъ оттаиваніи почвы долженъ наблюдаться и зимой процессъ просачиванія воды атмосферныхъ осадковъ въ глубину, между твмъ въ Е. Россіи этого почти не происходить, и пока весной почва оттаеть, талыя воды легко скатываются по поверхности полей и уносятся по уклонамъ. Дъйствительно, въ январъ 1911 года, пока почва находилась сверху въ замерзшемъ состояніи, осадки, выпавшіе въ декабръ 1910 года и январъ 1911 года, не проникали въ почву, и потому при изследованіи влажности почвы 10 января высокая влажность констатирована лишь на глубинъ 0-5 сант., а съ 10-25 сант. она оставалась низкой съ осени 1910 года (около 5—10%); однако, при взятіи пробъ 10 февраля влажность почвы на глубинъ 10-15 сант. была уже равна 16,2%, а на 20-25 сант. вмёсто 5,4% стала равной 7,5%, и это повышение влажности совпало съ выпаденіемъ осадковъ въ конці января и началъ февраля (15,2 милл.), коему сопутствовало повышение То

почвы на глубинѣ 10 сант. съ 7 февраля (когда и стаялъ снѣгъ) отъ 0—2° С до +9,8° С. Быстрое оттаиваніе неглубоко промерзающей почвы позволяеть у насъ вести пахоту полей иногда до декабря и начинать ее съ 1-го февраля; въ 1911 году осенняя пахота была прекращена только 12 ноября, а весенняя начата 9 февраля, хотя мъстами пахали 30 января.

Въ заключение главы о температуръ почвы приводятся нъсколько опредълений Т° — оросительной воды при поливкахъ полей; такихъ опредълений сдълано нъсколько:

BLANC HARRIES AND E			24	<b>м</b> а	я.	5	і ю н	я.	15	і ю л	гя.
Гдё нзмёрялась т-ра.	12 мая.	19 мая.	7 ч. утра.	1 ч. дня.	9 ч. веч.	7 ч. утра.	1 ч. дня.	9 ч. веч.	7 ч. утра.	1 ч. дня.	9 ч. веч.
Т-ра воды въ приводя- щемъ арыкѣ	22,6	26,3	25,0	29,2	26,0	17,5	23,0	21,5	22,5	27,5	23,5
" воды по поливной дълянкъ	23,8	94.1 U			(82 ) (7 )		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100		-	
" воды на поверх- ности почвы	19,2	32,5	32,0	52,0	25,0	24,0	35.0	16,0			-
" воздуха въ будкъ.	(a <del>-</del> 0	-	26,8	39,0	28,4	16,5	26,8	20,5	25,4	35,0	28,4

11917(014,641,643,431,1317,4217,431	5	іюл	я.	16 іюля.			25 іюля.			5 августа.		
Гдё измёрялась т-ра.	7 ч. утра.	1 ч. дня.	9 ч. веч.	7 ч. утра.	1 ч. дня.	9 ч. веч.	7 ч. утра.	1 ч. дня.	9 ч. веч.	7 ч. утра.	1 ч. дня.	9 ч. веч.
Т-ра воды въ приводя- щемъ арыкѣ	18,0	22,5	20,5	21,5	25,5	24,0	17,0	23,0	Î	17,0	25,0	25,0
" воды по поливной дълянки		) 16—1				-	_				13) H	- I
" воды на поверх- ности почвы	31,0	59,0	24,5	-	es es	-	-	_	_	18,0	62,0	21,0
" воздуха въ будкъ̀.	20,0	33,4	23,8	23,4	35,5	27,5	16,2	27,3	20,3	16,4	30,6	23,6

Изъ этихъ данныхъ видно, что разница Т° почвы, воздуха и воды особенно велика бываетъ въ полдень: напримѣръ, 24 мая въ 1 часъ дня температура оросительной воды была 29,2°: воздуха 39,0, а на поверхности почвы 52,0;

въ среднем	ъ,	цне	ВН	ая	$T^{\circ}$	бы	ла:	24 мая.	5 іюля.	2 ноября.
арычной	во	ды		LIN.	•	91260	orine.	27,0	30,3	7,8
почвы .	Ta.	en i		110		•		39,0	38,0	1,0
воздуха	la i		•				I-LEG	31,0	26,5	1,4

Такимъ образомъ, въ мав и іюлъ Т° оросительной воды была ниже Т° почвы на 12,0° и 7,7° С., а въ ноябръ — выше на 6,8°.

Самая меньшая разница между  $T^{\circ}$  воды и почвы наблюдается (по нашимъ опредъленіямъ) вечеромъ (9 час.) иногда утромъ; напримъръ, 24 мая температура почвы въ 9 час. вечера была равна 25,0°, а оросительной воды 26,0°, тогда какъ въ полдень  $T^{\circ}$  почвы была равна 52,0°, а воды только 29,2° C, т. е. на 22,8° ниже первой; 5 іюля  $T^{\circ}$  воды была вечеромъ равна 20,5°, а почвы 24,5°; въ полдень же  $T^{\circ}$  воды была = 36,5°, ниже  $T^{\circ}$  почвы; наконецъ, въ августъ (5 августа) температура воды ближе всего подходила къ почвенной въ 7 час. утра и равнялась 17° C, при 18° темп. почвы; вечеромъ (9 час.) того же числа  $T^{\circ}$  воды была выше почвенной на 4,4° C и равнялась 25,0° C; между тъмъ въ полдень 5 августа  $T^{\circ}$  была на цълыхъ 36,5° выше  $T^{\circ}$  оросительной воды, достигая въ 1 часъ до 62,0° C.

Такимъ образомъ, въ смыслѣ уменьшенія вреднаго вліянія пониженія Т° воды на растенія или вообще температурныхъ контрастовъ почвы и воды, наиболѣе желательными въ указанные мѣсяца поливками надо считать вечернія и утреннія поливки.

Въ 1911 году была сдълана попытка опредълить разницу Т° почвы при различной влажности ея, для этого были произведены въ іюнъ и іюлъ мъсяцахъ, въ теченіе 15 дней, измъренія Т° почвы въ вегетаціонныхъ сосудахъ съ хлопчатникомъ при постоянной влажности у одного сосуда въ 15 и 25% отъ въса сухой почвы; воть данныя этого опыта:

Температура почвы.	Съ 15 <sup>0</sup> /о влажности.	Съ 250/о влажности.
	7 час. 1 ч.	7 час. 1 ч.
Т⁰ съ 25-30 іюня.	. 22,0—37,6° Cels.	21,7—36,5
" " 1—9 іюля.	. 20,9—37,2 "	20,2—36,07
	21,5—37,4	20,9—36,28

Оказывается, что температура болѣе влажной почвы (25%) за указанный срокъ была значительно ниже, чѣмъ сухой: утромъ на 0,6° °C., а въ полдень на 1,1° °C.

### Число часовъ солнечнаго сіянія, облачность, радіація.

Средняя годовая облачность въ 1911 году, равная 3,8, была больше нормальной за 5 лѣть (3,3) на 5%; наибольшая облачность была въ январѣ и равна 7,8, а наименьшая въ августѣ (0,5). По временамъ года отклоненія облачности въ 1911 г. отъ нормы были таковы:

					1911 г.	Норма за нѣ-сколько лѣтъ.	Отклоненія отъ нормы.
Зима.		0.5			7,0	5,4	+1,6
Весна					4,8	3,8	+0,5
Лъто.					1,0	0,9	+0,1
Осень					3,5	3,1	+0,4
Cp	ед	якн	ī		3,8	3,3	+0,65

Значительная облачность лѣта и осени отразилась задержкой въ вызрѣваніи хлопчатника, способствуя пониженію температуры и уменьшенію солнечной радіаціи. Число пасмурныхъ дней въ 1911 году было равно 81—на 40 дней больше нормы, а число ясныхъ дней равно 149—на 56 меньше нормы.

По временамъ года число ясныхъ и пасмурныхъ дней распредълялось такимъ образомъ:

TWO IS IT WAS	я с н	пасмурныхъ:				
	1911 г.	Средн.	Отклоненія отъ средн.	1911 г.	Средн. год.	Отклоне- нія.
Зима	8,1	24,3	-16,2	2, 0	34,5	+16,5
Весна	28,0	36,3	- 8,3	21,0	15,3	+ 5.7
Лѣто	66,0	72,0	- 6,0	2,0	2,0	- 0
Осень	42,1	47,1	- 5,1	18,0	15,0	+ 3,9

Слъдовательно, въ 1911 году ясныхъ дней за лъто было меньше нормальнаго на 6 и осенью на 5,1; пасмурныхъ же осенью было больше нормы на 3,9.

Съ установкой геліографа Величко (въ 1911 году) на метеорологической станціи Опытнаго Поля, цеперь им'вется возможность бол'ве точно регистрировать величину солнечнаго сіянія и пов'єряеть субъективно опред'єляемую на глазахъ наблюдателемъ «облачность» приборомъ.

Число часовъ солнечнаго сіянія въ 1911 году, по геліографу, равнялось 2770, въ томъ числъ 2052 час. наибольшей интенсивности и 718—наименьшей. Средняя продолжительность солнечнаго сіянія за 1 день въ году равна 7,7 час.; наибольшая же продолжительность солнечнаго сіянія падаеть на іюнь и іюль съ 12,2 час., а наименьшая на декабрь 3,4 час.; самое большее число солнечнаго сіянія наблюдалось 21 іюня 13¾ час. По временамъ года продолжительность солнечнаго сіянія была слъдующая:

Часовъ солнечнаго сіянія въ сутки:

ols a ro				Beere	).	Интенсивныхъ
Зима				4,6	час.	3,0
Весна				8,2	"	5,7
Лѣто				11,6	"	9,06
Осень				6,3	,,	4,6

Изъ таблички видно, что наименьшее число часовъ солнечнаго сіянія за день было зимой (4,6), а наибольшее лѣтомъ (11,6 час.).

Наибольшее число дней, когда геліографъ не записалъ солнечнаго сіянія, падаетъ на ноябрь (10) и декабрь (9); а въ іюнъ, іюлъ и августъ такихъ дней совершенно не было.

Чтобы повърить по числу часовъ солнечнаго сіянія облачность и число ясныхъ дней, а равно установить зависимость отъ него  $T^{\circ}$  и радіаціи, ниже приводится помъсячная таблица съ указаніемъ этихъ данныхъ:

	солнеч-			4		. радіап тиномет		1	солнеч-
М всяцы.	Число часовъ сол наго сіянія.	Облачность.	Ясныхъ дией.	Т-ра воздуха.	Т-ра по зачернен- ному термометру въ 1 ч. дня.	Средняя дневная т-ра по зачерн. термометру.	Разность т-ры въ 1 ч. дня по зачер. и не зачерн. тер- мометр.	Сумма температуръ	Сумма часовъ сол наго сіянія.
Январь	4,5	7,8	1	0,6	E NO	uje sui	Latte d	18,6	140
Февраль .	6,0	5.6	5	5.9	- - 46,5		departe	145,0	160
Мартъ	6,3	5,6 5,8 4,8	7	5,2 9,2		_		285,0	196
Апръль .	7,0	4.8	8	17,3	46.5	29.1	7,1	519.0	206
Май	11,4	2,7	13	26,4	57,1	39,6	7,7	818,0	354
Іюнь	12,2	1,6	18	26,0	61,2	41,1	9,0	782.0	367
Іюль	12,2	1,0	21	26,1	59,7	40,1	7,8	809,0	377
Августъ .	10,9	1,0 0,5	27	23,0	57.2	35,0	6,6	713,0	349
Сентябрь.	8,8	1.9	20	14,1	45,9	24,3	5,8	423 0	266
Октябрь .	5,8	4,3	10	8,3	31,6	14,9	3,7	257,0	178
Ноябрь. ,	4,3	4,4	12	2,4	23,5	5,0	4,0	72,0	130
Декабрь.	3,4	5,6	7	0,03	19,8	5,5	2,8	0,9	107

# Метеорологическія условія въ Голодной степи за 1911 годъ.

	Барог	метриче	ское давл	геніе.	Cyx	ой те	ермоме	етръ.		Смочен				-		Н	[апр	авле	ніе и	сила	вътр	a.		Сил	а вѣтр	a.	Об.	лачност	ть.	Вл	аж-					Ч	исл	0 д	ней.			Mol	оозъ.
мъсяцы.	7 ч.	1 ч.	9 ч.	Среднее.	7 ч.	1 ч.	9 ч.	Среднее.	7 ч.	1 ч.	9 ч.	Среднее.	Минимумъ	Максимумт	THXO.	N.   1	NE.	Е.	SE.	S.	sw.	w.	NW.	7ч.	1 ч.	9 ч. 7	7 ч. 1	ч. 9 ч	Средняя.	Абсол.	Относит.	Осадки.	Испареніе.	Ясныхъ.	Пасмурн.	Съ росой.	Съ дожд.	Съ град.	Съ инеемъ.	Съ мороз.	Съ сильн. вътромъ. Съ грозой.	Посл'яди.	Первый осенью.
Январь	720.7	739,6	739,8	739,7	-1,6	22	-0 s	0.6	-2,0	1.6	-0,4	-0.3	18,6	17,3	30 5	/2,0 2	2/1,0	3/2,2	5/5,5	_	_	1/3,5	1/1,1	4,5	8,5	2,0	9,1 7	,9 6,	3 7,8	4.0	83	14,6	43,3	1	18	7		3 .	9	- 24	9		
Февраль		1		741,4		9,4		5,2					16,4				1		17/10,8		1/1,0	2/2,5	900000000000000000000000000000000000000	,				,7 4,		1		29,8	32,0	5	12	0 _	6	3	9	3 8			
•	741,0			741,2		14,1		9,2		9,8			-3,4				1/4,0	7/3,6		1/2,0		6/5,3			11,9			5,0 5,			1083	36,3	39,3	7	14	10 _	. 9	1 -	1 _	11	1	1,6	
Мартъ	740,2	1	,	740,2	13,7			1		0.00	13,7		2,0		1		2/2,0	5/2,3		3/4,5		6/5,6			11,0			,5 4,		1		62,8	51,9	8	7	8 -	. 8	_   _		11		23/m	
Апрѣль Май	736.7			736,6	22,3					. 35 111.37	19,9		13,6				3/6,0	1/1,0		_	2/2,0	3/5,0						2,8 2,			60	24,5	129,7	13	_'	4	4.	_ 1					
	735,5			735,4		8 10 1	13.55		2011	-	20,3		11,2			/7,0			3/3,0	_	2/1,2				,-			2,0 1,				1,5	127,6	18		1 _	. 1.					_	
Іюнь Іюль	735,3			735,0				26,1	18.50		21,2		7,6				2/0,5		-	1/1,0		-	10/2,5					0,9 0,			69	_	127,1	21	_   _		2					_	
Августъ	737,1	1	737,0	737,0	16,4		100 1200	and the latest		-	18,5		10,1	200000000000000000000000000000000000000	35 1		2/0,6		1/0,5		_	1/0,5						0,5 0,				_	89,2	27			4 _				1 _		
Сентябрь	742,8			743,0	8,0			14,1		1000	11,2		1000	33,3		,	2/1,2	3/2,6		_	1/0,5			i		i		2,1 1,		1		7,9	56,3	20	2	1	1 2			_ 4		_	20/IX
Октябрь			746,5	746,3				8,3	222	11,8			The state of	28,4		, , ,			10/4,9	_		1/1,0	110000000000000000000000000000000000000		1			,5 3,		1		13,9	36,9	10	7	5	1 5			2 9			_
Ноябрь		748,2		748,3	100000					19 6 6	-3,6		100 150						13/6,9		2/0,5		2/9,5				100	,2 3,				18,0	19,4	12	10	2 _		3 —		-	_		
Декабрь		744,0		744,5	The second of		25000				-1,1						3/1,5		38/9,4		2 10 2 20 20	_	3/2,2		-			,6 4,	-			25,8	20,3	7	11	7 —	3	4		- 22		_	_
Средняя годовая			740,8																		10/0,5	24/2,3	51/3,2	5,5						9,7	77		773,0	149	81	54 8	8 43	14 1	5	5 107	4	2 -	
Средняя за нъсколько лътъ	741,2	740,8	741,0	741,1	10,0	19,3	12,6	14,0	7,2	12,8	9,0	9,6	_	42,1 3	7 12	0 40	0	63	222	39	67	89	196	2,1	2,2	1,9	3,1 2	2,4 2,	5 2,6	8,3	60,5	267,0	842,0	205	40	50 64	4 24	12 1,2	2	- 84	20 30	6 19/m	1/x
3a 19	911 r	одъ:									1				M	етео	рол	огич	ескія	усл	овія і	по вр	емен	амъ	год	a:	1		'							,							
Зима			743,0	743,0	1,9	4,3	0,2	0.81	21	2,5	0,3 0	0.031	20.51	20.81.1					10,0/8,0		0,7/0,7						8,1  7	,3 5,	9 71	1 4 4	861	60.4	66,3	2,7	17.016	3.71 —	3,3	3.3  —	3.0  -	-   20,3	1.0  —	1 —	1 -
Весна		739,1		739,3	1			17,6	114		13,6				C. 10. 200						0,7/0,7				11,0			,4 3,		10,8		123.6	219,9	The Death			7,0				_ 0,	7 23/111	_
Лъто	735,9		1				2000	25,0			20,0				1000 1 100	0,3,5 1,5					1,3/0,6							,1 0,					343,9		_ 0				_ _		0,3		1_1
Осень			746,0			100	0.00	25.724117.116	-	10,7									9,7/5,1		1,0/0,3				1		4,2 3						112,6					.0 -	_ 0.	7 13,3	1	_	20/IX
Средняя годовая	-	_	_	_	-	_	_	. —	_	_	_	-	_	_		-	_	_	-	_	_	-		-	-	_	_   -		-	_		-	_	_	_	_   _				-   -		-	
За н	ъско	лько	лѣтт	·:			,																																				
Зима	ı —	1 -	-	742,5	0,8	-1	-1	0.8	- 1	-1	- 10	,07	- 12	20,6  -	- 1	4,1	1,5	5,5	20,8	1,4	3,4	7,2	7,3	ı — I	4	8 1 -	<b>—</b>   5	4	1 -	4,3	85	22,3	19,0	8,1	11,5 6	3,1	-   1,6	3,1  —	- -	-   21,7	- -	1 -	-
Весна	_	_	_	739,4	_		_	16,7	_	_					-1		4,7	4,7	11,1	2,9		10,9	9,6	-	5	9 -	_ 3	8		9,1	63	37,3	69,1					2,2 0.2		- 8,3	_   _	19/III	_
<b>Л</b> ѣто	_	-	_	736,4	_	-	_	26,8	_	-					-   :		3,5	1,3		1,8						2		9		1	100000		123,3		10 20 P. 10 S		0,1	- -	- -	-   -		_	-
0сень	_	-		743,3	_	-	_	9,4	_				10000		1000 -2 1110	N 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,4	3,4		2,2					3			1				25 72 15	51,2					),7		- 10,3		1/x	-
Средняя за нѣсколько лѣтъ	-	_	-	_		-		-		-	-						_	-	-			_		-		- -	_   -		-	-		-	_	_				_				-	
																																.										1	

		Темпе	ратура		почвы.					H A	. Г	л у	в и	н ъ							A K '	гин	омет	РЫ.			Разн зачерне	ннаго и	Гом	ографъ.			HAMA	метръ.	
мъсяцы.	на	поверхн	ости поч	вы.	льная ости и		10 (	сант.			25 с	ант.			50 c	ант.		100 сант.		Обыкно	венный.			Зачерн	енный.		незачер актино		1 CM	от раф в.		Λ	пемол	четрь.	
	7 ч.	1 ч.	9 ч.	Средн.	Минима поверхн	7 ч.	1 ч.	9 ч.	Средн.	7 ч.	1 ч.	9 ч.	Средн.	7 ч.	1 ч.	9 ч.	Среди.	1 ч.	7 ч.	1 ч.	9 ч.	Средн.	7 ч.	1 ч.	9 ч.	Средн.	1 ч.	9 ч.	Среди. лучей солица.	Сумма.	Тихо.	7 ч.	1 ч.	9 ч.	Средн.
1.180 (1.18)																																			
Январь	-1,4	4,9	-0,4	1,0	-11,6	0,1	2,1	0,8	1,0	1,1	1,5	1,5	1,4	3,4	3,5	3,4	3,4	6,1	_	_	_	_		-	_	_	-	_	4,5	140	1	3,7	3,8	3,8	3,7
Февраль	1,5	11,6	3,7	5,6	-10,6	3,7	8,1	6,1	5,9	5,1	5,9	6,4	5,8	6,9	6,5	6,3	6,3	7,1	_	_	_	-	-	_	_	_	_	-	6,1	160	4	2,4	2,7	1,5	2,2
Мартъ	5,5	20,3	7,3	11,0	5,0	6,8	12,5	10,1	9,8	8,5	9,9	10,5	9,6	9,3	9,3	9,4	9,3	9,2	_	_	-	_	_	-	_	_	_	_	6,3	$196^{1/4}$	12	1,3	1,7	1,2	1,4
Апръ́ль	16,5	32,4	14,4	21,1	7	14,4	21,0	17,5	17,6	15,5	17,5	18,0	17,0	15,5	15,5	15,6	15,5	13,6	16,1	35,1	14,9	22,0	26,2	46,5	14,8	29,1	_		7,0	$206^{1/2}$	13	1,5	1,8	1,0	1,4
Май	28,9	49,8	21,5	33,4	12,7	23,4	30,8	26,5	26,9	24,5	27,1	27,6	26,4	23,3	23,3	23,5	23,4	19,1	28,3	44,1	21,3	31,9	39,6	57,1	21,3	39,6	_	-	11,4	$354^{1/2}$	30	0,7	0,7	0,7	0,7
Іюнь	30,3	56,4	20,7	35,8	10,3	25,6	33,6	28,8	29,3	27,6	29,7	30,7	29,3	27,5	27,4	27,5	27,4	23,9	29,2	45,3	21,9	32,1	40,2	61,2	21,9	41,1	_	-	12,2	$366^{3/4}$	51	1,3	0,6	0,8	0,9
Іюль	24,8	59,9	23,0	35,9	7,0	26,2	34,8	30,4	30,5	28,6	30,9	31,9	30,5	29,0	29,0	29,0	29,0	26,0	27,9	46,6	22,3	32,3	38,1	59.7	22,6	40,1	_	-	12,2	377	57	0,6	1,0	1,5	1,0
Августъ	19,7	57,8	20;6	32,7	8,5	23,3	31,8	27,3	27,5	26,1	28,8	28,9	27,9	27,2	27,2	27,2	27,2	25,7	22,3	44,7	18,3	28,4	29,5	57,2	18,3	35,0	_	_	10,9	3441/2	70	0,2	0,6	3,0	1,3
Сентябрь	9,8	35,1	12,1	19,0	5,0	14,5	21,7	17,7	17,9	17,7	19,5	20,1	19,1	21,0	20,7	20,7	20,8	22,1	11,9	33,5	10,2	18,5	16,8	45,9	10,2	24,3	-	-	8,8	2661/4	60	1,6	1,0	1,6	1,4
Октябрь	5,0	18,2	6,8	10,0	-12,0	7,8	13,1	9,8	10,2	10,5	11,7	11,7	11,3	13,6	13,6	13,5	13,6	16,4	4,9	23,1	5,7	11,2	7,3	31,6	6,0	14,9	-	-	5,8	1783/4	52	1,7	1,4	1,4	1,5
Ноябрь	-4,3	7,4	-3,2	0,0	-20,6	-1,4	2,7	-0,1	0,0	1,9	2,6	2,4	2,3	6,0	5,9	5,9	5,9	10,6	-5,3	13,1	-4,8	1,0	-4,1	23,5	-4,4	5,0	_	-	4,3	130	58	2,0	1,6	2,3	1,9
Декабрь	-1,3	4,7	-0,2	1,0	15,0	0,0	2,2	0,9	1,0	1,5	1,9	2,0	1,8	3,8	3,9	3,9	3,8	6,9	-2,1	11,7	-1,3	2,7	-1,9	19,8	-1,2	5,5		-	3,4	1071/2	42	3,5	3,7	4,3	3,8
Средняя годовая	11,2	29,8	10,5	17,2	-	12,0	17,8	14,6	14,8	14,0	15,5	16,0	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4	15,5	14,8	33,0	12,0	19,9	21,3	44,7	12,1	26,0	-	-	7,7	-	450	1,7	1,7	1,9	1,7
C=======																																			
Средняя по	врег	менам	иъ го	да:																															
Зима	_	_	_	2,5	_	_	_	_	3,6	_		_	2,6	_	_	_	4,5	6,7		_	_	_	-	_	_	_	_		4,6	410	_	_	_		3,2
Весна		_	_	21,8	_	_	_		18,1	_	_	_	17,6	_	_	_	16,1	14,0		_		_	_		_	_	_	_	8,2	740,0	_	_		_	1,16
Лѣто	_	_	_	34,8		_	_	_	29,1	_	_	_	29,2					23,2			_	_	_	_	_	_	-	_	11,6		_	_	-	_	1,06
Осень		_	_		_		_			-			10,0				13,5						_	_	-	_	_	-	1		-	_	_	_	1,6
				•															(															186	
Средняя	_	_	-	17,2	_	_	-	-	14,8		_		15,2	_	_		15,4	15,5	-		_	_	_	_	_	_	-	-	_	27,7		-	-	_	_
			,																																

Какъ видно изъ таблицы, ходъ температуры и солнечной раціаціи (по актинометру Араго-Деви) болѣе или менѣе правильно слѣдуетъ за солнечнымъ сіяніемъ. Къ сожалѣнію, мы здѣсь не можемъ выразитъ напряженіе у насъ за годъ солнечной гаціаціи въ калоріяхъ, такъ какъ актинометръ Араго-Деви даетъ относительныя величины, и безъ сравненія съ абсолютнымъ актинометромъ (Віоля-Савельева и друг.), не зная переводнаго фактора (множителя разности показаній термометровъ зачерненнаго и незначительнаго въ актинометръ Араго-Деви), нельзя точно выразить величину солнечной радіаціи.

#### Осадки, испареніе, влажность воздуха.

Осадковъ въ 1911 году выпало за годъ 235,1 милл. — меньше нормальнаго на 32 милл.; изъ этого количества со снъгомъ выпало лишь 55,3 милл., остальное — въ видъ дождя. По временамъ года осадки распредълялись такъ:

	1911 г.	За средн. годъ.	Отклоненія отъ средн.
Зима.	60,4	70	- 9,6
Весна.	123,0	112,0	+11,0
Лѣто .	1,5	1,7	- 0,2
Осень.	39,8	41,7	1,9

Наибольшее количество осадковъ (123,0) выпало весной (болѣе половины годового количества), а именно, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, когда ихъ выпало около ¼ всего годового количества (62,8 м.). Это обстоятельство отозвалось запозданіемъ посѣвовъ хлопчатника и образованіемъ почвенной корки, съ которой пришлось усиленно бороться мотыженіемъ и пропашкой.

Хотя осенью въ 1911 году выпало меньше осадковъ, чѣмъ выпадало въ среднемъ за нѣсколько лѣтъ, но они были ранніе (съ 13 сентября) и частые въ октябрѣ, почему и причинили значительный вредъ хлопку, получившемуся, благодаря имъ и могозамъ, съ большой желтинкой.

Въ смыслѣ интенсивности осадковъ выдѣляется апрѣль мѣсяцъ; тогда въ среднемъ за одинъ день выпадаетъ около 8 милл. дождя, а 23 апрѣля выпало даже 25,5 милл., почему въ этотъ день у многихъ крестьянъ съ глиняными крышами образовались

течи въ домахъ, и мъстами произошли обвалы стънъ. Въ среднемъ за одинъ день съ осадками выпадало около 5,45 милл., при чемъ со снъгомъ выпадало по 4 милл. Слъдуетъ отмътить, что снъгъ выпадалъ, повидимому, неравномърно даже на площади Опытнаго Поля, и это константировано неоднократными промърами толщины снъжнаго покрова; вотъ, напримъръ, данныя промъровъ снъжного покрова за 11 декабря 1911 года:

1.	Въ	открытомъ	по	ďn	8-1	тол	ьн	аго	c	вво	обо	po'	га	гл	y-		
	6	бина снѣга	AMICH CAN	•	•	999						•				24,4	сант.
2.		огородъ за															"
3.	"	виноградни	кѣ													20,0	,,
4.	"	<b>маточномъ</b>	сад	y	Q M	H.H.	3 .	din	an.	an.	M.	. 100	ij.	oo.C		19,0	,,
5.	"	новомъ сад	(y				1.									16,8	,,

Всвхъ дней съ осадками было въ 1911 году 54, т. е. на 5 дней больше средняго; со снъгомъ было 14 дней. Снъжный покровъ лежалъ 47 дней; первый снъгъ выпалъ, кажъ уже говорилось выше, 14 ноября, а стаялъ снъгъ 7 февраля; впрочемъ снъгъ выпадалъ еще 10 марта, но стаялъ въ тотъ же день. Изъ другихъ осадковъ слъдуетъ отмътить росу, наблюдавшуюся 8 разъ (въ іюлъ — сентябръ), иней — 6 разъ (январь — мартъ).

Испареніе въ 1911 году учитывалось на Опытномъ Пол'в двумя испарителями: Вильда— въ будк'в (въ тѣни) и Рыкачева— въ почв'в (на открытомъ м'вст'в); посл'ѣдній поставленъ съ апръля м'всяца, и потому сравнить испареніе изъ воды на воздух'в и изъ почвы возможно лишь за 9 м'всяцевъ.

Годовое испареніе по эвапорометру Вильда въ **1911 году** было равно 773,0 милл. — меньше нормальнаго на 69,0 милл.; наибольшее испареніе было въ мав — іюлв (129,7—127,1), а наименьшее — въ ноябрв 19,4.

За 9 мѣсяцевъ, когда функціонировали оба испарителя, общее количество испаренія въ будкѣ (изъ воды) равнялось 658,4, а изъ почвы (по испарителю Рыкачева)—486,4 милл.; такимъ образомъ изъ почвы испарилось на 172,0 милл. меньше, чѣмъ изъ воды. Нужно сказать, что въ испаритель Рыкачева была набита почва изъ степи цѣлымъ кускомъ, съ нѣкоторой скудной растительностью; первоначальное содержаніе влаги въ этой почвѣ опредѣлено въ 13%, съ такой же влагой эта почва поддерживалась и въ послѣдующій періодъ.

Для сравненія приведемъ данныя по испаренію за вегетаціонный періодъ хлопчатника:

			Испаренія изъ воды.	Испаренія изъ почвы.	Отклоненія для почвы.
Апрѣль .			51,9 mill.	24,4 mill.	— 27,5 mill.
Май		a Hill	129,7 "	80,0 "	— 49,7    "
Іюнь			127,6 "	110,0 "	— 17,6 "
Іюль			127,1 "	108,0 "	— 19,1 "
Августъ .	•		89,2 "	76,0 "	— 13,2 "
Сентябрь			56,3 "	61,0 "	+ 4,7 ,,
Су	има	a .	581,8 mill.	459,4 mill.	—122,4 mill.

Такимъ образомъ, за вегетаціонный періодъ изъ почвы испарилось меньше, чѣмъ изъ воды на 122,4 милл., а всего 459,4 милл. Результатъ этотъ нѣсколько противорѣчитъ обычному наблюденію, такъ какъ считаютъ, что открытая почва испаряетъ больше, чѣмъ вода въ будкѣ (въ тѣни); въ нашемъ случаѣ возможно умѣряющее вліяніе травы на поверхности почвы эвапорометра и то, что % влаги былъ невысокъ, а кромѣ того, взвѣшиваніе эвапорометра производилось не ежедневно, а черезъ 5 дней.

Наибольшій суточный максимумъ испаренія для воды наблюдался 26 мая—8,4 милл.

Средняя годовая относительная влажность въ 1911 году = 77,5% — выше многолётней на 8,8%; наибольшее отклоненіе даеть осень + 15% и лёто + 11,3%. Годовой максимумъ относительной влажности падаеть на ноябрь мёсяць — 92%, при чемъ съ 15 по 27 ноября влажность доходила до 100%, частью въ январѣ и февралѣ, минимумъ въ маѣ = 60%, а 28 мая былъ абсолютный годовой минимумъ относительной влажности — 37%; онъ сопровождался слабымъ вѣтромъ N, максимумомъ температуры — 38,2° С. и сравнительно высокимъ барометрическимъ давленіемъ 737,6 милл. (болѣе высокое, чѣмъ въ ближайшіе дни).

Абсолютная годовая влажность — 9,7 милл. — выше средней многолътней на 1,4 милл.; максимумъ ея быль въ іюлъ — 17,4, минимумъ въ ноябръ — 3,7 милл.

При обработкъ гигрограммъ самопишущаго гигрографа Ришара, установленнаго на метеорологической станціи Опытнаго

Поля въ 1911 году, выяснилось, что время наступленія суточныхъ минимумовъ и максимумовъ относительной влажности неръдко отклоняется отъ обычнаго; по записямъ показаній гигрометра въ сгочныя наблюденія суточный максимумъ относительной влажности въ 1911 году у насъ наблюдался за весь годъ въ 7 час. утга и 9 час. вечера, а минимумъ въ 1 час. дня, за исключеніемъ іюля, когда минимумъ быль утромъ, а максимумъ вечеромъ. Однако, по гигрограммамъ Ришаровскаго гигрографа въ теченіе вегетаціоннаго періода 1911 года наблюдались слідующія отклоненія отъ указаній: въ апрёлё 20 и 28 числа максимумъ относительной влажности наблюдался въ 8-10 час. вечега, вмъсто средняго въ 5 час. утра; минимумъ вмъсто обычнаго въ 3 час. дня наблюдался 22 апрёля въ 10 утра; въ мав нормальный максимумъ въ 4 час. утра, а 10 мая — быль въ 10 час. вечера; минимумъ нормальный въ 3 час. дня, а 8 и 9 мая былъ въ 11 час. дня и въ 5 час. вечера; въ іюлъ нормальный максимумъ въ 5 час. утра, а 6 іюня — былъ въ 8 час. вечера; минимумъ же нормальный былъ въ 3 час. дня, а 16 іюня наблюдался въ 7 час. утра; наконецъ, въ іюлъ нормальный максимумъ былъ въ 5 час. утра, а 9 іюля наблюдался въ 1 час. дня, и минимумъ нормальный былъ въ 3 час. дня, 24 и 29 іюня онъ быль въ 12 час. дня и 5 час. вечера.

На основаніи приведенныхъ данныхъ, мы можемъ теперь судить о метеорологическихъ особенностяхъ по временамъ года за отчетный годъ.

Весна въ 1911 году была теплъе средней (17,6° С.) на 0,9° С.; особенно теплымъ былъ май мъсяцъ; максимальная Т° доходила до 40,7° — противъ 36,0° средняго максимума за нъсколько лътъ. Послъдній заморозокъ былъ 23 марта — 1,6°, и затъмъ установилась теплая погода, благопріятная для посъва и роста хлопчатника.

Осадковъ за весну 1911 года выпало 123,6 милл. — больше средняго на 11 милл., и они, главнымъ образомъ, падали на апръль 62,8 милл. и частью на май, что неважно отозвалось на всходахъ хлопчатника, страдавшаго отъ почвенной корки послъ дождя. Средняя температура на поверхности почвы за весну 1911 г. была = 21,8°, а на глубинъ 10 сант., гдъ идетъ главное развитие корневой системы, — 18,1; при этомъ здъсь уже съ 25 марта установилась Т° болъе 14° С.,

и потому посъвъ хлопчатника можно было производить уже около этого времени.

Число часовъ солнечнаго сіянія весной за день было 8,2 час., а сумма за всю весну = 740,0 час.; самымъ солнечнымъ мѣсяцемъ былъ май съ 11,4 час. солнечнаго сіянія за день.

Фазы наступленія весны въ природъ и въ полъ отмъчены ниже— въ календаръ фенологическихъ наблюденій.

Льто 1911 года было съ значительно пониженной средней  $T^c = 25,0^\circ$  — на 1,8° С. ниже нормы; особенно низкая  $T^\circ$  наблюдалась въ іюнъ и іюлъ; средняя ихъ  $T^\circ$  была въ 1911 году на 3° ниже многолътней, и абсолютная  $(26,0^\circ)$  — даже меньше майской  $T^\circ$  (26,4°). Максимумъ  $T^\circ$  лътомъ ни разу не доходилъ до среднихъ максимумовъ за нъсколько лътъ, не превышая абсолютно 39,2° С. (въ іюлъ). Пониженная  $T^\circ$  лъта въ 1911 году сопровождалась и большей облачностью, меньшимъ числомъ ясныхъ дней (66 — противъ 72 въ средніе годы), большей относительно влажностью воздуха (68% противъ 57%) и проч.

Разумъется и температура почвы лътомъ 1911 года была значительно ниже, чъмъ, напримъръ, въ 1910 году; такъ, на глубинъ 10 сант. температура почвы была лътомъ 1911 года ниже таковой же 1910 года на 2,5°; весной на 1,9° и осенью на 2,3° С. ниже, чъмъ въ 1910 году, какъ видно изъ таблицы.

	1911	г.	1910	г.	
Температура почвы.	На поверх- ности.	На 10 сант.	На поверхности.		Отклоненіе отъ 1910 г.
Весна	21,8	18,1	26,3	20,0	-1,9
Лѣто	34,8	29,1	36,5	31,6	2,5
Осень	9,6	9,3	14,9	11,6	-2,3
Зима	2,5	3,6	2,3	2,4	+1,2

Геліографъ записалъ въ 1911 году число часовъ солнечнаго сіянія лѣтомъ за день 11,6 час., а въ суммѣ за лѣто 1040 часовъ; сравнительно съ нормальными и «жаркими» у насъ годами — это значительно меньше.

Все это, вмъстъ взятое, дълало лъто 1911 года неблагопріятнымъ для скораго созръванія хлопчатника, затягивало вегетацію до сентября мъсяца, когда былъ ранній морозъ (20 сентября), погубившій не только поздній, но даже и ранній хлопчатникъ.

Какъ уже говорилось выше, недочеть въ суммахъ тепла за лъто 1911 года противъ средняго года равнялся 250° С., а за весь вегетаціонный періодъ сумма Т° была въ 1911 году равна лишь 3800°, — противъ 4000° для средней годовой.

Осень 1911 года окончательно убила надежды хлопководовь, выдавшись чрезвычайно холодной, сырой, пасмурной, съраннимъ морозомъ (20 сентября— $1,6^{\circ}$ ). Средняя температура осени 1911 года =  $6,6^{\circ}$  ниже нормальной на  $2,8^{\circ}$ ; облачность=7,1— на 7% больше противъ средней. Минимумъ  $T^{\circ}$  осени доходилъ до — $19^{\circ}$  (30 ноября); такое значительное пониженіе  $T^{\circ}$  за все время существованія Опытнаго Поля наблюдалось только въ 1910 году.

Число морозныхъ дней было — 40, почти на 10 дней больше средняго года. Къ счастью, за нѣсколько дней до большихъ ноябрьскихъ морозовъ (18—30 ноября) выпало много снѣга, и озимыя, прикрытыя имъ, не померзли. 14 ноября снѣгъ выпалъ толщиною 25 сант. (11,0 милл.).

Число часовъ солнечнаго сіянія дошло лишь до 6,3 часовъ въ день — при общей сумм'в за всю осень въ 580 часовъ.

Зима въ 1911 году была съ такой же  $T^{\circ}$ , какъ и въ средніе годы (0,8° С.); минимумъ  $T^{\circ}$  былъ очень сильный — 25,2° (10 августа), но при этомъ почва на глубинѣ 10 сант. имѣла  $T^{\circ}$  не ниже — 2,4° С., т. к. во время мороза поверхностъ почвы была покрыта значительнымъ слоемъ снѣга. Облачностъ зимой 1911 года была = 6,4 — выше средней на 10%; осадковъ выпало 86 милл. — почти нормальное количество, и большая часть ихъ приходилась на декабрь и февраль. Морозныхъ дней было 61, изъ нихъ 24 наблюдалось въ январѣ и 8 въ февралѣ. Температура на поверхности почвы и на глубинѣ 10 сант. была выше, чѣмъ въ 1910 году на 1,2° С. Число часовъ солнечнаго сілнія за день = 4,6, а за всю зиму — 410 часовъ.

Чтобы покончить съ метеорологическими особенностями 1911 года, приведемъ данныя за вегетаціонный періодъ хлопчатника (апръть — сентябрь). За вегетаціонный періодъ, длившійся 178 дней (отъ посъва до 1 сбора и заморозка), хлопчатникъ въ 1911 году развивался при Т° 22,5 — ниже средней на 0,95° и получить около 3800° тепла — на 178° меньше средней. Максимумъ Т° былъ за этотъ періодъ = 40,7°, а минимумъ — 3,7°. Число часовъ солнечнаго сіянія за день =

10,4, а въ суммъ 1900 час.; осадковъ выпало 97,6 милл., на 22,7 больше средняго; испареніе (581 милл.) меньше средняго.

Метеорологическіе элементы.	1911 г.	Средн.	Отклоненіе <u>+</u> для 1911 г
er emocie.   San Realized argentally			
Послъдній морозъ весною	23/III	15/III	+ 8
Первый морозъ осенью	20/IX	8/X	+18
Барометрическое давленіе	738,0	File	
Средняя температура воздуха	22,5	23,45	-0,95
Средняя температура поверхности .	22,0		en <del>en en</del> ergie
Максимальная Т <sup>0</sup>	40,7		1 10 22 22
Минимальная Т <sup>0</sup>	3,7	101-1-	and <del>al</del> egation
Сумма температуръ	3800,0	3978,00	-178,0
Число часовъ солнеч. сіянія—день .	10,4	-	
" " " — сумма	1900	1 1 2 TO	_
Актинометр. радіац. — разн	7,30	-	-
" — ср. чер	39,3	A STATE OF	T 1907-1
Осадки	96,7	74 м.	# <b>—</b> 10-38
Испареніе	581,8	1001_016	dhae_1313
Влажность воздуха	700/0		
Число дней въ періодъ	173	191	n 0-17
" " ясныхъ	102	- La	_
" " " пасмурныхъ	9	10.4419	D _ 1
" " съ осадками	14	_	_

Число дней за весь періодъ вегетаціи (до мороза 20 сентября) въ 1911 году 173, а отъ поства до раскрытія первыхъ коробочекъ 120, тогда какъ въ средній годъ весь періодъ до заморозковъ можеть продолжаться до 191 дня, а до раскрытія пер-

выхъ коробочекъ сокращается до 105—110 дней; ясныхъ дней было 102, пасмурныхъ 9.

Чтобы имъть представление о значении главнъйшихъ метеорологическихъ факторовъ на развитие хлопчатника, ниже приводятся фенологическия наблюдения по отдъльнымъ фазамъ вегетации хлопчатника, сравнительно съ 1910 и 1909 годами.

V	число.	100000000000000000000000000000000000000	перал оздух:		00	еадки	•	9000000	нос	ит. н.	, ,	ей: ріод		сіяніе.	Сумм	а темп туръ.	ера-
Хлопчатникъ Кингъ.	Мѣсацъ и ч	1911 г.	1910 г.	1909 г.	1911 г.	1910 г.	1909 г.	1911 r.	1910 г.	1909 г.	1911 г.	1910 г.	1909 г.	Солнечное сіяніе.	1911 г.	1910 г.	1909 г.
1-й періодъ: по- съвъ-веходы .	18/ v	18,7	20,5	19,2	44,4	0,2	0	73			7	6	6	56	131,2	123,0	115
2-й періодъ: всхо- ды—цвѣтеніе .	18/v1	25,4	24,6	25,8	0,0	9,1	12,8	71	_	_	54	53	57	<b>56</b> 8	1370	1302	143
3-й періодъ: цвѣ- теніе-созрѣваніе	5/ <b>v</b> 111	25,4	28,7	30,6	0,0	1,1	6,8	71	-	-	48	<b>4</b> 0	<b>4</b> 0	447	1206	1148	124
Среднее	1 10	23,2	24,6	25,2	44,4	10,4	19,6	72		_	109	99	105	1071	2574	2573	279

Вегетаціонный періодъ хлопчатника въ 1911 году отпичался назкой  $T^\circ$  (особенно по сравненію съ 1909 годомъ) =  $23,2^\circ$ ; значительнымъ количествомъ осадковъ =  $44,4\,$  милл., значительной относительной влажностью и большой облачностью. Все это способствовало удлиненію всего періода вегетаціи съ 99 дней (въ 1910 году) до 109 дней и позднему созрѣванію хлопка.

## Фенологическій календарь за 1911 годъ.

(См. таблицу В).

1-5 января на каналѣ Императора Николая I ледъ достигъ толщины до 10 вершковъ; пользуясь краткимъ періодомъ ледостава возили ледъ для погреба. 8 января стаялъ снѣгъ. 9 января отмѣченъ облетъ пчелъ изъ улья, остававшагося открытымъ на зиму; было тепло ( $+8^{\circ}$  С.). Въ ночь на 1-е января была буря, закончившаяся дождемъ (при вѣтрѣ), и затѣмъ несло

много лессовой пыли. 10 января тепло  $+10.0^{\circ}$  С; начали пахать 4 и. основного съвооброта (запашка навоза). Продолжается возка навоза на поля.

12 января очистка лъсныхъ деревьевъ отъ сучьевъ. Выпавшій 11 января сніть стаяль 18 января — главнымь образомь послъ теплаго вътра (съ пылью). Послъ перерыва съ 11 января 23 января опять приступили къ пахотъ. Вечеромъ 28 января шелъ дождь. 1 февраля производили подръзку плодовыхъ деревьевъ. 3 февраля выпаль снътъ. 4 февраля быль морозъ — 11,6°. 8 февраля вносили удобреніе — суперфосфать по люцернъ. 9 февраля замъченъ облетъ пчелъ. 10 февраля вспашка подъ овесъ на стебутовскомъ свиоборотв, а 11 февраля тамъ же свяли овесъ (сорта). 13 февраля разбрасывали удобрение подъ хлопчатникъ и пшеницу. 14 февраля пересъвали на 1 п. основного съвооборота вымерзшіе за зиму сорта яровой пшеницы. Боронили поля, оставшіяся съ осени въ пластахъ. Съ 15 февраля производилась очистка оросительныхъ арыковъ — на полъ. Появились всходы редиса, посъяннаго на огородъ. 20 февраля сильный дождь. Съ 21 февраля производится дискованіе люцерны. 23 февраля появились всходы овсовъ, посъянныхъ 11 февраля, тоже пшеницы, посъянной въ вегетаціонныхъ сосудахъ. 28 февраля производится посъвъ различныхъ растеній на ботаническомъ питомникъ — вики, люцерны и друг.; 1 марта въ поляхъ промышленнаго 8-полья съяли люцерну.

Въ степи, по окраинамъ дороги 27 февраля — 1 марта цвътутъ одуванчикъ, гусиный лукъ; въ паркъ цвътетъ карагачъ; распускаетъ листья смородина, мъстами талъ; 3 марта выпалъ снъгъ. 5 марта въ огородъ съяли морковь, ръдьку; открывали виноградникъ, гранаты, розы; выкапывали саженцы въ плодовомъ питомникъ. 8 марта получена изъ Самарканда грена шелковичныхъ червей, часть ея оживилась въ дорогъ. 10 марта появились всходы люцерны, шабдара, посвянныхъ 28 февраля на ботаническомъ питомникъ. 12 марта опять выпалъ снътъ. Въ вегетаціонныхъ сосудахъ посъяны 13 марта — вика, люцерна съ нитрагиномъ. 17 марта цвътутъ абрикосы и персики. Пчелы беруть съ цвътущихъ деревьевъ взятки. 18 марта свяли сорта туркестанской люцерны на опытномъ участкъ, всходы съ 28 марта. 20 марта опять выпалъ снъгъ. 22 марта посвы кукурузы въ 8-ми польв; 23 марта свяли кормовую и сахарную свеклу на стебутовскомъ сврооборотв. 24 марта цвв-



Феноло	гическі	н наблю
--------	---------	---------

денія за 1911 годъ.

	въ пе-	0 пе-	.RESET S	Темп	ература	возд	y x a.		i a. Hie.	злаж-	Ч	исло	дн	ЕЙ.	
НАЗВАНІЕ РАСТЕНІЙ.	Число дней в ріод'в.	Мѣсяцъ и число ріода.	Среднее.	Максимумъ.	Минимумъ.	Сумма.	Почва на 10 сант.	Осадки.	Испаренія. Солнечное сіяніс.	Относительн. влаж- ность воздуха.	Яспыхъ.	Пасмурныхъ.	Съ осадками.	Съ морозомъ.	Примъ́чаніе.
		Первь	ий пе	ріод	ъ отъ	по	съв	адо	всход	0 в ъ					
Ілопчат. Кингъ	1 7	28/111—4/1V	19,1	34,4	9,4	133,9	17.1	11,1/5,5	17,2  54	73	1 3	4	2		
" "	7	18/IV—25/IV	18,7	28,6	8,6	131,2						7	4		
" Туземный	7	28/III - 4/IV	19,1	34,4	9,4	133,9		CHURCHEN PROPERTY.		"	3	4	2		
	1	18/IV—25/IV	18,7	28,6	8,6	131,2		,			_	7	4		
" "	7	28/III—4/IV	19,1	34,4	9,4	133,9				AT STATE OF STATE OF	3	4	2	-	
, , , , ,	7	18/IV—25/IV	18,7	28,6	8,6	131,2		44,4	9,4 56					NTA.	
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	6	19/IV-25/IV	18.2	28,6	10.7	109,4			8,2 52			7	4		
[발전 12] (1 프랑프) (프랑트) (프랑크) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	6	19/IV-25/IV 19/IV-25/IV	18,2	28,6	10,7	109,4						6	4		
" Кутаисск. гибридъ . Рисъ бълый	0.11.03.55.1	4/vi—9/vi	23,2	35,5	11,2	116,1	19,2 27,7		8,2 52		-	6	4	_	
	5 7			38,2	10,0	148,9		0	21,6 66		5	-	100	_	
Зимая пшеница		1/1x—7/1x	21,3			C 1000	,		19,4 —	48	1	6	- H	-	
Эвесъ Рыхликъ	Section for contract of	1/m-18/m	7,7	23,0	- 3,4	127,2			23.4 100	79	2	16	6	6	
Люцерна	15	28/II—15/III	6,2	23,0	-3,4	93,5		8,9/ 2,2	18,4 85	78	2	13	4	6	
Красный клеверъ	15	28/II—15/III	6,2	23,0	$-3,4 \\ -3,4$	93,5		8,9/ 2,2	18,4 85	78	2	13	4	6	
Персидск. клев. Шабдаръ	15	28/п—15/пп	6,2	23,0		93,5		8,9/ 2,2		78	2	13	4	6	
		втор	ои пе	ртод	ъ отъ	. вс.	ход	овъ ,	цо цвт	тен	11Я.				
Хлопокъ Кингъ	68	4/IV—11VI	22,1	40,7	2,0	1503,6	23,4	63,9/ 7,1	217,4 671	71	27	41	12	_	
	54	25/IV—18/VI	A SECURE OF SECURE	40,7	2,0	1370,0	26,6	0	221,7 568	1 -	27	27	4	_	
"    туземный	77	4/IV-20/VI	22,6	40.7	2,0	1762,0	24,2	63,9/ 7,1	260,8 770	70	32	45	12	ODECHA	
,, 1,000	59	25/IV—23/VI	The second secon	40,7	2,0	1490,0	26,9	0	242,5 668		31	28	5		
" Египет. Афифи	77	4/IV - 20/VI	22,6	40,7	2,0	1762,0	24,2	63,9/ 7,1	260,8 770	70	32	46	12	to entre an	
	60	25/IV24/VI		40.7	2,0	1510,0	26,7	0	245,5 679		31	29	5		
" " " Кукуруза Чинквантино	45	25/IV — 8/VI	24,4	40,7	2,0	1096,5	26,5	1,0/ 1,0	174,0 496	66	21	24	4		
мукурува чинквантино "Кутаисск. гибридъ	82	25/IV—6/VI 25/IV—15/VII	25,1	40,7	2,0	2058,5	28,1	1,0	326.4 848	68	46	36	5		
					7,6	1410,1	30,5	0	224,1 648	70	38	17	1		
Рисъ бѣлый		9/v1—3/v111	25,6	39,2	1,0	1623,9	11,8	0	229,2	10				- 10	
Эзимая пшеница	$\frac{134}{228}$	7/ix—24/iv	12,1/+6,3	34,4/34,4	-23,5/23,5	1429,0	7,9	10,4/ 3,7	$\frac{229,2}{324,8}$	66	$\frac{39}{44}$	$\frac{95}{184}$	$\frac{22}{42}$	$\begin{array}{c c} 49 \\ \hline 109 \end{array}$	
Овесь Рыхликъ	61	18/m-19/v	18,7	38,2	- 1,6	1140,4	18,9	88,5/ 6,3	125,6 494	77	18	43	17	5	
Люцерна		15/m-25/v	18,5	40,6	-1,6	1334,0	19,2	91,2/ 6,0	156,1 —	66	22	50	18	5	
Красный клеверъ	5 July 2 7 3 20 20	15/III—25/VI	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	40,7	-1,6	2166,0	21,9	91,2/ 6,0	301,2	-	42	61	19	5	
Персид. клеверъ Шабдаръ		15/III—20/v		38,2	-1,6	1192,8	18,6	91,3/6,1	135,7 671	75	18	48	18	5	
				VII TEKES	'										

Таблица В.

# Фенологическія наблю денія за 1911 годъ.

						дент	я за	1911 ro;	цъ.							
	въ пе-	число пе-	Тем	пера	тура	возд	y x a.		i e.	rie.	влаж-	Ч	исло	ДНЯ	: й.	a santah ang
названіе растеній.	Число дней ріод'в.	Мѣсяцъ и чис ріода.	Среднее.	Максимумъ.	Минимумъ.	Сумма.	Почва на 10 сант.	Осадки.	Испарен	Солнечное сіяніе.	Относительн. вл ность воздуха.	Ясныхъ.	Пасмурныхъ.	Съ осадками.	Съ морозомъ.	Примъчаніе.
Трет	ій п	еріодт	о т	ъц	въ	тен	нія	до с с	озр	ъва	ні	я.				
Хлопчат. Кингъ	. 46	11/vi-27/vii	25,8	39,0	7,6	1187,0	30,2	0	189,8	544	71	34	12	1 1		
, ,	. 48	18/vi—5/viii	25,4	39,0	7,6	1219,0	32,0	SECTION AND AND ADDRESS.	183,9	447	_	34	14	1		
Хлопч. Туземный	. 48	20/vi—8/viii	25,1	39,0	7,6	1205,9	32,5	0	183,7	679		35	13	1	F (1)	
, ,	. 53	23/vi—15/viii	25,4	39,0	7,6	1345,0			193,7	533		42	11	_		
" Египет. Афифи	. 61	20/vi-20/viii	25,3	39,0	7,6	1545,0			219,1	_		44	17	1		
n n n	. 68	24/vi—1/ix	25,3	39,0	7,6	1722,0	29,5		237,5		8.0		No.			
Кукуруза Чинквантино	. 38	8/vi-15/vii	26,3	39,2	12,5	997,8				434	- 00	53 24	15	1		
" Кутаисск. гибридъ	. 52	15/vII-5/IX	23,2	39,0	6,5		28,5	-	150,6	454	66		14	1		
Рисъ бълый	. 48	3/viii—20/ix	19,7	39,0	3,0	1208,8 950,5			164,5			42	10	1		
Озимая пшеница	. 38	24/IV—1/IV	24,0	40,7	2,0	909,0			118,2	-	-	37	, 11	1		
Овесъ Рыхликъ	. 27	19/v-15/vi	24,8	40,7	11,2	670,7	22,7 29,2		134,4	354		17	21	5		
	1				1	0,0,1	20,2		133,4		69	10	9			
3	а в	есь	ве	ге	та	ці	о н	ны	й г	се :	p i	о д	ъ.			
Хлопч. Кингъ	.   121	28/III—27/VII	22,3	40,7	2,0	2824	23,5	75,0/12,6	424,4	1269	71	64	57	15	10 —	
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	. 109	18/IV—5/VIII	23,1	40,7	2,0	2720			415,0	1071	_	61	48	9	_	
" Туземный	. 133	28/III—8/VIII	22,2	40,7	2,0	3102			471,7	1503	71	71	62		_	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 119	8/IV—15/VIII	23,3	40,7	2,0	2966			445,6	1257		73	46	_	_	
" Египет. Афифи	. 146	28/m—20/vm	22,3	40,7	2,0	3440				826	71	79	67	15	_	
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	. 135	18/iv—15/ix	23,0	40,7	2,0	3363			492,4	735		84	51	9		
Кукуруза Чинквантино	. 89	19/rv—15 'vri	22,9	40,7	2,0	2203				982	70	45	44	5	_	
" Кутаисск. гибридъ	. 140	19/iv—5/ix	22,1	40,7	2,0	3376			500,0	900		88	52	9	_	
Рисъ бѣлый	. 108	4/IV -20/IX	22,8	39,0	3,0	2467	27,6		363,9	714	66	80	28	2	_	
	179*	) ,, ,,	11,0	40,7	- 23,5	2672*)			383	354		57	122	27	49	*) Нижняя гра
Озимая пшеница	272	1/IX—1/VI	17,2	40,7	- 23,5	2486	18,2		478,6	354	61	$\frac{67}{62}$	$\frac{122}{211}$	47	$\frac{40}{109}$	касается
Овесъ Рыхликъ	. 106	_	17,0	40.7	- 3,4	1938	STREET, IN	106,0 /9,2		594	75	38	68	23	11	ріода вмѣ съ зимним
Люцерна { 1911 г	: 89	-	-	-	-   1	1427		100,1/ 8,2		85	72	94	63	22	11	ов замним
тюцерна (старая		-	SS TE	. –	-		_		_	_	_	-	_		_	
Красный клеверъ	. 118			8.13-4	-	2259	14.8	100,1/ 8,2		85	78	44	74	23	11	
Персидскій клеверъ Шабдаръ		_	144,10	8.81_	_	1288	,	100,2/ 8,3	1	756	76	20	61	22	11	
	ı				I	1200	10,1	1.00,2, 0,0	101,1	100		1 -0	01	1	11	

туть сливы японскія. 24 марта начали сѣять хлопчатникъ кингъ и кокъ-чигитъ на основномъ сѣвооборотѣ. Въ степи цвѣтетъ Trigonella grandiflora. Въ ягодникѣ молодого сада цвѣтетъ 25 марта земляника. 31 марта поливали 11-е поле основного сѣвооборота — подъ хлопчатникъ. Около 31 марта начала отрождаться въ степи саранча (мароккская кобылка). 2 апрѣля появились всходы кукурузы, посѣянной 22 марта; также 1 апрѣля всходы свеклы на стебутовскомъ сѣвооборотѣ.

1-3 апръля цвътетъ въ степи дикій макъ. 4 апръля отмъчены всходы хлопчатника, посъяннаго 25 марта на опытномъ участкъ. 4 апръля цвътеть бълая сирень. 6 апръля посъвъ хлопка въ американскомъ съвооборотъ — безъ предварительной поливки поля. 5-6 апръля началась выкормка червей багдадской бълой и французской желтой породъ. 9 апръля началъ выколашиваться озимый мъстный ячмень на стебутовскомъ съвооборотъ. 9 апръля пущена вторично весенняя вода по каналу Императора Николая I, и на Опытномъ Полъ началась поливка полей подъ посъвъ хлопчатника и ячменя въстебутовскомъ съвооборотъ. 11 апръля первая весенняя поливка озимой пшеницы и люцерны, питомника и плодоваго сада. 13 апрёля зацвёла бёлая акація. 18 апръля высъвались сорта хлопчатника. 20 апръля проръживали всходы хлопчатника посъва 25 и 28 марта. 25 апръля зацвъта 5-лътняя люцерна. 28 апръля отроился рой пчелъ изъ улья № 8 въ паркъ. 28 апръля начала созръвать земляника въ ягодникъ Опытнаго Поля. 5-7 мая овсы посъва 11 февраля (въ стебутовскомъ сввооборотв) начали выкидывать метелки. 15 мая закончили съвъ поздняго хлопчатника. 16 мая съяли машъ въ 8-польъ. 16 мая жали озимые ячмени въ стебутовскомъ съвооборотъ. 15-16 мая возка съ полей люцерны 1 укоса. 28 мая созръла озимая пшеница. 28 мая появились зрълыя черешни и кое-гдъ мъстный абрикосъ и крупный «королевскій». 30 мая отмъчено появление завязавшихся цвъточныхъ бутоновъ у хлопчатника кингъ, посвяннаго 24 марта.

4 іюня свяли рись послё уборки озимаго ячменя. 4 іюня первая послё всходовь поливка хлопчатника, посвяннаго 20 апрёля. 7 іюня свяли машь на зеленое удобреніе послё озимаго ячменя.

9 іюня появились первые цвѣты хлопчатника кингъ, посѣяннаго 24 марта. Съ 10 іюня была прохладная погода. 22 созрѣли японскія сливы. 22 іюня къ вечеру былъ дождь съ грозой.

Съ 20 іюня отмічено появленіе на хлопчатникі гусепицы «Heliothis armiger», около того же времени отмъчена 2-я генегація плодожорки въ саду. 25 іюня созр'влъ виноградъ «чиляги» и «тагоби». Между 15 и 27 іюня отмъчено значительное цвътеніе хлопчатника поства 18 апроля. 1—4 іюля отмъчено массовое появленіе гусеницы карадрины (Caradrina exigua) на листьяхъ люцерны, свеклы и хлопчатника (особенно на селекціонномъ питомникъ). Съ 10 іюля уменьшено количество воды въ каналъ Императора Николая I изъ-за ремонта Волынской подпруды). 4 августа колосится рисъ, посвянной 4 іюня. Съ 28 іюля началось раскрываніе коробочекь у хлопчатника книгь посвва 1 апрвля, а съ 5 августа у хлопчатника, посвяннаго 18 апръля. Отмъчено, что при цвътеніи 26 іюня — коробочки начали раскрываться 16 августа (на 51 день), полное же разверзаніе когобочекъ наступило 20 августа (на 55 день отъ цвътенія или на 140 день отъ времени посвва хлопчатника). 25 августа начали сборъ хлопка кингъ, посвяннаго 24 марта.

30 августа съ риса, въ виду начала его созръванія, сбросили воду. 7 сентября съяли озимый ячмень въ 8-польъ. 20 сентября быль первый осенній заморозокь—1,5°, побившій хлопчатникъ. Къ 20 октября закончили сборъ хлопка и приступили къ уборкъ стеблей хлопчатника, чтобы начать взметъ полей на зябь. Съ 25 октября по 12 ноября произведена вспашка полей на зябь. Первый снъть осенью выпаль 14 ноября; съ 15 по 30 ноября стояли сильные морозы (до — 19,0° С.), продолжавшіеся и въ декабръ; все это время лежалъ значительный снъгъ. Работы прекращены. Въ декабръ приступили къ очисткъ хлопка сырца, съ которой задержались изъ-за установки новаго джина и мотора на хлопкоочистительномъ заводъ. Хлопокъ-волокно продали въ декабръ заводу Руббенчикъ-Рудницкій по слъдующимъ цънамъ: 1-й сортъ 10 р. 30 к., 2-й — 8 руб. и 3-й — 7 руб. 25 коп. По сортамъ хлопокъ Опытнаго Поля 1911 года распредълялся такъ: 38% 1-го и 12,6% минусъ, остальное — межеумокъ, 2-й и 3-й сорта.

# Лабораторныя работы.

Приводя ниже нъкоторыя данныя по лабораторнымъ работамъ Опытнаго Поля въ 1911 году, мы оставляемъ ихъ пока безъ особаго пояснительнаго текста, имъя въ виду дать его въ 1912 году, когда будуть закончены всё начатыя въ отчетномъ году лабогаторныя изслёдованія и поставлены на разр'єшеніе, въ свизи съ ними, новые вопросы по агрономическому анализу; тогда полную сводку ихъ сдёлаетъ агрономъ В. С. Малыгинъ, занимающійся аналитическими работами на Опытномъ Пол'є.

Здёсь мы остановимся лишь на данныхъ по опредёленію почвенной влажности въ 1911 году и высоты грунтовыхъ водъ въ предёлахъ Опытнаго Поля, такъ какъ эти данныя тёсно примыкаютъ къ только что разсмотрённымъ метеорологическимъ условіямъ.

Свою влажность почвы, какъ извъстно, получають или въ видъ капиллярно поднявшейся воды изъ болъе глубокихъ слоевъ (грунтовой воды), или (больше всего) въ видъ осадковъ, въ меньшемъ размъръ въ видъ такъ называемой подземной росы (конденсирующейся изъ паровъ воздуха, просачивающейся въ почву въ болъе холодные слои почвы), или, наконецъ, при помощи искусственнаго орошенія изъ р'якъ и проч. На основаніи изслъдованій поздняго времени (Митчерлиха, Макъ-Лана и друг.) теперь считають, что растенія не могуть непосредственно использовать гигроскопическую влагу почвы, и даже капиллярную воду они извлекають не всю, именно: почва отдаеть растеніямъ капиллярную влагу\*) только до извъстной степени влажности (около 9-11%), при чемъ остальная вода удерживается частицами почвы и не передается растеніямъ; поэтому главнъйшимъ источникомъ влаги въ почвъ, непосредственно используемой растеніями, являются атмосферные осадки. Повторяемость и сила осадковъ, водоудерживающіяся свойства почвы и сила испаренія въ данномъ м'єсть (значить, и влажность воздуха, такъ какъ увеличение относительной влажности уменьшаетъ испареніе), являются главнъйшими условіями, вліяющими на режимъ почвенной влажности.

<sup>\*)</sup> Подъ капиллярной влагой подразумъвають ту часть почвенной влаги, которая въ капельно-жидкомъ состояни окружаетъ тонкимъ слоемъ частицы почвы, удерживаемой силой поверхностнаго напряженія и наполняетъ волосные канальцы между почвой; она обыкновенно используется отъ 80 до 90% корнями растеній, т. к. осмотическое давленіе, обусловленное тканями корневыхъ волосковъ, превышаетъ силу поверхностнаго притяженія воды частицами почвы.

# Данныя по опредъленію въ 1911 г. влажности почвы, уровня грунтовыхъ водъ, механическаго анализа почвъ и пр.

#### I. Влажность почвы за 1911 годъ въ 0/00/0.

Мѣсацы.         Боличество. Осад. Испа. Осад. Испа. Оста. Испа. Минг.         На глубинѣ въ сантиметрахъ.           A. Степь — неорошаемая:           А. Степь — неорошаемая:           Винарь О, 6 14,6 43,3 19,4 10,0 75,4 8,0 6,2 7,1 10,8 10,9 13,0 15,4 14,1 3,2 15,0 Мартъ 9,2 36,3 39,3 13,0 14,0 13,5 11,1 8,1 10,0 13,7 12,0 12,8 11,6 14,6 Апръл 17,3 62,8 51,9 4,99 8,29 9,58 9,23 8,68 10,27 10,41 11,14 11,2 12,0 12,5 14,1 13,2 15,0 14,0 13,5 11,1 8,1 10,0 13,7 12,0 12,8 11,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6		яя рат	Колич				Н	а глу	бинъ	въ са	нтим	етрах	ъ.			
Яннарь         0,6         14,6         43,3         19,4         10,0         5,4         8,0         6,2         7,1         10,8         10,9         13,0         15,4         14,3           Февраль         5,2         29,8         32,0         20,8         16,2         7,5         7,0         7,4         11,3         12,4         12,5         14,1         13,2         15,0           Марть         9,2         36,3         39,3         13,0         14,0         13,5         11,1         8,1         10,0         13,7         12,0         12,8         11,6         14,6           Анръль         17,3         62,8         51,9         4,99         8,29         9,58         9,23         8,68         10,27         10,41         11,1         12,0         12,5         14,6         14,6         14,6         14,6         14,6         14,6         14,1         1,2         11,2         12,0         12,5         14,1         1,6         14,1         1,2         12,0         12,5         14,4         14,3         15,2         16,0         12,5         14,4         14,3         15,2         14,4         14,8         14,4         15,0         14,4         14,5	Мѣсяцы.	Средн	ковъ.	реній.	0—5	10—15	20—25	3035	40—45	50—55	60—65	70—75	80—85	90—95	95—100	Примѣч
Ферраль . 5,2   29,8   32,0   26,8   16,2   7,5   7,0   7,4   11,3   12,4   12,5   14,1   13,2   15,0   мартъ						A.	Степн	- не	орош	аема	я:					
В. IV поле американскаго съвооборота орошаемое (хлопчат.):  Январь	Февраль	5,2 9,2 17,3 26,4 26,0 26,1 23,0 14,1 8,3 2,4	29,8 36,3 62,8 24,5 1,5 — 7,9 13,9 18,0	32,0 39,3 51,9 129,7 127,6 127,1 89,2 56,3 36,9 19,4	20,8 13,0 4,99 5,03 0,77 0,9 0,74 0,4 10,2 4,2	16,2 14,0 8,29 7,85 3,0 5,4 2,44 2,0 5,44 5,05	7,5 13,5 9,58 12,18 6,0 7,1 5,9 5,8 6,45 7,3	7,0 11,1 9,23 12,07 7,56 8,9 6,13 6,3 7,54 6,2	7,4 8,1 8,68 11,3 8,76 10,5 7,74 7,9 7,98 7,4	11,3 10,0 10,27 11,36 10,17 10,8 9,87 9,2 9,79 10,2	12,4 13,7 10,41 11,7 10,7 10,8 10,73 9,7 11,17 9,4	12,5 12,0 11,14 12,9 10,35 11,9 10,6 11,02 10,3	14,1 12,8 11,2 13,64 13,9 12,8 12,2 10,3 12,18 12,3	13,2 11,6 12,0 14,3 14,4 14,23 10,2 13,27 14,02	15,0 14,6 12,5 15,2 14,85 15,0 14,9 10,2 14,38 14,0	
Январь       —       —       —       38,2       19,1       15,6       —       16,3       —       19,2       22,0       21,7       23,0         Февраль       —       —       —       11,7       18,0       16,8       —       16,1       —       17,6       19,3       23,8       22,2         Марть       —       —       —       9,0       12,8       16,7       —       14,4       —       17,7       12,5       17,3       17,6         Апръль       —       —       —       —       —       —       —       —       —       16,5       —       —       —       —       —       —       —       —       —       17,0 <td>Средняя годовая</td> <td></td>	Средняя годовая															
	Февраль				38,2 11,7 9,0 11,0 8,5 11,75 10,8 5,4 14,7 15,55 12,3	19,1 18,0 12,8 12,9 14,41 12,63 13,2 8,08 14,9 12,14 19,0	15,6 16,8 16,7 15,0 13,4 14,12 13,8 8,77 14,4 15,54 17,2		16,3 16,1 14,4 — 11,6 19,2 14,15 13,5 14,6 15,94 15,1		19 17 17 	1,2 22 1,6 19 1,7 12 1,01 22 1,01 22 1,01 23 1,01 25 1,01 2	2,0 2 2,3 2 2,5 1 3,5 2,9 2 3,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,7 3,8 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,0 3,	1,7 3,8 7,3 3,06	23,0 22,2 17,6 17,0 22,5 22,7 25,0 26,7 21,7 26,91 22,8	

# Сравненіе влажности при различныхъ способахъ посѣва. 2-е поле американскаго 4-хъ-полья:

			Наг	луб	йнй	въ с	анти	метр	ахъ.			
Способы посѣва.	<b>9</b> —0	10—15	20—25	30—35	40-45	50—55	60 – 65	70—75	80—85	66 - 06	95—100	Примѣ чаніе.
Джоячный посѣвъ.												
13/vі На джоякахъ	12,	,4 21	,74	_	2	1,94		20	0	_	23,8	
въ бороздахъ.		,22 22		_		9,7	_		_	_	_	
Разбросный.	16.	,23 18	3,6	_	18	3,8	_		-	_	_	
Посѣвъ на грядахъ	16,	,3 20	,12	_	2	0	-		_	-	_	
Рядовой посвы:								Section 1				
Въ средн. рядахъ.	12,	,2 8	3,8	_	11	,9				-	21,6	
Въ бороздъ	12,	34 13	,97		-	-	-	1	5,8	-	-	
Средняя годовая .			-6	_			_				13.2	
	2	2-е п	оле	осн	 О <b>вно</b>	го с	 ВВ00	 боро	та:			
Апръль . 29/vi	10,0	15,5	14,0	_	1	4,46	_	1	7,4	-	16,45	10.07
" . 28/vi	15,3	21,2	18,8	_	2	2,4	-	2	7,0	-	21,3	
Май 10/v	12,4	16,5	16,8	_	1	9,1	-	1	9,8	-	22,5	
Iюнь 10/vi	13,22	18,63	20,2	_	2	3,05	-	2	3,55		26,2	
Іюль 10/vII	9,7	16,0	16,3	-	1	8,4	-	2	1,6	-	23,1	
Августъ . 8/viii	10,17	12,7	12,5	-	1	7,88	-	2	1,8	-	21,6	
Сентябрь. 10/іх	13,6	14,31	16,44	-	1	8,22	-	2.	4,73	-	21,95	
Октябрь . 10/x	18,58	18,15	19,1	-		8,69	_	Designation of the last	8,5	-	23,57	
Ноябрь 10/хі	8,2	14,6	16,4	-		0,3	_	100	5,5	-	26,2	
Декабрь . 10/хи	23,3	22,2	21,7		2	1,1	-	2	3,1	-	23,9	
Средняя годовая .					Transfer of the					-	_	
11, 121	١ ،	<b>4-</b> е п	оле	про	CTOI	0 4-	 ХЪ-П	олья	τ:			
Январь	23,0	20,7	20,1	_	1'	7,6	23	,5 20	6,2	_	-	
Февраль		_		_	- 1041	_	-	- 1			_	
Мартъ	14,6	13,0	12,7	-	1	5,5	16	,3 1	5,0	-		
Апръль	13,26	14,24	14,21	_	1	3,61	-	- 1'	7,79	-	18,12	
Май	17,6	18,9	17,5	_	18	8,0	-	- 1	7.2	-	23,6	

# Сравненіе влажности при различныхъ способахъ посѣва: 3-е поле стебутовскаго сѣвооборота:

1			Наг	луби	нъ в	ъса	нтим	етра	хъ.			
Мъ́сяцы.	<b>c</b> —0	10—15	20-25	30-35	40—45	5055	60—65	70-75	80 – 85	90—95	95-100	Примѣ- чаніе.
				i di								edita int
Февраль	17,8	15,7	16,0		18	3,4	_ 1	4,5 18	8,2 20	0,0	20,4	
Мартъ	12,1	17,0	15,2	_	18	3,1	— 1	7,8 2	1,9 20	0,1	19,0	194 0.
Апръть	9,9	8,33	10,43	-	10	),44	— 1	4,06 13	3,81 16	3,31	17,68	
Май	7,6	12,08	12,07	-	18	3,5	— 1	3,56 19	9,0 -	-	21,4	
Іюнь	4,9	8,42	8,91	_			20,0 2	0,0	-	<u> </u>	23,92	
Іюль	1,8	15,5	12,8	_	-	-	- 1	5 -	- 11-	-	26,5	
Августъ	13,9	15,6	16,8	-	-	-	_ 1	8,00 -	<u>_</u>	_	23,82	
Сентябрь	21,26	22,51	20,94		-	_	_ 2	0,18 -		-	24,23	
Октябрь	20,34	20,06	18,0	_	-	_	_ 1	7,16 -	<u> </u>	-	20,36	
Ноябрь	15,3	18,0	15,6	-	-	_	_ 1	5,5		1 100	24,5	
Декабрь	22,1	21,0	18,6	-	-	-	- 1	7,5 -			19,9	
24	V. 5	-е по	ле 8	8-ми	-пол	ья (	сред	няя	пала	):		
	-	15,2	16,4	-	-	-	— <u>1</u> 8	5,9 –		-	25,3	740) 1.40
12	/ <b>IV.</b> ]	Влая	кнос	ть н	а оп	ытн	омъ	учас	сткъ	•		
	14,11	12,12	-	11,66	-				-46 J	-	11,32	
22	/111.	1-е п	оле	8-ми	I-IIOJ	ка	(при	пост	sвѣ) :	- 44		
	16	15	13,7	_	_		- 19	,3 –		-	-	
										- 1	I	

# Уровень грунтовыхъ водъ.

H 8	опытномъ	участкъ.	H a	дворъ (въ к	олодцѣ).
Число.	Высота.	Примѣчаніе.	Число.	Высота.	Примъчаніе.
0тъ 10/1			10/I	2 ар. 10 вер.	
до 10/п	3 ар. 10 вер.		10/11	2 ар. 8 вер.	
отъ 10/п			10/III	2 ар. 7 вер.	
до 10/111	3 ар. 8 вер.		10/IV	2 ap. 11 Bep.	
10/iv	3 ap. 91/2Bep.				
11/IV	3 ар. —	Постоянныя полив-	16/iv	2 ар. 4 вер.	
		ки опытнаго участ-	18/IV	2 ар. 3 вер.	Послѣ поливки.
		ка и основного съвооборота.	20/iv	2 ap. 1/2 Bep.	
14/iv	2 ар. 15 <sup>1</sup> /2вер.	Періодъ дождей.	26/IV	2 ар. 2 <sup>1</sup> /2 вер.	
15/IV	2 ар. 131/2вер.	" "	27/IV	2 ар. 2 вер.	Послѣ дождя.
.16/vi	2 ар. 13 вер.	, ,,	отъ 28/iv	1	Періодъ дождей.
отъ 18/1			до 6/у	2 ap. 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Bep.	
до 25/10	2 ар. 12 вер.	,, ,,	8/v	2 ap. 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Bep.	,, ,,
отъ 25/10					
до 27/10	2 ар. 11 вер.		10/v	2 ap. 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Bep.	" "
27/IV	2 ар. 10 вер.	Послъ дождя.	10/vi	2 ар. 8 вер.	" "
отъ 27/іч		Hoori B Assigni	10/vII	3 ар. 7 вер.	avinose.
до 6/v	2 ар. 11 вер.		10/vIII	3 ар. 14 вер.	
8/v	2 ap. $11^{1/}_{2}$ Bep.		10/ix	3 ар. 5 вер.	
10/v	2 ар. 12 вер.		10/x	3 ар. 10 вер.	
13/v			10/xI	3 ap. —	
13/1	2 ар. 4 вер.	Послѣ поливки. опыт. уч-ка.			
14/v	2 ар. 5 вер.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10/xii	2 ар. 8 вер.	
16/v					
	2 ap. 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер.				
18/v	2 ар. 10 вер.	an esta mato	mini	m. 2 ар. <sup>1</sup> /2 вер.	20/Iv
8/x1	3 ар. 6 вер.		maxi	т. 3 ар. 14 вер.	10/vIII
10/x11	3 ар. 5 вер.				

#### Анализы почвъ.

Количество взмученныхъ частицъ и твердыхъ остатковъ въ водъ канала Николая I при орошеніи въ 1911 году.

Какая вода.	<ul> <li>0/0 взмучен- ныхъчастицъ</li> <li>въ водъ.</li> </ul>	0/ <sub>0</sub> твердаго остатка.	Примѣчаніе.
Оросительная		0,16	
Грунтовая		0,10	
Вода канала	0,014	0,068	
Грунтовая 28/10	0,023	0,212	
Вода канала 9/v	0,002	0,022	
Въ арыкѣ 10/vi	_	0,028	Тоже при спускъ съ поля 0,0380/ <sub>0</sub> .
Въ каналѣ 10/vi	_	0,030	
Въ грунт. водъ 10/vi	_	0,27	
Арычная при впускѣ на поле 10/vi	-	0,032	

## Данныя анализа промывныхъ водъ (опыты промыв. солонц.).

	Сухого остат- ка.	Cl.	SO <sub>3</sub> .	NaCl.	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> .	Сумма солей.
Взята вода 13/vm при началъ американс				оля 4-х	ъ поль	наго
Въ приводящемъ арыкъ (у входа на рисъ) . въ грам. При спускъ съ поля въ грам.	0,332 1,026				_	
Взята вода при промываніи с	! солонце	въ на	прост	омъ <b>4-</b> :	хъ-пол	ьѣ:
Вода при спускѣ съполя въ гр. Водаприводящаго арыка въ гр.	1,414 0,306		0,5779		0,8767	

Принято, что весь хлоръ соединенъ съ Na и вся сърная кислота тоже съ Na, хотя послъднее безъ достаточныхъ основаній.

								На глубинъ въ сантиметрахъ.	0/0
Солей	въ	водной	вытяжкѣ				٠	2 - 10	1,52
"	,,	<b>"</b> ·	"					10—25	2,16
"	,,	"	"		•			80—95	1,76

## Данныя механическаго анализа почвъ (по Сабанину).

Откуда взятъ образецъ.	Глубина въ сантиме- трахъ.	Всего песку. 1—0,25	и пес	песокъ чаная ль. 0,05—0,001	Всего мелка-го песку.	Всего песку.	Физич. глины.	Отношен. гли- ны къ песку.	Типъ почвы.
					215 126				
Съ американскаго	2—10	0,425	27,780	30,750	58,53	58,955	41,045	1:1,42	4/vIII
4-хъ - полья на	10-25	0,350	35,505	25,800	59,305	59,655	40,345	1:1,47	7/vIII
площади, предна- значенной подъ	85—95	4,55	28,9	27,22	56,12	60,67	39,33	1:1,54	10/vin Въ пескъ 1—0,25 mill. оказа лось много солей, напр. СО
рисъ:	100—115	2,77	25,15	30,08	55,23	58,0	42,0	1:1,38	и др. 18/viii Тоже.
					l · ·				

Изслъдованіе влажности почвы на Опытномъ Полъ производится уже нъсколько лътъ — регулярно въ опредъленное число каждаго мъсяца, при чемъ почва берется буромъ Яновчика; для изслъдованія выбрано одно мъсто «степи», ни разу не пахавшейся и не орошавшейся, и нъсколько пунктовъ на разныхъ орошаемыхъ (4—5 разъ за лъто) поляхъ Опытнаго Поля, занятыхъ хлопчатникомъ и другими растеніями. Ниже приведены въ таблицахъ данныя опредъленій почвенной влажности за 1911 г.

Какъ показываетъ нижеслъдующая таблица, зависимость почвенной влажности отъ указанныхъ выше факторовъ (испаренія, осадковъ и проч.) яснъ всего, конечно, видна въ степи.

Мѣсяцы 1911 года.	Влажн. почвы на глубин* 10—15 с. въ º/º	Осадки.	Испареніе.	Число дней съ осадками.	Относитель- ная влаж- ность.	T-ра воздуха Cels.	Глубина грунтовыхъ водъ въ колодцѣ.	Капилляр- ность.	Водопроница-
Январь	3,0	m i 14,6  29,8 36,3 62,8  24,5 1,5 0 7,9 13,9 18,0 20,3	11. 43,33 32,0 39,3 51,9 128,7 128,0 127,1 89,2 56,3 36,9 19,4 18,0	7(2,1) 9(3,3) 10(3,6) 8(7,8) 4(6,0) 1(1,5) — 1(7,9) 5(2,7) 2(9,0) 7(3)	83 76 74 60 62 69 72 80 86	0,6 5,2 9,2 17,3 26,4 26,0 26,1 23,0 14,1 8,3 -2,4 -0,04	2 , 8 , 2 , 7 , 12 , 4 , (Дожды). 2 арш. 3 вер. 2 , 8 , 3 , 7 , 3 , 14 , 3 , 5 , 3 , 10 , 3 , 10 , 3 , .	Въ 1 ч. — 12 ем. " 3 "— 21 " " 6 "— 29 " " 16 "— 40 " " 24 "— 41 " во 2 день 44 " въ 3 " 50 " " 4 " 53 " " 5 " 55 " " 10 " 58 " " 10 " 58 " " 10 " 64 " " 20 " 67 " " 25 " 72 "	
Среднее.	7,57	235,1	773,0	54	77,5	12,8		<u> </u>	

Прежде всего бросается (см. таблицы С) въ глаза значительно меньшая влажность непаханной степи по сравнению съ стаго-пахотными полями; такъ, средняя годовая влажность почвы въ степи на глубинъ 1—100 сант. = 10,2%, а на орошенномъ ьспаханомъ полъ 17,38%, при чемъ въ послъдней почвъ влажность держится болъе или менъе равномърно высокой весь годъ, особенно съ глубины 20 сантиметровъ, а въ степи она распредълена очень неравномърно: достигая въ періодъ съ января по апръль въ верхнихъ горизонтахъ (1—15 сант.) 8—20%, она падаетъ съ апръля по октябрь до 0,7—9,0%.

Хагактерной особенностью въ степи является также существование въ толщъ почвы двухъ слоевъ: верхняго съ усыха-

ющими горизонтами и нижняго съ неусыхающими горизонтами; толщина усыхающаго слоя мъняется по-мъсячно слъдуюющимъ образомъ:

Въ январъ горизонтъ съ самой низкой влажностью находится на 20-25 сант., въ февралъ на 30-35 сан., въ мартъ 40-45 сант., апрълъ 40-45 сант., маъ 40-55 сант., іюлъ и по декабрь 30-35 сант. Ниже этихъ критическихъ горизонтовъ идутъ горизонты неусыхающіе — съ возрастающей влажностью. На огошаемыхъ поляхъ подобное распредъление толщи почвъ на усыхающіе и неусыхающіе горизонты можеть быть лишь за тотъ періодъ, когда орошеніе не производится — ранней весной и зимой; въ остальное время, почва какъ бы представляется одной непрерывно капиллирующей массой. Какъ видно изъ таблицы С. и друг., переходный горизонть на орошаемомъ полъ стебутовскаго съвооборота и американскаго 2-хъ-полья лежитъ на глубинъ 40-50 сант., и здъсь влажность въ разные мъсяца колеблется отъ 11,6% до 19,5%; отъ него кверху и книзу идутт горизонты съ увеличенной влажностью, при чемъ въ верхнихъ горизонтахъ влажность колеблется отъ 9 до 22%, а въ нижнихъ (70-100 с.) отъ 17 до 27%.

Какъ велика средняя годовая разница во влагъ въ степи и на орошаемомъ полъ по отдъльнымъ горизонтамъ, видно изъ слъдующей таблицы (образцы брались одновременно — 10 числа каждаго мъсяца):

Влажность въ 0/00/о.

На какой глубинѣ.	Въ степи.	На оро- шенномъ полѣ (В).	Примѣчаніе.	Мъсяцы.	Въ степи.	На оро- шенномъ полъв.
0— 5 см. 10— 15 л 20 — 25 л 40— 50 л 60— 70 л 70— 80 л 80— 90 л 90—100 л	82 76 79 9,5 10,9 11,3 12,7 14,0	14,1 16/1 15,45 — 17,2 — 18,1 — — —	Поле (В) занято овсомъ съ 11/п— 12/vi и машемъ. съ 24/vi—8/vii Орошалось осенью 5 разъ, именно: 17/iv, 16/v, 18/vi, 29/vii и 11/viii.	Январь	10,1 12,5 12,18 9, 8 11,6 9,1 9,8 8,8 7,0 10,0 9,2 12,4	21,8 16,95 17,0 12,1 14,1 17,2 13,3 17,6 21,8 19,1 17,8 19,8

Средняя влажность почвы за 1911 годъ на всей изслъдованной глубинъ (10—100 сант.) въ степи равна 10,2%, а на орошоемомъ полъ, бывшемъ подъ овсомъ и машемъ, =17,3%; самая большая средняя влажность въ степи была на глубинъ 100 сант. — 14,0%, а на орошаемомъ полъ — 18,1% (на той же глубинъ); самая низкая влага въ степи была въ сентябръ — 7,0%, а на орошаемомъ полъ въ апрълъ — 12,2% (до орошенія поля).

Наиболѣе влажнымъ мѣсяцемъ въ степи былъ февраль съ 12,5% средней влаги, отчасти мартъ 12,2% и декабрь съ 12,4%, а на орошенномъ полѣ — сентябрь съ 21,8% влаги, декабрь — 19,8% и октябрь (19,1%). Абсолютный максимумъ влаги въ степи наблюдается въ февралѣ — на глубинѣ 0—5 сант. и былъ раьенъ 20,8%; на орошенномъ же полѣ въ сентябрѣ — на глубинѣ 90—100 сант. (24,2%) и въ ноябрѣ на той же глубинѣ (24,5%); изъ поверхностнаго горизонта на орошенномъ полѣ наибольшій процентъ влаги наблюдался въ январѣ и декабрѣ на глубинѣ 0—15 сант. = 23—21% воды.

Наименьшій проценть влаги въ степи наблюдался въ сентябръ, на глубинъ 1-5 сант. - 0,4%, а наименьшій % воды на орошаемомъ полъ былъ отмъченъ въ іюлъ на глубинъ 0-5 сант. — 18%; этотъ минимумъ совпадаетъ съ періодами послё уборки овса и до поливки и посвва (вслёдъ за нимъ) маша (на зеленое удобреніе). Въ общемъ въ степи только въ февралъ и мартъ мъсяцахъ влажность въ районъ распространенія корней является болбе или менбе достаточной для жизни растеній, да и то лишь до глубины 25 сант., а послъ (въ теплое время) она спускается далеко ниже предёла используемости растенія (отъ 0,4 до 9%); поэтому-то въ 1911 году даже суходольныя степныя травы могли расти еще съ конца февраля до конца апръля, а послъ и онъ совершенно высохли. На орошавшемся (5 разъ) полъ стебутовскаго съвооборота, нолучившемъ за 5 поливокъ 450 куб. саж. воды, влажность должна слёдовать, конечно, за поливками, а въ приведенной таблице, какъ разъ, всв опредвленія двлали до поливокъ, поэтому въ верхнихъ горизонтахъ и здъсь % влаги не великъ; зато въ нижнихъ горизонтахъ, откуда влага не могла быстро теряться черезъ испареніе, % влаги постоянно оказывался довольно высокимъ и, начиная съ конца апръля и съ глубины 45 сант. колебался отъ 14% до 24,5%.

Кромѣ указанныхъ изслѣдованій, въ лабораторіи производились опредѣленія всхожести посѣвныхъ сѣмянъ, вѣса, сорности ихъ и проч.; результаты не приводятся, такъ какъ ничего новаго, по сравненію съ прошлыми годами, они не представляютъ. Опредѣленія качества хлопковаго волокна различныхъ сортовъ приводятся при описаніи опытовъ съ хлопчатникомъ. Опредѣленія жира въ молокѣ приводятся въ таблицѣ удоевъ молока у коровъ Опытнаго Поля.

Въ дальнъйшемъ описаніи результатовъ дъятельности Опытнаго Поля за 1911 годъ мы отдъльно опишемъ работы:

по полеводству,

по опытному и селекціонному участкамъ и

по вегетаціонной оранжерев.

#### Вегетаціонные опыты.

Въ 1911 году были поставлены слъдующіе вегетаціонные опыты:

- 1. Сравненіе плодородія различныхъ почвъ (овесъ и пшеница).
- 2. Вліяніе удобреній на урожай пшеницы, овса и хлопчатника.
- 3. Вліяніе на урожай маша, внесенія въ солонцеватую почву гипса, сърнокислаго кали.
  - 4. Вліяніе различной влажности на пшеницу и машъ.
  - 5. Вліяніе нитрагина и нъкоторыхъ удобреній на люцерну.
- 1. Для сравненія плодородія взяты были слѣдующія почвы: съ а) голодностепской цѣлинной степи; b) лессовый суглинокъ Опытнаго Поля по кукурузѣ з п. основного сѣвооборота; с) солонцеватая почва виноградника; d) солонцеватая почва американскаго сѣвооборота; е) арычный илъ; f) песокъ изъ мѣстности Джеты-Сая и g) черноземъ изъ Безенчука. Почва набивалась во всѣ сосуды съ одинаковой плотностью, просѣянная черезъ сито; до посѣва влажность была доведена во всѣхъ сосудахъ до 15%, при чемъ поливка производилась снизу, въ боковыя трубочки, такъ какъ всѣ наши сосуды обыкновеннаго Вагнеровскаго типа (цинковые съ дренирующими желобами и боковыми трубочками для поливокъ). Вѣсъ почвы въ сосудахъ былъ: въ малыхъ 15 ф., среднихъ длинныхъ 30 ф. и въ большихъ широкихъ 2½ пуд. Посѣвъ произведенъ замоченными сѣменами од-

ного сорта яровой пшеницы — сарымагизъ и овса-немерчанскаго. Въ каждый сосудъ высъвалось по 14 съмянъ, а по укръпленіи всходовъ оставлялось только по 7 растеній въ сосудъ. Уходъ за растеніями состоялъ въ поливкахъ сосудовъ сначала черезъ 3 дня, потомъ черезъ 5 дней; вода обыкновенная арычная приливалась по въсу до опредъленнаго въса сосуда. Сначала весной влажность поддерживалась при 15%, а съ наступленіемъ жаровъ доведена до 20%, а послъ и до 25% отъ въса сухой почвы; къ концу созръванія опять перешли на 20% влагу. Въ случат образованія корки (при смачиваніи поверхности почвы водою) почва въ сосудахъ рыхлилась. Вст столы съ вегетаціонными сосудами днемъ выкатывались на солнце, а на ночь и въ дождь — закатывались обратно; въ періодъ бездождія — іюнь, августъ сосуды большей частью и ночью оставались подъ открытымъ небомъ.

Слъдуетъ отмътить, что всъ растенія въ вегетаціонныхъ сосудахъ (пшеница, овесъ, машъ, люцерна, хлопчатникъ) развивались вообще слабо по сравненію съ полевыми; причиной этого, надо полагать, служитъ малая величина сосудовъ, сильная нагръваемость ихъ и большое испареніе изъ почвы воды.

Результаты первой серіи опытовъ таковы:

tobb.	Сравниваемая							жай пицы.	Урож овс		зерна.	0/0 з	ерна.	Уро мал	
№М сосудовъ.	почва.	Постви.	Всходы.	Колошеніе.	Цвътеніе.	Созрѣваніе.	Вся масса.	Зерно.	Вся масса.	Зерно.	Сумма зер	Пшеницы.	Овса.	Вся масса.	Зерно.
IT								Γр	амі	мы.					
42	Цълинная степь.	14/11	25/11	11/v	13/v	10/vi	2,15				1,59	6,9	32,0	2,5	0,3
43	Лессовой суглинокъ Опытнаго Поля	,,	25/11	8/v	,,	9/v1	7,15	2,87	11,82	2,64	5,51	40,0	22,3	14,5	3,6
44	Солонецъ съ ви- ноградника	,,	2/111	11/v	16/v	13/ <b>y</b> ī	1,64	0,49	7,41	2,22	2,71	30,0	30,0	2,3	0,01
45	Солонецъ съ американскаго съвоборота		3/111	8/1	12/v	6/v1	7.0	2,57	1,47	3,3	5 97	367	22,6	6,0	
46	Арычный илъ	1		8/v		Section 1							1		
40		"	25/111	8/V	"	0/VI	7,,0	3,4	9,71	2,4	5,8	48,3	24,7	25,4	7,0
47	Песокъ Джеты-	,,	25/11	8/v	13/v	9/v1	3,4	1,25	10,5	1,45	2,7	36,7	14,0	17,0	4,6
48	Черноземъ Везенчука	"	25/11	8/ <b>v</b>	II/v	5/ <b>v</b> 1	3,95	0,9	12,2	1,1	2,0	22,8	9,1	20,0	5,0

Изъ таблицы видно, что скоръе всего развились растенія на черноземъ и позже всего на солонцъ.

Максимальный урожай зерна получился у пшеницы по арычному илу, а всей массы (съ соломой) — по лессовому суглинку опытнаго поля и высшій % зерна — по арычному илу (48,3%); минимальный же урожай пшеницы получился по цѣлинѣ, всей массы на солонцѣ виноградника и низшій % зерна — на цѣлинѣ (6,9%). Овесъ далъ большій урожай по солонцу американскаго сѣвооборота, а меньшій — по чернозему; большій % зерна по цѣлинѣ (32%) и меньшій по чернозему (9,1).

Сумма урожаевъ овса и пшеницы наибольшей оказалась по арычному илу, и это наводить на мысль испытать его въ качествъ удобрительнаго вещества на поляхъ, такъ какъ при чисткъ арыковъ весной ила получается значительное количество. По нъкоторымъ изслъдованіямъ, илъ довольно богатъ азотомъ, фосфорной кислотой (и особенно растворимой) и цеолитными веществами, и этимъ, въроятно, объясняется эффектъ его дъйствія въ нашихъ вегетаціонныхъ опытахъ. Послъ уборки овса и пшеницы въ тъ же сосуды былъ посъянъ зерновой бобовый машъ (Phaseolus Mungo) и онъ далъ слъдующій урожай: наивысшій по илу, затъмъ по чернозему, а низшій — по цълинъ и солонцу.

Вліяніе удобреній на пшеницу и овесъ (тѣ же сорта).

Въ этой серіи и въ другихъ съ опытами по вліянію удобреній, послѣднія вносились въ количествахъ, соотвѣтствующихъ двойному полному удобренію на десятину (по вѣсу почвы), именно:

	H.			ie.		rie.	Пшег	ица.	Ове	есъ.	0/0 36	ерна.	зерна.
Удобренія.	0/о главн элемент.	Посквъ.	Веходъ.	Колошеніе.	Цвѣтеніе.	Созрѣваніе.	Beero.	Зерна.	Beero.	Зерна.	Пше- ницы.	Овса.	Сумма зе
Навозъ	PNK	14/11	2/m	18/v	14/v	6/vi	5,6	2,3	15,8	2,8	41,4	18,0	5,14
Жмыхъ хлон- ковый	7	,,	1/111	13/v	18/v	10/vi	2,7	0,9	9,2	3,0	30	32	3,9
Кровяная мука	14	,,	,,	15/v	20/v	15/vi	. 32	1,6	4,5	1,9	50	42	3,5
Костяная		"											
мука	14	"	2/111			15/vI	2,3	1,9	4,0	1,4	43	35	2,3
Суперфосф Сърнокислый	12	"	2/111	8/v	12/v	6/v1		1,3	4,5	0,9	42	21	3,3
калій	40	"	$1/\mathrm{m}$	12/v	16/v	13/vı	1,8	1,1	1,6	0,58	61	36	1,68

Урожай маша 24 сентября.

C.	Зерно.	№№ сосудовъ.	Удобреніе.
19,4	4.7	34	Навозъ.
13,0	3,8	35	Хлопков. жмыхъ.
9,6	1,7	36	Кровяная мука.
6,3	1,6	37	Костяная мука.
19,6	6,0	38	Дв. суперфосфатъ.
14,5	4,0	39	Сърнокислый калій.

Лучшій урожай получился по навозу и хлопковому жмыху по сумм'в урожая обоихъ растеній, а въ частности овесь далъ зерна больше по жмыху. Проценть зерна у пшеницы выше всего былъ по сърнокислому кали и кровяной мукт, а ниже всего — по жмыху; у овса — высокій % зерна по кровяной мукт и низшій — по навозу. Машъ, постянный 2-мъ поствомъ въ тъхъ же сосудахъ, далъ наивысшій урожай зерна и массы по суперфосфату, отчасти по навозу, а низшій — по костяной мукт и кровяной.

Вліяніе удобреній на хлопчатникъ:

					Состе		е хло )/vii.		Опаві	пихъ.	30/vіі брано робоч	о ко-	0	1-й ко-
Удобренія.	Посѣвъ. Всходы.	Всходы.	Цвътеніе.	Созр'яваніе.	Высота сант.	Вѣтв.	Kopo6.	Вут.	Завязей.	Листьевъ.	Открыв- шихся.	Слабыхъ.	Вѣсъ всего сбора.	Вѣсъ сырца 1 робочки въ 1
Селитра	30/ш	7/IV		7/vIII	14,5	9	7	4	2	4	9	3	28,2	3,18
Жмыхъ хло- ковый	"	,,	_	3/vIII	8,2	7	4	,	4	3	7	1	25,9	3,7
Суперфос- фатъ	"	6/17	_	8/vIII	7,5	7	3	1	5	6	3	2	8,78	2,91
$K_2SO_4$ .	,,	,,	_	31/v11	8,2	4	2	_	4	6	4		9,9	2,47
Жмыхъ+су- перфосф	,,	9/IV	_	11/vIII	10,0	8	4	_	6	5	7	1	27,9	3,9
$\mathbb{K}_{2}SO_{4}\dots$	"	,,	_	31/vII	10,5	8	6	1	2	5	8	1	24,2	3,03
Суперфосф. $+$ $K_2$ $SO_4$	"	6/1v	-	_	_	_	_	_	-	_	3	1	10,3	3,4
Контрольная	,,	5/IV		_	_	_	-	_	_		3	2	4,3	3,1

По количеству урожая лучшій результать дала селитра, затѣмь жмыхь плюсь суперфосфать и одинь жмыхь, а худшій — суперфосфать и сѣрн. калій; по величинѣ коробочекь — наибольшія коробочки получились по жмыху плюсь суперфосфать, жмыху и жмыху плюсь сѣрн. калій, а меньшія по  $K_2SO_4$  и суперфосфату; наконець, по времени созрѣванія — скорѣе всего созрѣли коробочки по жмыху съ сѣрн. каліємъ и жмыху плюсь суперфосфать плюсь сѣрн. калій, а позже всего по жмыху съ суперфосфатомъ.

Вліяніе различной влажности на пшеницу и машъ:

	a de la co	Опыты съ пшеницей.							Опыты съ машемъ.						
0/0 влажности			ніе.	ie.	ie.			I III E	Урожай.		рна.				
почвы.	Посѣвъ.	Всходы.	Колошеніе.	Цвѣтеніе.	Созрѣваніе.	Урожай.	Посѣвъ. Уборка.	Уборка	Всей массы.	Зерна.	0/00/0 зерна.				
10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> H <sub>2</sub> O	14/111	2/111	20/v	28/v	8/vi	на-		24/1x	2,25	0,4	17,7				
$16^{0}/_{0} \dots \dots$	,,	1/111	,,	25/v		Перепутанъ на блюдателемъ.	, 22	,,	5,23	1,26	24,1				
$22^{0}/_{0}$	,,	26/111	,,	n	"	ута ате	"	,,	7,32	1,04	14,2				
330/0	"	28/11	,,	,,	11/vI	еп Од	"	"	6,02	1,45	24,0				
40%	,,	2/111	21/v	28/v	15/vI	ep	,,	,,	6,17	0,92	15,0				

Лучшій результать по урожаю зерна маша получился съ влажностью въ 16% и 33%, а по всей массѣ съ влажностью въ 22%, а худшій— съ влажностью въ 40% и 10%, какъ по количеству урожая, такъ и по выходу зерна.

Вліяніе на машъ гипсованія, известкованія, внесенія естественной люцерновой почвы:

		Уроз	кай.	0/0
Ne Ne	какія удовренія.	Всей массы.	Зерна.	зерна.
		Грам	імы.	
1	Лессовый суглинокъ + 50% люцерновой почвы	04.05	0.10	90
	Оп. Поля	24,07	9,13	38
2	Лессъ Оп. Поля + машевая почва	29,4	8,64	29,4
4	Лессъ Оп. Поля + известь	8,51	1,70	20
6	Контрольн. лессъ	17,04	3.81	22,?
8	Лессъ Оп. Поля + гипсъ	6,24	1,43	23,0
10	Тоже	12,6	3,7	30,0

Какъ видно изъ таблицы, наибольшій урожай маша (зерна) въ этой серіи полученъ въ сосудѣ съ примѣсью къ почвѣ Опытнаго Поля люцерновой земли, а также — машевой; худшій же отъ внесенія извести и гипса; это и понятно, такъ какъ известь и гипсъ имѣются въ очень значительныхъ количествахъ въ нашей почвѣ, и, конечно, растенія въ нихъ не нуждаются; извѣстное количество органическихъ веществъ и рыхлая структура машевой и люцерновой почвы, прибавленныхъ къ бѣдной и уплотненной почвѣ Опытнаго Поля, произвели значительное вліяніе на машъ, повысивъ его урожай.

Послъдняя серія вегетаціонныхъ опытовъ въ 1911 году поставлена для разръшенія вопросовъ о вліяніи на люцерну разныхъ нитрагиновъ, присланныхъ Московской бактеріологической лабораторіей (имени Феррейна) и о сравнительномъ съ ними дъйствіи удобренія люцерны суперфосфатомъ.

9	Fr Braginia a	Вре	емя.	сухой лю-	а уро- отивъ ъной.	signific ; espec
New	Какой опыть.	Посѣ-	вовъ. Вско- довъ. Въсъ с массы дерны.		Прибавка уро- жая противъ контрольной.	Примъ́чаніе.
1 2 3 4 5 6 14 16 17 22	Нитрагинъ Сѣверина	28/11	13/III 12/III 11/III " " " " " "	9,3	-3,3 -9,0   -2,5  +14,4	Люцерна была посвяна 1 и снята 24-го сентября, вообще она развивалась въ сосудахъ неважно.
23	Клубеньки лю- перны изъ Оп. Поля	n	n	15,3	+2,7	

На основаніи одного этого опыта, конечно, трудно сказать, какое имѣетъ значеніе для нашей почвы удобреніе нитрагиномъ (при внесеніи съ посѣвомъ люцерны, сѣмена которой размѣшиваются съ нитрагиномъ); однако, ни въ одномъ сосудѣ съ нитрагиномъ не было превышенія урожая надъ контрольнымъ сосудомъ (неудобреннымъ); зато удобреніе двойнымъ суперфосфатомъ (42%  $P_2O_5$ ), внесеннымъ при посѣвѣ люцерны въ количествѣ, соотвѣтствующимъ 12 пуд. на десятину (или 5 пуд.  $P_2O_5$ ), сказалось значительнымъ увеличеніемъ урожая, и это всегда подтверждается нашими полевыми опытами.

## Полевые опыты въ 1911 году.

Опыты по отдёльнымъ сёвооборотамъ были поставлены слёдующіе:

- 1) На основномъ 5-польъ:
- 1-е поле: Вліяніе числа поливокъ на озимую пшеницу и сорта пшеницъ.
- **2-е поле:** Сравненіе сортовъ хлопчатника и вліяніе чеканки и густоты.
- 3-е поле: Сорта кукурузы и вліяніе удобреній.
- 4-е поле: Вліяніе на хлопчатникъ поливокъ и промышленныхъ удобреній.
- 5-е поле: Хозяйственный посъвъ маша и опытъ посъва его между рядами кукурузы.
  - 2) На американскомъ 4-поль в:
- 1-е поле: Вліяніе удобреній на пшеницу и культура риса при разномъ числъ подивокъ.
- **2-е поле**: Вліяніе минеральныхъ удобреній на хлопчатникъ и время внесенія удобреній.
- 3-е поле: Способы поства хлопчатника и вліяніе глубины мотыженія на хлопчатникъ.
- 4-е поле: Способы и густота посъва кукурузы.
  - 3) На простомъ 4-поль :
- 1-е поле: Культура риса на солонцахъ.
- 2-е поле: Вліяніе времени чеканки на урожай хлопчатника и способы посадки его.
- 4-е поле: Сорта подсолнечника.

4) На простомъ 2-поль в:

Вліяніе предшествующихъ растеній на урожай хлопчатника.

- 5) На стебутовскомъ сѣвооборотѣ:
- 1-е поле: Сорта озимаго ячменя.
- 2-е поле: Сорта кормовой свеклы и сахарной.
- з-е поле: Сорта овса.
  - 6) На промышленномъ 8-польъ:
- 1-е и 2-е поле: Культура хлопчатника на солонцъ.
- 3-е поле: Сорта кукурузы и густота посъва кукурузы.
- 5-е поле: Промышленные сорта хлопчатника время поства ихъ.
- 8-е поле: Опытъ удобренія люцерны нитрагиномъ.
- 9) На практическомъ участкъ, сдававшемся изъ доли:

Учетъ стоимости урожая хлопчатника при рядовомъ посъвъ и джоячномъ (на грядахъ).

10) На ботаническомъ питомникъ́ — испытаніе овыхъ растеній и пріемовъ культуры.

#### Основной сфвооборотъ.

1-е поле. Въ опытахъ съ вліяніемъ поливокъ выствалась озимая пшеница мъстная-красная (Triticum vulg. erythrosperтит). Была посъяна 30 августа 1910 года рядовой съялкой; съмянъ расходовалось по 7 пуд. на десятину; всходы появились 5 сентября. На той же части этого поля, гдв сравнивались сорта пшеницъ и густота высъва, посъвъ былъ произведенъ 12 сентября, всходы у большинства сортовъ появились 18-го сентября. Для выясненія вопроса, возможенъ ли посъвъ яровыхъ сортовъ пшеницы, ячменя и овса осенью, на этомъ участкъ, кромъ слъдующихъ озимыхъ сортовъ: оз. красная (Tr. v. erythrospermum), бълая (гл. обр. Tr. v. graecum) и саватская (главнымъ образомъ Tr. v. meridionale) высъвались еще яровые сорта: полтавка, арнаутка, ноэ и ячмени: голый, огница, (а для сравненія озимый ячмень-черный); наконецъ, яровые овсы — рыхликъ и шведскій. Вслудствіе наступившихъ въ ноябру 1910 года (—23,0°) морозовъ (при отсутствіи сніва), повторившихся въ январт (—18,0°) и февралт 1911 года (—16,0°), вст яровые сорта пшеницъ, ячменя и овсовъ померзли и ихъ пришлось пересъвать 14 февраля 1911 года; озимые ячмени тоже жестоко пострадали (особенно черный), и только озимыя пшеницы почти нисколько не были затронуты морозами. Въ дальнъйшемъ, сорта пшеницы развивались удовлетворительно; при созръваніи, какъ всегда, они подвергались нападенію воробьевъ. Созръваніе озимой пшеницы въ среднемъ наступило около 25 мая; уборка произведена серпами 2 іюня, послъ чего поле было орошено, вспахано, и на немъ 10 іюня быль посъянъ машъ на зеленое удобреніе. Результаты опытовъ на этомъ поле слъдующіе:

Какой опытъ.	Урожай зерна на десят.	Количе куб. саз Осенью.	ество воды к. на десят. Весной.	Beero.	Время поливокъ.	Примъчаніе.
Вліяніе поливокъ:  1 поливка осенью и 2-я поливка весной  Безъ осенней поливки и 2-я поливка весной  1-я поливка осенью и поливка весной  1-я поливка осенью и безъ поливки весной  Безъ осенней поливки и 1-я поливка весной	85 " 87 " 60 "	100	240 247 62 79	340 247 162 100	13/1v 23/x	За періодъ вегетаціи пшеницы выпадо осадковъ (1/1х—20/v) 193,0 mill., въ томъ числѣ осенью 1910 г. 25 mill. Кромѣ того, всѣ дѣлянки получили передъ посѣвомъ пшени поливку и съ нею по 100 куб. саж. воды на десятину.

Сорта пшеницы.	Урожай на	% %	Кусти-	длина.			
	десятину.	зерна.	стость.	Стебля.	Колоса.		
Озимая красная	78 пуд.	36,5	2,9	80	7,0		
" бѣлая	51 "	32,5	2,1	89	5,3		
" Саватская	61 "	39,5	1,7	.85	6,8		
Яровая Полтавская	41 "	20,0	2,4	79	6,6		
" Ноэ	30 "	20,1	2,0	83	3,8		
" Арнаутка	51 "	29,8	2,1	84	6,8		

Изъ таблицы видно, что осенняя поливка пшеницы (приблизительно, черезъ мъсяцъ послъ появленія всходовъ) ухудшаетъ урожай пшеницы — все равно, сопровождалась ли она потомъ 1 или 2 весенними поливками; лучшій урожай получился при 1-й весенней поливкъ 13 апръля (98 пуд. зерна на десятину), при чемъ за эту поливку пшеница получила всего 79 куб. саж. оросительной воды на десятину (не считая предпосвыной осенней поливки и выпавшихъ съ января по конецъ мая 168,0 милл. осадковъ); нъсколько хуже получился урожай (85 пуд.) при 2-хъ весеннихъ поливкахъ (13 апръля и 11 мая), при чемъ оросительной воды израсходовано на десятину 247 куб. саж. Изъ сортовъ пшеницъ лучшій урожай дала озимая красная пшеница — 78 пуд. на десятину; при этомъ она имъла и большую кустистость и высокій проценть зерна — 36,5% (по отношенію къ общему урожаю съ соломой); за ней шла по урожайности озимая Саватская пшеница (61 пуд.) — съ еще болъе высокимъ % зерна 39,5%; хуже быль урожай у бълой пшеницы — 51 пуд., при невысокомъ % зерна (32,5%); изъ яровыхъ пшеницъ въ этомъ году хорошій урожай дала арнаутка (51 пуд. на десятину), при сравнительно приличномъ % зерна (около 30%), и хуже всего удалась пшеница «Ноэ» съ урожаемъ 30 пуд. на десятину и выходомъ зерна въ 20,0%.

2-е поле основного съвооборота было разбито на два участка, и на одномъ изъ нихъ былъ поставленъ опытъ съ чеканкой хлопчатника при началъ цвътенія, а равно съ густотой посъва хлопчатника, а на другомъ— сравнивались въ повторныхъ дълянкахъ сорта хлопчатника (помимо селекціоннаго участка). Для первыхъ опытовъ былъ посъянъ (обычнымъ порядкомъ: съялкой Баннера послъ первой осенней вспашки, весенней бороновки Зигзагомъ и французской бороной) хлопчатникъ кингъ 24 марта; сорта же хлопчатника высъвались съялкой 18 апръля.

Всходы хлопчатника, посъяннаго 24 марта, появились 4 апръля; цвътеніе здъсь началось 9 іюня, а созръваніе 25 іюля; къ 1-му сбору приступлено съ 24 августа. Что касается сортовъ хлопчатника, то послъ посъва ихъ 18 апръля всходы появились 23—25 апръля; цвътеніе шло разновременно: раньше всего у кинга 16 іюня; туземный зацвълъ 23 іюня, а египетскій афифи 25 іюня.

Созръваніе шло тоже неодинаково: кингъ началъ соззръвать 5 августа, туземный—16 августа, египетскій афифи—1 сентября.

Всё дёлянки съ чеканкой, сортами хлопчатника и проч. получили за лёто по 3 поливки, 3 мотыженія сапками и 3 пропашки коннымъ планетомъ. Сборъ хлопчатника производился: у чеканеннаго 26 августа (1-й); 7 сентября (2-й); 22 сентября (3-й); 20 октября (4-й); на сортахъ первый сборъ былъ 22 сентября; 2-й сборъ 17 октября и 3-й сборъ не производился въ виду холода и дождей.

Изъ нижеприводимой таблицы промѣровъ хлопчатника (10 іюля) предъ началомъ созрѣванія видно, насколько существенна разница между скороспѣлыми и поздноспѣлыми сортами хлопчатника, съ одной стороны, а съ другой, насколько очевидно преимущество чеканки при началѣ цвѣтенія и густого посѣва хлопчатника. Въ настоящемъ году хлопчатникъ пострадалъ во 1-хъ, отъ гусеницы бабочки карадрины (1—15 іюля), а во 2-хъ отъ ранняго заморозка 20 сентября; имъ побитъ весь хлопчатникъ, и особенно пострадали поздніе сорта — египетскій, флорадоръ, Excelsior, какъ и друг.

Даже въ такой неурожайный для хлопчатника годъ, какъ 1911 годъ, рекомендованные раньше сорта хлопчатника: кингъ и кокъ-чигитъ дали превосходный урожай хлопка: кингъ около 208 пуд. на дес., а кокъ-чигитъ 174 пуд., при этомъ кингъ уже въ 1-мъ сборъ (до заморозковъ) 54% всего хлопка, а кокъ-чигитъ 44%; а невызръвшихъ послъ мороза коробочекъ у этихъ сортовъ осталось ничтожное количество у кинга 1,5, а у кокъ-чигита 2,0, тогда какъ у тріумфа ихъ осталось 9, флорадора 10, аунсбола 6,0, у египетскаго афифи 12,0.

Выходъ волокна былъ также отличный у кинга — 34,5%; у кок-чигита — хорошій 32,6%. Довольно урожайными и скороспѣлыми въ 1911 г. оказались также сорта: малля-чигить (130 пуд.), ташкентскій упландъ (115 пуд.), Начкіп'з (110 пуд.) и, что особенно любопытно, туземные сорта — бѣлая гуза (90 пуд.) и красная гуза (115 пуд.); но послѣдніе сорта обладаютъ малымъ выходомъ (29,0%). Самый ничтожный урожай дали египетскіе сорта — афифи (10 пуд.) и ашмуни (6 пуд.); поэтому въ Голодностепскомъ районѣ въ такіе годы, какъ 1911 годъ, отъ посѣва ихъ приходится совершенно отказаться.

## Результаты промфровъ 29 августа.

Supplement of the Contract	I.		ВЪ.	Чис	ло ко	робоч	екъ.		Вел коро		екъ не 20/х.	десят.	на
названіе сорта.	Высота стебля.	Число вътвей.	Число листьевъ.	Сформировав- шихся.	Раскрыв- шихся.	Завязей.	Бутоновъ и цвътовъ.	Опавшихъ.	Длина.	Шприна.	Число коробочекъ раскрывш. къ 20/	Урожай на де сырца.	Выходъ волокна 0/0 0/0.
Кингъ Опытнаго Поля. Кингъ американскій. Ташкентскій Упландъ. Паариханскій. Кувинскій Кокъ-чигитъ. Малля-чигитъ Тріумфъ Руссель Аунсболъ Bleu Ribbon Allen King Hawkin's Most Improved Southern Hope Gold Standart Excelsior prolific Кукъ Florador. Mells Select Egypt Erunetcкій Афифи Туземная бълая гуза " желтая " красная " красная " красная "	Caht. 117 130 132 — 136 135 126 136 125 128 137 — — 160 150 163 — 169 147 128 145 129	16 15 15 — 18 16 13 14 14 13 12 — — — 15 14 15 18 — 17 15 18 16 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	111 121 122 157 116 92 107 96 67 84 85 115 125 130 _ 108 99 118 154 160	30 31 28 	1,5 0,6 2,0 - 3,0 3,5 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0	3,5 7,3 2,0 	3 13 2 — 9 0 0 1 3 0 0 0 1 — — 3 3 6 6 22 — 7 16 0 0 14 17	23 17 38 - 31 25 22 15 21 26 12 - - 15 13 17 7 - 6 4 11 6 3	ca 4,0 4,1 3,9 4,5 4,1 4,1 5,8 4,6 4,0 - - - 4,2 4,3 - - 4,7 4,4 3,5 3,0 - - - - - - - - - - - - -	3,7 3,7 3,2 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,5 - - - - 3,8 3,2 4,6 3,7 3,1 3,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,3 4,2 3,5 — 2,2 3,0 4,3 9,5 5,6 3,1 — 9,4 7,0 2,0 10,0 6,0 6,0 6,0	115 112 95 174 130 96 52 84 175 — 84 110 77 — 25 44 36 20 10 6 90 65	34,5 36,0 32,1 30,5 30,0 32,6 - 28,0 33,2 33,4 32.5 30,5 29,0 31,0 - - - 31,4 27,0 29,2 26,0 29,4
Учетъ 10-го іюня.													
Кингъ чеканенный , нечеканенный , съ 1 растеніемъ	95 120	20 14	92 62	17/ 20	=	2 2	32 19	<u>-</u>	— —	_	140 138	50,0 46,0	0/0
" съ 1 растениемъ въ одномъ гнѣздѣ Кингъ съ 2 растеніями	97	20	89	15	-	2	30	-	-	-	139	45	-
въ гивздв	95	18	84	13	_	2	26	_	-	_	125	40	_
Кингъ съ 3 растеніями въ гнъздъ	95	14-	79	9	_	1	20	_	_		100	36	_

Настоящій неудачный для туркестанскихъ хлопководовъ годъ далъ возможность, во 1-хъ, провести різкую границу между надежными и ненадежными сортами хлопчатника, а во 2-хъ, опреділенно заявить, что Голодная Степь даже въ худшіе годы для хлопчатника, является вполнів надежнымъ хлопковымъ райономъ, если здізсь будутъ культивировать такіе сорта, какъ кингъ и кок-чигитъ, а посівъ производить между 1 и 15 апрізля.

Какъ видно изъ таблицы 2-й, отличнымъ средствомъ для ускоренія созр'вванія хлопчатника и увеличенія урожая его верхушекъ (обръзка стебля). чеканка началъ цвътенія и густой посъвъ. По опытамъ 1911 года чеканенный хлопчатникъ далъ урожай на десятину 140 пудовъ сырца и перваго сбора 50%, а нечеканенный 183 пудовъ и перваго сбора лишь 46%. Далъе, при рядовомъ посъвъ съялкой, при междурядьяхъ въ 11/4 арш. и между гнъздами 1/2 арш., наибольшій урожай получается при оставленіи въ гніздів по 3 растенія (139 пуд.) и наименьшій при 1 растеніи въ гніздів (110 пуд.); эта прибавка въ 29 пуд. оцфинвается суммой около 95 рублей.

3-е поле основного съвооборота было занято въ одной половинъ сортами кукурузы, а въ другой опытомъ по вліянію удобреній на кукурузу. Посъвъ сортовъ кукурузы съялкой Баннера произведенъ 18 апръля, а для опыта съ удобреніями посъяна 30 марта кукуруза кутаисскій гибридъ (поздноспълая, высокостебельная); при чемъ удобренія вносились 11 февраля въ разбросъ, по пласту, и задълывалось бороной. Для сравнимости всъ сорта кукурузы съялись на одной дълянкъ съ одинаковой густотой для всъхъ сортовъ въ 1¼ арш. между рядами и ¾ арш. между гнъздами (по одному растенію въ гнъздъ), а на другой дълянкъ, контрольной — съялись съ нормальными для каждаго сорта разстояніями между рядами: чинквантино на ¾ арш., бессарабская 1 арш., стерлингъ 1¼ арш. и кутаисскій гибридъ 1½ арш.

Всходы кукурузы, посъянной 30 марта, появились 8 апръля, а сорта, посъянные 18 апръля, дали всходы 25—27 апръля; сортовыя кукурузы начали выкидывать султаны: кутаисскій гибридъ между 26 іюня—10 іюля, а такія скороспълыя, какъ спасовская, чинквантино, мотто — около 30 мая; созръваніе нача-

лось у кутаисскаго гибрида—5—10 сентября, а у скоросивлыхъ около 15 іюля. Уходъ за кукурузой состояль въ прорѣживаніи, пасынкованіи, 3-кратномъ мотыженіи (съ одной окучкой), 2-кратной пропашкой планетомъ и 5-кратномъ орошеніи. Какъ развивалась кукуруза, и какой она дала урожай зерна, видно изъ слѣдующей таблицы:

Названіе сорта.	B.E	Число почат- ковъ на 100 растеній.	100 0Bb.	0/о обертокъ.	0/о зерна въ початкахъ.	Урожай с тин	
пазвание сорта.	Высота стебля въ вершк.	Число ковъ н растен	Вѣсъ 100 початковъ.	990 0/0	0/0 зерна 1 початкахъ.	Початк.	Стебля.
Спасовская	27	175	11,7	25,0	65	171	125
Бессарабская	31	78	14,0	33,0	69	92	340
Чинквантино	32	114	11,8	24,0	78	124	170
Мотто	30	107	16,0	26,0	77	152	209
Мъстная тузем- ная бълая	33	108	<b>14,</b> 3	16,7	80	126	263
∙Минезотта №23	43	89	18,5	17,1	85	138	335
" № 13.	43	50	15,0	16,0	75	63	420
Браункотти	43	64	26,0	16,0	. 78	139	377
Мъстная Гру- шевская	36	51	24,0	16,0	71	102	335
Стерлингъ	43	72	21,0	17,0	79	126	263
Доттонъ	32	69	20,0	16,3	67	116	314
Кутаисскій ги- бридъ	50	110	_			115	<b>4</b> 50
Тріумфъ	38	64	11,7	23,0	66,7	63	335

100				And the second					1000				_
	Названіе удобренія.	Высота стебля.	Число почат- ковъ.	Число листьевъ.	Поверх. 1 листа.	Поверх. всъхъ листъевъ.	Урожай почат- ковъ съ десят.	Урожай стеблей съ десят.	Прибавка зерна.	Рентабель- я ность по зерну.	.d Стоимость   1 пуда.	Н Стоимость э на десятину.	
						1000				70			
	Удобр. 23 п. кро- вяной муки	58,0	110	_	_	_	192	838	87	60	_ 90	21	
	Удобр. 40 п. жмыха		100	100	90		100	000	0.77		70	90	
	хлопковаго Удобр. 20 п. жмыха	53,0	100	18,0	29	509	192	833	87	57	- 70	30	
	рядовой	54,0	80	16,0	30	495	157	800	52	37	- 70	15	
	Удобр. навозомъ 2400 п	49,0	140	18,0	29	528	176	737	71	41	1 3	30	
	Удобр. 40 п. жмыха												
	12 п. суперф	58,0	100	17,0	25	423	157	785	52	— 2		54	
	Удобр. 12 п. суперфосфата	49,5	90	17,0	23	381	140	700	35	+11	2 -	24	
	Удобр. 24 п. костя-		00	150	07	107	140		0.5		E0	12	
	ной муки Контрольная — не-	4,7	80	17,0	27	467	140	550	99	23	- 50	12	
	удобр	48,0	110	17,0	26	455	105	490	-	W = 1		-	
						1	1		1	THE STREET			

Наиболъ скороспълые сорта, созръвшие въ 1911 году на 90—95-й день послъ посъва, дали въ общемъ большій урожай, чъмъ поздносивлые; такъ, скоросивлая «Спасовская» кукуруза дала урожай почти 171 пуд. на дес.; «Мотто» — 152 пуд., «Чинквантино» — 124 пуд., и сравнительно скороспълый «Браункотти» — 139 пуд.; поздноспълые же дали Доттонъ — 116 пуд., Кутаисскій гибридъ — 115 Тріумфъ — 63 пуд. Наибольшій выходъ зерна получился у сорта Миневотта = 80-85% (отъ въса початка), затъмъ у Чинквантино, Стерлинга и Браункотти = 78-79%, а наименьпій у Спасовской, Доттона и Тріумфа = 65—67%. Проценть обергокъ у початковъ выше другихъ былъ у бессарабской, Мотто, Тріумфа (23—33%) и меньше всего у Браункотти, Минезотта, у грушевской (16%).

Наибольшая масса стеблей получалась у кутаисскаго гибрида—490 пуд. на десятину, затъмъ у Минезотты № 13— 420 пуд., у Браункотти—377 пуд., а наименьшая у Чинквантино—170 пуд. и Спасовской 125 пуд.

Что касается вліянія удобреній на кукурузу, то наибольшій урожай кукурузы получился по удобренію кровяной мукой и 40 пуд. хлопковаго жмыха—192 пуд. зерна и 838 пуд. стебля; затъмъ, по навозу—176 пуд. зерна и 737 пуд. стебля; ниже

быль урожай по жмыху + суперфосфать — 157 пуд. зерна и, наконецъ, 140 пуд. зерна получено по удобренію суперфосфатемъ, а также по костяной мукъ. Наиболъе рентальнымъ удобреніемъ подъ кукурузу оказалось опять-таки кровяная мука, давшая чистаго дохода на десятину 66 рублей; затъмъ жмыхъ 40 пуд. — съ доходностью 57 руб., навозъ — 41 руб и друг.; нерентабельнымъ оказалось двойное удобрение жмыхъ + суперфосфать, давшее убытку 2 рубля; мало доходно удобреніе однимъ суперфосфатомъ — 11 рублей. Низкій урожай кукурузы по двойному удобренію жмыхъ + суперфосфать кажется страннымъ при наличности повышеннаго урожая отъ внесенія отдъльно жмыха (192 пуд.) и суперфосфата (140 пуд.); но это объясняется, съ одной стороны, тъмъ, что участокъ подъ опытами съ кукурузой быль бъденъ азотомъ, и потому фосфатъ могъ дъйствовать лучше лишь по внесеніи избытка азотистаго удобренія, что въ опытъ не было; съ другой стороны, возможно, что двойной суперфосфать, какъ кислое удобреніе, въ сферъ его дъйствія образоваль сначала кислую реакцію почвы и тъмъ уменьшилъ процессы нитрификаціи, такъ какъ при кислой реакціи (по Минцеру) почти не происходить разложенія, напримъръ, кровяной муки, до образованія азотной кислоты; слъдовательно, кукуруза не могла въ данномъ случав использовать за это время даже тотъ азотъ, который былъ внесенъ съ 40 пуд. жмыха (при совмъстномъ удобреніи суперфосфатомъ).

4-е поле основного съвооборота было разбито на 2 участка, и на одномъ изъ нихъ были поставлены опыты съ вліяніемъ числа поливокъ на хлопчатникъ, а на другомъ изучалось дъйствіе промышленныхъ удобреній на хлопчатникъ, которыя были внесены 13 февраля. На всемъ полъ былъ высъянъ съялкой 18 апръля сортъ кингъ; всходы его появились 25 апръля; цвътеніе началось 18 іюня; созръваніе 8 августа; сборъ былъ сдъланъ: 1-й—5 сентября, второй—21 сентября и 3-й—12 октября. Хлопчатникъ развивался удовлетворительно, лишь въ іюлъ слегка подвергался нападенію гусеницы карадрины, а 20 сентября онъ былъ побитъ морозомъ. Уходъ за посъвомъ былъ обычный: по удобреніямъ хлопчатникъ получиль 4 поливки: 4 іюня, 25 іюня, 15 іюля и 1 августа; затъмъ ему дано 3 ручныхъ мотыженія сапками и 2 пропашки коннымъ планетомъ. На участкъ, гдъ производился опытъ съ числомъ поливокъ, сроки ихъ были различные и указаны въ нижеслъдующей таблицъ.

### Результаты вліянія удобреній на хлопчатникъ.

DOMESTICAL PROPERTY OF THE	у	четт	10					ръ 21 12/х		
II-mania wasanania	เล	ебля	вей.		Іисло обочен	ιъ.	<b>y</b> ]	рожай десят		HOCTE.
Названіе удобреній.	Количество удобрен. на десятину.	Высота стебля въ вершк.	Число вътвей.	Сформир.	Цвѣты и завязи.	Бутоны.	Beero.	0/0 1-ro c6opa.	Прибавка.	Рентабельность.
					MIN			Viley		
Неудобренная — кон- трольная	_	21	20	6	2	12	66	44	_	-
Навозъ	2400	21	15	5	2	13	60	30	- 6	30
Жмыхъ хлопковый	<b>4</b> 0	20	16	4	3	12	70	59	+ 4	<b>—</b> 15
Кровяная мука	23	18	14	4	2	13	88	50	+22	+50
Мясокостная мука		19	14	4	2	11	86	55	+20	-
Селитра чилійская	12	19	13	4	1	13	92	31	+26	+52
Селитра + суперфос- фатъ	12+12	21	18	5	2	13	74	48	+ 8	+26
Селитра + калій	12+10	20	14	4	2	14	91	53,6	+25	+30
Суперфосфать — калій.	12+10	17	11	4	2	11	82	58	+16	+10
Суперфосфатъ	12	19	12	5	2	11	64	40	<b>—</b> 2	+24
Калій	10	18	13	5	2	12	66	30	<b>—</b> 0	-17
Селитра + суперфосфать + калій	12+12+5	22	18	5	3	14	96	47	+30	<del> </del> +25
Жмыхъ + суперфос- фатъ	40+12	22	17	4	3	14	85	29	+19	+ 6
Жмыхъ + калій	40+80	18	14	5	3	13	88	40	+21	+20
Илъ арычный	2400	17	10	3	2	11	70	45	+ 4	-14
Жмыхъ рядами	20	18	13	4	3	12	71	60	+ 5	+ 2
" въ разбросъ .	40	17	12	4	- 2	12	79	57	+13	+12
" мелкій	- v	17	11	4	3	11	79	62	+13	+12
" крупный	_	17	11	4	2	10	70	53	+ 4	1 —

Выходъ волокна = 34,40/0.

Какъ видно изъ таблицы, высшій урожай полученъ по полному удобренію — селитра + суперфосфать + калій — 95 пуд. сырца на десятину, затъмъ по селитръ 92 пуд., селитръ + калій 91 пуд.; далъе по кровяной мукъ 88, жмыху + калій 88 пудовъ, по жмыху + суперфосфать 85 пуд., по жмыху въ количествъ 40 пудовъ на десятину — 79 пуд.; меньше всего полученъ урожай, какъ это ни странно, по навозу — 60 пуд., по суперфосфату 64 пуд., стрнекислому калію 66 пуд.; илъ арычный и жмыхъ хлопковый (въ количествъ 20 пуд. на дес.) дали тоже небольшой урожай — 70 пуд. на десятину. Малый урожай по навозу объясняется позднимъ внесеніемъ его (13 февраля), такъ что онъ не успълъ еще хорошо разложиться, а во второй періодъ роста хлопчатника дъйствовалъ замедляюще на его созръваніе, почему при наступленіи заморозка (20 сентября) значительная часть коробочекъ, побитая морозомъ, уже не созръла — не раскрылась. Наибольшій доходъ дало удобреніе селитрой = 52 руб. на дес., затъмъ кровяная мука = 50 руб.; селитра + калій 30 руб. и селитра + суперфосфать + калій — 25 руб.; суперфосфать же далъ убытокъ въ 24 руб., (также калій 17 рублей). Въ смыслъ ускоренія созр'вванія хлопка, судя по первому сбору, удобренія дъйствовали также неодинаково; большій проценть 1-го сбора быль по жмыховому удобренію = 57-60%; затымь по мясокостной мукъ 55%; кровяной мукъ 50%; по селитръ + калій 54%; малый 1-й сборь оказался по навозу = 30%, селитръ 31% и по одному суперфосфату или калію 30—40%. Мы видимъ, что внесеніе подъ хлопчатникъ кровяной муки и селитры даже въ плохіе для хлопчатника (съ ранними заморозками) годы оказывается рентабельнымъ, именно, на тъхъ поляхъ, которыя сильно нуждаются въ азотистыхъ удобреніяхъ, и въ тоже время ни суперфосфать, ни калій на такихъ почвахъ никакого ускоряющаго дъйствія не оказывають.

Опыты съ поливками (на томъ же полѣ), въ условіяхъ настоящаго года, не дали рѣзко-опредѣленной картины вліянія числа и времени поливокъ на хлопчатникъ, что приходится поставить въ связь съ большимъ количествомъ весеннихъ осадковъ—133 милл. въ 1911 году, при чемъ въ апрѣлѣ выпало ихъ 63,0 милл., а въ маѣ 25,0 милл.

Самый большой урожай—65 пуд., какъ оказывается, дала дѣлянка № 11, получившая за вегетаціонный періодъ пять поливокъ, распредѣленныхъ такъ: 1 до цвѣтенія, 4 при цвѣ-

## Вліяніе поливокъ на хлопчатникъ въ 1911 году.

ALC: NO.	олько поливо	было окъ.			ороси- ы на де- уб. саж.			к (	9 Р О Б	0 ЧЕ	къ.		й хлопка есятину.
До цвътенія.	При цвътеніи.	При созрѣ- ваніи,	Всего.	время поливокъ.	Количество ороси- тельной воды на де- сятину въ куб. саж.	Высота стебля.	Число вътвей.	Сформиро- вавшихся.	Цвѣтовъ и завязей,	Бутоновъ.	0/0/0 опав- шихъ.	Всего пудовъ.	% 1-ro c6opa.
Ì						у	иетъ 9	августа	1-й с	боръ 2	1/ іх и	2-й — 1	2/x.
0	2	0	2	23/vi-4/vii	138,0	19	16	20	2	3	44	37	55,0
0	3	0	3	23/vi-4/vii25/vii	213,0	21	17	28	2	11	27	36	57,0
0	2	1	3	23/vi—15/vii—15/viii	244,0	20	20	17	3	3	. 17	491/2.	65,0
0	4	0	4	20/vi-4/vii-15vii-25vii	304,0	26	18	27	4	29	5	38	40,0
0	2	2	4	23/vi—15/vii—15/viii—1/ix	251,0	19	19	18	2	3	21	44	61,0
1	0	2	3	4/vi-25/vii-15/viii	215,0	23	21	34	- 3	11	9	52	42,0
1	1	1	3	4/vi-4/vii-15/viii	202,0	31	22	31	3	4	20	60	37,0
1	2	Ö	3	4/vi-4/vii-25/vii	212,0	21	17	24	2	2	25	40	50,0
1	2	1	4	4/vi-4/vii-25vii -15/viii	332,0	18	17	29	2	11	12	49	38,0
1	3	1	5	4/vi-4/vii-15/vii-25vii	390,0	26	17	32	4	16	6	47	51,0
1	4	0	5	4/vi-20/vii-4/vii-15/vii-25/vii	408,0	24	21	20	9	27	13	65	40,0
2	0	1	3	4/vi—20/vi—15/viii	260,0	20	17	16	2	4	38	44	60,0

теніи и ни одной при созрѣваніи; всего здѣсь израсходовано воды 408 куб. саж. на десятину (не считая предпосѣвной поливки); затѣмъ шла дѣлянка № 6—52 пуд., получившая 3 поливки и 215 куб. саж. воды на десятину; далѣе — дѣлянка № 3 и 8, съ 3 же поливками и 244—332 куб. саж. воды, наименьшій урожай дали дѣлянки № 1 и 2, получившія по 3 поливки во время цѣѣтенія, но въ общемъ малое количество оросительной воды на десятину = 138 — 213 куб. саж.

Кромъ указанныхъ опытовъ на 3 полъ основного съвооборота были произведены также слъдующіе:

На  $\frac{1}{8}$  дес. было разбито 10 дѣлянокъ, и на нихъ посѣяна 23 марта сахарная свекла Вильморена, съ цѣлью учета количества воды и вліянія числа поливокъ на урожай свеклы; другой опытъ съ кукурузой (мѣстной бѣлой) состоялъ въ учетѣ вліянія обрыванія листьевъ у кукурузы въ стадіи молочной спѣлости, а также — въ обрываніи султановъ.

Результаты этихъ опытовъ таковы: Вліяніе поливокъ на сахарную свеклу:

число поливокъ		ельно		ороси- ы куб. эсят.		ай свеклы есятину.
9 поливокъ .		1100	куб.	саж.	1056	пудовъ.
8 поливокъ .		1110	"	, "	1056	"
6 поливокъ .		800	"	"	990	"
5 поливокъ .		634	,,	"	800	"
4 поливки .	. 201	430	,,	,,	900	, m

Какъ видно изъ таблицы, урожай свеклы поднимался параллельно увеличенію числа поливокъ и количеству оросительной воды; однако, повидимому, не обязательно доводить расходъ воды на десятину до такого большого количества, какъ было при 8 и 9 поливкахъ (110 куб. саж.), такъ какъ и 4 поливки, своевременно произведенныя и сопровождавшіяся тщательнымъ мотыженіемъ почвы, дали хорошій урожай—при маломъ расходѣ воды = 430 куб. саж. на десятину. Опытъ этотъ, въ виду неопредѣленности результатовъ, необходимо повторить.

Что касается вліянія обрѣзки листьевь и султановь у кукурузы, то опыть этоть даль слѣдующій результать:

Опыть сь кукурузой.	Число початковъ на 100 стеблей.	Вѣсъ оболочекъ у 100 початковъ.	Въсъ початковъ безъ оболочекъ у 100 стеблей.	Вѣсъ зерна у 100 стебл.	На десятину зерна.
		Фунт.	Фунт.		Пуд.
Листья обрывались вь стадіи молочной спѣлости	46	1,8	6,5	4,2	30,0
Листья обрывались въ стадіи восковой спѣлости	82	4,0	16,2	10,4	71,0
Листья не обрывались, султаны тоже.	80	3,1	12,2	8,0	54,0
Листья не обрывались, султаны обрывались	. 91	4,9	22,0	15,2	100,0

Мы видимъ, что эти два пріема— обрываніе листьевъ и обламываніе султановъ (черезъ рядъ) приводятъ къ очень важнымъ послъдствіямъ:

- 1) Если листья оборвать въ стадіи молочной спѣлости первыхъ початковъ, когда еще не у всѣхъ стеблей початки сформировались, то и число ихъ и урожай зерна очень сильно падаетъ початковъ на 100 стеблей приходится лишь 46, а урожай зерна на дес. только 33 пудамъ.
- 2) Если же листья обрывались въ стадіи восковой спѣлости, то число початковъ и урожай зерна на десятину увеличивается значительно по сравненію съ стеблями, у которыхъ сохранены листья и султаны (71 пуд. зерна у оборванныхъ и 54 пуда у необорванныхъ).
- 3) Но особенно большое повышеніе урожая (но не числа початковъ) бываетъ при обрываніи султановъ во время ихъ появленія (черезъ рядъ): урожай такой кукурузы достигалъ 100 пудовъ на десятину, тогда какъ кукуруза съ необломанными султанами дала лишь 54 пуда зерна на десятину. Пытливые американцы давно уже подмътили это явленіе, и потому въ практикъ хозяевъ этотъ пріемъ (обрываніе султановъ) является весьма распространеннымъ; въ то же время во многихъ мъстахъ распространено и обрываніе листьевъ, которыя въ зеленомъ видъ идутъ на кормъ скоту или сушатся.

#### Простой 4-хъ-польный съвооборотъ.

На 1-мъ полъ этого съвооборота быль посъянь 4 іюня (послъ очень плохой пшеницы на солонцевой почвъ) рисъ «арпашалы», съ цълью промывки солей изъ почвы. Всходы риса появились 9 іюня, цвътеніе началось 3 августа, созръваніе 20 октября. Хотя рисъ и былъ прихваченъ сентябрьскимъ заморозкомъ, но онъ далъ все же хорошій урожай — около 100 п., тогда какъ на этой солонцеватой почвъ раньше ничего не росло.

На 2-мъ полъ простого 4-полья быль поставленъ опыть съ чеканкой хлопчатника и способами задълки его съмянъ. Хлопчатникъ посъянъ (кок-чигитъ на солонцеватой почвъ) 25 марта, всходы появились 4 апръля; цвътеніе началось 12 іюня; созръваніе 29 іюля. 1-й сборъ хлопка произведенъ 20 сентября; второй — 17 октября.

Результаты опыта видны изъ слъдующей таблицы:

	ля.		Дл. вѣт	ина вей.				-	0-	тка на	
названіе опыта.	Высота стебля.	Число вътвей.	Нижнихъ.	Верхнихъ.	Bekxb.	Сформировав.	Завязей.	Бутоновъ.	Опавшихъ.	Урожай хлопка 1 десят.	
	САНТ.	:	четт	ь пр	оизі	воді	илс	я 1	0/v1	α.	
Чеканка при началъ цвътенія	51,0	12,0	68	30	34	12	7	14	2	135	
Чеканка при началъ созръванія .	_	_	-		-	-	-	-	_	108	
Чеканка ранняя, до цвътенія	19,0	16,0	90	61	25	7	9	10	3	47	
Нечеканенный	87,0	13,0	31	9	21	8	5	6	7	106	
Посѣвъ рядовой(почва солонцевая)	86,0	15,0	31	9	23	9	6	9	8	107	
" въ разбросъ " "	91,0	12,0	29	9	11	6	2	3	7	86	
" "бороздку "	82,0	13,0	33	9	21	7	6	7	8	69	
" " на узкихъ грядахъ	_	-	_	_	_	_	_	-	_	55	

Чеканка при началъ цвътенія и въ этомъ году, какъ всегда, дала высшій урожай—135 пуд. по сравненію съ нечеканеннымъ хлопчатникомъ и особенно съ чеканеннымъ рано; этотъ послъдній хлопчатникъ далъ очень низкій урожай—47 пуд. хлопка

на десятину. Опыть посъва хлопчатника на солонцеватой почвъ разными способами указалъ на преимущество рядового гладкаго посъва передъ разброснымъ, посъвомъ въ борозду и особенно на узкихъ грядахъ.

На 4-мъ полѣ этого сѣвооборота былъ произведенъ посѣвъ различныхъ сортовъ подсолнечника, съ цѣлью выясненія рентабельности этой культуры на солонцевой почвѣ и сравненія сортовъ грызового и масличнаго подсолнечника. Посѣвъ подсолнечника произведенъ 12 мая сѣялкой Баннера; всходы появились 18 мая; цвѣтеніе началось 4 іюля и созрѣваніе 10 сентября.

Урожай различныхъ сортовъ подсолнечника былъ таковъ:

Названіе сорта подсолнечника.	Урожай сѣмянъ на десятину	0/0 щуп- лыхъ сѣ- мянъ.	Вѣсъ 1-й головки.	Діаметръ головки.		ысота стебля дсолнечника.
Темно-сърый грызовой	81 пуд.	17	0,2	17	2	<b>а</b> рш. 6 веј
Обыкновенный сърый грызовой	70 "	25	0,16	15	2	" 10 "
Бѣлый пузанчикъ ма- сличный	52 "	18	0,12	14	2	"5"
Свѣтло-сѣрый "	51 "	16	0,17	16	2	" 3 "
Черный "	51 "	24	0,12	18	2	, 9 ,,
Исполинскій "	49 ,	35	0,15	10	2	" 6 "
Полосатый масличный.	45 "	21	0,10	10	2	, 2 ,

Лучшимъ по урожаю сортомъ оказался темно-сърый грызовой, давшій съмянъ 81 пудъ на десятину и сравнительно небольшой % щуплыхъ съмянъ; изъ масличныхъ— порядочный урожай далъ сортъ подсолнечника «Бълый Туземный»— 52 пуда; наименьшій урожай получили у «Полосатаго масличнаго»— 45 пудовъ, а большій % щуплыхъ съмянъ былъ у «Исполинскаго» подсолнечника = 35%.

#### 2-хъ-польный сфвооборотъ:

Здъсь, какъ и въ прежніе годы, изучалось вліяніе на хлопчатникъ предшествовавшихъ растеній. Посъянъ хлопчатникъ кокъ-чигитъ 28 марта; всходы появились 8 апръля; цвътеніе 11 іюня; созрѣваніе 28 іюля. Сборъ производился: 1-й 24 августа; 2-й 3 сентября; 3-й 17 сентября и 1 октября.

Въ настоящемъ году въ урожайности хлопка не наблюдалось такой послъдовательности, какъ въ прошлые годы, и высшій урожай полученъ не по зеленому удобренію, а по машу— на зерно, затъмъ по свеклъ и по черному пару; это видно изъ слъдующей таблицы:

Послъ чего посъянъ хлопчатни	«ъ.	Урожай хл Всего.	опка на дес. 1-го сбора.
Послъ маша на зерно		82 пуда	37,0
Послъ свеклы	CALL	80 "	40,0
По черному пару	ARTH BU	76 "	28,0
По пшеницъ	al distrib	73 "	34,0
По зеленому удобренію		67 "	42,0
По джугаръ	or II. Sy.	56 "	48,0
По хлопчатнику	0.715	55 "	44,0
По кукурузъ		53 "	51,0
По кунжуту		51 "	39,0
По просу	1007	35 "	44,2

На кукурузномъ участкъ этого съвооборота былъ поставленъ опытъ съ вліяніемъ ширины междурядій на урожай кукурузы «Кутаисскій гибридъ», при чемъ половина участка была занята кукурузой съ междурядьями въ 2 арш., а другая въ 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> арш.; преимущество оказалось для этого высокостебельнаго сорта на сторонъ широкихъ междурядій: урожай зерна въ этомъ случать получился 107 пуд. на десятину, а при узкихъ междурядьяхъ лишь 81 пудъ, при этомъ число початковъ и въсъ ихъ на 1 стеблт у широкорядныхъ поствовъ былъ больше, нежели при узкихъ междурядьяхъ, но процентъ зерна въ початкъ былъ выше при узкихъ междурядьяхъ (82% при 75%).

#### Опыты на поляхъ американскаго 4-хъ-полья:

На полѣ съ пшеницей были заложены опыты съ различными удобреніями. На томъ же полѣ, уже послѣ уборки пшеницы, на солонцевыхъ выцвѣтахъ, гдѣ пшеница удержаться не могла, былъ посѣянъ 6/VI рисъ съ предварительнымъ промываніемъ

почвы въ теченіе 2-хъ недѣль съ 19 мая. На этомъ рисовомъ участкѣ въ 200 кв. саж. были поставлены опыты съ разными способами поливки риса. Именно, одинъ участокъ поливался ежедневно безъ высыханія, 2-й поливался черезъ 1 день; 3-й—черезъ 2 дня и 4-й участокъ поливался черезъ 3 дня.

На 2-мъ полъ съ хлопчатникомъ по зеленому удобренію были поставлены опыты съ удобреніемъ хлопка минеральными туками, жмыхомъ, навозомъ, кровяной мукой и проч. Здъсь же эти опыты детализировались различными сроками внесенія удобренія.

На 8-мъ полъ испытывалось дъйствіе различныхъ механическихъ пріемовъ по культуръ хлопка, какъ-то: способы посъва, количество поливокъ и количества оросительной воды, глубокое и мелкое мотыженіе, глубокая и мелкая пропашка и т. д.

4-е поле съ кукурузой занято было двумя конкурирующими здѣсь сортами: кутаисскимъ гибридомъ и бессарабской. Тотъ и другой сортъ были посѣяны рядами черезъ 2 арш. и рядами, чередующимися — 2-аршинными и ¾ аршинными. Послѣдній способъ посѣва былъ аналогиченъ строчному, при чемъ его широкія междурядія были заняты машемъ, а узкія не засѣвались.

Озимая пшеница. Съ осени послъ уборки кукурузы поле было полито 4 сентября, вспахано, и послъ боронованія посъвъ произведенъ 10 сентября.

Высѣяно было 6 пудовъ на десятину озимой красной мѣстной пшеницы. Всходы появились на 7 день 17 сентября. Осенью же 26/IX солонцевые бугры были вновь политы. Весной колошеніе началось 20 апрѣля, цвѣтеніе 26 апрѣля. Весной пшеница получила 2 поливки—11 апрѣля и 14 мая, въ стадіи молочной спѣлости. Сжата она была 27 мая 6-ю рабочими въ одинъ день. Ростъ ея осенью и весной былъ вполнѣ нормаленъ; никакихъ поврежденій и неблагопріятныхъ моментовъ не было. Удобренія были внесены рано весной 12 февраля; вскорѣ же стала выдѣляться могучимъ ростомъ и пышнымъ развитіемъ пшеница на дѣлянкахъ съ навозомъ, селитрой и кровяной мукой. Всѣ данныя, характеризующіе ростъ и урожаи приведены ниже въ таблицѣ. Одновременно сравниваются урожаи со всей дѣлянки съ урожаемъ на квадратный аршинъ. Результаты получились при этомъ очень сходные.

	Навозъ.	Кровяная мука.	Селитра.	Mainte I.	Жмыхъ П.	Жмыхъ — су- перфосфагъ.	K2 SO4.	Супер- фосфатъ I.	Супер- фосфатъ II.	Костяная мука.	Контроль- пая Г.	Контроль- ная II.
Зерна на дес, въ пулахъ	77	114	123	68	76	871/2	861/4	69	56	53	431/2	52.7
% зерна отъ урожая съ соломой	19,4	38,2	29,4	30,7	30,4	29,6	26	32,5	30	(391/2)	съ 48 24,2	пуд. 25,1
Пуд. прироста	$29^{1/2}$	66	75	20	28	391/2	381/4	21	8	5	0	0
Стоимость удобренія на десят.	_	18.40	45.—	32.—	32.—	53.60		21.60	21.60	9.60	0	0
Учетъ повъ	роч	і <b>ны</b>	йп	ок	вад	рат	оно	му	арц	и и	у.	
Масса урожая съ соломой въ граммахъ	396	335,7	301,75	248,6	307,7	259	174,9	240,5	240,55	128,7	174,7	260,7
Число стеблей	194	160	163	133	156	134	124	126	170	95	133	153
Число колосьевъ	184	160	151	130	153	132	116	117	170	92	113	151
Высота стебля при цвѣтеніи	95	90	85	80	85	90	70	85	_	-	_	73
Въсъ зерна въ граммахъ	139,29	119	108,47	82,72	105,3	88,53	65,85	52,85	50,8	19,4	40,31	77,
% зерна отъ валового	35,2	35,4	35,9	33,5	34,2	34,2	31,6	22	21,2	15	30	29,
Въсъ 1000 зеренъ	43,2	39,28	39,34	41,37	40,38	44,76	39,35	36,4	38,76	37,48	37,72	39,

Табличка, показывающая % содержаніе питательныхъ веществъ въразныхъ удобреніяхъ, цѣну за пудъ, нормальную дозу на десятину и стоимость удобреній на десятину.

	%	содержа	нie.	доза сят. (ахъ.	Цѣна за пудъ.		Стоим	
Удобренія.	Азота.	Калія.	Фосф.	рм. де пуд	цъна	за пудъ.	удобрен десят	
			кисл.	Но на въ	Руб.	Коп.	Руб.	Коп
Селитра	15	<u>60</u> m		15	2	_	45	_
Сърнокисл. амонн	20	1122	_	12	3	50		
Суперфосфатъ	_	_	44	12	1	80	21	60
Тамасшлакъ	e		12-17	40	_	50	-	_
Сѣрнокисл. калій	_	44.8	_	10	1	70	_	_
Каинитъ	_	12	-	24	_	45	_	_
Гипсъ	_	-	_	40	-	-	_	_
Навозъ при 75% воды	1/2	_	1/4	2400	_	-	<del>-</del>	_
Жмыхъ	7	0	3	40	-	60 - 80	32	_
Кровян. мука	14	0,5	0,5	23	-	80	18	40
Пахта нури	5	$3^{1/2}$	$11^{1/2}$	54	1	20	65	80
Кост. мука	3	_	20	24	-	40	9	60
Мясокостная мука .	10-15	1	8-12	40	_	90	36	-
Мясная мука	10	_	5		_	_	_	

таблицы видно, что наибольшій прирость урожая дають азотистыя удобренія, почти вдвое больше противъ неудобренныхъ контрольныхъ дёлянокъ. Изъ азотистыхъ: навозъ, кровяная мука и селитра особенно выдъляются по выдающемуся эффекту. Наиболве же выгодными для мвстныхъ условій являются навозъ и кровяная мука, хотя навозъ и не успълъ проявить полнаго своего дъйствія. Что касается жмыха, то онъ не далъ такого значительнаго повышенія, какъ селитра и кровяная мука. Это обстоятельство, можеть быть, следуеть объяснить поверхностнымъ внесеніемъ такого трудно-растворимаго вещества и сравнительно позднимъ внесеніемъ его (весной 12 февраля). Изъ этой же таблицы видно, что и сърнокислый калій обусловливаеть хорошій прирость зерна, вполн'я вознаграждая предпріимчиваго хозяина какъ за самое удобреніе, такъ и за трудъ по внесенію его въ почву и за иниціативу. Хорошее дъйствіе сърнистаго калія при сравнительномъ богатствъ имъ нашихъ почвъ представляется нъсколько неожиданнымъ. Нами раньше уже указывалось, что главная роль этого удобренія на мъстныхъ почвахъ заключаются, въроятно, не въ прямомъ его

дъйствіи, какъ калійнаго удобренія, а въ томъ косвенномъ воздъйствіи, которое усредняеть наши сильно-щелочныя почвы и которое обусловливается физіологической кислотностью этой соли. Фосфорновислыя удобренія— суперфосфать и костяная мука, несмотря на бъдность фосфорной кислотой нашихъ почвъ, почти не оказывають никакого вліянія на увеличеніе урожая. Не слъдуетъ, однако, думать, что фосфорнокислыя удобренія не нужны. Почти нулевое ихъ дъйствіе объясняется особенностями нашихъ почвъ, содержащихъ огромныя количества углекислой извести (CaCO<sub>3</sub>) и свойствами суперфосфата переходить въ присутствіи извести въ нерастворимое состояніе, съ образованіемъ 3-хъ основного фосфата кальція Са<sub>2</sub>(РО<sub>4</sub>). Другая причина плохого дъйствія суперфосфата объяснима тъмъ, что почва (и особенно именно этого поля), сильно истощенная, нуждается прежде всего въ азотъ. И въ отсутствии его никакія количества другихъ удобреній оказать вліянія на приростъ не могутъ. Какъ разъ на Опытномъ Полъ суперфосфатъ вносился отдъльно, а не совмъстно съ азотистымъ удобреніемъ, и можетъ быть именно поэтому онъ далъ ничтожный приростъ. Правда, въ одномъ случат онъ внесенъ былъ вмъстт со жмыхомъ. Приростъ получился большій (391/2 пуд. противъ контрольной), но все же не такъ великъ, какъ этого можно было ожидать; это можетъ быть потому, что самъ жмыхъ, какъ трудно доступный для корней растеній, не быль использовань въ достаточномъ количествъ. Вспомнимъ, что жмыхъ, внесенный отдъльно, также очень мало повысиль урожай. Лучше было взять азотистую соль физіологически кислую, напримъръ, сърнокислый аммоній. Тогда, надо думать, дъйствіе было бы лучшимъ. Это предположение подтверждаеть и тоть факть, что наибольшій въсь 1000 зеренъ (44,11 гр.) получился именно съ дълянки, удобренной суперфосфатомъ и жмыхомъ. Такое увеличение можно объяснить дъйствіемъ фосфорной кислоты, присутствіе которой, какъ извъстно, вліяеть на увеличеніе бълка въ зернъ и на въса. На дълянкахъ же, получившихъ увеличеніе его одно фосфорное удобреніе въ вид'в суперфосфата, в'всъ зерна получился наименьшій (36,4, 38,7 гр. 1000 зеренъ). Это еще лишній разъ указываеть на недостатокъ другого какого-то питательнаго вещества — въ данномъ случав азота.

Заканчивая обзоръ дъйствія удобреній на пшеницу, слъдуеть сказать, что трудно-растворимыя удобренія, какъ супер-

фосфатъ, костяная мука, на мъстныхъ, сильно щелочныхъ почвахъ, содержащихъ массу углекислой извести, оказываются значительно худшими, чвмъ это можно ожидать въ отношеніи этихъ же удобреній, но приміненныхъ на почвахъ кислыхъ и нейтральныхъ. Процессы деградацій у насъ всегда возможны въ очень интенсивной степени. Практическій выводъ отсюда по возможности избъгать удобреній физіологически щелочныхъ и, наоборотъ, отдавать предпочтение солямъ физіологически кислымъ. Удобренія, склонныя переходить въ присутствіи СаСО3 въ нерастворимое состояніе, какъ суперфосфать, костяная мука, можеть быть, лучше вносить малыми порціями, но чаще. Рядовое внесеніе такихъ удобреній тоже можетъ уменьшить деградацію. Люцерну, напр., лучше удобрять малыми дозами, но ежегодно, чъмъ большими порціями, но ръдко, и этимъ слъдуетъ пользоваться. Физіологически щелочныя соли, особенно при внесеніи большими количествами, могутъ проявить скор'ве вредное вліяніе, чъмъ полезное. Къ подобному случаю надо отнести фактъ, имъвшій мъсто въ вегетаціонныхъ сосудахъ Туркестанской опытной станціи и описанный агрономомъ И. К. Негодновымъ во 2 выпускъ извъстій станціи. Тамъ, овесъ, получившій азотистое удобреніе, не только не далъ прибавки урожая по сравненію съ неудобреннымъ сосудомъ, но погибъ совершенно, не успъвши разцвъсть. Въ отчетъ сказано, что удобреніе вносилось въ вид'в чистыхъ солей NaNo3 и NaHPO4. Та и другая соль являются сильно щелочными, и если мы допустимъ, что весь N и весь P былъ поглощенъ растеніемъ, то освободившійся натръ, могущій превратиться въ соду N<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, могъ дать до 4,4 гр. соды на сосудъ или 0,097%, а это количество соды, и даже вдвое меньшее могло быть смертельно для всякаго растенія.

Машъ. На этомъ же полѣ послѣ уборки (29 мая) пшеницы, былъ посѣянъ машъ на зеленое удобреніе. Поле, сейчасъ же по уборкѣ, было полито, 6 іюня вспахано, 7 іюня пробороновано и засѣяно машемъ рядовой сѣялкой по 3 пуда на десятину и опять пробороновано французской бороной.

Всходы появились на 4-й день. Машъ получилъ двѣ поливки 4 іюля и 29 іюля. Цвѣтеніе началось 25—28 іюля. Безъ предварительнаго скашиванія машъ запаханъ плугомъ Сакка въ августѣ мѣсяцѣ, послѣ вспашки проборонованъ французской бороной и оставленъ въ зиму на зябь.

Рисъ. На солонцевой части этого поля на 400 кв. саж., тоже послъ уборки пшеницы, былъ посъянъ рисъ. Сдълано это было въ цъляхъ промыванія участка, такъ какъ по предыдущему году операція эта оказалась весьма хорошей. На мъстъ риса соли были вымыты, и получилась прекрасная пшеница.

Въ цъляхъ выясненія вліянія поливокъ на рисъ, дълянка въ 400 кв. саж. была раздълена на 4 равныя части, и на каждой изъ нихъ поливка велась особыми способами: 1) одна дълянка поливалась ежедневно; 2) одна — черезъ день, 3) одна — черезъ 2 дня, и одна черезъ 3 дня.

Результаты опыта изложены въ началѣ настоящаго отчета, они получились не совсѣмъ послѣдовательные, но все же говорятъ, что рисъ можетъ быть поливаемъ не безпрерывно, что возможна періодическая поливка его съ просыханіемъ площади на 2 дня. Это обстоятельство важно въ цѣляхъ борьбы съ маляріей, такъ какъ личинки комара, разносчики маляріи (Anoph. pulcherimus), живущіе и развивающіеся въ водѣ, при ея высыханіи погибаютъ.

Постьт риса можеть служить хорошей мёрой въ цёляхъ борьбы съ солонцами; онъ удобенъ въ смыслё своей дешевизны и удсбства, такъ какъ посёвъ можетъ производиться послё уборки озимыхъ хлёбовъ вторымъ растеніемъ и не нарушаетъ правильности сёвооборота.

Хлопчатникъ. На второмъ полъ американскаго 4-полья хлопчатникъ въ съвооборотъ шелъ по пшеницъ и получилъ азотистое удобреніе запашкою маша въ качествъ зеленаго удобренія. Весеннія работы на этомъ полъ начались, какъ и на другихъ поляхъ, раннею бороньбою, въ цъляхъ уничтоженія корки и уменьшенія испаренія.

Поле быле полито до посѣва тотчасъ, какъ прибыла вода по каналу Императора Николая І-го — 10 апрѣля; но наступившіе дожди, не прекращавшіеся до начала мая, не дали просохнуть почвѣ, и посѣвъ затянулся до начала мая. Передъ посѣвомъ поле было вспахано плугомъ Сакка на 3—3½ вершка, выравняно французской бороною, и хлопокъ (сортъ кокъ-чигитъ) сѣялся рядами съ междурядіями въ 1¼ арш. сѣялкою Баннера 4 мая и прикапывался французскою бороной.

Ниже приводится таблица количества тепла, осадковъ и иныхъ метеорологическихъ факторовъ, а также таблица съ ходомъ развитія хлопчатника.

Таблица количества тепла, осадковъ, облачности, испаренія, влажности и пр., для разныхъ періодовъ роста хлопчатника.

метеорологическіе факторы.	Отъ посѣва до всходовъ.	Отъ всходовъ до цвѣтенія.	Отъ цвътенія до созръванія.	Отъ созрѣва- нія до уборки.	Отъ первой уборки до послъдней.	Всего.
COLLO S COLORDOS DE SESTIMADO COLORDO		E SELECT	11.0 Mag 1800 - 1815	EU SHI		THE COL
Сумма тепла (по т-рѣ воздуха)	470,9	1278,4	1180,3	668	423	4020,6
" температ. на глуб. 10 саж.	456,3	1330,4	1359	792,4	895	4833,1
Барометрич. давл. средн	438,9	750,6	735,6	736,1	742,7	91 <del>4   1</del> 181
Minimum T	4	+ 2	+ 7,6	+ 12	<b>— 3,7</b>	- 3,7
Maximum T	34,4	+40,7	+39	+38	+37,2	+40,7
Относительная влажн. ср. $^{0}/_{0}$ .	73	62,5	68	71,5	76,53	ulanga Lalama
Осадковъ mill.	33,4	68,6	1,5	0	19,1	122,6
Испареніе mill.	52,6	190,6	185,2	85,1	95,4	608,9
Облачность	5,3	2,8	1,2	1,2	1,7	_

#### Таблица фазъ развитія хлопчатника:

āen v	000000	nahe i	B P	Е	м я.	rossing.	4	исло	дней.
Посквъ.	Веходы.	Цвѣтеніе.	Созрѣва- ніе.	1-й сборъ.	2 сборъ.	3 сборъ.	До всхо- довъ.	До цвѣ- тенія.	До созрѣ- ванія.
4/v	8/v	26/vi	16v/111	12/ix	5/x	не было	4	52	110—120
24/111	12/IV	12/vi	29/vII	23/vIII	10/ix—21/ix	12/x	19	80	127
				27 п.	283/4 п. 253/4 п.	91/2 п.			CHRUICE CHRUICE
DE LA	la la on	BEĞQ	10000		91 пуд.	i Essol	1.65	1124.01	

Количество тепла:	mining me incention and a	Всего тепла.
для поздняго 119,5 1337,6 1297,4 542,9	286,1	3583,5
" ранняго 470,9 1278,4 1180,3 668	423	4020,6

Небольшой участокъ на этомъ же полѣ въ 800 кв. саж., съ *О* стороны былъ засѣянъ безъ предварительнаго полива 24 марта; обработка и уходъ за нимъ примѣнялся общій для всего Опытнаго Поля. Періоды развитія и время уборки приведены ниже, изъ нихъ видно, что ранніе посѣвы 24 марта дали четыре сбора, а послѣдніе лишь два.

Вслѣдствіе обильныхъ дождей въ апрѣлѣ ранній хлопокъ росъ очень туго, онъ то забивался коркой, то страдалъ отъ недостатка тепла, то заглушался сорной растительностью. Для уничтоженія этихъ вредныхъ факторовъ пришлось его мотыжить и пропахивать отъ 2 до 4 разъ. Ранніе посѣвы были такъ плохи, что въ началѣ мая они выглядѣли гораздо хуже позднихъ майскихъ посѣвовъ. Несмотря на это, въ концѣ концовъ, преимущество по урожаю оказалось все же за ранними посѣвами, давшими 90 пуд. сырца, тогда какъ поздніе дали только 73 пуда. Съ мая мѣсяца, когда ранніе дожди уже прекратилось, мотыженіе и пропашка были производимы только послѣ двухъ поливокъ, такъ какъ къ моменту 3-й поливки, хлопокъ настолько сомкнулся, что ни въ мотыженіи, ни въ пропашкѣ не нуждался.

Поливки, кром'в предпосъвной, произведенной 10 апръля, были произведены 8 іюня, 24 іюня, 23 іюля и одна 1 сентября. Всего воды пошло на десятину за пять поливокъ около 350 куб. саж.

На позднихъ посъвахъ 4 мая были поставлены опыты съ удобреніемъ, и они детализировались еще дополнительными опытами, выяснившими лучшіе сроки внесенія удобреній, какъ-то: внесеніе до посъва, при посъвъ, при цвътеніи, при созръваніи. Послъдняя серія опытовъ производилась лишь съ главными у насъ промышленными удобрительными средствами: жмыхомъ и суперфосфатомъ.

Чтобы судить о силѣ роста и развитія хлопчатника, были произведены промѣры и подсчеты на всѣхъ опытныхъ дѣлянкахъ. Результаты этихъ подсчетовъ и промѣровъ производившихся 10—13 августа въ 100 дневномъ возрастѣ хлопчатника (среднее изъ 100 растеній на дѣлянкѣ) приведены ниже.

	emoton Total moragis	урожай.	T.	Длі вѣт	ина вей.		Кол	гичест	во ко	робоч	екъ.		CE KE
№М дѣлянки.	названіе опыта.	Возможный ур	Высота стебля.	Нижнихъ.	Верхнихъ.	Число вътвей.	Већхъ.	Сформир. и завязей.	Сформировав- шихся.	Завязей.	Бутоновъ.	Опавшихъ.	0/00/0 опавшихъ остатку.
	esanour finuso file en ero eronouro or		Въ сан	тимет	рахъ:		Det Con						
1	Навозъ 2400 п	27,8	77,7	27,2	7	12,6	12,2	11,6	8,6	3	0,6	7,3	60
2	Контрольн	43,7	99,3	45	7	15	18,9	18,2	10,8	7,4	1,7	9,7	51
3	Жмыхъ 40 пудовъ	98,4	88	67	7	17	42	41	13	28	1	8	19
4	Суперфосфатъ,	60,0	115	57	9	16	25	25	17	8	0	17	68
5	Селитра $+ (NH_4)_2 SO_4$	31,2	101	29	11	21	13	13	9	4	0	8	61
6	$K_2 SO_4 \dots$	62,4	112	53	12	15	26	26	14	12	0	8	31
7	$N+P \dots \dots$	48	103	57	9	17	21	20	14	6	1	15	71
8	Жмыхъ 40 пуд. — суперфос- фатъ 12 пуц	45	102	39	12	15	22	19	11	8	3	6	27
9	Кровяная мука	52,8	94	57	11	16	24	22	14	8	2	14	58
10	Жмыхъ рядами 20 пуд	31,2	82	25	11	14	13	13	14	2	0	8	61
11	Илъ арычн. 2400 пуд	45,6	98	37	11	15	20	19	13	6	1	6	30
12	N + K	26,4	82	25	16	13	22	11	6	5	11	5	23
13	Томасшлакъ	28,8	73	28	11	12	14	12	6	6	2	4	28
14	Костяная мука	-	107	43	13	16	12	13	11	. 1	0	20	166
15	N+P+K	n in	111	39	11	14	16	14	7	7	2	9	56
16	P + K		73	22	9	11	14	12	7	5	2	5	36
17	Жмыхъ $+$ К $_2$ SO $_4$	-	88	40	8	14	16	14	9	5	2	12	75
18	Жмыхъ — зола хлопков. съм.	_	92	20	6	12	12	11	6	5	1	10	83
19	Мясокостная мука	3220	83	50	5.	14	11	11	11	0	0	10	90
20	Костяная мука	zdo u	90	27	5	14	18	17	11	6	1	13	7
	Среднее изъ 2000 растеній для 20 дёлянокъ		93,5	39,4	9,5	14,7	18,6		10,4	6,6	1,5	9,7	58,5

Считая урожай сырца пропорціональнымъ количеству сформировавшихся коробочекъ на растеніи, можно сказать, что на первомъ мъстъ въ этомъ смыслъ стоитъ суперфосфатъ, имъющій 17 коробочекъ, дальше

Сѣрнокис	лы	йн	ca.	пій		СЪ	14	коробочками.
N+P.						"	14	"
Кровяная	му	ка				,,	14	"
Жмыхъ		•				"	13	"
Костяная	му	ка				"	11	,,
Мясокости	ная	M,	ук	a		"	11	"

Остальныя удобренія дали меньшее число коробочекь, и въ среднемъ для всёхъ дёлянокъ получилось 10,4 коробочекъ на кустъ.

Приблизительно, такая же послъдовательность наблюдается и по количеству сырца, полученнаго съ различныхъ дълянокъ и опредъленнаго непосредственнымъ взвъшиваніемъ сырца при сборъ. Изъ таблицы видно, что въ пропорціональной же зависимости къ урожаю и къ числу коробочекъ на кустъ находится высота стебля и длина нижнихъ вътвей; что касается количества вътвей, то оно какъ будто не стоитъ въ прямой зависимости къ количеству коробочекъ на растеніи. Длина верхнихъ вътвей также не служитъ указателемъ на урожай.

Проценть опавшихъ завязей и цвътовъ равенъ въ среднемъ 58,3%, т. е. больше половины отъ оставшихся коробочекъ или около ½ всъхъ имъвшихся на растеніи цвътовъ. Наибольшій проценть опаденія отмъченъ на дълянкахъ съ мясокостной мукой — 90%, жмыхомъ съ золою хлопковыхъ съмянъ — 83% и костяной мукой — 73%. Наименьшій % опаденія — на жмыхъ, азотъ съ каліемъ и по фосфату съ каліемъ и илу. Какъ будто бы присутствіе калія (или его физіологическая кислотность) уменьшаетъ % опаденія коробочекъ, а одностороннее фосфорнокислое удобреніе увеличиваетъ это опаденіе. Надо, однако, быть въ выводахъ осторожнымъ, и сказать, что эти факты могли бытъ слъдствіемъ химическаго состава самой почвы, представляющей здъсь, какъ и всюду на Опытномъ Полъ, пеструю картину смънъ солонцовыхъ пятенъ съ почвами, засолоненными слабъе.

Урожай сырца по удобреніямъ на десятину.

НАЗВАНІЕ ОПЫТА.	Площадь.	1-й сборъ.	2-й сборъ.	Всего сырецъ	
Навовъ	37,5	$35^{1/4}$	$57^{1/4}$		
$(NH_4)_2SO_4 + NaNO_3 \dots$		$41^{1/2}$	00	$41^{1/2}$	
Кровяная мука		$24^{3/4}$	$86^{1/2}$		Part State of the Control of the Con
Жмыхъ 40 пуд		$59^{1/2}$	$62^{1/2}$	162	N = 128,3 пуд,
Жмыхъ 40 пуд	-	$6^{1/2}$	8	$14^{1/2}$	11 — 120,5 Hyd.
Жмыхъ ряд. 20 п	_	48	64	112	
Жмыхъ + зола хлопов.					
съмянъ	7	$58^{1/4}$	$75^{1/2}$		
Суперфосфатъ	18,15	90	$105^{1/2}$		
Томасшлакъ	7	171/4	$51^{1/2}$		
Костяная мука	7	$42^{3/4}$	$131^{1/2}$		
Тоже	$17^{1/2}$	$61^{3/4}$	$44^{3/4}$		The state of the s
$K_2SO_4 \ldots \ldots$	18,75	671/4	$28^{3/4}$	96	$K_2O_5 = 96$ пуд.
Жмыхъ 40+Суперфосф.	l' '				
2 пуд	$37^{1/2}$	$51^{1/4}$	701/2	$121^{3/4}$	$N + P_2O_5 = 127,6$
Мясокостная мука	171/9	31	41	72	1 1 2 2 5 1 1 1 1 1
$N + P_2O_5 \dots$	18,75	$54^{1/2}$	$134^{1/2}$		N + K = 80.5  my
N + K	$17^{1/2}$	24	581/4	821/4	
$\mathbb{K}_{\text{мыхъ}} + \mathrm{K}_{2}\mathrm{SO}_{4} \ldots$	$17^{1/2}$	341/4	441/2	783/4	A management
$P_2O_5 + K_2O$		123/4	471/4		$P_{9}O_{5} + K = 60 \text{ m}.$
$N + P_2O_5 + K_2O$	21	311/2	$51^{1/2}$	83	$N+P_{9}O_{5}+K=83$
Илъ арычный 2400 пуд.	35	53	$51^{1/2}$	$104^{1/2}$	N+P+K=104,5
Контрольная	371/2	32	411/2	731/2	Контрольная 731

Въ этихъ опытахъ приходится выкинуть изъ учета дѣлянку со жмыхомъ въ разбросъ, какъ засолоненную; сюда же слѣдовало бы причислить дѣлянку съ навозомъ; дѣлянка съ NaNo<sub>3</sub> пропала для опыта вслъдствіе того, что урожай второго сбора по ошибкѣ не былъ взвѣшенъ.

Ва этими исключеніями, можно отмѣтить, что лучшій эффекть (до 200 пуд. сырца) дали фосфорнокислыя удобренія, кромѣ томасшлака; однако, двѣ одноименныя дѣлянки съ костяной мукой дали результаты весьма расходящіеся: на одной  $214^{1}/_{2}$  пуд., на другой  $106^{1}/_{2}$  пуд. на десятину. Это отчасти могло быть объяснено невыравненностью дѣлянокъ въ почвенномъ отношеніи и осолоненностью ихъ. Отличное дѣйствіе фосфорнокислыхъ удобреній объясняєтся тѣмъ, что данное поле было обогащено азотомъ, внесеннымъ въ видѣ зеленаго удобренія съ прошлой осени.

Далъе, слъдуетъ отмътить хорошее дъйствіе промышленноазотистыхъ удобреній — жмыха и кровяной муки: отъ 112 до 162 пуд. Кровяная мука дъйствовала особенно хорошо; на ней раньше началось цвътеніе, раньше началось и созръваніе. Здъсь какъ разъ наблюдалось явленіе противоположное тому, какое приписываютъ одностороннему N удобренію — сильное развитіе вегетативныхъ частей и затягивающееся созръваніе. Калійныя удобренія дали меньшій прирость; меньшій прирость получился и въ комбинаціи калія съ суперфосфатомъ и калія съ азотомъ.

Зато фосфоръ съ азотомъ вмѣстѣ дали урожай въ 189 пуд., почти рекордный для всего Опытнаго Поля. Вслѣдствіе ранняго заморозка (19 сентября), прекратившаго развитіе хлопчатника, много уже сформировавшихся коробочекъ не открылось. Въ среднемъ на одно растеніе неоткрывшихся коробочекъ, по подсчету 18 октября, приходилось:

По	навозу						•					4,65
"	жмыху											4,95
"	суперфо	сф	ат	у.								3,02
"	кровяной	i M	ун	Ť	•			100			Acres -	4,03
"	контроли	<b>H</b> 0	й									3,05

Для выясненія лучшаго срока для внесенія удобреній, были выбраны два главныхъ удобренія— суперфосфать и хлопковый жмыхъ. Вносились они по нормѣ 40 пудовъ жмыха и 12 пуд. суперфосфата на десятину, а при рядовомъ внесеніи въ половинномъ количествѣ. При разбросномъ способѣ внесенія удобренія разбрасывались руками, при рядовомъ— высѣвались сѣялкою Баннера.

Сроковъ для внесенія было назначено пять:

1-е до посъва,

2-е при посъвъ,

3-е при цвътеніи,

4-е при созръваніи.

Посъвъ, всходы и цвътеніе наблюдались въ тъ же сроки, какъ и на другихъ дълянкахъ съ удобреніемъ. Способы обработки и сроки поливокъ были одинаковы съ другими дълянками этого поля. Результаты опытовъ приводятся въ нижеслъдующей таблицъ:

		До по	сѣва.		При п	осѣвѣ.	Пр	и цвѣте	ніи.		ри ваніи.	Контр	ольн.
	Жмыхъ 40 п. + супер. 12 п.	20 п. жмыхъ + супер. 6 п.	Жмыхъ 40 п.	Суперфосф. 12 п.	Жмыхъ 40 п.	Суперфосф. 12 п.	Жмыхъ 40 п.	Суперфосф. 12 п.	Жмыхъ 40 п. + супер. 12 п.	Жмыхъ 40 п.	Суперфосф. 12 п.	Безъ удобр.	
			uard a service con-										
Площадь кв. саж	60,0	40	60	60	60	60	40	40	40	40	40	40	-
Ур. сырца I сбора на дес. пуд.	581/2		$65^{1/2}$		$119^{3}/4$	69	102	60	771/4	$65^{3/4}$	433/4	. 57	-
" " П " пуд	463/4	451/4	$45^{1/2}$		42	48	72	72	$27^{1/2}$	$26^{1/4}$	$49^{3}/4$	$29^{1/4}$	100
Превыш., сравнит. съконтрол.	$105^{1/4}$ $19$	$\frac{108^{1/4}}{22}$	$\frac{111}{24^{3/4}}$	$\frac{147}{60^3/4}$	$161^{3/4}$ $75^{1/2}$	$\frac{117}{30^{3/4}}$	174 87 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	$132$ $45^{3/4}$	$104^{3/4}$ $18^{1/2}$	$\frac{92}{5^{3/4}}$	$93^{1/2}$	861/4	-
									No. of the last of				1
Измъренія и подс	четы,	прои	зведе	нныя	I Въ 1	00 дв	i. Bosj	растѣ	хлог	іка 10	D-13/	VIII.	
				нныя	и <b>въ 1</b> 0	00 дв 	г. возј 	растъ	хлог 	ıка 10	O —13/   	VIII.	Сред
Высота стебля	127	122	132	<b>нныя</b> 115	т <b>въ 1</b> 0	ОО дн 133	г. возј     128	р <b>аст</b> 132	хлог   137	гка 10 125	<b>D-13</b> /	<b>V</b> III.	Сред 127
	127											<b>V</b> III.	127
Высота стебля	127	122	132	115	123	133	128	132	137	125	125	VIII.  	127 51,
Высота стебля	127 48 9 18	122 37 13 14	132 57	115 45	123 37	133 50	128 62	132 23	137 77	125 45	125 38	<b>V</b> III.	127 51, 10,
Высота стебля	127 48 9 18 21	122 37 13	132 57 12	115 45 10	123 37 17	133 50 13	128 62 5	132 23 6	137 77 9	125 45 10	125 38 3		127 51, 10, 16,
Высота стебля	127 48 9 18	122 37 13 14	132 57 12 17	115 45 10 14	123 37 17 14	133 50 13 17	128 62 5 17	132 23 6 17	137 77 9 19	125 45 10 16	125 38 3 16		127 51, 10, 16, 22,
Высота стебля	127 48 9 18 21 12 7	122 37 13 14 12	132 57 12 17 19	115 45 10 14 15	123 37 17 14 21	133 50 13 17 25	128 62 5 17 37	132 23 6 17 21	137 77 9 19 35	125 45 10 16 21	125 38 3 16 8		127 51, 10, 16, 22,
Высота стебля	127 48 9 18 21 12 7	122 37 13 14 12 6 3 3	132 57 12 17 19	115 45 10 14 15 10	123 37 17 14 21 12	133 50 13 17 25 17	128 62 5 17 37 15	132 23 6 17 21 7	137 77 9 19 35 13	125 45 10 16 21 11	125 38 3 16 8 7		127 51, 10, 16, 22, 11, 9
Высота стебля	127 48 9 18 21 12 7 2	122 37 13 14 12 6 3	132 57 12 17 19 11 5	115 45 10 14 15 10 5	123 37 17 14 21 12 6	133 50 13 17 25 17 8	128 62 5 17 37 15	132 23 6 17 21 7	137 77 9 19 35 13 19	125 45 10 16 21 11 9	125 38 3 16 8 7	- - - - - -	127 51, 10, 16, 22,

Изъ таблицы видно, что лучшее дъйствіе суперфосфата и жмыха оказалось въ томъ случав, когда удобренія были внесены при началв цвътенія 26 іюня; слъдующій лучшій срокъ внесенія при посввв; внесеніе же при созръваніи жмыха и суперфосфата оказало слабое дъйствіе по сравненію съ контрольной (неудобренной) дълянкой. Что же касается срока внесенія удобренія до посвва, то для жмыха онъ оказался плохимъ срокомъ, а для суперфосфата лучшимъ. Это является пока необъяснимымъ и нуждается въ повъркъ.

Достойно вниманія, что въ данномъ случав суперфосфать оказалъ почти одинаковое двйствіе со жмыхомъ. Первый далъ въ среднемъ изъ всвхъ двлянокъ 122,4 пуда, а жмыхъ далъ въ среднемъ 134,1 п. То обстоятельство, что суперфосфать оказался почти не хуже жмыха, объясняется твмъ, что данное поле получило азотистое удобреніе въ видв запашки маша, и азотъ, слвдовательно, здвсь не былъ въ минимумв. Съ другой стороны, все же меньшій урожай по суперфосфату въ сравненіи со жмыхомъ, указываетъ и на то, что азота, внесеннаго запашкою маша, еще не достаточно, и новая порція азота, данная со жмыхомъ, не оказалась избыточной, а увеличила урожай.

Двойное азотистое удобреніе жмыха и зеленаго маша оказалось лучшимъ, чъмъ одно азотистое удобреніе зеленымъ машемъ + одно фосфорнокислое. Необъяснимымъ остается фактъ, почему жмыхъ и суперфосфатъ, внесенные вмъстъ, дали меньшее повышеніе урожая въ среднемъ, чъмъ при дъйствіи въ отдъльности; (возможно уменьшеніе процессовъ нитрификаціи) опытъ слъдуетъ повторить.

Хлопчатникъ на 3-мъ полъ американскаго 4-хъ-полья шелъ по хлопчатнику же.

Здѣсь были поставлены опыты со способами посѣва, обработки, ухода за хлопкомъ, съ количествомъ поливокъ и съ учетомъ поливной воды при разномъ количествѣ поливокъ и при разныхъ способахъ посѣва.

Часть поля была посъяна безъ предпосъвнаго полива 5 апръля, и на ней заложены опыты со способами посъва:

- 1) рядовой при помощи съялки Баннера,
- 2) разбросной, передъланный въ рядовой при пропашкт
- 3) грядковой узкій,
- 4) джоячный туземный.

Тѣ же опыты были повторены при позднемъ общемъ посѣвѣ 6 мая уже съ предпосѣвной поливкой. Кромѣ того, на позднихъ способахъ были поставлены опыты съ различнымъ количествомъ поливокъ и съ учетомъ воды. Поливокъ было дано 8, 5, 4 и 3.

Сроки поливокъ и распредъленіе ихъ по періодамъ были

слъдующіе:

id soc	по	ливки.	o a	До цвѣ- тенія.	gara Lai	Пр	RVB Hill (	При созрѣ- ваніи.			
	Magg	III awazi	MA	00.18	lero)	ti.	obliga	unaut	D M	Pour .	11,698
При	8-ми	поливкахт	<b>.</b>	8/vi	25/vi	6/v11	14/vII	22/v11	30/v11	15/vm	30/vIII
,,	5-ти	"	TP .	8/vi	ćī.	6/v11	14/v11	22/v11	30/v11	15/vm	30/vm
,,,	4-хъ	, c	y • 1 • 1	8/v1	<b>医多种性性</b>	6/v11	25/vII	22/v11	30/v11	15/vIII	30/vm
	3-хъ	A to viati ter	М.	8/v1	Для	6/v11	25/v11	22/v11	30/v11	15/vIII	30/vIII

Количество воды, которое пошло на различныхъ способахъ посъва и при разномъ количествъ поливокъ, разовое и суммарное, приводятся ниже въ куб. саж. на десятину.

Сравнивая разные способы поства съ одинаковымъ количествомъ поливокъ, мы видимъ, что наибольшее количество воды пошло на разбросномъ поствет по ровной поверхности (545 куб. саж. и 344 куб. саж.), слъдующимъ идетъ поствъ джоячный, потребовавшій при 4 поливкахъ на 27 куб. саж. больше, чты рядовой и на 56 куб. саж. больше, чты грядковый (узкія гряды).

Меньшее количество воды потребоваль рядовой посѣвъ (356 куб. саж.) и еще меньше грядковый способъ 327 куб. саж., хотя слѣдуетъ оговориться, что при 8-кратной поливкѣ грядковый посѣвъ потребилъ 655 куб. саж. — почти не меньше, чѣмъ джоячный (669 куб.).

Эти данныя отвъчаютъ вполнъ и теоретическимъ положеніямъ. При прочихъ равныхъ условіяхъ, количество поливной воды, пошедшей на разныхъ способахъ посъва, будетъ зависъть отъ способности почвы впитывать воду и способности испарять ее. То и другое должно быть тъмъ больше, чъмъ больше будетъ смачиваться при поливъ поверхность.

2 2 7 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5			овый жвъ.		ічный Ввъ.		осный Ввъ.		ковый Ввъ.
пол	ивки.	4 полив.	5 полив.	4 полив.	8 полив.	3 полив.	5 полив.	4 полив.	8 полив.
Первая поли	вка	71,19	71,19	123,5	123,5	121,7	121,7	75,5	75,5
Вторая "		123	123	106,2	106,2	125,9	125,9	92,6	92,6
Третья "		99,42	62,61	91,81	120,3	96,51	105	86,54	151
Четвертая "		62,61	42,35	61,76	74,09	(e	96,54	74,64	69,97
Пятая "		_	62,61	_	91,81	_	96,54	_	86,54
Шестая "		_	-	-	52,37	_	-	-	44,19
Седьмая "		_	_		36,71	_	_	-	62,61
Восьмая "		_	_	-	64,21	-	_	-	73,64
I		356,22	361,76	383,28	669,2	344,14	545,7	327,74	655,51
88.160 растені	на десятину п ій, а на одно рас	теніе 1	<sup>3</sup> /4 куб.	фута,	или оп	коло тр	ехъ пу	довъ 1	воды.
Урожай на	нада и баля в В нами в						ующи	ими і	тиф-
Первый сбор	ъ 12/іх	48,8	45	35,4	17,4	45,8	36	55	49
Второй "	8/x	73	90,35	53,28	51	26,36	24,48	54,15	99,35
Ι	Зсего	121,2	135,35	88,68	68,4	72,16	60,48	109,15	148,35
По и	и смкінэцемк	кусто	въ и	поде	четам	тъ 12	авгу	ста.	
Высота стебл	я	87	88	80	83	60	60	61	77
Число вѣтвей		13	14,	14	12	12	12	11	12
	всѣхъ	18	11	7	13	5	6	5	8
Число коро-	сформирован	15	8	7	6	5	6	5	-7
бочекъ и <	завязей	2	2	0	6	0	0	0	1
цвѣтовъ.	бутоновъ	1	1	0	1	0	0	0	0
	опавшихъ	8	13	18	10	13	13	12	15
0/0 опавшихъ оставшимс	коробочекъ къ	44	118	257	77	260	216	240	188

При поливъ напускомъ — на разбросномъ посъвъ вся поверхность смачивается, на ней часто образуются глубокія трещины; въ эти трещины вода можетъ просачиваться очень быстро. Слъдовательно, ее много должно итти на поливъ. Съ другой стороны эта поверхность сильно должна испарять, почва должна быстро высыхать и требовать новой поливки. При рядовомъ способъ поливъ идетъ по мелкимъ бороздкамъ. Здъсь смачивается при поливъ, примърно, половина всей площади, т. е. самыя борозды и гряды не заливаются, на нихъ не образуется корки. Эта поверхность меньше испаряетъ, да еще меньше поглощаетъ.

При джоячномъ посъвъ поливныя борозды такъ глубоки, что смачивающая поверхность получается большей, чъмъ при рядовомъ посъвъ съ меньшей волнистой поверхностью.

Слъдовательно, въ цъляхъ экономіи оросительной воды и сбереженія ее въ почвъ, нужно стремиться полить такъ, чтобы смочить малую площадь оросительной воды и дать ей просачиваться инфильтраціонно возможно больше. Очевидно, что рядовой посъвъ съ мелкими бороздками представляется въ этомъ смыслъ оптимальнымъ, по сравненію съ двумя другими полосами — гладкимъ разброснымъ и чрезвычайно волнистымъ — джоячнымъ. Вообще же можно сказать, что воды идетъ па хлопчатникъ больше въ первыя стадіи развитія — до цвътенія и въ первую половину періода цвътенія, а въ послъдующія стадіи потребность въ водъ сокращается

Все же лишніе поливы для рядового и грядковаго посъвовъ оказались небезполезными. Одна лишняя поливка на рядовомъ дала прибавку 14 пуд. сырца на десятину, а четыре лишнихъ поливки на грядковомъ дали прибавку въ 39 пудовъ сырца на десятину. Замъчательно, что на разбросномъ и джоячномъ посъвахъ получились обратныя отношенія: чъмъ больше дано поливокъ и воды, тъмъ меньше получился урожай. Для объясненія этого опять приходится вспомнить о большей величинъ смачиваемой и испаряющей поверхности при этихъ способахъ посъва.

Эта смоченная при поливкъ поверхность очень скоро, на 2-й день отъ полива, засыхаетъ, образуются глубокія трещины, сильно изсушающія почву. Къ этому прибавляется то обстоятельство, что при поливкъ уплотненіе верхнихъ горизонтовъ увеличивается еще отъ внъдренія илистыхъ частицъ въ смачиваемыя

мъста, и къ концу лъта это уплотнение увеличивается; оно мъшаетъ свободному прониканию воды въ почву — отсюда постепенное уменьшение поливной воды, но оно же и увеличиваетъ испарение, и увеличиваетъ настолько, что лишняя поливка не только безполезна, но она вліяетъ даже въ сторону пониженія урожая.

Что касается вообще выгодности разныхъ способовъ посъва, безотносительно къ количеству воды, то и здъсь рядовой и грядксвый посъвы имъютъ несомнънныя преимущества, они дали почти вдвое большій урожай, чъмъ разбросный и джоячный.

Къ невыгодности джоячнаго посъва слъдуетъ отнести и излишекъ труда по сравненію съ рядовымъ, исчисляемый суммой въ 49 рублей:

1) на приготовление широких	и ж	высс	кихт	r]	ряс	Ъ				
25 рабочихъ на десят. п	освва						20	p.	-	к.
2) ручная посадка — излишек	къ 12	рабо	тихъ	дне	ей.		7	"	20	,,
з) ручное мотыжение (лишнее	e) .			127.10			22	,,	_	,,
		Ит	ого				4.9	p.	20	к.

Что касается раннихъ способовъ посѣва, произведенныхъ 4 апрѣля безъ предварительнаго орошенія, то результаты, получившіеся на нихъ, не такъ убѣдительны вслѣдствіе солонцовыхъ пятенъ, разбросанныхъ на этомъ участкѣ. Ихъ особенно много было на грядковомъ посѣвѣ.

Слъдуетъ отмътить, что лучшіе и наиболъ́е густые всходы получились, какъ это наблюдается и всегда, на разбросномъ посъ́въ, и это не мудрено, такъ какъ на него высъ́яно было до 6—8 пудовъ на десятину.

Кстати сказать, опыть посъва хлопчатника разными способами на солонцахъ (какъ было въ данномъ случаъ) лишній разъ показываетъ, что въ условіяхъ Голодной Степи посъвъ на грядахъ (куда обыкновенно послѣ поливокъ передвигаются большія количества солей до образованія выцвѣтовъ) и даже не рядовой сѣялкой съ превращеніемъ этого посъва въ полугрядовой при пропашкѣ съ отвалами можетъ дать меньшій урожай, чъмъ густой разбросной. Поэтому, на такихъ почвахъ приходится, при рядовомъ посъвъ съять не на грядахъ, а въ легкія борозды, дълаемыя свипомъ, послѣ котораго уже идетъ

сѣялка; кромѣ того, въ этихъ случаяхъ приходится поливать дѣлянки напускомъ и рыхлить планетомъ безъ отваловъ, а съ придѣланными къ пропашнику боронящими зубьями.

Урожай хлопка при посъвъ разными способами на солонцовой почвъ.

время свора хлопка.	Рядовый.	Джоячный.	Разброс- ный.	Грядковый узкій.
Сырца 1-го сбора 26/vm	21,35 п.	28 п.	38 п.	17,16 п.
" 2-го " 12/іх	43,24	34,45	49,29	23,32
" 3-го " 5/х	26,32	25,44	13,25	14,52
Всего сырца на десятину въ	91 п.	88 п.	100 п.	55 п.

#### Измъренія по подсчету 12 августа:

Высота стебля въ сант	93	55	62	63
Число всвхъ коробочекъ .	18	$4^{1/3}$	$6^{1}/3$	$6^{1/3}$
Коробочекъ открывшихся .	-3	1/3	$1^{1/3}$	$1/_{3}$
" сформировавш.	15	4	5	6
Опавшихъ коробочекъ	14	6	13	15
$^{0/00/0}$ опавшихъ къ остатку .	77%	139%	205%	237%

Въ данномъ случав на двлянкахъ не было подсчитано количество стеблей и не введено на нихъ поправки, какъ это сдвлано съ поздними способами посвва, и результаты получились сбивчивые.

Заканчивая описаніе опытовъ со способами посъва, нельзя не упомянуть о характерной особенности корневой системы хлопка, развивающейся на джоякахъ. Вообще говоря, корневая система хлопчатника характеризуется на глубокихъ почвахъ съ низко лежащими грунтовыми водами (у насъ на Опытномъ Полъ этого нътъ) длиннымъ стержневымъ корнемъ — до 1,5—2 саж. и даже больше, съ массою боковыхъ корешковъ, отходящихъ отъ стержня, по преимуществу къ верхнимъ 20—30 сант. почвы, близъ корневой шейки; это особенно ръзко выдъляется на разбросномъ гладкомъ посъвъ. Характерная особенность корней, развивающихся на джоякахъ, состоитъ въ отсутствіи этого

стержня; здёсь главный корень на глубинё 20—10 сант. вётвится на два корня, отходящихъ внизъ и въ стороны подъ угломъ градусовъ въ 45 отъ вертикальной линіи.

# Способы обработки: различная глубина мотыженія и пропашки.

На этомъ же полѣ были поставлены опыты съ различной глубиной пропашки и мотыженія. При глубокомъ мотыженіи оно производилось кетменями мужчинами-сартами на 3—4½ вершк., а при мелкомъ мотыженіи на 1—1½ вершк. женщинами и подростками посредствомъ мелкихъ тяпокъ. Пропашка производилась Planet'омъ на тѣ же, соотвътственно, глубины, т. е. на 3 и 1 вершк.

Результаты этого мотыженія сведены ниже въ таблицъ:

	Урожай хлопка на десятину.				
СБОРЫ.	Глубокое			отыженіе.	
C B O P DI.	Мелкая пропашка.			Мелкая пропашка.	
Сырца 1-го сбора пуд.	$36^{1/2}$ $52^{1/2}$	$22^{1/4}$ $61^{1/3}$	$2^{1/4}$ $70^{3/4}$	32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 84	
Всего пудовъ на десятину	89	84	93	$116^{3/4}$	

#### Результаты подсчета на кустахъ 13 августа:

Высота стебля въ сант	102	98	97	83
Длина нижнихъ вътвей	37	45	26	17
" верхнихъ "	10	7	3	7
Число вътвей	15	14	16	11
" коробочекъ всѣхъ	25	12	13	10
" " сформировавш.	9	11	10	6
" " бутоновъ	3	0	0	0
Опавшихъ коробочекъ	8	15	13	9
0/0 опавшихъ коробочекъ къ остатку	$32^{0/0}$	$125^{0/0}$	$100^{0/0}$	900/0

Такимъ образомъ, мелкая обработка дала наивысшій урожай, а комбинація мелкой пропашки съ глубокимъ мотыженіемъ и, наоборотъ, дали средній урожай. Глубокое мотыженіе и глубокая пропашка дала наименьшій урожай.

#### Культура кукурузы.

Четвертое поле американскаго съвооборота, послъ двухлътней культуры на ней хлопка, было занято кукурузой. Два сорта кукурузы, промышленные въ нашемъ районъ: кутаисскій гибридъ и бессарабская были высъяны на этомъ полъ двумя способами:

- 1) съ широкими междурядіями въ 2 аршина и
- 2) съ узкими междурядіями въ  $\frac{3}{4}$  арш., чередующимися съ таковыми же широкими въ  $2^{1}/_{4}$  аршина.

Послѣдній способъ напоминаетъ родъ строчнаго посѣва пшеницы. Широкія междурядія съ весны обрабатывались пропашниками, а съ 25 мая въ нихъ былъ посѣянъ машъ на зерно рядовой дисковой сѣялкой. Узкія междурядія не обрабатывались пропашниками (а мотыжились сапками) и были свободны отъ посѣва маша.

Оба сорта были посъ́яны безъ предварительнаго полива подъ атмосферную влагу 21 марта. Всходы появились 4 апръ́ля. Начало цвътенія у бессарабской кукурузы 25 іюня; у кутаисскаго гибрида—13 іюля. Созръ́ваніе у бессарабской 13 іюня; у кутаисскаго 31 іюля. Убраны бессарабская 24 іюля, а кутаисскій 31 августа.

Въ нижеприведенной таблицъ показаны моменты развитія кукурузы, продолжительность разныхъ періодовъ роста и количество тепла въ каждомъ періодъ.

НАЗВАНІЕ СОРТА.	Отъ посѣва до всходовъ.	Отъ всходовъ до цвѣтенія.	Отъ цвѣтенія до созрѣванія.	Отъ созрѣванія до уборки.	Beero.
Кутансскій гибридъ дней	144/IV	7013/vi	48—31/vii	32—1/ix	164
,, ,, тепла	240,4	1624,3	1233	735,3	3833
Вессарабская дней	14—4/IV	51—25/v	49—13/vII	11—25/vII	125
" тепла	240,4	1090,7	1306,6	319,9	2957,6

Первая поливка была произведена 16 апръля. Затъмъ были даны еще 4 поливки: 3 мая, 23 мая, 12 іюня и 3 іюля.

Пропахивались междурядья три раза: 26 апрёля, 11 мая и 25 мая.

Мотыжилась кукуруза въ рядахъ четыре раза: 30 апръля, 4 мая, 26 мая и 18 іюня.

Проръживаніе было произведено 27 апръля, при чемъ растенія оставлялись въ рядахъ на разстояніи ½ аршина одно отъ другого (4,4 рабочихъ на десятину).

На солонцовыхъ пятнахъ кукуруза всходовъ не дала, и здъсь примънялась до 4 разъ посадка, но всходовъ все-таки не получилось.

15 мая кукуруза подсаживалась въ борозды, сдѣланныя листеромъ, но и при этомъ способѣ всходовъ получилось очень мало, да и то, что взошло, при дальнѣйшемъ развитіи не выдержало солонцовъ и посохло. Посадка производилась, кромѣ того, еще въ лунки, наполненныя люцерновой землей, но и этотъ пріемъ не побѣдилъ солонцовъ, — такъ эти мѣста и остались голыми на все лѣто.

Урожаи, приведенные въ таблицъ, разсчитаны на десятину:

	Кутаисскій гибридъ.		Бессарабская кукуруза.		
	Широкія междурядья.	Узкія междурядья.	Широкія междурядья.	The state of the s	
Площадь	566,0 кв. саж.	507,0 к. с.	240 к. с.	196,75 к. с.	
Вѣсъ початковъ съ обертками	95 п. 25 ф.	139 п ф.	112 п. 5 ф.	103 п. 32 ф.	
Въсъ початковъ безъ обертокъ	62 п. — ф.	61 п. 20 ф.	87 п. 20 ф.	82 п. 20 ф	
0/0 обертокъ	35	44,6	22,2	19,8	
Сухого зерна на десятину	; 43,7 п. 28 ф.	, 51 п. 04 ф.	65 п. 20 ф.	62 п. — ф	
<sup>0</sup> / <sub>0</sub> зерна отъвѣса су- хихъ початковъ	70,6	69,2	74,9	75	
Средній въсъ одного початка	_	-	— п. 20 ф.	— п. 19 ф	
Количество почат- ковъ на десятину.		<u> </u>	17300	15301	
Стеблей на десятину.	278 п.	226 п. 20 ф.		_	

Для характеристики початковъ съ различныхъ по качеству почвъ приводятся слъдующія данныя:

	П 0	Ч А Т І	αи.
THE STRUCTURE OF STREET	Съ солонцовъ.	Со средней почвы.	Съ лучшей почвы.
PROBLEM OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF		Latinger Li	
$^{0}/_{0}$ обертокъ въ початк $\mathring{ ext{b}}$	24,3	21	15
Средній въсъ початка	53 гр.	80 rp.	169 гр.
Количество рядовъ въ початкѣ.			12—14
" зеренъ. "	(85) (3 <u>—</u> 5) (8)		488
Средній діаметръ початка внизу.			4 см.
Средняя длина			20 "

Въ междурядьяхъ кукурузы собрано маша: Съ бессарабской кукурузы

Количества тепла и число дней по періодамъ роста для маша видны изъ приводимой ниже таблицы:

	Сумма тепла.	Число дней.
Отъ посва до всходовъ 25/v	204,8	6
" всходовъ до цвътенія 30/v	1802,1	70
" цвѣтенія до созрѣванія 9/vIII .	500	23
Bcero	2506,9	99

Вообще слъдуетъ сказать, что культура кукурузы на солонцеватыхъ почвахъ вслъдствіе большихъ затратъ на обработку и уходъ, не уступая въ этомъ отношеніи хлопку, является одной изъ самыхъ невыгодныхъ и часто убыточныхъ культуръ.

По продолжительности вегетаціи и по очень большому количеству воды, которое она требуеть, по сравненію съ другими культурами, ее слѣдуеть также поставить на второй планъ. Въ хозяйствахъ русскихъ поселенцевъ она совершенно не прививается, а тѣ хозяева, которые пробовали ее разводить, остались недовольны и уже больше кукурузы не сѣютъ.

Кукуруза удается лучше на хорошихъ цълинныхъ почвахъ и въ болъе высокой полосъ (къ горахъ) Туркестана, въ знойныхъ же полупустыняхъ нужно еще поработать надъ ея селекціей, въ смыслъ засухоустойчивости и пр.

#### Селекціонный участокъ.

На селекціонномъ участкѣ, какъ уже упоминалось, испытывались разные сорта кукурузы и хлопка, а также выводились болѣе урожайныя и скороспѣлыя разновидности промышленныхъ сортовъ кокъ-чигита и кинга изъ сѣмянъ, собранныхъ съ выдающихся кустовъ. Эти отборныя сѣмена высѣвались отдѣльно, не смѣшиваясь съ сѣменами другихъ кустовъ, хотя бы и отличавшихся тѣми же выдающимися особенностями.

Встхъ сортовъ было выстяно 24, а именно:

		distance of	Время	I.
НАЗВАНІЕ СОРТА.	Посѣва.	Всходовъ.	Цвѣтенія.	Созръванія.
Кокъ-чигитъ	8/v	13/v	3/vII	24/viii
Ташкентскій упландъ	,,		,,	,,
Аунсболъ	"	,,	"	"
Тріумфъ	'n	,,	5/vII	28/vIII
• Руссель	"	"	1/vII	24/vIII
Кингъ американскій	,,	"	5/vII	25/vIII
Кингъ Опытнаго Поля.	'n	77	3/vII	"
Кингъ пятнистый	"	,,	5/vII	28/vIII
Малия-чигить	,,	,,	1/vII	25/v111
Хавкинъ	n	,	"	28/viii
Кара-чигитъ	,,	,,	3/vII	25/vIII

			Врем	Я.
названіе сорта.	Посѣва.	Всходовъ.	Цвътенія.	Созръ́ванія.
Афифи	,,	22	5/v11	15/іх зел. сём.
Ашмуни	n	n	3/vII	15/іх зел. сем.
Moss Improwed	"	,,	5/vII	15/1x
Bleu Ribbon	"	"	8/vII	ed, an garin
Флорадоръ	,,	,	. "	,,
Алленъ Кингъ	n	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. "	,,
Excelsior prolific	,,	"	"	не было.
Southern Hope	"	17	13/vII	
Кукъ	n	"	8/vII	n
Тиндаль	,,	n	"	# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Gold-Standart	,,	'n	3/vII	28/viii
Гибридъ	n	n	5/vII	6/1x
Туземная гуза красная .	"	"	9/v11	13/IX

Участку этому въ описываемомъ году очень не посчастливилось. Посъвъ на немъ былъ произведенъ, вслъдствіе непрекращавшихся апръльскихъ дождей, очень поздно. Хлопокъ былъ самый запоздалый. Въ довершеніе бъды на этотъ участокъ съ 20 іюля напала гусеница Caradrina exigua, и въ два дня значительная часть хлопка была буквально събдена. Почти ни одного неизъбденнаго листка не оставалось на поврежденныхъ мъстахъ. Только что начинавшееся цвътеніе быстро прекратилось, и хлопокъ сталъ оправляться лишь черезъ мъсяцъ. Растенія были страшно изуродованы: събдены были не только листья, но частью и стебли. О сравненіи урожая не могло быть и ръчи. Наконецъ, очень ранній заморозокъ 19 октября уничтожилъ и послъднюю надежду собрать хоть что-нибудь съ этого участка.

Пришлось выбрать на этомъ питомникъ изъ разныхъ сортовъ и развидностей лучшіе экземпляры кустовъ, и съмена отъ нихъ отобрать для новаго испытанія и для размноженія.

0 развитіи растеній можно судить по изм'вреніямъ и подсчетамъ, произведеннымъ 10 августа:

названіе сорта.	Толщина стебля въ сантиметрахъ.	Высота стебля въ вершкахъ.	Количество вътвей.		Нижнихъ.	Сформировав- шихся коробочекъ.	Опавшихъ коро- бочекъ.	Длина коробочекъ въ сантиметрахъ.	Ширина коробо- чекъ въ сантим.	Количество створокъ.	Количество за- вязей.	Количество бу- тоновъ.	Количество листьевъ.	Волосяной покровъ стебля и листьевъ.
Кингъ американскій. Кингъ пятнистый. Малля-чигитъ Наwkins. Кара-чигитъ Афифи Афифи зелен. сѣмена. "зел. сѣмена. Моss Improwed. Ашмуни зел. сѣм. Ашмуни зел. сѣм. Вleu Ribbon Флорадоръ. Allen King. Туз. гуза бѣлая. Туз. гуза красная. Excelsior prolif. Southern Норе Кукъ	1,1 1,1 1,2 1,25 1,25 1,1 1,0 1,1 1,6 1,3 1,2 1,4 1,5 1,5 1,3 1,5 1,3 2,33 2,0 1,6 2,5	21,3 19,5 20,0 22,5 26,5 26,5 25,2 28,2 21,7 18,5 18,7 17,8 17,3 19,3 21,3 24,2 29,0 26,0 30,3 23,7	17 18,3 12 11,66 14 18,3 15 15,15 15,3 9 16,6 6,7 10,3 11,7 14 12,7 16 21,7 16 18,3 17 14 12,7 16 14,3 20,5 14,7	3,3 2,25 3,4 1,3 3,5 1,2 2,3 2,3 3,5 4,5 3 3,5 1,2 3,5 4,5 3,7 2,4 4,5 3,7 2,2 4,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7	11 11,3 4,3 4,3 5,5 7 12 6 1,3 6,2 5,3 11 11,3 11,3 11,3 5,7 7 17,3 14 9 20,5 17	5 6,7 5,3 8 7,3 9 9,3 11,3 4 мелк. 6 1,7 3 3,7 4 7,7 4 4,7 3	6 3,7 4,7 4,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 1,3 3,3 1,3 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5	4,5 4,4 4,7 4,7 4,5 3,7 4,5 3,8 4,1 4,5 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,7 4,8 4,8	4 3,5 2,5 6,1 8 3,5 5,5 6,1 8 3,5 5,5 6,5 9,5 6,5 6,9 6,9 6,5 6,5 6,9 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5	$\begin{array}{c} 4-5\\ 4-5\\ 4-5\\ 4-5\\ 4-5\\ 4-5\\ 3-4\\ 4-5\\ 4-5\\ 4-5\\ 3\\ 3\\ 4-5\\ 4-5\\ 4-5\\ 4-5\\ 4-5\\ 4-5\\ 4-5\\ 4-5$	13,7 15,3 6,7 4,7 3,7 9 8 12,3 14 8,7 2 7,3 5,3 7 9 8,7 8,43 112,3 8,7 5 14 14 7,7 2 28	3,7 3,7 0,5 4 23,3 14 2,7 7,3 15 6,3 11 12,3 10,7 12 14 30,7,7 12 14,30,7,7 10,3 25,3 30,3 30,3	142 82 288	густой средній. рѣдкій бѣлый. оч. рѣдкій бѣлый. оч. рѣдкій бѣлый. оф. довольно густ. рѣдкій прѣдкій прѣдкій офлый рѣдкій офлый рѣдкій офлый рѣдкій преденей покрыто оф. преденей преденей пръдкій преденей преденей пръдкій пръткій п

Приводимъ характеристику нѣкоторыхъ сортовъ хлопка по коробочкамъ и волокну (среднее изъ 50 коробочекъ):

названіе сорта.	Количество сѣ- мянъ въ коро- бочкѣ.	Гићздо въ короб. створчат.	Вѣсъ коробочки со створками.	Въсъ сырца.	Выходъ волокна.	Толщина волокна.	Полость волокна.
		1 4 4 1	Въ грам	махъ.		микрона	
Кокъ-чигитъ	29	. 5	8,13	6,06	32,25 28	10,75 6,45	10,8 10,8
Кингъ	31	5	6,36	4,85	28	6,45	10,8
Аунсболъ	33	4-5	6,63	5,06	19,8	4,3	7,8
Ташкентскій упландъ .	$30^{1/2}$	4-5	6,85	5,04	25,8	6,45	10,8
Малля-чигитъ	$25^{1/2}$	4-5	6,2	4,64	28	6,45	10,8
Кара-чигитъ	30	4-5	6,42	4,85	26	4,3	10,8
Туземная гуза бѣлая .	30	3-5	3,94	2,74	30,1	10,75	9,7
Афифи	_	_	_	_	23,6	8,6	7,5

Изъ приведенной таблицы видно, что наиболѣе сильно были развиты сорта: обѣ туземныя гузы, Excelsior prolific, Southern Норе, кукъ, тиндаль и Gold-Standart. У нихъ наиболѣе длинный и толстый стебель, наибольшее число листьевъ (до 288 шт.) на одномъ растеніи.

Изъ прочихъ сортовъ наибольшей высотой и наименьшей длиной вътвей отличается хавкинъ, характеризующійся кромътого скученнымъ расположеніемъ коробокъ, какъ бы гроздевидныхъ по 2 и 3 вмъстъ.

Наименьшее число сформировавшихся коробочекъ наблюдалось на сортахъ поздноспълыхъ: египетск. афифи, ашмуни и нъкоторыхъ упландахъ.

Число створокъ у коробочекъ всѣхъ упландовъ 4 или 5, за исключеніемъ кинга пятнистаго, у котораго ихъ отъ 3-4-5.

Всѣ типичные египетскіе сорта Barbadense: ашмуни, афифи, яновичь — имѣютъ коробочекъ 3-хъ-створчатыя. Онѣ, кромѣ того, характеризуются голымъ стеблемъ и листьями рѣзко трехлопастными съ болѣе длинными долями.

Въ междурядьяхъ хлопка на этомъ же селекціонномъ участкі, культивировались разныя сорта кукурузы, выписанные частью изъ Америки черезъ Екатеринославское Губернское Земство. Діло съ кукурузою обстояло еще хуже, чіть съ хлопкомъ. Къ вреднымъ факторамъ, вліявшимъ на хлопокъ, здісь прибавилось еще плохое опыленіе. Почти половина каждаго початка всітхъ сортовъ не была оплодотворена и осталась пустой. Произошло это, надо думать, частью вслідствіе поздняго посіва 9 мая, частью потому, что число рядовъ кукурузы было мало — 2—3, и она не могла опылиться за отсутствіемъ пыльцы, которая относилась вітромъ въ сторону отъ рядовъ. Какъ разъ и ряды были расположены перпендикулярно къ паправленію господствующихъ вітровъ съ SO.

Къ характеристикъ развитія кукурузы приводится слъдующая таблица:

названіе сорта.	B	ремя по- сѣва.	Вехо- ды.	Цвѣтеніе.	Созрѣваніе.	Сборъ.
Мотто		9/v	19/v	24/vi	_	7/ix
Калико		n	"	25/vi	_	,,
Гольдрау		"	n	1/vii	_	"
Минневотта № 13		,,	,,	1/vII	_	,,
Стерлинъ		"	"	25/v1	21/vIII	"
Миннезотта № 23		,,	"	.,,	"	"
Бессарабская		n	n	n	17/vIII	,,
Броунконти		n	"	,,	,,	"
Чинквантино		n	"	"	16/vIII	, ,,
Доммепръ		"	"	,,	"	"
Грушевка мъстная		"	,,,	29/vi	17/vIII	"
Стерлинъ изъ Сулкозы .		n	,,	,,	16/vIII	,,
Лимингъ		,,	:)	3/vII	,,	"

Лучше другихъ была развита съ полными початками кукуруза мотто. Остальныя были очень плохи.

На второй ½ дес. опытнаго участка ставились опыты съ хлопчатникомъ, съ протравливаніемъ съмянъ, съ различными сроками предпосъвной мочки ихъ, съ качествомъ и происхожденіемъ съмянъ, съ обволакиваніемъ съмянъ.

Вст опыты сведены въ следующую табличку:

philopicamen techcalism	KB.	( )()	Періодт	развит	riя.	Уроя	кай на	дес.
названіе опыта.	Площадь кв саж.	Посквъ.	Веходы.	Цвѣтеніе.	Созрѣва- ніе.	1-й сборъ.	2-й сборъ.	Beero chdua.
I. Обволакиваніе съмянъ:			1800) 110	BRQ SECOR		OCC		
Жмыхомъ	34	8/v	14/v	7/vII	6/IX	19,9	1-10	19,9
Суперфосфатомъ	42,5	"	"	2/v11	31/vIII	18,3	_	18,
Волой холопк. сёмянъ	34	. "	,,	5/vII	6/1x	11,5	56,3	67,8
II. Протравливаніе сѣ- мянъ въ 1/20/0 формалинъ.	110.46						a. Wate	
Протравливались впр. 1 часа	17	"	,,	2/vII	25/vIII	17,6	38,75	56,
" 1/2 "	17	"	n	1/vII	"	14,1	38,75	52,
Не протравливались	42,5	"	"	2/vII	23/vIII	14,1	26,75	40,
III. Продолжительность предпосёвной мочки сёмянъ:								
Мочка въ водъ впр. 1 сутокъ	42,5	"	"	2/vII	25/vIII	21,1	23,9	45
" " " 3 сутокъ	42,5	"	"	3/vII	31/vm	9,8	40,8	50,
IV. В ліяніе в ѣ са с ѣ- мянъ:				rija sid				
Тяжелыя 1000=115,35 гр	42,5	27	"	2/vII	25/viii	23,9	50,75	74,
Легкія сём. 1000==113,05 гр.	42,5	"	"	"	27/vIII	2675	43,6	70,
V. Происхожденіе с ѣ- мянъ и возрастъ ихъ:								
Кокъ-чигитъ съ солонцовъ .	34	"	"	2/vII	25/viii	14,1	38,75	52,
Кч. линтерныя свм	51	"	"	,,	29/vIII	5,9	18,75	24,
Делинтерныя съм	.34	"	,,	7/vII	4/IX	10,6	29,9	40,
Кокъ-чигитъ 1 сбора	42,5	, ,	,,,,	2/vII	31/vm	39,4	_	39,
, 2 ,	34	"	'n	,,	,,	22,9		22,
VI. У добреніе:				•				
Экстракціонный жмыхъ хлоп- ковый	17	"	. "	2/vII	31/vm	01.0	66,9	66,
Крупный жмыхъ	17	11	n	4/vII	,,		52,8	52,

Какъ видимъ, обволакиваніе сѣмянъ передъ посѣвомъ вредно, Это относится особенно къ обволакиванію жмыхомъ. Всходы на этихъ опытахъ запоздали, и были очень изрѣжены. Надо думать, что жмыхъ способствуетъ образованію непроницаемой для воды и воздуха оболочки вокругъ сѣмени, и послѣднее не набухаетъ и задыхается.

Такія же данныя по этому вопросу получились и въ прошломъ году, почему обволакиваніе сѣмянъ хлопчатника удобрительными веществами рекомендовать нельзя.

Стерилизація съмянъ протравливаніемъ въ 1/2 формалинъ въ теченіе 1/2 часа и 1 часа, съ послъдующей мочкой ихъ въ теченіе сутокъ, оказалась полезной.

Опыть съ продолжительностью предпосвиной мочки въ теченіе сутокъ и 3-хъ сутокъ обнаружилъ малое различіе, но надо оговориться, что свмена, моченыя трое сутокъ проросли, давъ корешки до 2 см. длины. Такъ какъ посадка была ручная, то это не особенно повредило, но при посвив свялкой корешки у этихъ свмянъ были бы при перемвшиваніи въ свялкв неминуемо поломаны, и результатъ продолжительной мочки оказался бы отрицательнымъ.

Опыть съ тяжелыми и легкими сѣменами, отдѣленными другъ отъ друга на сортировкѣ Тріумфъ (вѣтромъ), говоритъ въ пользу тяжелыхъ сѣмянъ. Разница въ вѣсѣ посѣвныхъ сѣмянъ на 1000 зеренъ равнялась 2,3 граммамъ.

Происхожденіе съмянь также оказалось не безразличнымъ: кокъ-чигить съ солонцовъ оказался болъе приспособленнымъ и далъ высшій урожай по сравненію съ съменами кокъ-чигита другого происхожденія.

Съмена перваго сбора оказались лучше съмянъ второго сбора. Джинныя съмена оказались лучше линтерныхъ.

Экстракціонный, сильнъе измельченный жмыхъ, оказаль лучшее дъйствіе, чъмъ крупный жмыхъ, менъе обезжиренный. Возможно, что и обволакиваніе съмянъ экстракціоннымъ жмыхомъ было бы не такъ вредно, какъ обволакиваніе крупнымъ жмыхомъ.

#### Стебутовское 3-хъ-полье.

На 1-мъ полъ этого съвооборота испытывались сорта озимаго ячменя и сроки ихъ посъва. Высъвались ячмени: черный караязскій, мъстный четырехрядный (Hordeum tetra-

stichum) — букинскій и зааминскій. Сроки посъва ихъ: 22 августа, 29 августа и 22 сентября.

Всходы ячменей появились:

Сорта ячменя.	22/vIII.	Посъвъ. 29/vm.	22/ix.
Зааминскій	27/VIII	Всходы.	<u> </u>
Букинскій	27/VIII		
Мъстный 27-			29/IX
Черный	28/vIII	5/IX	30/IX

Вслъдствіе ноябрьскихъ, а затъмъ январьскихъ и февральскихъ морозовъ, ячмень порядочно пострадалъ, значительно изръдившись; особенно пострадали поздніе посъвы (22 сентября) и главнымъ образомъ чернаго ячменя, почему его на значительной части участка пришлось весной (27 февраля) пересъять овсомъ «рыхликъ». Колошеніе началось раньше всего у мъстнаго озимаго ячменя— 9 апръля; созръваніе 1—2 мая; уборка началась 12 мая, послъ чего 18 мая на томъ же полъ былъ посъянъ машъ. За время роста ячмени были политы 2 раза: 10 апръля и 5 мая.

Учетныя данныя урожая здёсь не приводятся, такъ какъ всё ячмени были значительно изр'єжены морозами, а при созр'єваніи сильно опустошены воробьями. Для характеристики развитія сортовъ приводятся сл'єдующія данныя, полученныя при изм'єреніи растеній въ апр'єл'є:

INTERNATION AUGUSTA	Высота стебля въ вершк.	Кусти- стость.	Длина колосьевъ въ вершк.
Зааминскій	14,0	3,5	1,5
Букинскій	14,6	5,5	1,5
Мѣстный	12,0	4,6	1,5
Черный	18,0	3,3	2,0

На 2-мъ полъ стебутовскаго съвооборота сорта свеклы высъвались въ два срока: 23 марта и 28 апръля. Всходы были отмъчены 1 апръля (полные 7 апръля) у сортовъ, посъянныхъ 23 марта и со 2-го по 10 мая при посъвъ 28 апръля. Уборка свеклы произведена одновременно — 26 сентября. Росла свекла удовлетворительно, но послъ нападенія гусеницы карадрины (съ конца іюня по 15 іюля) она замътно отстала въразвитіи, такъ какъ листья были значительно изъёдены этимъ

вредителемъ. Свекла 3 раза мотыжилась сапками, 3 раза пропахивалась культиваторомъ Држевецкаго и 5 разъ орошалась. Урожай свеклы былъ слъдующій:

	Наз	ваніе сорта свеклы.	ожа <b>й</b> корней 1 десятину въ пуд.	Вѣсъ 1 корня въ фунт.
Посѣвъ	23/111	Эккендорфская красная	1400	1,25
. ,,	,,	Кривенская	1800	1,8
"	28/IV	Эккендорфская красная	1430	1,43
,,	. ,,	Кривенская	1320	1,4
"	"	Сахарная каунчинская	800	0,70

Несмотря на нѣкоторую неопредѣленность данныхъ урожая свеклы, можно сказать, однако, что при раннемъ посѣвѣ (23 марта) кормовая свекла Арминъ-Кривенская дала большій урожай (1800 пуд. на десят.), чѣмъ при позднемъ (28 апрѣля) — и оказалась въ этомъ случаѣ урожайнѣе эккендорфской красной. Въ то же время и вѣсъ 1 корня былъ больше (около 2 фунт.), чѣмъ у эккендорфской. При позднемъ посѣвѣ урожай получился въ общемъ ниже, чѣмъ при раннемъ и въ то же время эккендорфская свекла дала высшій урожай (1430 пуд.), а низшій — (800 пуд.) дала сахарная свекла каунчинскаго сахарнаго завода (подъ Ташкентомъ).

Посъвомъ сахарной свеклы въ этомъ году, благодаря выданнымъ отъ завода задаткамъ, занялись многіе крестьяне въ Голодной Степи, но поврежденіе свеклы гусеницей карадрины и невысокая урожайность ея на здѣшнихъ солонцовыхъ почвахъ не оправдали надеждъ завода и крестьянъ. Теперь мѣстные хозяева надолго, вѣроятно, разстанутся съ культурой свеклы, тѣмъ болѣе, что она никогда здѣсь не будетъ въ состояніи конкурировать по выгодности съ хлопчатникомъ.

На 3-мъ полъ стебутовскаго съвооборота высъвались сорта яровыхъ овсовъ. Посъвъ былъ произведенъ 11 февраля; при этомъ на одномъ участкъ поля всъ сорта посъяны съ густотой 6 пуд. на десятину (съялкой «крестьянка»), а на другомъ — немерчанскій и канадскій овсы посъяны съ разной густотой 5, 8, и 10 пуд. на десятину. Всходы появились 28 февраля. Скороспълые сорта рыхликъ и немерчанскій начали выкидывать метелки съ 5 мая; созръваніе ихъ началось около 25 мая. Уборка овсовъ произведена 3 іюня, послъ нихъ посъянъ машъ на зеленое удобреніе.

Въ слъдующей таблицъ помъщены данныя для характеристики сортовъ яровыхъ овсовъ:

egos ( vestadas 1 au avitadas tratas ( a	эля	yennas		Урожа десят		
названіе сорта.	Высота стебля въ вершк.	Кустистость.	Густога.	Зерна.	Соломы.	% зерна.
1 800 m	9.8 173				2	
Рыхликъ	13	2,5	104	70	211	25
Немерчанскій	11	2	104	65	111	37
Австралійскій	18	1,5	80	40	109	27
Желанный	17	2	70	36	118	24
Канадскій	19	2,5	76	35	98	42
Шведскій	21	3	141	32	141	18
Гигантскій	17	3	79	30	101	28
Тріумфъ	19	3	72	25	168	30
Немерчанскій, посѣвъ 5 пуд. на десятину	8,3	2	100	60	180	25
" " 8 пуд.	9,6	2	103	56	201	21
" 10 пуд.	8,3	2	99	40	130	28

Изъ таблицы видно, что наибольшій урожай дали у насъ, какъ и раньше, скороспѣлые овсы — рыхликъ (70 пуд. зерна) и немерчанскій (65 пуд.), остальные не дали больше 30—40 пуд. на десятину, урожай же соломы колебался стъ 200 до 98 пуд. Процентъ зерна (по отношенію къ соломѣ) выше всего оказался у сортовъ канадскаго (42%) и немерчанскаго (37%).

Въ условіяхъ 1911 года рѣдкій посѣвъ овса оказался лучшимъ: при высѣвѣ сѣмянъ въ количествѣ 5 пудовъ на десятину урожай зерна получился въ 60 пудовъ, при 8 пуд.— 56 пуд., и при 10 пудахъ только въ 40 пудовъ.

#### 8-ми-польный промышленный съвооборотъ.

- 1. Люцерна.
- 2. Люцерна.
- з. Люцерна.
- 4. Хлопчатникъ.
- 5. Хлопчатникъ.
- 6. Кукуруза + машъ на зерно (въ междурядьяхъ).
- 7. Озим. ячмень + машъ на зеленое удобреніе.
- 8. Хлопчатникъ.

Здъсь хлопковыя поля служать «полями размноженія» для лучшихъ сортовъ хлопчатника: кингъ, кокъ-чигитъ, руссель и тріумфъ, съмена которыхъ получены при индивидуальной селекціи.

Кром'в того, на 5-мъ пол'в былъ произведенъ опытъ пос'вва 27 марта различныхъ сортовъ хлопчатника на весьма солонцовомъ участк'в. Результаты его по учету и изм'вреніямъ, произведенные 12 августа, таковы:

	1	1	Чис.	10 кој	обоч. на	кустѣ.
названіе сорта.	Высота сте- бля.	Число вът- вей.	Beåxb.	Сформиро- вавшихся.	Завязей, бутоновъ и цвътовъ.	Опавшихъ коробо- чекъ.
Кокъ-чигитъ на хорошей почвъ	98	16	26	11	15	3
" съ солонца, галофитный .	66	8	13	4	9	4
" " сѣмена 1 сбора	72	10	20	6	14	1
" " " " 2 сбора	64	8	9	4	5	4
Кингъ 1 сбора съ солонца	74	10	16	6	10	1
Руссель обыкнов, съ солонца	66	8	14	3	11	2
" отборный "	70	10	16	4	11	4
Ташкентскій упландъ обыкновенный	61	9	10	3	7	1
" " отборный	63	11	14	5	9	2

Такимъ образомъ, при спеціальномъ отборѣ хлопчатника на солевыносливость можно получать удовлетворительные результаты и на значительно солонцоватыхъ почвахъ. Какъ видно изъ

таблицы, если кокъ-чигить на хорошей почвъ даеть на 1 кусть около 26 коробочекъ (при 11 сформировавшихся), то на солонцовой почвъ тотъ же сорть даеть около 13 коробочекъ на кустъ (при 4 сформировавшихся). Сорть руссель также даеть не менъе 15 коробочекъ.

На 6-мъ полъ 8-миполья былъ поставленъ опыть посъва кукурузы (бессарабской) съ различной густотой.

На 2-хъ дълянкахъ кукурузы оставлено (при междурядьяхъ въ 1 арш.) по 1 растенію, а на двухъ другихъ дълянкахъ— по 2 растенія въ гнъздъ. Посъвъ былъ сдъланъ 23 марта съялкой. Кукуруза два раза мотыжилась и 3 раза пропахивалась планетомъ; 5 разъ была полита. Урожай початковъ, по учету 1 августа, былъ слъдующій:

Урожай и выходъ зерна.	при 1 растеніи въ гнѣздѣ.	при 2 растеніяхъ въ гнѣздѣ.
Число початковъ на 100 стеблей	. 80,0	74,0
Въсъ початковъ со 100 стебл. (съ	omonaria arovia	
обертками)	. 20,0	15,5
Процентъ оболочекъ початковъ.	$21^{0}/^{0}$	$20^{0}/o$
Въсъ зерна на 100 стеблей	. 11,1 ф.	6,0 ф.
Число стеблей на 1 десятину	29.000	58.000
Урожай зерна на 1 десятину	80 пуд.	87 пуд.

Такимъ образомъ при оставленіи двухъ растеній въ гнѣздѣ урожай получается у бессарабской кукурузы больше, чѣмъ при 1 растеніи, однако число початковъ на 100 растеній и вѣсъ початковъ и зерна значительно ниже у двойныхъ растеній, чѣмъ у одиночныхъ.

На томъ же клину 8-полья, для размноженія и продажи ихъ крестьянамъ, высѣвались промышленные улучшенные сорта кукурузы: кутаисскій гибридъ, бессарабская и спасовская.

Въ цѣляхъ выясненія значенія нитрагина для культуры люцерны въ 1911 г. былъ заложенъ на 1-мъ полѣ 8-полья опытъ внесенія въ почву (при посѣвѣ, путемъ обволакиванія сѣмянъ) нѣсколькихъ сортовъ нитрагина и, для сравненія съ ними, суперфосфата. Люцерна была посѣяна 15 марта (одновременно вносились нитрагинъ и суперфосфатъ). Всходы появились 26 марта; 1-й укосъ сдѣланъ 10 мая; второй 26 іюля и третій 20 сентября.

Результаты дъйствія нитрагиновь и суперфосфата таковы:

<b>建筑。1985年,1987年,</b> 第10年6年7月1	e .	a.		Ур	ожай су	хой масс	зы.	зка.
УДОБРЕНІЯ.	Высота вершк.	Густота.	Кусти-	1 укосъ.	2 укосъ.	3 укосъ.	Всего пуд.	Прибавка въ пуд.
SERVER ZHERSEN GEREL S					17754		2,87%	Texas
Контрольная	14	33	4	140	190	250	580	0
Феррейна (Северина).	15	34	5	150	156	230	536	- 44
Нитрагинъ Моора Нитрагинъ лабораторіи	15	32	5,5	125	153	245	525	— 55
Феррейна, твердый . Нитрагинъ лабораторіи	15	20	5,5	120	138	120	378	-202
Феррейна, жидкій	14	17	5,5	148	160	150	458	-122
Дв. суперфосфать 6 п.	15	25	5	148	207	240	595	+ 15

Какъ видно изъ таблицы ни одинъ нитрагинъ въ 1-й годъ не далъ прибавки урожая. Хотя нитрагинъ московской бактеріологической лабораторіи Феррейна (полученъ отъ г. Северина) дъйствовалъ какъ-будто лучше другихъ, однако и онъ и всъ другіе дали урожай люцерны низшій, чъмъ онъ былъ на контрольныхъ дълянкахъ. Въ то же время двойной суперфосфатъ далъ прибавку урожая (15 пуд.), и вообще люцерна по этому удобренію росла лучше, чъмъ на другихъ дълянкахъ: была зеленъе и мощнъе.

**Многольтній опыть по вліянію удобреній на люцерну** (на запольномъ участкъ́) даль въ 1911 году слъдующіе результаты:

Первый укосъ былъ произведенъ 15 мая; 2-й — 15 іюня; 3-й — 20 іюля и 4-й — 5 сентября.

внесено удобренія.	H	Высота	сте	ебл	я					ассы, довъ.	Прибавка.	Стоимость	прибавки.
	1 y	косъ.	2	yı	косъ.	1	2	3	4	Beero.	При	CTO	при
	арш	верш.	ap	ш.	верш.								
Контрольная	_	12		1	5	108	190	110	103	500	1	_	-
Дв. суперфосфата 12 пуд	1	4		1	8	180	252	176	178	780	280	84	p
,, ,, 6 ,, ,, ,, 6 ,, IIO-	1	4 2	1	1	6	143	167	135	125	570	70	21	,
слъ 2 укоса	1	3	]	1	6	169	185	100	120	574	74	22	,
Дв. суперфосфата 3 пуда , , , , , , , , , по-	1	3 2	]		4	162	160	105	77	530	30		
слъ 2 укоса	1	2	]		4	182	168	120	80	550	50	15	,
Томасшлака 40 пуд		15	1	1	6	162	200	110	133	605	105		
Сърнокислаго калія 10 пуд.	1		1		8	202	162	96	50	510	10		,
Каинита 24 пуд		4	1	1	8	164	242	142	108	655	155	46	,
Гипса 20 пуд	1	3	1	1	6	158	162	107	98	525	25	7	,
Навоза 2400 пуд	1	- 3		1	8	139	245	133	159	676	176	52	,

Изъ таблицы видно, что наибольшій урожай въ 780 пуд. сухой люцерны получился въ 1911 году (какъ и въ 1910 году) по удобренію суперфосфатомъ, внесенному въ количествъ 12 пуд. на десятину. Это даетъ прибавку противъ неудобренныхъ дълянокъ около 280 пуд. съ десятины. Считая стоимость 1 пуд. люцерны въ 30 коп. (стоимость внесеннаго удобренія была погашена прибавкой урожая еще въ 1910 году), прибавка выразится увеличеніемъ дохода на 84 руб. съ десятины.

Хорошо дъйствовалъ въ этомъ году и навозъ, давшій прибавку урожая въ 176 пуд. и дохода въ 52 руб. на десятину. Недурно дъйствовалъ каинитъ (+155 пуд.), томасшлакъ (+105 пуд.), дв. суперфосфатъ въ количествъ 6 пуд. на десятину (+74 пуда). Гипсъ и сърнокислый калій оказали на люцерну малое дъйствіе.

Въ ботаническомъ питомникъ въ 1911 году испытывались нъкоторыя новыя растенія и пріемы.

Для фенологическихъ наблюденій близъ англійской будки были высѣяны (на небольшихъ дѣлянкахъ) всѣ полевыя растенія основного сѣвооборота различныхъ сортовъ: пшеница, ячмень, овесъ, хлопчатникъ, кукуруза, сорго, машъ, кунжутъ и люцерна.

Результаты наблюденій сведены въ особую «фенологическую таблицу».

Изъ новыхъ растеній испытывались въ питомник земляной оръхъ, эспарцеть, шабдарь, красный клеверь, мадія, сафлоръ, рапсъ, клещевина, ворсильная шишка, тефъ, пенициллярія, житнякъ, различные сорта сорго на зеленый кормъ (бурая дурра, сах. янтарь, кафрское бълое, майло и друг.), нъсколько сортовъ туркестанской люцерны и проч. Результаты испытаній этихъ растеній будутъ сообщены въ будущемъ году, такъ какъ по одному году судить о новыхъ сортахъ невозможно (были взяты дълянки безъ повторныхъ).

Въ ботаническомъ питомникъ ведется многолътній опыть по вліянію удобреній на хлопчатникъ по восьмерной схемъ и отдъльно съ промышленными удобреніями. Результаты опыта здъсь большей частью тождественны съ опытами на другихъ поляхъ.

Въ плодовомъ саду и огородѣ были поставлены опыты по изученю вліянія удобреній и сравнивались (по урожайности

и скороспѣлости) нѣкоторые сорта огородныхъ растеній, но такъ какъ опытъ съ удобреніями въ саду и отчасти въ огородѣ въ 1911 году не законченъ, то о результатахъ его будетъ сообщено въ отчетѣ за 1912 годъ.

#### Стадо молочнаго скота.

Къ концу 1911 года все стадо Опытнаго Поля состояло изъ 14 головъ: 1 быка-производителя, 6 дойныхъ коровъ, 4 нетелей и 3 бычковъ (лътомъ 1911 года отъ маляріи и эмфизематознаго карбункула пали 4 теленка).

Удои молока и приходъ отъ продажи молочныхъ продуктовъ видны изъ слъдующей таблицы:

КЛИЧКА КОРОВЫ.	въ м	вечер. Вечер.	Число удой- ныхъ дней въ 1911 г.	Удои лока ведр	. въ	ВЪ	жира сен- брѣ.		въ 19	911	•	γ.	Всего.
	УT	Be	Ч <sub>г</sub> ны 19	19	19	УT	Be .	Мс	Ma C	Ta	TB	7	Bc
1. Близничка	4,1	3,3	360	79	190	4,2	5,3	1					
2. Гранетка	3,3	2,7	350	144	117	3,9	4,6	a moneyat					
3. Уварка	Сухос	 Стойн.	290	60	180	3,4	3,2	На	c	v	M I	M N	7.
4. Бълка	3,3	3,1	270	183	144	3,8	4,9	р. к. р.	к. П	). к.	р. 1	e.	р. к.
5. Калинка	3,9	2,9	245	153	146	Cyxoo	стойн.	320 03 13	03 0	13	4 1	4 34	16 55
6. Киргизка	3,3	2,9	330	100	118	3,4	3,8	i mila ool					
7. Голубка	3,2	2,9	360	33	117	3,8	3,8	)					
У всего стада.	3,5	2,9		752	1012	3,6	4,0			200			

Всего въ 1911 году продано молочныхъ продуктовъ на сумму 346 руб. 55 коп. (или по 60 рублей на корову). Остальное молоко разошлось въ хозяйствъ на выпойку телятъ и для служащихъ.

Какъ видимъ, удои въ 1911 году значительно увеличились по сравненію съ 1910 годомъ. Въ общемъ на каждую корову, приходится въ годъ по 139 ведеръ молока (139 руб.), а на удойный день почти по  $^{1}/_{2}$  ведра на корову и на стадо по 3 ведра.

Въ 1911 году велись систематическія опредѣленія жира въ молокъ коровъ Опытнаго Поля. Результаты этихъ опредѣленій приводятся ниже:

для всего стада.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апръль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октабрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Общій год. удой.	Средній дневной удой.	
Удон въ ведрахъ % жира въмолокѣ: Утромъ	95,5		86,0	105,6 2,7	102,0 3,0		77,5 4,3		63,0 3,6				1012,0 3,3		
Вечеромъ	$\left\{ ^{3,0}_{3,0}\right\}$		2,5	3,2			2,9		4,0					3,20/0	

Наибольшіе удои отъ всего стада получались въ апрѣлѣ и маѣ мѣсяцахъ, а наименьшіе — въ сентябрѣ и октябрѣ. % жира въ стадѣ (3,20%) невысокъ, и это характерно для полуголландскаго отродья; выше всего процентъ жира былъ въ декабрѣ и ноябрѣ (4,0%), затѣмъ въ сентябрѣ и іюлѣ (3,7%), а ниже всего — въ октябрѣ (1,9%). Самое густое молоко было у Близнички — старой коровы (4,1%), а самое жидкое у Киргизки — молодой коровы (3,1%). Скармливаніе животнымъ кормовой свеклы въ смѣси съ хлопковыми сѣменами (3-го сорта) сказалось повышеніемъ % жира въ молокѣ (ноябрь — январь).

Выкъ «Побъдитель», кромъ коровъ своего стада, крылъ часто крестьянскихъ коровъ, случка разръшалась безвозмездно.

Въ виду склонности мъстныхъ крестьянъ къ овцеводству и скотоводству, было бы желательно испробовать въ Голодной Степи разведение цигайскихъ овецъ и ангорскихъ козъ.

#### Случный пунктъ.

Въ январъ 1911 года Опытное Поле пріобръло въ Ташкентъ у г. Тарсина жеребца «Досаднаго», вороно-карей масти, завода Н. И. Иванова (въ г. Ауліеата). Жеребецъ «Досадный», ро-

дившійся въ 1902 году и записанный въ приплодную книгу завода за № 546, несетъ кровь орловскихъ рысаковъ и произошелъ отъ «Непокорнаго» и «Астарты». Въ цѣляхъ полученія приплода для нуждъ Опытнаго Поля (ремонтъ рабочихъ лошадей) и чтобы хотя отчасти удовлетворить желаніе мѣстныхъ крестьянъ имѣть случный пунктъ въ Голодной Степи, Опытное Поле пустило жеребца «Досаднаго» въ ручную случку съ мѣстными кобылами, при чемъ за случку платы не взималось.

Въ первый же случный періодъ (съ февраля по май) «Досадный» покрылъ 20 кобыль, сдѣлавъ 60 садокъ; только въ 2 случаяхъ кобылы приводились на вторичную случку, остальныя же оказались жеребыми послѣ перваго же покрытія.

Въ результатъ оказалось, что большинство явившихся на свътъ отъ «Досаднаго» жеребятъ несутъ до деталей общія съ нимъ черты: карюю масть, высокій рость, значительное развитіе крупа, нъкоторую съдлистость спины и оленью голову. Крестьяне очень довольны приплодомъ, и каждый опять повторяетъ случку со своими кобылами.

По селамъ слученныя кобыли распредвлялись такъ:

Сел. Спасское — 5 кобыль; Конногвардейское — 5; Романовское — 3 кобылы; Волынское — 2; Надеждинское — 1 и у сартовъ-арендаторовъ покрыто 2 кобылы; кромъ того, на Опытномъ Полъ покрыто 2.

Обладая хорошей рысью, кръпкимъ сложеніемъ и высокимъ ростомъ, жеребецъ «Досадный», разумъется, передастъ эти качества приплоду отъ мъстныхъ киргизскихъ кобылъ, и такимъ образомъ положитъ начало улучшенію и ремонту мъстной мелкой рабочей лошади.

#### Показательное хозяйство крестьянина Кузьмы Ретунскаго въ 1911 году.

Несмотря на неудачный для хлопка 1911 годъ, показательное хозяйство имѣло даже нѣсколько большій валовой доходъ, чѣмъ въ блестящій по урожаю и цѣнамъ на хлопокъ 1910 годъ, и это лишній разъ подтверждаетъ устойчивость раціонально организованнаго хозяйства.

Какъ видно изъ нижеприведенной таблицы, валовой приходъ по хозяйству въ 1911 году опредълился суммою въ 2330 р. или около 238 руб. на десятину.

Главный доходъ полученъ, конечно, отъ полеводства, цѣнность продуктовъ коего равна 1499 руб., или 85% отъ общаго дохода; собственно хлопка продано на сумму 835 руб. 20 коп. (42,4% отъ стоимости продуктовъ полеводства), т. е. на 285 руб. меньше, чѣмъ въ 1910 году, хотя урожай хлопка въ показательномъ хозяйствѣ оказался въ 1911 году выше прошлогодняго на 28 пуда (при урожаѣ на дес. въ 130 пуд.), и недоборъ въ деньгахъ объясняется низкой цѣной хлопка въ 1911 году (въ сезонъ 1911 года хлопокъ былъ проданъ по 3 руб. 20 коп. пуд., а въ 1910 году по 4 руб. 70 коп. пуд.).

Значительный урожай хлопка въ показательномъ хозяйствъ и въ 1911 году объясняется тъмъ, что на немъ, во 1-хъ, были высъяны скороспълые сорта — кингъ и кокъ-чигитъ; во 2-хъ, посъвъ произведенъ рано — до 10 апръля; въ 3-хъ, хлопчатникъ съялся по зеленому удобренію и люцернъ; въ 4-хъ, обрабатывался своевременно (машинная обработка); въ 5-хъ, поливался онъ всего 3—4 раза.

Кром'в хлопчатника значительный доходъ дала люцерна, которой собрано съ 1½ дес. — 1020 пуд. на сумму 670 рублей. Часть люцерны въ 5-польномъ съвооборотъ удобрялась двойнымъ суперфосфатомъ (6 пуд. на десятину), купленнымъ хозяиномъ участка въ казенномъ складъ.

Доходы отъ скотоводства исчисляются суммой въ 336 руб. 20 коп., что составляетъ около  $14\,\%$  отъ всего валового дохода по хозяйству.

Имъ́я при организаціи хозяйства въ 1908 году лишь 1 корову, хозяинъ показательнаго участка къ концу 1911 года имъ́лъ уже 7 головъ рогатаго скота, въ томъ числъ́ 4 дойныхъ коровы. Разумъ́ется, получаемаго отъ коровъ молока хватало на семью съ избыткомъ, и частью даже продавалось на сторону.

Стоимость имущества показательнаго хозяйства, движимаго и недвижимаго, къ концу года исчислялась суммой въ 6232 руб., именно: 10 десятинъ земли 3500 руб., постройки — 2000 руб., 9 головъ скота и 45 шт. птицы — 415 руб. и земледъльческихъ машинъ на 322 руб.

Въ 1911 году, собравшись съ деньгами, хозяинъ показательнаго участка, найдя помъщение для себя и скота тъснымъ,

пристроилъ на свои средства просторную кухню, навъсъ и баню. Все это обощлось ему въ 345 руб.

Этотъ единовременный расходъ, а также расходы, сопряженные съ выдачей дочери замужъ, значительно повысили общую сумму издержекъ по хозяйству въ 1911 году и низвели чистый остатокъ до скромной цифры въ 130 рублей. Изъ общей суммы расхода — 1100 руб. (50%) приходятся на личныя нужды (пища, одежда и пр.) и 1100 руб. (50%) на хозяйственныя.

Главнымъ хозяйственнымъ расходомъ является содержаніе скота — 791 руб. (36%), а изъ личныхъ — расходы на пищу — 659 руб. (29,0%).

Всѣ расходы въ 1911 году превышають таковые же за 1910 годъ на 300 рублей.

Показательное хозяйство въ 1911 году участвовало своими экспонатами (хлопкомъ, огородными овощами и плодами перваго урожая плодоваго сада) на сельско-хозяйственной выставкъ въ Ташкентъ и получило медаль и денежную награду въ размъръ 60 рублей.

Какъ распредълялись доходы и расходы по отдъльнымъ статьямъ показательнаго хозяйства въ 1911 году, видно изъ слъдующей таблицы, помъщенной на стр. 125.

При организаціи хозяйства въ 1908 году предполагалось, что со временемъ, когда хозяинъ участка встанетъ на ноги и вполнѣ освоится съ пропашной культурой хлопчатника на орашаемыхъ земляхъ, — площадь хлопчатника въ одномъ сѣвооборотѣ будетъ увеличена, а такъ какъ хозяйство Ретунскаго уже 3 года подъ рядъ даетъ урожаи хлопка не менѣе 100 пуд. съ десятины и самъ хозяинъ заявилъ о томъ, что онъ справится еще съ однимъ пропашнымъ полемъ, то съ 1912 года вмѣсто 6-польнаго сѣвооборота (при особомъ клинѣ съ люцерной) съ первымъ полемъ хлопчатника вводится слѣдующій 6-польный же съ 2 хлопковыми полями:

- 1. озимая пшеница машъ на зеленое удобреніе,
- 2. хлопчатникъ,
- 3. хлопчатникъ,
- 4. яровой ячмень машъ,
- 5. кукуруза + машъ въ междурядьяхъ,
- 6. особый клинъ люцерна.

	HA		СУММА.		-	к о. л в 1	· A H	I E	P A						СЯ	н Р	0.
приходъ.	СУММУ.	P A C X О Д Ъ.		0/0			На 1		ще	Одежда обувь покуп.	СТЕ	y.	По ско	By.	Разн		Bcero.
MATERIAL NEWSFILM	Р. К.		P. K			М ѣсяцы.	Свои.	Покуп.	Жилище покуп.	Одежд обувь	Свои.	Покуп.	Свои.	Покуп.	На се-	По хо	
І. Получено продуктовъ		І. Личные расходы:			-		Р. К.	Р. к.	Р. К.	Р. К.	Р. к.		Р. к.				
полеводства.			ri si			Январь	9 -	28 18	9 62	1 20		15 26	67 50	4 —	19 2	3 14	156
Хлопка съ 2-хъ десят. 260 п	835 20 4	2,4 На пищу	659	29		Февраль	9 10	8 43	2 30	2 15		14 77	78 —	3 70	2 15	12 65	133
Ячменя — 113 п	113 -	— " одежду, обувь	203	-		Мартъ	9 30	2 5	5 —	38 -		2 50	76 50	10 40	6 10	11 70	161
Птеницы — 65 п	74 75	—     ,,     жилище .    .    .          .	50										8 18 75				160
Маша — 120 п	145 —	— ,, различныя надобности.	188			Апръль		26 75				1.	100				107
(укурузы — 6 п	6					Май		7 9			9	28		1 15			
		Итого	1100 -			Іюнь	22 30	21 89	1 41	1 80	13 93	35 7	0 43 50	8 80	7 92		157
Подсолнечника — 3 п	4 50	a- Pro tre aditionality is able to pay to produce a solic amore as a second		,		Іюль	36	11 82	2 - 42	2 -			45	-	3 87	— 80	97
Съ́на люцеры — 1020 п	670	— II. Хозяйственные расходы:			1	Августъ		8 27 60					43	-	1 54	95	104
Соломы ячменой — 225 п	55 —	По полеводству и огороду.	220 -	-	K			5 60		$\begin{vmatrix} 2 & 3 \end{vmatrix} 9$			19 50	0	3 16	6 1	115
Соломы машевн. — 240 п	46 —	По скотоводству	792	36		Сентябрь.						0.0	80		86	2 30	391
		— Различныя потребности	88 -			Октябрь		0 55 8				62					
Итого	1949 45					Ноябрь								-	40	39 4	
II. Съ бахчи:		Итого	1100			Декабрь .	111	5 40 9	0 14 8	3 15 7	0 -		107 1	0 75	0 6 7	8 6 6	7 210
Арбузовъ дынь карт	25 —	TO DECL'S DESCRIPTION															
III. Съ огорода: вапусты, огурцовъ	15 —																
IV. Отъ скота:		ta santa kerapai appinan															1
Іолочн. продукт. 5126 бут.	306 —				•					464							
Іродано скота	15 -																
" птицы	15 20	APRETATION FOR															
. Посторонній заработокъ.	5	- Dr. Grover Consideration				1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -											
Bcero	2330 65	Beero	2200 —			Итого				(1)	1.1	20155	71 703	25 00	e5 190	_ 88	_ 22

Въ этомъ сѣвооборотѣ 2-е поле хлопчатника заняло мѣсто кукурузы, которая исключается въ видѣ отдѣльнаго поля, а вмѣсто 5-го чистаго машеваго поля, вводится комбинированный посѣвъ (на подобіе американскаго) маша въ широкихъ междурядьяхъ (2¼ арш.) кукурузы, при чемъ кукуруза высѣвается рано — въ концѣ марта, а машъ — въ концѣ мая послѣ поливки кукурузы и пропашки междурядій. Такая комбинація позволяетъ использовать поле за весь вегетаціонный періодъ, тогда какъ при существованіи на 5-мъ полѣ одного маша, какъ было раньше, оно до конца мая оставалось въ дикомъ состояніи, т. к. машъ сѣять раньше мая не рекомендуется (требователенъ къ теплу). Въ то же время эта комбинація позволяеть надѣяться на полученіе хорошихъ урожаевъ кукурузы и маша, какъ выяснилось на Голодностепскомъ Опытномъ Полѣ.

Въ будущемъ, однако, этотъ сѣвооборотъ предполагается замѣнить 8-польнымъ, сообразуясь съ осолоняемостью мѣстныхъ почвъ при орошеніи, и ввести люцерну въ постоянное чередованіе, именно:

- 1. хлопчатникъ (удобр. 6 пуд. суперфосф.),
- 2. хлопчатникъ,
- 3. кукуруза (сорго) + машъ на зерно въ междурядьяхъ,
- 4. озимый ячмень или пшеница+машъ на зеленое удобреніе (или зерно),
  - 5. хлопчатникъ;
  - 6. люцерна (удобр. двойн. суперфосфатомъ 6—9 пуд.),
  - 7. люцерна,
  - 8. люцерна.

При данномъ сѣвооборотѣ площадь подъ хлопчатникомъ равна 38% всей посѣвной площади и подъ люцерной 38%. На солонцеватыхъ почвахъ, разумѣется, это соотношеніе будетъ правильнымъ.

По соображеніямъ только-что высказаннымъ— о неполномъ использованіи машемъ 5-го поля (при чистомъ посѣвѣ)— рѣшено и на Опытномъ Полѣ въ Голодной Степи ввести тотъ же 8-польный сѣвооборотъ вмѣсто существующаго основного 5-полья, оказавшагося, по мѣстнымъ условіямъ, не совсѣмъ выгоднымъ.

На болъ̀е осолоненныхъ участкахъ предположено ввести вмъ̀сто Андижанскаго съ̀вооборота тоже 6-польный, но съ люцерной, именно:

1-ое поле — озимая пшеница + машъ на зерно,

2-ое » хлопчатникъ,

3-ье » хлопчатникъ,

4-ое » яровой ячмень + люцерна (подсъвъ весной),

5-ое » люцерна,

6-ое » люцерна.

Здъсь хлопчатникъ составляетъ 1/3 всей посъвной площади.

Наконець, на другихь участкахь, съ болѣе хорошей почвой (не солонцеватой) будеть введень вмѣсто 2-полья особый 4-польный сѣвообороть (съ 50% площади хлопчатника):

- 1. яровой ячмень + машъ на зеленое удобреніе,
- 2. хлопчатникъ,
- 3. хлопчатникъ,
- 4. кукуруза (сорго) съ машемъ въ междурядьяхъ.

Въ случав осолоненія почвы предполагается послів ячменя сівять (вмівсто маша) вторымь посівномь въ лівто (съ 25 мая по 10 іюня) скороспівлый рись (арпа-шалы) и пользоваться этой культурой для промывки солонцовь, такъ какъ по даннымь Опытнаго Поля этоть пріемь оказывается наиболіве дійствительнымь для быстраго приведенія въ годность солонцовь, даже при отсутствій дренажа. Разумівется, послів риса подъ хлопчатникъ вносится навозное удобреніе.

## Дѣятельность прокатнаго пункта при Опытномъ Полѣ въ Голодной Степи за 1911 г.

О д'ятельности прокатнаго пункта сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій при опытномъ пол'є можно судить по таблиц'є, пом'єщенной на стр. 128.

Прокатный пунктъ при Опытномъ Полъ въ Голодной Степи открытъ съ весны 1911 года, по распоряжению Туркестанскаго Управления Земледълия и Государственныхъ Имуществъ, на основании представления Завъдывающаго Опытнымъ Полемъ. Для него выписано 15 различныхъ сельско-хоз. орудій — всего на

порядку.	Рабочій пе-	прокатъ	названія орудія.	дій въ	Стоимость	орудій.	прокатныхъ	Суг вн руч	120 CT 100 CT	Прог оруді полі	или в	селен	г. каких ій польз сь оруд	0-	Въ 0	/0 <sup>0</sup> /0.	
NºNº 110	ріодъ орудій.	Плата за въ день.	naobania oragia.	Число орудій прокат'в.	Р.	К.	Число про дней.	Р.	К.	Число хо- зяйствъ.	Обрабо- тано десят.	Сел. Спас- скаго.	Крест. аренда- торы.	Прочіе.	Число ра- боч. дней къ общ.	Выручка къ стоим. орудій.	
		Коп.									7	#5 70					
1	25/н1—25/у	30	Съялка хлонк. Баннера	2	97	_	$53^{1/2}$	16	50	28	80	18	10	-	27,0	16,6	
2	1/IV15/VII	30	Культиваторъ Планета	2	46		$62^{1/2}$	18	75	21	93	19	3	1	31,6	40,7	
3	30/111—30/v	10	Окучникъ	1	8	50	17	1	70	. 7	20	6	. 1		8,6.	20	
4	1/iv-30/iv	30	Плугъ Сакка 6"	1	26	10	3		90	2	2	1		1	1,5	3,4	
5	15/x—1/x1	10	Плугъ 1-конный	1	9	-	10	1	_	1	5	1		-	5,0	11	
6	1/IV—15/VI	20	Борона Зигзагъ	1	17	_	81/2	1	70	3	24	3		-	4,3	10	
7	1/IV—15 <sup>1</sup> IX	40	Французская борона ,	1	40	-	$17^{1/2}$	7	-	6	35	5	1		8,9	17,5	
8	15/vII—1/xI	1 съ п.	Въ́ялка Гетенко	1	50		23 дня 1150 п.	11	50	15	1150 л.	11	3	1	11,6	23	
9		1	Сортировка "Тріумфъ"	1	58			_	_	_	-1	_	_	_	_		
10		1.	Рисовая сортировка	1	51						71 - H	_		-	_		
11	1/1x-15/x	5	Клеверн. сортиров. "Кускута"	1	176		2 д./16 п.		80	2	16 п.	1		1	1,0	0,4	
12	18/x1		Кукурузная молот. ручная	2	10	_	1 д./4 п.	-	20	1	4 п.	1		_	0,5	-	
3 3		5	За поломку и просрочку	-			_	3	20	_	_		_	-	_	-	
										75 F							
			Итого	15	588	60	198 дней 1170 п.	63	25	86	259 1170	66	18	4	_		

сумму 588 руб. 60 коп.; изъ нихъ 9 орудій — для обработки почвы и поства, на сумму 2243 руб. 60 коп. и 6 орудій — по очисткт стоимостью 345 руб.

Главнъйшую роль, какъ и предполагалось, играли хлопковыя съялки Баннера, пропашникъ Планета и французская борона — орудія для рядовой культуры хлопковыхъ полей, такъ какъ у крестьянъ въ Голодной Степи привилась, въ силу вліянія Опытнаго Поля, почти исключительно одна машинная обработка хлопчатника.

Изъ всѣхъ 138 прокатныхъ дней для всѣхъ орудій, на хлопковую сѣялку приходится  $53\frac{1}{2}$  дня или 27%, на пропашникъ Планета  $62\frac{1}{2}$  дня или 31,6% (самое большее); французская борона, прекрасно рыхлящая почву и разбивающая корку по выходамъ хлопчатника, также часто бралась крестьянами —  $17^{1}/_{2}$  дней, хотя ее состоятельные крестьяне предпочитаютъ покупать (она нужна все время при пахотѣ), и, какъ видно изъ вѣдомости проданныхъ съ нашего склада сел.-хоз. орудій, въ 1911 году французская борона была куплена 4 хозяевами, несмотря на ея сравнительную дороговизну (39 руб.). Меньше всего брались на прокатъ плуги и бороны зигзагъ, такъ какъ всякій крестьянинъ, конечно, старается пріобрѣсти въ собственность такія обязательныя въ обиходѣ сельскаго хозяина орудія.

Изъ орудій по очисткъ съмянъ чаще всего брались въялки Гетенко — (работали 23 дней) и ръдко сортировка «Кускута» — для очистки съмянъ люцерны отъ «повилики», которой очень сильно заражены мъстные люцерники. Малый спросъ на «Кускуту» и полное отсутствие его на сортировки «Тріумфъ» и «рисовую» отчасти объясняется тъмъ, что поле не могло выдавать эти орудія крестьянамъ на домъ, въ виду громоздкости и дороговизны этихъмашинъ (были случаи поломокъ въялки при перевозкъ съпункта на домъ).

Общая сумма, вырученная въ 1911 году за прокатныя орудія, равна 63 руб. 25 коп. или 10,7% отъ общей стоимости работавшихъ орудій; на одинъ рабочій день это дастъ около 32 коп.

Самый высокій проценть выручки за прокать приходится на пропашникъ Планета (18 руб. 75 коп.) — 40,7% отъ стоимости орудія; затѣмъ идетъ хлопковая сѣялка Баннера, за пользованіе коей выручено 16 руб. 50 коп. или 16,6% къ стоимости орудія и т. д. (см. таблицу).

Въ общемъ можно сказать, на основаніи выручки за прокатныя орудія въ 1911 году, что орудія для обработки почвы и поства окупять свою стоимость черезъ 10 лтт службы на прокатномъ пунктт; въ частности, пропашникъ Планета окупится уже черезъ 2½ года, стялка Баннера— черезъ 6 лтт; французская борона черезъ 5½ лтть и т. д.

Такъ какъ съялка, пропашникъ и проч. — сезонныя орудія, то они работали лишь 1—2 мъсяца въ году; хлопковая съялка съ 25 марта по 25 мая; пропашникъ съ 1 апръля по 15 іюля и т. под.

Орудіями прокатнаго пункта при Опытномъ Полѣ пользовались почти исключительно крестьяне ближайшаго поселка Спасскаго (2 версты) и арендаторы (крестьяне) казенныхъ земель (4 версты).

Плата за пользованіе прокатными орудіями установлена Управленіємъ Земледѣлія и, какъ видно изъ таблицы, очень небольшая: отъ 40 коп. въ день за французскую борону до 10 коп. за 1-конный плугъ Липгарта. Вѣялка и сортировка выдавались на прокатъ съ платой по 1 коп. съ пуда, а сортировка люцерновая «Кускута» — по 5 коп. съ пуда. Завѣдываніе прокатнымъ пунктомъ было поручено практиканту П. Д. Дерябину, а съ ноября мѣсяца — конторщику Опытнаго Поля; тотъ и другой несли обязанности по пункту безвозмездно.

Слъдуетъ отмътить, что крестьяне очень заинтересованы въ увеличеніи числа такихъ прокатныхъ орудій, какъ хлопковыя съялки, пропашники, окучники и французскія бороны, и не разъ выражали намъ свои сожаленія, что этихъ орудій не хватаетъ даже для сел. Спасскаго. Дъйствительно, въ сезонъ посвва хлопка и пропашки его кандидаты на эти орудія записывались за 10-20 дней впередъ и являлись за очередными орудіями съ 3-4 час. утра, а иногда и въ 10-11 час. вечера (послъ возврата орудія предшественникомъ). Все это указываеть на необходимость расширить мъстный прокатный пунктъ. Необходимо также, чтобы имъ завъдывалъ инструкторъ даннаго района, на обязанности котораго лежало бы также показать крестьянину, взявшему орудіе, правильную его установку, необходимыя разстоянія между рядами и пр., такъ какъ бывали случаи, что крестьяне, взявъ на-спъхъ орудіе и не разспросивъ, долго не могли направить его, теряли время и плохо съяли или пропахивали хлопчатникъ.

## Дъятельность склада сельско-хозяйственныхъ орудій при Опытномъ Полъ въ Голодной Степи за 1911 годъ.

	PORTURE TOTAL STREET, SECTION OF		Citer		ПР	0 Д				
№№ по порядку.	Названія проданныхъ орудій.	Число.	Цъ́		· Н	200	нал ны	-РИ	В: кре дит	e-
~ F	different cars on some in	1	P.	К.	Р.	к.	P.	к.	P.	К
				114	(7,5)					
1	Плуги 1-корпусн. Сакка 6 и 7"	4	28	50	113		71	35	41	6
2	" Бр. Донскихъ № 0	30	16	80	504	09	350	04	154	(
3	" Липгартъ, 1-конные, (дерев. грядил.)	7	7	70	55	60	47	15	8	
4	" 2-корпусные Брянскіе.	4	38	50	153	_	75	44	77	
5	Бороны Зигзагъ	3	16		40	60	30	60	10	
6	"французская	4	39	-	156	_	137		19	
7	,, экстирпаторъ	1	16	50	16	50	16	50		1
8	Пропашники Планетъ	19	23	_	426	26	402	36	23	,
9	Окучники	4	10	15	40	30	40	30		
10	Сѣялки хлопковыя "Баннера"	8	50	-	400		370	_	30	
11	Въялки	1	41	70	41	70	41	70		
12	Соломоръзки	3	31	35	94	10	94	10		
13	Ульи Дадана	1	7	_	7	_	7	_		
14	Легкопарные ходы	2	77	75	155	50	68	-	87	
15	Молотилки кукурузныя	2	2	75	5	50	5	50		
16	Косы	40		83	32	99	32	99		
17	Отбои	8		26	2	80	2	80		
18	Молотки	6		26	1	56	1	56	_	
19	Бруски	15		11	1	65	1	65	_	-
20	Кольца	5		11	_	55		55	-	100
21	Плужныя части — лемеха	10	1	20	11	90	11	90		-
22	,, пятки	2	-	60	1	20	]	20		
23	,, отвалы, ключи, доски	4	1	60	6	40	6	40		
24	Садовыя ножницы	1	1	65	1	65	1	65	_	
25	Огородныя сапки	11	-	60	.6	70	6	70.		
26	Швейныя машины	1	33	-	33	-	33	-		
27	Суперфосфатъ	6	-	-	11	70	11	70		
28	Долгъ за плугъ		_	-	-	-	-	-	11	2
29	Процентовъ съ суммы долга.				16	54	16	54		

Какъ видно изъ приводимой таблицы, общая стоимость проданныхъ въ 1911 году орудій опредѣляется суммой 2337 руб. 79 коп. и можетъ быть признана нормальной для нашего отдѣленія склада, въ 1909 году, напримѣръ, она равнялась 2330 руб., также нормальной слѣдуетъ считать и задолженность складу мѣстныхъ крестьянъ-покупателей, именно: въ кредитъ было взято орудій на сумму 463 руб. 31 коп., что составляетъ около 20% отъ общей продажной суммы, т. е. даже значительно меньше величины допускаемой разсрочки платежа (1/3—1/2 стоимости орудій).

Какъ и раньше, орудія отпускались въ кредить изъ 8% годовыхъ на сроки отъ 2 до 12 м ${}^{*}$ бсяцевъ.

Дъла склада ведетъ Завъдывающій Опытнымъ Полемъ.

Самыми ходкими орудіями попрежнему были плуги Бр. Донскихъ, которыхъ продано на 504 руб. (22% отъ общей продажной суммы по складу). Затѣмъ, съ каждымъ годомъ больше и больше требуются хлопковыя сѣялки и пропашники для обработки хлопковыхъ плантацій; первыхъ взято на сумму 400 рублей—(17%), а пропашниковъ на 426 руб.—(18%). Въ послѣднее время отъ крестьянъ начали часто поступать заказы на соломорѣзки, употребляющіяся здѣсь для рѣзки люцерноваго сѣна (получается значительная экономія корма, въ виду почти полнаго отсутствія объѣдковъ); на зимній сезонъ соломорѣзокъ продано на сумму 94 руб. 10 коп., при чемъ преимущественно брались соломорѣзки педальныя (для работы ногой), цѣною въ 36 рублей.

Главными покупателями орудій и въ 1911 году являлись крестьяне сел. Спасскаго, — ими взято орудій на сумму 1391 руб. 63 коп. (60% всѣхъ покупокъ); далѣе идутъ крестьяне-арендаторы казенныхъ земель — на 416 руб.; сел. Романовскаго — 295 руб., сел. Надеждинскаго — 87 руб.; сел. Конногвардейскаго — 66 руб.; арендаторы-сарты — 74 руб. и проч.

Отдаленность такихъ поселковъ (20—25 верстъ отъ Голодной Степи), какъ Конногвардейскаго, Романовскаго, Надеждинскаго, заставляютъ крестьянъ часто обращаться за орудіями непосредственно въ Ташкентскій казенный складъ, отдѣленіемъ котораго является Голодностепскій Складъ.

Къ концу 1911 года долгъ крестьянъ нашему Складу выражался суммой въ 335 руб. 90 коп., именно за 1909 годъ—18 руб. 40 коп., за 1910 годъ—159 руб. 90 коп. и за 1911 годъ—103 руб. 75 коп.

# Поврежденія хлопчатника, люцерны, маша, свеклы и др. растеній гусеницами карадрины (Caradrina exigua) въ Голодной Степи.

Около 1-го іюля 1911 года въ Голодной Степи зам'вчены были поврежденія на листьяхъ хлопчатника гусеницами-червями. Тогда же, при ближайшемъ осмотръ посъвовъ у крестьянъ, обнаружилось, что гусеницы уже сильно обътли листья люцерны. свеклы и частью маша. Листья у свеклы и люцерны были настолько сильно изръшетены (скелетированы) гусеницей, что такія поля вм'єсто зеленыхъ казались желтыми, просв'єчивающими. Чтобы спасти отъ «червей» оставшійся посвыь, крестьяне спъшно начали косить (3-й укосъ) люцерну, еще не начавшую цвъсти, а послъ убирки — поливать. Тогда-то, между прочимъ, и было обнаружено, что гусеницы съ люцерны стали быстро перебираться на межи, по сухимъ дорогамъ на хлопчатникъ, машъ и пр.; ъли онъ, впрочемъ, по пути и сорныя травы — лебеду, выюнокъ и др. — и поражали всвхъ своей всеядностью и необыкновенно быстрыми движеніями по земль. Около 9 іюля отмъчено наибольшее поражение хлопчатника, и съ того же, приблизительно, времени началось окукливаніе гусеницъ въ земл'я, подъ кустами хлопчатника. Больше всего куколокъ найдено между 12—15 іюля, но уже съ 11-го іюля стали появляться единично изъ раннихъ куколокъ бабочки новаго поколѣнія и 12-15 іюля кое-гдъ на листьяхъ хлопчатника, подъ паутинкой, были открыты маленькія гусеницы, вышедшія изъ яицъ, стложенныхъ на листьяхъ, очевидно, ранними бабочками того же поколънія.

Мы не можемъ точно сказать, когда появились бабочки и яички той генераціи, которая начала вредить хл. пчатнику, но относительно дальнъйшей эволюціи гусениць «хлопковаго» періода имъемъ такія данныя (по нашимъ наблюденіямъ): гусеницы появились на хлопчатникъ около 20 іюня; наибольшій вредъ ему причинили около 1—5 іюля; начали закукливаться въ землъ 9 іюля, а больше всего 13 іюля; изъ гусеницъ, окуклившихся 9 іюля, на 7-й день (12 іюля) вышли бабочкисовки. Такимъ образомъ, циклъ развитія этого вредителя хлопка и люцерны равенъ, приблизительно, 20—25 днямъ, а такъ какъ около 15 іюля стали появляться уже новыя бабочки, то можно сказать, что только въ теченіе лъта отчетнаго года было уже 3 поколънія вредителя.

Ниже мы вкратцѣ опишемъ самихъ вредителей хлопка и люцерны, поврежденія послѣднихъ и способы борьбы съ гусеницами — по опытамъ Голодностепскаго Опытнаго Поля съ 1 по 15 іюля 1911 года. Полагаемъ, что болѣе полныя свѣдѣнія обо всемъ этомъ дастъ энтомологъ М. М. Сіазовъ, наблюдавшій вредителя за это же время въ Голодной Степи.

Гусеницы, повреждавшія въ массъ хлопчатникъ, люцерну, свеклу, кукурузу и машъ съ 1 по 15 іюля, были различнаго вида, но главную массу ихъ составляютъ Caradrina по habitus'у слъдующія: темно-зеленой окраски, 16-ногія, длиною около 20 mill., толщиною  $2^{1/2}$  mill.; тёло гусеницы голое, голова небольшая со щетинками около челюстей, на заднемъ членикъ тоже щетинки, какъ и на ножкахъ (ръзкія); рисунокъ спинки отчетливый: посрединъ идетъ узкая черная полоска, по бокамъ ея — вдоль всего тёла гусеницы, расположены широкія темнозеленыя полосы, состоящія изъ чередующихся темныхъ и желтоватыхъ линій; далье къ бокамъ гусеницы проходять съ каждой стороны тъла узкія темныя полосы, еще ниже — свътло-желтая полоса, потомъ идетъ широкая черная полоса съ 8-ю бълыми точками по нижнему краю; далье, на границь этой полосы, располагаются дыхальца — круглыя, съ чернымъ ободкомъ; ниже идеть (поуже черной) желтозеленая полоса; наконець, брюшная поверхность темно-желтаго цвъта съ ножками такого же цвъта. Между поперечными вдавленіями на спинкъ описываемой гусеницы нътъ характерныхъ для гусеницы Heliothis armiger'а 4-хъ точекъ со щетинками или онъ незамътны.

Куколка гусеницы свътло-коричневаго цвъта, длиною 10 mill., толщиною 3—4 mill., передній конецъ тупой, задній острый; тъло куколки имъетъ ръзкія поперечныя кольца сегментовъ (ихъ 12), съ боковъ расположены черныя точки дыхалецъ.

Относительно способа закукливанія гусеницы нами сд'вланы такія наблюденія:

Закукливается гусеница почти исключительно въ сухую землю, подъ тѣмъ же кустомъ хлопка, который она ѣла; обычно она какъ бы выбираетъ болѣе плотные комки почвы и съ нижней поверхности ихъ, на глубинѣ около 5 сантиметровъ отъ поверхности почвы (сюда гусеница пробирается гл. обр. по щелямъ), дѣлаетъ земляную крышку, вытачивая для нея въ комкъ коническую ямку, въ которую потомъ входитъ узкій конецъ куколки. Закрытая наглухо крышечка (толщиною въ ½ mill.)

выдается на поверхности комка въ видъ кругловатаго сплощного возвышенія (около 10 mill. въ діаметръ) съ рисункомъ вдавленнаго, напримъръ, въ сырую глину, человъческаго пальца (тонкія линіи кожи); куколка лежитъ въ углубленіи комка свободно и при разламываніи его выпадаетъ, при чемъ обыкновенно начинаетъ двигать узкимъ концомъ тъла; при выходъ изъ куколки бабочки, земляная крышечка оказывается пробитой противъ головного конца, такъ что послъ выхода отсюда бабочки въ комкъ остается кругловатое отверстіе величиною около 5 mill.

Бабочка - совка, летающая ночью, а днемъ сидящая между комками сухой земли подъ кустами хлопка или на самыхъ кустахъ (въ тъни) — небольшая, сърая, длиною 15 mill., шириною, при расправленныхъ переднихъ крыльяхъ, около 27 mill., а при сложенныхъ — 5 mill.; переднія крылья длиною около 12 mill., заднія 9 mill.; шириною (у задняго края) — переднія 5 mill., а заднія 9 mill.; брюшко короче крыльевь (оть головы до конца брюшка 11 mill.) и закрыто ими совершенно — при сидячемъ положеніи бабочки. Голова небольшая, страя съ большими черными глазами; усики нитевидные, гладкіе, бурые; хоботокъ свернутъ спирально, длиною 5 mill. Грудь темно-съраго цвъта, сверху почти во всю длину оголена въ видъ темнаго овала; ножекъ 3 пары, на 2-мъ членикъ среднихъ ножекъ имъется по 1 шипику, а на заднихъ — по два. Брюшко свътло-сърое снизу и темно-сърое со спинками, состоить изъ 7 сегментовъ; съ боковъ брюшка расположены между сегментами черныя точки. Голова, грудь, брюшко и ножки покрыты болъе или менъе густо сърыми волосками, а на концъ брюшка имъется пучекъ длинныхъ шелковистыхъ, бъловатыхъ щетинокъ. Переднія крылья темнопепельнаго страго цвта, съ легко отпадающими чешуйками, отчего рисунокъ этихъ крыльевъ часто теряется; съ нижней поверхности эти крылья свътло-серебристаго цвъта, съ отливомъ, безъ особаго рисунка. Заднія крылья прозрачныя, въерообразныя, съ темной поперечной полоской у задняго края, за который идетъ свътлая концевая бахрома; вдоль заднихъ крыльевъ идутъ 3-4 буроватыя жилки, къ концу развътвляющіяся на 9-10 жилокъ. Рисунокъ верхней поверхности переднихъ крыльевъ напоминаетъ рисунокъ совокъ; на темно-съромъ полъ крыльевъ можно различить у конца ихъ узкую черную поперечную линію, за когорой (къ концу) крылья окрашены свътлъе; въ концъ

передней трети крыльевъ, ближе къ боковому краю крыла, расположено по одному овальному пятнышку — (въ центръ оно коричневое, а съ периферіи окружено бъловатымъ ободкомъ); ниже этого пятна, въ чертъ прямой поперечной полоски посрединъ крыльевъ, имъется не ръзко очерченное бобовидное пятно; далъе, къ концу крыльевъ, идетъ подъ угломъ къ указанной поперечной прямой полоскъ болъе свътлая полоска (на съромъ фонъ крыльевъ), параллельно концу крыла и направляясь къ переднему углу его; за ней по концу крыла идетъ широкая темноватая полоса съ болъе свътлыми зазубринами по краю. Бабочки сидятъ со сложенными книзу, кровлеобразно, крыльями, почти незамътныя на землъ; при сотрясеніи онъ быстро вспархиваютъ и улетаютъ.

Поврежденія, наносимыя гусеницей хлопчатнику, разнообразны, но обльше всего она у него обътдаетъ листья; на нихъ она вывдаеть паренхиму и эпидермись, такъ что листь становится дырявымъ, иногда на немъ сохраняются только жилки; часто при этомъ гусеница, начиная тсть листь съ нижней или съ верхней поверхности, не трогаетъ эпидермисъ, и тогда остается вмъсто дыры тонкая просвъчивающая пленка; отверстія на листъ у хлопчатника она дълаетъ кругловатыя или угловатыя. Обычно на поврежденныхъ частяхъ растенія находятся и черные экскременты гусеницы. Цвъты и бутоны она обычно прогрызаетъ насквозь, въ мелкихъ завязяхъ гусеница тоже дълаетъ небольшое сквозное отверстіе, а на болъе крупныхъ коробочкахъ чаще только оставляеть снаружи круглыя неглубокія ямки — сліды укусовь; зеленые прицвітники объйдаеть часто такъ сильно, что завязь оказывается оголенной и въ большинствъ случаевъ засыхаетъ (но опадають такія завязи не скоро, въ отличіе отъ поврежденныхъ настоящимъ хлопковымъ червемъ).

Довольно характернымъ поврежденіемъ на хлопчатникъ является усыханіе верхушки его стебля, которая повисаетъ послъ того, какъ гусеница продълаетъ въ стеблъ, около пазухи какоголибо верхняго листа, круглое отверстіе и, устремившись въ сердцевину, выъсть въ ней прилегающую къ наружному отверэтого прогрызанія стебля, гусеница скоро уходитъ дальше на значительный ходъ — до 2—3 сантиметровъ длиною; послъ этого прогрызанія стебля, гусеница скоро уходитъ дальше на листья.

Какъ велики поврежденія хлопчатника гусеницею на отдъльныхъ кустахъ, видно изъ слъдующихъ данныхъ осмотра поврежденныхъ кустовъ 10 іюля. Изъ 51 листа на кустъ поврежденныхъ оказалось 45, изъ нихъ 20 сильно, сплошь изъъденныхъ; изъ 5 завизей проъдено 3; изъ 20 бутоновъ -- про-**В**дено 10; верхушка стебля поникла и усохла; кустъ хлопчатника пересталъ цвъсти, новыхъ бутоновъ не завязываетъ. На кукурузъ гусеница поъдала сначала (въ концъ іюня) молодыя листья, прогрызая на нихъ длинныя отверстія вдоль жилокъ; послъ она забиралась въ верхушки молодыхъ початковъ и выъдала гнъздами молочныя зерна. Кормовую и сахарную свеклу гусеница, повидимому, особенно любить, и потому листья свеклы раньше всего и сильнъе всего были у насъ объъдены ею; большая часть листа свеклы оказывается събденной гусеницей до жилокъ, и тогда она принимается ъсть вновь появляющеся изъ сегдечка свеклы нъжные листья. Корни свеклы, разумъется, перестають расти, несмотря на усиленную поливку и обработку пораженныхъ плантацій.

На люцернъ гусеница поъдаетъ всъ почти листья, оставляя только скелетъ, такъ что такіе люцерники кажутся изръшетенными, съро-желтыми; разумъется, крестьяне стараются немедленно скашивать пораженную люцерну тотчасъ же, какътолько замътятъ небольшія пятна оголенной люцерны.

Борьба съ гусеницей, по опытамъ на Опытномъ Полъ, можетъ вестись болье или менье успышно во всых трех стадіяхь развитія насъкомаго: 1) въ стадіи бабочки — ловлей ея по ночамъ фонарями, т. к. бабочки на свътъ летятъ хорошо, и отчасти — отравленными медовиками, хотя на нихъ бабочка здёсь летъла плохо; 2) въ стадіи гусеницы-при помощи опрыскиванія поствовъ парижской зеленью, отъ которой гусеницы дохнуть уже на 2-й день, поввъ отравленныхъ листьевъ; наконецъ, 3) въ стадіи куколки, повидимому, съ успъхомъ можно примънять сильную поливку полей водой, орошая ихъ напускомъ, чтобы слой воды достигалъ 2-3 вершковъ надъ поверхностью почвы, — при этомъ бабочки, по нашимъ наблюденіямъ, въ значительномъ числъ не могуть выйти изъ куколокъ, заплотнымъ слоемъ земли и ила, нанесенныхъ мазанныхъ того, конечно, надежнымъ средствомъ кромъ тивъ зимующей въ куколкахъ генераціи бабочки явится глубокая вспашка полей осенью — подъ поливку. На Опытномъ Пол'в въ Голодной Степи были поставлены опыты борьбы съ гусеницей при помощи опрыскиванія (изъ ручныхъ аппаратовъ) посѣвовъ хлопка, люцерны и свеклы нижеуказанными инсектесидами; результаты получились слъдующіе:

- а) При опрыскиваніи хлопка и свеклы сильной дозой (саганчевой) парижской зелени (60 грамм. на ведро воды) гусеницы исчезали съ кустовъ хлопка и свеклы на слъдующій же день, часть ихъ мертвыми найдена въ землъ, подъ кустами и на кустахъ (въ бутонахъ); живыми остались на кустахъ только тъ гусеницы, которыя при опрыскиваніи находились въ закрытыхъ бутонахъ.
- б) Джепсинъ въ дозъ 17 грамм. на ведро воды не дъйствоваль, и на 2-й день гусеницы почти всъ были на кустъ.
- в) При опрыскиваніи люцерны 14 іюля нашли на 2-й день, что на д'влянк'в: 1) съ парижской зеленью (40 грамм. на ведро воды) погибло на куст'в 8 гусеницъ и осталось живыхъ 9;
- 2) съ парижск. зеленью, растворенной въ нашатырномъ спиртъ и послъ въ водъ, живыхъ осталось 2, погибшихъ 1, но люцерна была обожжена;
- 3) со слабымъ джепсиномъ (10 грамм. на ведро) живыхъ гусеницъ 9, погибшихъ нътъ;
- 4) съ кръпкимъ джепсиномъ (20 грамм.) живыхъ 8, погибшихъ нътъ;
- 5) съ 2% растворомъ хлористаго барія— живыхъ 8, погибшихъ нѣтъ; наконецъ,
- 6) съ 5% растворомъ хлористаго барія (плюсъ патока)— живыхъ 5, погибшихъ 0. Такимъ образомъ, и въ этомъ случаѣ дъйствовала губительно на гусеницъ только парижская зелень; ее необходимо примънять въ «саранчевой дозѣ» около 60 грамм. на ведро воды, чтобы подъйствовать на гусеницъ быстро и върно.

Слъдуетъ еще упомянуть о томъ, что попытки примънить противъ гусеницы на хлопкъ эмульсію зеленаго мыла (2—5%) не увънчались успъхомъ: правда, сначала гусеницы скоро теряли всякую подвижность и казались мертвыми, но черезъ нъкоторый промежутокъ времени онъ опять оживали и расползались.

Гусеница Caradrina появилась у насъ впервые, но по силъ нанесенныхъ ею поврежденій хлопчатнику и др. растеніямъ, приходится признать въ ней не менъе опаснаго вредителя, чъмъ Heliothis armiger, кстати сказать почти отсутствовавшаго въ 1911 году; гусеница карадрина, оказывается, въ 1911 году была замъчена во многихъ мъстахъ Закаспійской и Самаркандской областей, и всюду произвела значительныя опустошенія на поляхъ.

тырон**описательных праводностичество по праводностичество пределательного принамення принамення принамення при** 

### Андижанское Опытное Поле

въ 1911 году.

Отчетъ завъдывающаго полемъ А. Я. Мухина.

Работы Андижанскаго Опытнаго Поля по хлопководству въ отчетномъ 1911-мъ году продолжались по программѣ прежнихъ лътъ, а именно:

- 1. Производились срочныя метеорологическія наблюденія, сводка и пов'єрка вс'єхъ записей;
- 2. Производились опыты по изученію вліянія различныхъ удобреній на урожай хлопчатника въ зависимости отъ времени ихъ внесенія;
- 3. Производились опыты со способомъ посѣва хлопчатника, при чемъ изучалось вліяніе на урожай хлопчатника различныхъ разстояній между рядами и растеніями и различныхъ количествъ растеній въ лункахъ;
- 4. Ставились опыты съ числомъ поливокъ хлопчатника, съ учетомъ воды водомъромъ Фута;
- 5. Производились испытанія и сравненіе разныхъ сортовъ и расъ хлопчатника;
  - 6. Ставились опыты съ чеканкой хлопчатника;
- 7. Изучалось вліяніе на урожай хлопчатника предшествующихъ растеній;
- 8. Изучалось вліяніе глубины зад'влки с'вмянъ хлопчатника на энергію проростанія.

Изъ новыхъ вопросовъ большее внимание было удълено:

- 9. Испытанію работы листера;
- 10. Изслъдованію корневой системы хлопчатника;
- 11. Изученію константности разнообразныхъ свойствъ сортовъ и чистыхъ линій хлопчатника;

Въ пятипольномъ съвооборотъ ставились:

12. Опыты съ яровыми, озимыми и кормовыми растеніями.

# Метеорологическія условія 1911-го года.

Январь (по новому стилю). Барометрическое давленіе въянварѣ 1911-го года въ среднемъ равнялось 721,0 мм. или на 2,2 мм. меньше нормальнаго за послѣдніе семь лѣтъ (723,2).

Средняя температура въ воздух за мбсяц5 —  $1,3^{\circ}$  С., что выше нормы (—  $2,3^{\circ}$ ) за десять л5 ть на  $1,0^{\circ}$ .

Самый большой минимумъ былъ 28-го числа, когда минимальный термометръ въ будкѣ показывалъ—16,8°. На поверхности же почвы была слѣдующая температура:

Вообще за весь мѣсяцъ минимальный термометръ на поверхности почвы ни разу не поднимался выше нуля. Минимумъ же въ будкѣ только 2 раза показывалъ температуру выше нуля.

Изъ вътровъ по повторяемости и суммъ скоростей преобладали вътры восточные и западные. Распредъляя всъ вътры на четыре главныя группы, мы получимъ слъдующую картину:

Восточные	вѣтры,	сумма	скоростей							29
Западные	, a	,,		TP			d.	18	0.0	26
Южные	"	,,	ramo,,/rroad	LITE !	Į.	4.0	0.	10.00	0.0)	20
Сѣверные	,,	"			1.		0.04	W.L		2

Средняя относительная влажность (по гигрометру) за м'всяцъ (84%) была на 3% выше нормальной, а средняя облачность (82%) выше нормы за 10 посл'єднихъ л'єтъ (68,3%) на 13,7%.

Осадковъ за весь мъсяцъ выпало 9,8 мм. (ниже нормы 38,9 за десять лътъ на 29,1 мм.), распредъляются они на 8 дней, изъкоторыхъ 7 были со снътомъ и только одинъ съ дождемъ.

Въ общемъ, январь мъсяцъ въ данномъ году отличался довольно ровной и сравнительно теплой и сухой погодой; почвенный термометръ на глубинъ 0,25 м. спускался ниже нуля тольковъ течени пяти дней: 16, 17, 18, 30 и 31-го января.

Февраль. Барометрическое давленіе 722,5 мм. почти равно нормѣ. Средняя температура воздуха (1,9°) на 1,1° выше нормальнаго. Количество осадковъ 12,5 м. (тогда, какъ нормальное коли-

чество за февраль 17,1 м.); выпали они въ теченіе 8 дней, изъ нихъ со снъ́гомъ было только 3 дня. Средняя относительная влажность (по гигрометру) 81% на 3% выше нормальной; облачность (59%) на 2% ниже нормы.

Самымъ холоднымъ днемъ мѣсяца было 1-е число, когда темпер. воздуха упала до—11,5°, а самыми теплыми днями были 22, 27, 28-е (со средней температурой 8,6°; 8,7°; и 9,8°). Безъ мороза было 10 дней. Температура на поверхности почвы была слѣдующая:

Средняя						3U	5,3°	
Максимумъ	1.1		T.g				28,6° (28-го)	
Минимумъ.	11	16.0	M.F	o'i	in a		$-14.6^{\circ}$ (1-r0)	


Какъ и въ январъ преобладали восточные вътры, сумма скоростей которыхъ 74, тогда, какъ сумма скоростей всъхъ остальныхъ только 35. Разбивъ общую сумму скоростей 71 на четыре главныя группы, получимъ, что на долю:

Восточныхъ	вѣтровъ	сумма	скоростей	ii.	74
Западныхъ	and "	27	<b>))</b>		19
ахынжО	on i comi.	ė . <sub>11</sub>	,		15
Сѣверныхъ	"	"	,,		1


Нужно замътить, что большая часть февраля мъсяца ничъмъ не отличалась отъ предшествующаго ему января, т. е. все время держалась довольно равномърная и сухая погода, и только въ послъдней четверти мъсяца температура ръзко начала повышаться, и начало сказываться приближеніе весны. Почва промерзла до глубины 0,25 м. и (лишь постепенно) послъ 5-го февраля стала согръваться. Согръваніе почвы особенно интенсивно началось съ 22-го числа, когда на глубинъ 0,25 м. температура достигла уже 4,4° и къ концу мъсяца поднялась до 8,1°. И это несмотря на постоянныя опусканія ниже нуля минимальнаго термометра на поверхности почвы.

Мартъ. Среднее барометрическое давленіе (718,7 мм.) на 2,8 м. ниже нормальнаго. Средняя т. воздуха (8,1°) почти равна норм(7,3°). Дней съ морозомъ было 5 (въ начал(7,3°)). В второй половины м(7,3°), при этомъ температура не опускалась ниже — 2,1°. Максимумъ температуры воздуха (20,2°) наблюдался 28-го числа. Температура на поверхности почвы была сл(7,3°) сл(7,3°) наблюдался 28-го числа.


### Барометрическое давленіе.



### Температура воздуха.



# Относительная влажность по гигрометру.



Средняя.		1.	10.10			$11,2^{\circ}$
Максимумъ	:					34,5° (8-го)
Минимумъ				1.		— 4,7° (20-го)

Средняя относительная влажность (по гигрометру 77%) такъ же, какт и облачность (62%), почти равны нормальной (76 и 63), но тъмъ не менъе количество выпавшихъ осадковъ за мъсяцъ (15,6 мм.) почти въ три раза ниже нормальнаго количества (41,4 м.).

Всего съ осадками было 5 дней, изъ нихъ 2 со снѣгомъ. Изъ вѣтровъ преобладали западные; общая сумма скоростей вѣтровъ за мартъ мѣсяцъ (104) распредѣляется по группамъ слѣдующимъ образомъ:

Западные в	вфтры					11.0	55
Восточные	"	•					24
Сѣверные	,,						18
Южные	,,						7

Весь мѣсяцъ стояла довольно ровная, теплая и сравнительно сухая погода, при средней суточной температурѣ около 10—12°, только въ началѣ второй половины мѣсяца она рѣзко упала до 0,9°, но затѣмъ стала опять медленно подниматься и достигла своего максимума (13,5°) 31-го числа. Почва прогрѣлась къ концу мѣсяца на глубинѣ 0,25 м. до 11,4°.

Апрѣль. Барометрическое давленіе (718,5 мм.) равно нормальному. Средняя температура мѣсяца (15,4°) такъ же почти равна нормѣ (15,0°). Дней со снѣгомъ было только 1. Всего осадковъ за 6 дней, въ которые они наблюдались, выпало 26,1 мм., при нормальномъ количествѣ для апрѣля мѣсяца въ 27,4 мм. Относительная влажность по психометру = 70%, облачность (55%) приблизительно равны нормѣ. Минимальная температура воздуха (—1,0°) была 4-го числа, и послѣ 4-го минимальный термометръ въ воздухѣ не опускался ниже нуля; максимальная температура воздуха 33,5° наблюдалась 15-го числа. На поверхности почвы наблюдалась слѣдующая температура:

Средняя.	-			19,8°
Максимумъ				<b>51</b> ,0° (15-го)
Минимумъ.				— 3.2° (4-го)

Послъдній заморозокъ на поверхности почвы (—0,5°) былъ 6-го. Изъ вътровъ преобладали западные; по суммъ скоростей они распредълялись слъдующимъ образомъ:

Западные и	вфтры									53
Восточные	"	LUU	PLON.	451.0				GIUI:	HO.	17
Сѣверные	"				100	AG)			•	19
Южные	22			11.0		H-P	1,17	•	EAN BC	27

Подведя итоги за весь мъсяцъ, можно замътить, что апръль въ текущемъ 1911-мъ году ближе всъхъ другихъ мъсяцевъ подходитъ по своимъ метеорологическимъ условіямъ къ нормальному. Морозы прекратились въ началъ мъсяца, затъмъ установилась довольно теплая и ровная погода, благопріятствовавшая развитію озимыхъ и яровыхъ хлъбовъ. Въ апрълъ начались посъвы хлопчатника. Почва на глубинъ 0,25 м. къ 10 апрълю достигла уже 15. Въ концъ апръля пошли дожди, температура упала, развитіе произведенныхъ посъвовъ задержалось, много посъвовъ погибло подъ образовавшеюся послъ дождя коркою.


Май. Барометрическое давленіе 716,7 мм. на 1,1 мм. ниже нормальнаго. Средняя температура воздуха за май (22,1°) на 1,2° выше нормы. Температура на поверхности почвы:

Средняя	organia.			6.	29,0°	
Максимальная		•			63,0°	$(29-\Gamma 0)$
Минимальная	•				3,9°	(10-го)

Средняя относительная влажность по гигрометру (53%) выше нормальной на 10%, облачность 35% ниже нормы на 17%, количество осадковъ (10,0 мм.) въ два съ половиною раза меньше нормальнаго (26,1). Всего дней съ осадками было пять. Обиліемъ вътровъ май настоящаго года напоминаетъ май прошлаго года; въ теченіи всего мъсяца только 22 раза отмъчено знакомъ «тихо»; преобладали вътры южные и восточные. Сумма скоростей всъхъ вътровъ (210) раздъляется по группамъ слъдующимъ образомъ:

Западные п	вѣтры							58
Восточные	,,					H.B.		59
Сѣверные	"			• •	T.		103	28
Южные	"				di b	fуn	U.E	65

# Сумма среднихъ температуръ за вегетаціонный періодъ хлопчатника.



Продолжительность безморознаго періода.



Максимальная температура воздуха въ мав наблюдалась 30-го числа и достигла 37,5°, въ этотъ же день достигла максимума и средняя суточная температура 29,6°. Абсолютный минимумъ (4,8°) наблюдался 10-го. Почва на глубинв 0,25 м., постепенно прогръваясь, съ средней температурой 21,5°, достигла къ концу мъсяца 28,3°. Май отчетнаго года характеризовался сравнительно ясной, сухой и жаркой погодой, очень благопріятно отразившейся на ростъ хлопчатника.

Іюнь. Барометрическое давленіе 713,7 мм., такъ же, какъ и въ маѣ, ниже нормальнаго (714,6 мм.). Средняя температура мѣсяца 26,9° на 2,0° выше нормы. Максимальная температура (39,6°) была 25-го, а минимальная (13,0°) 21-го. На поверхности почвы наблюдалась слѣдующая температура:

Средняя .					35,7°	
Максимумъ					66,5°	$(3-\Gamma 0)$
Минимумъ					11,5°	$(22-\Gamma 0)$

Всего въ теченіе всего м'всяца было только два дня съ осадками и выпало  $2,5\,$  мм., т. е. почти въ пять разъ ниже нормальнаго количества (13,7 мм.).

Средняя относительная влажность (по гигрометру 59%) близка къ нормѣ 56%, но средняя влажность (29%) на 11% ниже нормальной. Сумма скоростей вѣтровъ для срочныхъ наблюденій равнялась 115, при чемъ преобладаютъ вѣтры сѣверные и южные, по группамъ же они распредѣляются такъ:

Сѣверные	вѣтры			•			• 1	55
Южные	,,							47
Восточные	"	•						9
Западные	,,							4

Въ общемъ іюнь отличался довольно жаркой и сухой погодой, оказавшейся очень благопріятной для культуры хлопка, такъ какъ въ это время хлопокъ наиболъе нуждается въ теплъ.

Почвенный термометръ на глубин<br/>ъ 0,25 м. ниже 28° не спускался.

Іюль. Барометрическое давленіе (712,8 мм.) почти равно нормальному (712,3 мм.). Средняя температура мѣсяца (26,1°) также почти равна нормѣ (26,2°). Максимальная температура

воздуха (37,0°) была ниже максимума предшествовавшихъ мѣсяцевъ и наблюдалась 28-го числа, минимальная ниже 14,9° не опускалась. На поверхности почвы была слѣдующая температура:

Средняя.	•		71.0	e id			35,6°
Максимумъ		a to		•			63,2°
Минимумъ							15.6°

Вътровъ въ іюлъ было очень мало; сумма скоростей ихъ (59) распредъляется по группамъ такъ:

Южные	вътры.		•	•		•			31
Западные	n	16.01			ior				12
Восточные	, ,								10
Сѣверные	,,								6

Относительная влажность по гигрометру (68%) превышаеть норму на 9%. Средняя облачность (22%) на 8% ниже пормальной. Число дней съ осадками 3, при чемъ выпало 4,9 мм.,— на 2,8 мм. меньше нормы. Вообще же іюль мѣсяцъ текущаго 1911-го года по своей средней температурѣ и другимъ метеорологическимъ условіямъ приближался къ нормѣ и былъ довольно благопріятенъ для развитія хлопчатника. Средняя температура почвы на глубинѣ 0,25 м. была  $28,7^{\circ}$ , на глубинѣ  $0,5-28,1^{\circ}$ .

Августъ. Барометрическое давленіе (713,0 мм.) на 0,9 мм. ниже нормальнаго. Средняя температура (24,3°) почти равна нормъ. Максимальная температура мъсяца (39,8°) наблюдалась 5-го числа; она является максимальной не только для даннаго мъсяца, но и для всего года. Минимальная температура (11,0°) была 30-го числа. Показанія термометровъ на поверхности почвы слъдующія:

Средняя .	101				32,8°
Максимумъ		n:	10.13		61,0° (11-го)
Минимумъ					10,0° (31-го)

Средняя относительная влажность (по гигрометру 71%) на 12% выше нормальной, а средняя облачность (22%) равна нормъ. Съ осадками въ августъ былъ только одинъ день и выпало

ихъ всего 0,6 мм., что въ шесть разъ меньше обычнаго для августа количества. Вътровъ было довольно много; сумма скоростей ихъ (76) распредъляется по группамъ слъдующимъ образомъ:

Западные	вѣтры					 19
Южные	,,					39
Восточные	,,					12
Сѣверные	,,					6

Вообще августь мѣсяць отличался чрезвычайно ясной и жаркой погодой, способствовавшей быстрому созрѣванію хлопчатника; средняя температура почвеннаго термометра за мѣсяць на глубинѣ 0,25 м. опустилась до 28,4°.

Сентябрь. Барометрическое давленіе (717,1 мм.) такъ же, какъ и средняя температура мѣсяца (19,5°), почти равны нормальному. Максимальная температура (34,0°) наблюдалась 10-го числа, а минимальная (5,0°) 27-го числа. На поверхности почвы показанія термометра были слѣдующія:

Средняя				$24,6^{\circ}$
Максимальная				54,7° (10-го).
Минимальная				5,9° (30-го)

Облачность (26%) почти равна нормальной (25%), количество осадковъ — 7,7 мм. на 3,3 мм. выше нормальнаго. Дней съ осадками — 3. Сумма скоростей вътровъ (71) распредъляется по группамъ слъдующимъ образомъ:

Южные	вѣтры					4.4			36
Западные	,,	di.a	ġ.	 10.0	W.D	d.	0.0	9.5	18
Восточные	,,				RH				18
Сѣверные	,,								7

Въ общемъ сентябрь былъ довольно ясный, сухой и теплый; почва, начавъ охлаждаться еще въ концѣ августа, охладилась въ концѣ сентября на глубинѣ 0,25 ниже 18°.

Октябрь. Барометрическое давленіе (723,5 мм.) выше нормы на 0,8 мм. Средняя температура воздуха (8,6°) на 2,9° ниже нормальной для даннаго мъсяца. Самымъ холоднымъ днемъ

мъсяца было 29-е число, когда средняя температура воздуха равнялась 3,6°, а минимумъ — 1,5°; это былъ первый осенній заморозокъ. Максимальная температура (24,4°) наблюдалась 12-го. Термометры на поверхности почвы дали слъдующія показанія:

Средняя темп.				ug	11,6°	
Максимальная.	•				$38,7^{\circ}$	(17 <b>-</b> го)
Минимальная .					3,5°	(31-го)

Средняя относительная влажность по гигрометру (85%) на 10% больше нормальной. Средняя облачность (43%) равна нормъ. Осадковъ въ теченіе мъсяца выпало 76,9 мм., что равно одной трети всего годового количества осадковъ и на 50,1 мм. больше нормальнаго количества для октября; максимумъ осадковъ за день (43,3) выпалъ 21 октября.


Количество вътровъ было среднее. Сумма скоростей ихъ 68; замъчается нъкоторое преобладаніе южныхъ вътровъ надъ другими:


Западные в	вадта						19
Восточные	"						9
Южные	,,						23
Сѣверные					anata.		17

Октябрь текущаго года отличался довольно низкой температурой воздуха, и необыкновенно обильнымъ количествомъ осадковъ, особенно во второй половинъ мъсяца, а средняя температура почвеннаго термометра на глубинъ 0,25 м. опустилась въ этомъ мъсяцъ до 12,7°.

Ноябрь. Барометрическое давленіе (725,4 мм.) на 1,5 мм. выше нормальнаго. Средняя мъсячная температура (3,2°) въ два раза ниже нормы (6,4°). Максимальная температура воздуха (17,4°) наблюдалась 5-го числа, а минимальная (—11,9°) 29-го. Всего съ морозами было 19 дней; на поверхности почвы наблюдалась слъдующая температура:

Средняя .				$3,9^{\circ}$
Максимумъ	1271	Eos Jay	5 II	25,5° (5·го)
Минимумъ	DE LA M	A TORNE	A .	11.1° (29 го)





Относительная влажность (86%) на 6% выше нормы, а облачность (41%) на 11% ниже нормальной для даннаго мъсяца, но количество дней съ осадками было больше — 22 дня, осадковъ же выпало только 27,4 мм. или на 27 мм. меньше нормальнаго количества. Со снъгомъ былъ только одинъ день. Вътровъ довольно мало. Сумма скоростей ихъ, распредъленная по группамъ, — слъдующая:

Западные	вѣтры				•		•		16	
Восточные	,,				•				9	
Съверные	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1.					9	
Южные	613 g (71)	n,	'n.					W.H	10	

Вообще ноябрь отличался очень холодной и сырой погодой; средняя температура почвы на глубин $^{\circ}$  0,25 м. опустилась до 5,3°.

Декабрь. Барометрическое давленіе (726,1 мм.) выше нормы на 1,3 мм. Средняя температура мѣсяца (— 0,4°) на 1,2° пиже нормальной. Минимумъ въ воздухѣ (— 18,9°) наблюдался 24-го числа, а максимумъ (6,9°) 30-го. Температура на поверхности почвы слѣдующая:

Средняя .				$1,6^{\circ}$	
Максимумъ				8,0°	(6-ro)
Минимумъ.				-11,4°	(25-ro)

Средняя относительная влажность по гигрометру (87%) на 5% выше нормы, облачность (75%) на 13% выше нормы.

Количество дней съ осадками 7, въ теченіе которыхъ выпало 29,7 мм., т. е. на 11,8 больше нормальнаго количества.

Число дней со снъ́гомъ 4. Изъ въ́тровъ преобладали восточные, сумма скоростей которыхъ (30) почти равна всему остальному количеству (27); распредъ́ляются они по группамъ такъ:

Восточные	вѣтры						•	30
Западные	,,			•	•		ı.	5
Южные	"							12
Сѣверные	анда 18	11.				a.		10

Декабрь отчетнаго года необыкновенно суровый и насмурный; таяніе снѣга было незначительно, снѣжный покровъ держался очень долго. Температура почвы на глубинѣ 0,25 м. опустилась въ концѣ декабря до 0,3°, но въ среднемъ была все же +1,0° и ниже нуля не опускалась.

Характеризуя метеорологическія условія 1911 года, слідуеть отмътить, что первая половина года отличалась довольно высокой температурой, значительно превышающей нормальную; слъдующіе три мъсяца (іюль, августь, сентябрь) были нормальными, и только последняя четверть года (октябрь, ноябрь и декабрь) отличалась холодами и сырою погодой. Для культуры хлопчатника почти все время имълись на лицо благопріятныя условія, при чемъ особенно удачнымъ можно считать весенній и лътній ходъ облачности. Урожай хлопчатника былъ выше средняго; наступившіе въ октябр'в холода и дожди причинили мало вреда, такъ какъ отъ нихъ пострадали только послъдніе малоцънные сборы хлопка. Вегетаціонный безморозный періодъ въ текущемъ году, какъ и въ предшествовавшемъ, длился 205 дней, но сумма среднихъ температуръ за вегетаціонный безморозный періодъ этого года была немного ниже по сравненію съ прошлымъ годомъ. Болъе подробныя данныя въ отношении метеорологическихъ условій текущаго года приводятся въ таблицахъ №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

#### Хлопчатникъ.

Опыты съ удобреніями. Опыты по изученію вліянія на урожай хлопчатника различныхъ удобреній и времени ихъ внесенія производились на двухъ участкахъ: на одномъ участкѣ № 3 этими опытами заняты были четыре дѣлянки, площадью 220 кв. саж. каждая; на первую былъ внесенъ навозъ въ количествѣ 2400 пуд. на десятину (22 марта) и сейчасъ же запаханъ, на вторую — мясокостная мука, въ разбросъ, въ количествѣ 25 пуд. на десятину — до предпосѣвной вспашки; на третью дѣлянку — мясокостная мука, въ томъ же количествѣ, была внесена рядовою сѣялкою передъ самымъ посѣвомъ хлопчатника; наконецъ, четвертая дѣлянка оставлена контрольной Посѣвъ повсюду былъ произведенъ 21 апрѣля (сортомъ Аунсъ

Болъ) съялкою Баннера по ровному полю. Предварительныя работы состояли въ одной осенней вспашкъ и двухъ весеннихъ, при чемъ вторая— она же и предпосъвная— произведена послъ поливки; кромъ того производилось частичное выравниваніе площади кетменями и боронованіе Сакковской бороной «Зигзагъ» и французской бороною-каткомъ.

Всходы появились на всѣхъ дѣлянкахъ на 7-ой, 8-ой день, при чемъ въ появленіи ихъ не было большой разницы между отдѣльными дѣлянками, но все же дѣлянка, удобренная мясокостной мукой передъ посѣвомъ въ ряды (по маркеру), отличалась плохими всходами; видимо таковые страдали отъ концентраціи удобренія.

При прорывкъ оставлялось по три растенія въ гнъздъ съ разстояніемъ между послъдними въ 8—10 вершковъ; ширина междурядій, въ среднемъ, равнялась 1 арш. 4 вершкамъ.

За весь вегетаціонный періодъ хлопчатнику дано семь поливокъ, шесть конныхъ пропашекъ культиваторомъ и два ручныхъ мотыженія кетменями. Въ періодъ появленія бутоновъ вліяніе удобреній стало обнаруживаться особенно опредѣленно; дѣлянка съ навознымъ удобреніемъ выдѣлялась болѣе энергичнымъ развитіемъ бутоновъ, она рѣзко отличалась отъ другихъ большею высотою растеній, лучшимъ развитіемъ боковыхъ вѣтвей и листовой поверхности. 15 іюня растенія на дѣлянкѣ съ навознымъ удобреніемъ достигали высоты 8 вершковъ, и нѣкоторыя изъ нихъ имѣли до 15 бутоновъ; растенія на другихъ дѣлянкахъ не превышали 6—7 вершковъ и не имѣли болѣе 10 бутоновъ.

- 24 іюня (началось цвѣтеніе, при чемъ на дѣлянкѣ съ навознымъ удобреніемъ оно было сильнѣе, чѣмъ на другихъ; въ концѣ іюля на всѣхъ дѣлянкахъ было замѣчено опаденіе бутоновъ и завязей.
- 3 и 5 августа начали раскрываться первыя коробочки на дѣлянкѣ, удобренной навозомъ и мясокостной мукой (передъ вспашкой), а 6-го и на всѣхъ остальныхъ дѣлянкахъ. 7 сентября, для точнаго выясненія вліянія удобреній на развитіе хлопчатника, были произведены измѣренія 85 растеній, характеризующихъ каждую дѣлянку; на этихъ растеніяхъ подсчитаны бутоны, цвѣты и коробочки; результаты приведены вътаблицѣ № 7.

### Сводная таблица метеорологи

### ческихъ данныхъ за 1911 годъ.

Табл. № 1.

i uz postantila — Internacional dispersi	рич.	Тем	перат	ypa	воздуха.		Злаж	ност	ь.		Поч	вен	ныя		тем	пер	ату	ры.		OCTE.	1	Ч	ис.	1 0	дн	е й.	T		Мор	03Ъ.	ete (a.	возд. ріодъ 7 тер- ѣ.	возд. ріодъ эмом. эчвы.
мъсяцы.	барометрич.	pick.	A.	бсол	нопой	-009		тнос По	ит. ги-	H a	пов	ерхн	ости		поч	вы.		азлич убина	хъ.	6лачно		ами.		XB.	MA T	роза		адковъ	-нәәо	i Be-	тельно період	ин. тем. іон. пер льному в будк	ил. тем. Іон. пер Іьн. тер ости п
ж в си ц ы.	Среднее б давленіе.	Средняя.	Макси-	Число.	Мини- мумъ. Число.	Средняя а	Средняя.	Среди.	Меним	7	1	9	Средняя.	•	Макси- мумъ.	Мини- мумъ.	0,25 ме- тровъ.	0,5 метр.	1,0 метр.		Затишье.	Съ осадками.	Ясныхъ.	Пасмурныхъ.	Въ будкъ.	земли.	CO CHB-	Сумма оса	Первый ос ній.	Посл'вдній сенній.	Продолжительность безморозн. періода.	Сумма сред за вегетаці по минима мометру в	Сумма сред за вегетаці по минимал на поверхн
Январь	721,0	-1,3	14,5	18	16,1 28	3 :_		84	47	-3,2	4,7	-2,4	-0,3		15,9	13,5	1,0	2,3	9,1	82	37	8	1	21	29	31	7	9,8	_		_	_	
Февраль	722,5	1,9	18,4	22	-11,5			81	50	-2,4	14,2	4,0	5,3		28,6	14,6	2,4	2,9	8,6	59	28	8	4	10	18	25	.3	12,5			_	_	
Мартъ `	718,7	8,1	20,5	22	- 2,1 19	6,	3 79	9 77	30	4,5	23,7	5,3	11,2		34.0	- 4,7	8,9	8,7	- 1	62	45	5	5	13	5	13	2	15,6	_		_	- 4 n.n.o	ing-s
Апръль	718,5	15,4	33,5	15	- 1,0 4	8,	8 70	) -		11,6	35,6	12,3	19,8		51,5	- 3,2	15,9	14,9	15,1	55	25	6	7	9	2	4	1	26,1	_	6	_	-	191 <u>34</u>
Май	716,7	22,1	37,5	30	4,8 10	11,	9 6	1 53	27	21,6	47,2	18,3	29,0		63,0	3,9	22,4	20,8	17,4	35	22	5	13	4	_ .			10,0	-	_	-	-	00 <del>-</del> 1
Іюнь	713,7	26,9	39,6	29	13,0 21	13,	55	2 59	32	27,7	57,2	22,1	35,7	-	66,5	11,5	29,3	27,2	23,2	29	27	2	15	2	- -	-	-	2,5	1	-	_	-	aus i
Іюль	712,8	26,1	37,2	28	14,9	15,	6	4 68	20	25,2	58,8	22,8	35,6	-	63,2	15,6	30,0	28,1	24,9	22	48	3	18	1	_		-	4,9	_		-	-	-
Августъ	713,0	24,3	39,5	5	11,0 30	15,	0 69	71	39	21,7	56,6	20,0	32,8		61,0	10,0	28,3	27,3	25,3	22	49	1	18	2	_			0,6	_		_		-
Сентябрь	717,1	19,5	34,0	10	5,0 27	-		225	2015	15,0	43,9	15,0	24,6		54,7	5,9	22,8	23,3	23,0	26	50	3	17	3	_ .	-		7,7	-			-	_
Октябрь	723,5	9,6	24,4	12	- 1,5 29	7,	8	85	32	5,6	22,0	7,1	11,6		38,7	— 3,5	12,8	14,4	17,0	43	47	10	13	9	3	3		76,9	29	_	-	-	10.2
Ноябрь	725,4	3,2	17,4	5	-11,9 29	6,	2 83	86	40	-4,0	13,8	1,5	3,8		25,5	-10,1	5,3	7,3	11,2	41	54	22	10	6	19	24	1	27,4	-	_	-	<del>ag</del> a a	1391
Декабрь	726,1	-0,4	6,9	30	-18,9 24	-	-	87	50	-3,5	2,7	- 2,8	-1,2		9,0	11,4	1,0	2,5	6,2	75	44	7	3	19	31	31	4	29,7	-	-	-	400	eat)
Сумма		_				1 4 5 E		-	-		000				-	_	-	-	_		-	80	124	99 1	.07	.31	18 2	223,7		-	205	4381,1	4353,1
Средняя за годъ.	719,1	12,9				10.18	-	75	36	10,0	31,7	10,3	17,3	1	-	-	15,0	14,9	16,4	46	40	-					-	_	—	-		-	-
Абсолютная за годъ	(2 1817 p		39,8		-18,9				20	10.6 10.80			_		66,5	14,6	s —		_	_	_				-	-	-	_		-	7110		
Средняя годовая за 5-лътіе	719,8	12,7	1363					70			(1	_	16,2			_	14,5	14,6	15,7	-	-	77	96 1	05 1	06 1	120	18	245,3	_	-	212	4402,1	4366,0
Абсолютная за 5 лѣтъ	107,896 6		40,2		23,9				<u> </u>	garda Orress	BATT BATT	-			66,5	20,5	-				-			_			-				-	-	-

Повторяемость вът ровъ за 1911 годъ.

Табл. № 2.

						va z l	101	18.80	110	BIO	pher	100		D D I	Po	ВР	oa	1711	10,	дъ.										aon.	0 1-	~.
	1	N	NI	NE	N	E	E	NE		E	Е	SE	S	E	S	SE	,	S	SS	SW-	S	W	W	SW	EOH.	W	Wi	NW	N	W	NI	NW
мъсяцы.	Повторяемость.	Сумма скоростей.	Повторяемость.	Сумма скоростей	Повторяемость.	Сумма скоростей.	Повторяемость.	Сумма екоростей.	Повторяемость.	Сумма екоростей.	Повторяемость.	Сумма скоростей.	Повторяемость.	Сумма скоростей.	Повторяемость.	Сумма скоростей.	Повторяемость.	Потооподо виму														
Январь	_			18 3	San		1	1	13	21	5	7	3	5		122	3	5	4	4	4	6	6	10	14	16	_	_	2	. 2		
Ревраль	_		_				5	7	21	42	11	25	4	_	1	3	3	, 5	1	3	2	4	4	4	6	12	1	3	1	1		891
артъ	_		4	6	2	4	-		12	24	_	_	1	1			1	1	_		1	5	11	23	8	26	2	6	3	7	1	
прёль	4	5	2	6	4	6	3	3	13	13	1	1	1	1	1	5	1	1	2	2	12	18	6	16	8	24	5	13	1	1	1	
a#	1	2	1	1	2	2	9	15	18	43	1	1	1	1	2	5	2	2	3	24	6	33	3	13	8	35	. 6	10	5	20	1	
онь	3	10	8	32	1	1	-		11	9	- -		8	8	6	8	2	2	6	11	7	18	_		3	4	- I	_	5	7	3	
оль	2	2	2	3	-		_		6	10			_	-	-	-	3	5	11	14	7	12	_	-	9	12	3	6	1	1	_	-
вгусть				-	1	1	. 9	10		-	2	2	1	4	2.753.	-	2	3	10	16	2	16	1	2	11	16	1	1	3	4	1	
ентябрь	1	1	1	1	1	1			4	4	3	6	-	_	2	2	-	-	13	16	3	18	1	3	6	13	1	2	T TOR	-	4	
ктябрь		3.5	4	5	3	4			6	7	2	2	3	3	3	5	-		6	11	4	4	-	-	9	18	1	1	1	1	4	
оябрь	2	2	4	6	1	1	-	01 10	8	9	-	-	1	1	2	2	1	1	6	6	-	-	-	-	11	16	-	-	-	-	- 1 B1	-
екабрь	1	1	2	4	.4	4		-	23	28	2	2	-	-	2	2	. 1	1	9	9	-	-	-		4	5		-		-	1	
того за годъ	14	23	28	64	19	24	27	36	135	172	27	46	19	24	19	32	19	26	71	116	48	134	32	71	97	197	20	42	22	44	16	2
редняя скорость въ метрахъ	_	1,6		2,29	÷	1,26		1,3		1,27	1	1,7		1,26		1,68		1,37		1,63	_	2,79	-	22	_	2,0		2,1	-	2,2		1

Табл. № 3.

# Сводная таблица метеорологическихъ данныхъ за последнее пятилетіе.

	Tex	перал			верхн	ости	Абс			макси		на		Абсо.		мини	100						пера	тур	a I	ıa p	a 3 J	пч	ных	ъ	луб	бина	а х ъ.			
			110	чвы.				пове	рност	ги по	чвы.				новер	хности	почвы.				0,25	метр.					0.5	иетр.					1,0	метр.		
мъсяца.		Γ	0	Д	Ы.			Г	0	Д	Ы.					Γ 0	д ь	I.		I	0	ДІ	Ы.			Г	0	Д	Ы.			Г	0	Д	Ы.	
	1907	1908	1909	1910	1911	Средн. за 5 л.	1907	1908	6061	1910	1911	Средн. за 5 л.	1907	1908	1909	1910	1911	Средн. за 5 л.	1907	1908	1909	1910	1911	Средн.	1907	1908	1909	1910	11911	Средн.	1907	1908	1909	1910	11611	Средн.
Январь	_	0,1	_3,1	1,8	_0,3	_0,4	ļ.	11,0	12,0	24,9	15,9	15,9		-13,4	-15,6	<b>11,</b> 5	-13,5	13,5		1,3	-0,3	2,3	1,0	1,0	_	2,3	1,0	3,7	2,3	2,3	_	5,3	4,6	9,9	9,1	1 '
Февраль		6,0	2,3	5,0	5,3	4,6	_	22,0	22,0	25,9	28,6	24,6		-15,9	- 17,2	- 7,9	-14,6	-13,9		1,1	0,4	4,4	2,4	2,1		2,0	1,0	5,1	2,9	2,7		4,2	3,4	10,4	8,6	3
Мартъ		8,9	10,5	8,2	11,2	9,7	_	41,7	35,5	32,6	34,0	35,9		-11,4	- 5,5	- 7,2	- 4,7	- 7,2	-	6,0	8,0	7,1	8,9	7,5	-	5,6	7,5	7,0	8,7	7,2	-	5,7	7,1	11,7	-	
Апръль	_	18,0	19,3	19,4	19,8	19,2	_	50,0	46,5	50,0	51,5	49,5	-	3,0	2,0	- 0,3	- 3,2	0,4		14,3	15,1	13,9	15,9	14,8	-	13,5	14,2	13,1	14,9	13,9	-	11,4	12,3	15,8	15,1	1 1
Іай	-	24,7	24,6	28,9	29,0	26,8	_	54,5	53,0	58,8	63,0	57,6		5,1	0,8	4,0	3,9	3,4		20,4	21,6	21,0	22,4	21,3	7.1	19,1	20,0	20,1	20,8	20,0	7 17 E	12,8	17,0	20,7	17,4	4 1
онь	26,9	30,4	28,6	31,8	35,7	30,7	52,6	62,3	64,3	58,0	66,5	60,8	9,1	8,1	9,0	12,2	11,5	10,0	23,4	23,8	26,2	25;2	29,3	25,6	22,4	22,3	24,7	23,8	27,2	24,1	19,6	19,1	21,4	24,3	23,2	2 5
оль	27,1	35,1	30,9	34,1	35,6	32,6	59,6	64,0	61,0	59,7	63,2	61,5	12,6	12,6	11,5	10,5	15,6	12,6	26,2	27,9	28,2	30,6	30,0	28,6	24,2	26,9	27,0	29,0	28,1	27,0	21,8	23,2	24,1	28,9	24,9	9
вгустъ	27,5	29,8	26,1	30,7	32,8	29,4	53,3	60,0	56,2	57,0	61,0	57,5	9,6	7,1	11,0	9,3	10,0	9,4	24,6	27,2	25,1	30,5	28,3	27,1	24,6	26,6	25,5	29,9	27,3	26,8	22,9	24,5	24,9	31,3	25,3	3
ентябрь	21,2	23,0	19,8	23,7	24,6	22,5	50,6	53,2	50,5	52,0	54,7	52,2	4,6	2,0	3,0	3,8	5,9	3,9	21,1	22,0	20,5	24,3	22,8	22,1	21,5	22,6	21,2	24,7	23,3	22,7	21,3	22,1	21,3	28,4	23,0	0
ктябрь	13,1	12,8	12,2	13,3	11,6	12,6	<b>42,</b> 2	47,5			38,7	42,8	-6,5	- 6,4	- 7,0	- 5,5	- 3,5	- 5,8	13,8	13,6	14,7	16,0	12,8	14,1	15,1	14,9	16,1	17,4	14,4	15,6	17,1	17,2	18,7	23,4	17,0	0
Іоябрь	6,9	6,2	7,1	5,5	3,8	5,9	37,5	30,5	_		25,5	31,2	-7,1	- 6,9	- 0,9	-14,8	-10,1	- 7,9	8,0	7,5	9,2	7,5	5,3	7,5	9,3	9,0	10,6	9,9	7,3	9,2	12,5	12,1	13,7	17,8	11,2	2
екабрь	0,7	0,4	0,5	3 4	-1,2	0,8	18,0	20,5			9,0	15,8	_9,0	- 8,4	- 9,5	-20,5	-11,4	11,7	2,8	2,8	3,2	-0,5	1,6	1,9	4,4	4,4	5,2	1,7	2,5	3,6	8,1	7,9	11,4	10,8	6,2	2
редняя го- довая		16,3	16,9	17,1	17,3	16,2				_		_		2 <u>1</u> 6		_			_	13,5	14,3	15,2	15,0	14,5		14,1	14,5	15,4	14,9	14,6	_	13,8	15,0	19,4	16,4	4 1
Эр. за 5 л.	_			-	-	-	_	-		-	_			_				-		-	-				-	-		-1	_	_	-	1 03		-23	-	
Абсолютн.за 5 лътъ			_		_	_	<u>.</u>			_		66,5		8,14,19		_	-	20,5	_				1352 1626 1738	T OM		_	863		_		_				_	

*Табл. № 7.* Опыты съ удобреніями (уч. **№** 3).

grad (i.i.)	Высота растеній въ вершкахъ.	Длина боковыхъ вътвей въ верш.	Вутоновъ.	Цвѣтовъ. П	Зеленыхъ ко-	Раскрытыхъ коробочекъ.	Число изслѣдо- ванныхъ растен.	Время под-
Навозн. удобреніе Мясокостная	16,8	3,1	0,6	0,3	11,3	2,3	85	7 сентября
мука передъ вспашкой Мясокостная мука передъ	17,0	3,5	0,3	0,15	8,9	2,7	85	8 сентября
посъвомъ Контрольная .	14,6 15,1	$^{2,7}_{2,5}$	0,25 0,05	0,08 0,5	9,8 8,8	1,7 1,5	72 66	9 сентября 9 сентября

Выводы изъ нея слѣдующіе: наибольшимъ ростомъ отличались растенія на дѣлянкахъ съ навознымъ удобреніемъ и мясокостной мукой, внесенной передъ вспашкой, но дѣлянка, удобренная навозомъ, по числу зеленыхъ коробочекъ на растеніяхъ, по числу цвѣтовъ и бутоновъ, превосходила получившую мясокостную муку; дѣлянки, удобренныя мясокостной мукой передъ вспашкой и передъ посѣвомъ, почти одинаковы; болѣе раннее внесеніе мясокостной муки слабо отразилось на ростѣ растеній и числѣ созрѣвшихъ коробочекъ; дѣлянка съ мясокостной мукой, внесенной передъ вспашкой, дала болѣе мощныя растенія и большее число раскрытыхъ коробочекъ; итоги урожаєвъ на десятину по сборамъ даетъ таблица № 8:

Tабл. № 8. Опыты еъ удобреніями (уч. **№** 3).

№№ дѣля- нокъ.	I co	боръ.	II c	боръ.	III c	боръ.	Итого сяти		9.1 9.3 solo- Charles 953
	п.	Φ.	п.	Φ.	п.	Φ.	π.	• Ф.	
4	64	10	59	38	34	3	157	11	Навозъ 2400 пудовъ.
5	44	6	49	1	43	25	136	32	Мясокостная мука передъ вспашкой.
6	37	8	42	26	56	-	135	. 34	Мясокостная мука пе- редъ посъвомъ.
7	19	27	34	13	50	22	104	22	Контрольная.

Таблица показываеть, что высшій урожай (158 пуд. на десятину) получился съ дълянки, удобренной навозомъ; контрольная дала только 104 пуда на десятину, мясокостная мука повысила сборъ на 31 пудъ (136 пудовъ на десятину).

Время внесенія мясокостной муки въ итогѣ почти не вліяеть на урожай хлопчатника, но внесеніе мясокостной муки передъ вспашкой дало превышеніе 1-го и 2-го сборовъ на 14 пудовъ. Отсюда можно сдѣлать выводъ, что рентабельнѣе вносить мясокостную муку передъ вспашкой.

Нъкоторую разницу въ урожаяхъ слъдуетъ отнести и на особенности орошенія дълянокъ. Дъло въ томъ, что нижнія части послъднихъ заливались больше, чъмъ верхнія; вода въ нихъ долго застаивалась и сильно промачивала почву.

Если подсчитать урожаи отдъльно для нижнихъ и верхнихъ частей дълянокъ, то результаты окажутся слъдующіе:

Въ верхнихъ частяхъ дълянокъ, гдъ вода быстро проходила по арыкамъ, не застаиваясь, цифры урожая таковы:

*Табл. № 9.* Опыты съ удобреніями (уч. № 3).

NeNe Ata.	Площ. въ кв. саж.	I co	боръ.	II c	боръ.	III d	еборъ.	Ит	ого.	
	n spel	п.	Φ.	п.	Φ.	п.	Φ.	п.	Φ.	
4	181,3	83	29	50	$25^{1/2}$	18	$25^{3/4}$	153	1/4	Навозъ 2400 пуд.
5	170	60	28	53	26	17	26	132		Мясокостная мука 25 пуд передъ вспашкой.
6	170	48	-	51	28	28	231/2	128	l 1 <sup>1</sup> /2	Мясокостная мука 25 пуд- передъ посѣвомъ.
7	192,6	24	19	42	27	21	9	88	15	Контрольная.

Нижнія же части д'влянокъ, гд вода сильно увлажняла гряды, дали сл'вдующіе урожаи:

*Табл. № 10.* Опыты съ удобреніями (уч. **№** 3).

Nene aka.	Площ. въ кв. саж.	I c	боръ.	II e	боръ.	III o	зборъ.	Ито	ого.	п 18 ки пробу далаці кону анкропа пуэрі амитивногу дамиру
	ain	п.	Ф.	п.	Φ.	п.	Φ.	п.	Φ.	r chromas deron bis
13	53,3	42	31	69	11	49	21	161	23	Навозъ.
14	50	27	24	44	16	69	24	141	24	Мясокостная мука пе- редъ вспашкой.
15	50	26	16	33	24	83	16	143	16	Мясокостная мука пе редъ посъвомъ.
16	56,6	14	351/3	25	39	79	351/4	120	$29^{3/4}$	Контрольная.

Обильныя поливки сильно задерживають созрѣваніе хлопчатника, поэтому съ нижнихъ концовъ дѣлянокъ первый сборъ всюду получался чуть не вдвое меньшій, чѣмъ съ верхнихъ частей ихъ; но послѣдующіе сборы съ избыткомъ покрываютъ недоборъ въ первомъ сборѣ.

Вторая серія опытовъ съ хлопковыми жмыхами, суперфосфатомъ, костяной, кровяной и мясокостной мукой и навозомъ была поставлена на участкъ № 15, гдъ было устроено одиннадцать дёлянокъ, площадью 120 кв. саж. каждая; на одну дълянку внесенъ былъ навозъ (въ количествъ 2400 пуд. на десятину), на другую — хлопковые жмыхи (въ количествъ 80 п.), на третью — хлопковые жмыхи (60 пуд.) + двойной суперфосфать (12 пуд.), на четвертую — мясокостная мука (25 пуд.), на пятую костяная мука (25 пуд.) и на шестую — кровяная мука (60 пуд.). Контрольныхъ дълянокъ было пять. Участку даны: одна осенняя вспашка и весенняя предпосъвная (послъ поливки). Послъ боронованія Сакковской бороной «Зигзагъ» и французской, маркеромъ были намъчены ряды посъвовъ хлопчатника, внесены поверхностно вышеуказанный удобренія по нам'вченнымъ рядамъ, и 20 апръля произведенъ посъвъ хлопчатника «Алленъ Кингъ» съялкою Баннера по ровному полю. На седьмой день начали появляться всходы, особенно дружно на дёлянкё, удобренной навозомъ и одними хлопковыми жмыхами, на дълянкъ же удобренной хлопковыми жмыхами съ суперфосфатомъ всходы

были ръдки и съ большими пропусками, требовавшими подсъва, но последній не быль произведень въ виду поздняго времени. 12-го мая дана была первая поливка по небольшимъ бороздамъ, наръзаннымъ культиваторомъ. Въ дальнъйшемъ участокъ получилъ три ручныхъ мотыженія, 5 поливокъ и 5 пропашекъ коннымъ культиваторомъ; при прорывкъ послъ первой поливки оставлялось по 3 растенія въ лункъ съ промежутками въ 12 верш., величина междурядій—1 арш. 4 верш. 22 іюня почти на всвхъ двлянкахъ началось цввтеніе; лишь немного запоздало цвътение на дълянкъ съ мясокостной и кровяной мукой. 10 августа началось созръвание на дълянкъ съ навознымъ удобреніемъ; 13 и 15 августа началось созрѣваніе и на вевхъ остальныхъ двлянкахъ; 26 августа были подсчитаны коробочки на 30-ти типичныхъ растеніяхъ съ каждой дълянки и измърена высота растеній на всъхъ дълянкахъ. Какъ по внъшнему виду растеній, такъ и по числу коробочекъ на нихъ, лучшими оказались дёлянки, удобренныя навозомъ, одними хлопковыми жмыхами и жмыхами съ суперфосфатомъ: на первой изъ нихъ растенія отличались особенно буйнымъ ростомъ и болве темною листвой; на послъдней — обиліемъ коробочекъ, цвътовъ и бутоновъ.

Табл. № 11. Опыты съ удобреніями (уч. № 15).

CONTRACTOR CONTRACTOR  TO STREET CONTRACTOR	Высота ра- стеній въ верш.	Число ко- робоч.	Число цвѣ- товъ и бу- тоновъ.		Время под-
Навозъ 2400 гуд Хлопковые жмыхи	18,1	11,3	0,7	30	26 августа.
80 пуд	16,6	11,9	1,1	30	26 августа.
Хлопк. жм. 60 п.+ дв. суперфосфат. 12 пуд	16,1	13,1	1,5	30	27 августа.
Мясокостная мука 25 пуд	17,2	9,4	0,8	30	27 августа.
Костяная мука 25 пуд	15,1	8,1	0,6	30	27 августа.
Кровяная мука 60 пуд	15,5	9,1	0,5	30	27 августа.

Но сборы не дали тъхъ данныхъ, какихъ можно было ожидать по числу коробочекъ, такъ какъ уже съ появленія веходовъ нъкоторыя дълянки отличались неполнотой и различной густотой стоянія растеній. Полными дружными всходами отличалась дълянка, удобренная навозомъ, — съ нея снятъ наивысшій урожай — 140 пудовъ на десятину за 3 сбора; дълянки съ хлопковыми жмыхами и костяной мукой дали 121 и 120 пудовъ на десятину; далъе, съ дълянки, удобренной мясокостной мукою, собрано 119 пуд. на десятину, кровяною мукою — 114 пуд., и на послъднемъ мъстъ стояла дълянка, удобренная хлопковыми жмыхами съ суперфосфатомъ.

Однако, результаты урожаевь послъдней дълянки требують оговорки. Неполнота стоянія хлопчатника, пустыя мъста, образовавшіяся послъ гибели нъкоторыхъ растеній, слабое развитіе кустовъ, вынуждавшее при прорывкъ оставлять въ лункахъ по два и даже по одному растенію — все это отражалось на пониженіи сбора; но и этотъ низкій урожай все же былъ выше средняго пяти контрольныхъ дълянокъ, средняя урожайность которыхъ выразилась въ 95 пудахъ сырца на десятину (съ колебаніями отъ 88 пудовъ минимумъ до 105 пуд.). Подробныя данныя объ урожать по сборамъ видны изъ прилагаемой ниже таблицы.

 $Ta\delta n. \ \mathcal{N}_{\!\!\!2} \ 12.$  Опыты съ удобреніями (уч.  $\mathbf{N}_{\!\!\!2} \ 15$ ).

№№ дѣлянокъ.	I сборъ.	II сборъ.	III сборъ.	Итого на десятину.	
5	110	17,5	13,5	140	Навозъ.
. 6	74,2	28,1	18,7	121	Хлопковый жмыхъ 80 пуд.
7	45,5	35,0	19,5	100	Хлопковый жмыхъ 60 пуд. — дв. супер- фасф. 12 пуд.
8	61,6	41	16,9	119,5	Мясокостная мука 25 пуд.
9	70,7	32,3	17,5	120,5	Костяная мука 25 пуд.
10 Ср. 5-ти	72,5	<b>2</b> 5	16,5	114	Кровяная мука 60 пуд.
контр.	60,5	21,5	13	95	Контрольная.

Опыты со способами посадки. Опыты со способами посадки хлопчатника имъли цълью изучение вліянія на урожай хлопчатника различныхъ разстояній между рядами и растеніями въ рядахъ и вліянія числа растеній въ лункъ. На участкъ № А разбито было 30 дълянокъ, площадью отъ 120 до 200 кв. саж. каждая. На первыхъ 10 дълянкахъ оставлено было по одному растенію въ лункъ, съ разстояніями въ рядахъ 8, 10, 12, 14 и 16 вершковъ, а между рядами 1 арш. 8 верш. и 1 арш. 4 верш.; на вторыхъ 10-ти при той же ширинъ междурядій и при тъхъ же промежуткахъ между кустами въ ряду, оставлено было по два растенія въ лункъ и на третьихъ 10-ти — оставлено по три растенія въ лункъ. На весь участокъ въ январъ былъ внесенъ навозъ (1200 пудовъ на десятину); въ началъ февраля навозъ былъ запаханъ Сакковскимъ 7" плугомъ на глубину въ 41/2 вершка; 23, 24 и 25 марта участку была дана предпосъвная поливка; 31 марти и 1 апръля произведены вспашка и боронованіе и 1 и 2 апрѣля съялкою Баннера по ровному полю былъ высъянъ Кингъ. апръля культиваторомъ проведены въ междурядіяхъ арыки передъ первой поливкой. 27, 28 и 29 апръля дана первая поливка пропускомъ воды по бороздамъ междурядій; послѣ поливки 4-го мая борозды разрыхлены культиваторомъ. сдълана прорывка и дано первое ручное мотыженіе. Такъ какъ послъ посъва наступили холода, падали дожди, и часть всходовъ погибла подъ образовавшейся коркой, то всходы не на ветхъ дълянкахъ были равномърные, много было пропусковъ. Поэтому пришлось кое-гдъ дълать ручной подсъвъ. Въ дальнъйшемъ участку было дано 7 поливокъ, изъ которыхъ 2 до цвътенія, 4 во время цвътенія и одна во время созръванія; 2 ручныхъ мотыженія и 4 пропашки культиваторомъ.

Съ 19 іюля по 13 августа на всѣхъ 30 дѣлянкахъ производился подсчетъ числа живыхъ и опавшихъ коробочекъ, цвѣтовъ и бутоновъ, числа боковыхъ вѣтвей; измѣрялись высота растеній и длина боковыхъ вѣтвей; полученные результаты приводятся въ слѣдующей таблицѣ (№ 13).

Приводимыя данныя показывають, что лучше всего развиваются одиночныя растенія, независимо отъ разстоянія между рядами и въ рядахъ, при всякомъ расположеніи одиночныя растенія выше и им'єють много длинныхъ боковыхъ в'єтвей съ большимъ количествомъ коробочекъ, цв'єтовъ и бутоновъ.

Табл. № 13.

# Опыты со способомъ посадки (уч. № А).

Среднія величины на 1 растеніе.

ММ дѣлянокъ.	Число измър. лунокъ,	Число растеній въ лункъ.	Высота растенія.	Число боков. вътвей.	Длина боковыхъ вътокъ.	Число открытыхъ коробочекъ	Число опавшихъ коробочекъ.	Число зелен. коробочекъ.	Число цвѣт. н бутоновъ.	Время подсчета.	Разстояніе между рядами,	Разстояніе между растеніями.
						1500	HILL NA		ELECTION OF THE SECOND	MELLE	арш.	верш.
1	30	1	19,4	18,76	4,41	Set Trees	21,2	30,53	33,63	A SHOULD SHOW	$1^{1/2}$	8
2	30	1	20	18,1	4,1	_	*15,1	27,7	35,9	19/vII	$1^{1/2}$	10
3	30	1	17,6	24,7	3,8		21,3	25,3	22,7	29/vII	$1^{1/2}$	12
4	30	1	16,4	15,4	3,8	_	9,9	22,6	18,2	29/v11	$1^{1/2}$	14
5	30	1	17,7	17,4	3,8	_	1,6	28,8	15,6	6/vIII	$1^{1}/2$	16
6	30	1	21,4	17,9	4,6	2,3	22,7	22,7	8,9	8/vIII	$1^{1/4}$	8
7	30	1	17,9	14	3,8	0,9	11,2	17,6	5,9	8/vIII	$1^{1/4}$	10
8	30	1	20,9	17,6	4,8	1,2	19,6	29,3	20,7	8/vIII	$1^{1/4}$	12
9	30	1	21	18	4,7	2	16,8	28,3	17,2	8/v111	$1^{1/4}$	14
10	30	1	18,1	15,2	4,6		8,2	18,9	14,1	8/ <b>v</b> 111	$1^{1/4}$	16
11	25	2	17,2	13,76	3,97		12,2	17,86	16,36	20/vII	$1^{1/2}$	8
12	25	2	17,9	14,4	3,8	_	11,4	17,7	12,5	22/vII	$1^{1/2}$	10
13	25	2	16,1	14,5	3,3	_	17,4	16,4	8,5	30/vII	$1^{1/2}$	12
14	25	2	15,5	13,6	3,1	-	17,4	17,0	3,5	1/vIII	$1^{1/2}$	14
15	25	2	15,9	13,8	2,9	_	18	17,5	3,5	7/vIII	11/2	16
16	25	2	15,5	12,3	3	1	15,2	12,9	4,1	7/vIII	$1^{1/4}$	8
17	25	2	15,6	12,8	3	1	17	16,5	3,6	7/vIII	$1^{1/4}$	10
18	25	2	16	13,2	3,2	1,2	12	15,1	8	7/vIII	$1^{1/4}$	12
19	25	2	17,1	14,7	3,7	1,5	18,8	22,2	2,80	12/vIII	11/4	14
20	25	2	18,5	14,6	3,4	2,9	17	16,1	9,2	13/vIII	11/4	16
21	20	3	15,5	11,7	3	_	9,7	11,1	7,05	21/vII	$1^{1/2}$	8
22	20	3	15	12,8	3	E design	9,7	12,2	8,3	23/vII	$1^{1/2}$	10
23	20	3	13,7	11,9	2,6	_	17,6	11,2	1,3	31/vII	$1^{1/2}$	12
24	20	3	15,5	12,7	2,7	_	11	12,9	10,8	31/vII	$1^{1/2}$	14
25	20	3	15,1	12,7	2,7	_	18,2	13,6	2,1	31/vII	$1^{1/2}$	16
26	20	3	14,1	13	2,3	2	14	9,3	1,7	9/vIII	11/4	8
27	20	3	15	11,8	2	1,3	16,3	10,2	2,2	10/vIII	$1^{1/4}$	10
28	20	3	15,7	12	3	1,3	13	11,7	3,4	11/vIII	11/4	12
29	20	3	16,5	12,7	3,2	1,9	13,3	12,8	4,3	11/vIII	$1^{1/4}$	14
30	20	3	17,4	15,1	3,5	2,6	18,1	14,3	3,2	11/vIII	11/4	16

5 августа на 15-ти дѣлянкахъ съ шириною междурядій въ 1 арш. 8 верш., были подсчитаны раскрытыя коробочки на кустахъ. Результаты приводятся въ таблицѣ № 14.

Tабл.  $\mathcal{N}$  14. Опыты со способомъ посадки (уч.  $\mathbb{N}$  A).

ъ.	Marking	ale-rest #4	ASSESSED TO STATE OF	ч и	сло.	ar-10)	Среднее	Birtha -
№М дълянокъ.	меж,	тояніе ду ря- ими.	Разстояніе между ра- стеніями.	Изсл'вдован- ныхъ лунокъ.	Растеній въ лункъ.	Сумма рас- крытыхъ коробоч.	раскры- тыхъ коро- бочекъ на 1 расте- ніе.	Время под счета.
	арш.	верш.	верш.	Ω (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1				A ma
1	1	8	8	87	ı	335	3,8	5/vIII
11	1	. 8	8	87	2	413	2,4	5/ <b>v</b> ıţı
21	1	8	8	70	3	354	1,7	5/vIII
2	1	8	10	103	1	385	3,7	5/vIII
12	1	8	10	90	2	596	3,3	5/vIII
22	1	8	10	70	3	506	2,4	5/vIII
.3	1	8	12	124	1	422	3,4	5/vIII
13	1	8	12	95	2	533	2,8	5/vIII
23	1	8	12	60	3	380	2,1	5/vIII
4	1	8	14	84	1 1	287	3,4	5/vIII
14	1	8	14	75	. 2	415	2,8	5/vIII
24	1	8	14	54	3	286	1,7	5/vIII
5	1	8	16	107	1	378	3,5	5/v111
15	1	8	16	80	. 2	360	2,2	5/vIII
25	1	8	16	60	3	408	2,3	5/v111

Таблица эта также подтверждаетъ выводъ, что одиночныя растенія, независимо отъ густоты ихъ стоянія, имѣютъ преобладающее число раскрытыхъ коробочекъ, при чемъ съ наибольшимъ количествомъ коробочекъ, цвѣтовъ и бутоновъ оказались все же одиночныя растенія при промежуткахъ въ 1 арш.

8 верш. между рядами и 8 верш. въ ряду. На изслъдуемыхъ растеніяхъ этой дълянки насчитано 19 іюля 30,5 коробочекъ и 33,6 цвътовъ, бутоновъ и коробочекъ = 64,1 на каждый кустъ. Далъе, одиночныя растенія при расположеніи 1 арш. 4 верш. между рядами и 12 верш. въ ряду, несли въ среднемъ на одномъ растеніи 29,3 коробочекъ и 20,7 цвътовъ и бутоновъ, что составляетъ въ суммъ цвътовъ, бутоновъ и коробочекъ 50 на каждый кустъ. Изъ всъхъ 30 дълянокъ — разныхъ способовъ распредъленія растеній на участкъ — дълянка съ одиночными растеніями въ гнъздахъ, съ шириною междурядій въ 1 арш. 8 верш. и съ промежутками между лунками въ 8 верш. и дълянка съ расположеніемъ растеній по одному въ лункъ, 1 арш. 4 верш. между рядами, и 12 верш. между растеніями, дали высшій урожай: 160 и 162 пуда на десятину. Таблица урожаевъ по дълянкамъ и сборамъ № 15.

При оставленіи въ гнѣздѣ двухъ растеній, лучшаго развитія достигаютъ растенія на дѣлянкахъ съ распредѣленіемъ: 1 арш. 8 верш. междурядія, и 8—10 верш. разстояніе между кустами въ рядахъ.

22 іюля на дѣлянкѣ съ 10-и вершковымъ разстояніемъ среднее число бутоновъ, цвѣтовъ и коробочекъ равнялось 30,2 для одного куста (эта цифра удваивается для сложнаго куста), при чемъ это общее количество распредѣляется такъ: бутоновъ и цвѣтовъ оказалось 12,5, а коробочекъ 17,7

Для растеній, отдівленных 8-и вершк. промежутками върядахь, эти цифры повышаются, а именно, среднее число цвівтовъ и бутоновъ достигаетъ 16,3, число же коробочекъ (17,8) почти равно таковому же на предыдущей ділянкі. Такимъ образомъ сумма всіхъ этихъ органовъ средняго, одиночнаго куста равна 34,1, а сложнаго — 68,2.

Высшій урожай—140 пудовъ на десятину—полученъ съ дълянки, гдъ разстояніе между сложными кустами равно 10 вершкамъ; та же дълянка дала наибольшій процентъ 1-го сбора.

Всѣ слѣдующія дѣлянки имѣли ширину междурядій въ 1 арш. 4 верш., и сложный кустъ на нихъ составленъ изъ двухъ растеній. Наилучшимъ между такими кустами оказалось разстояніе въ ряду въ 14 и даже въ 16 вершковъ. Растенія хорошо развились, и когда 12 августа были сосчитаны бутоны, цвѣты и коробочки, то получилось, что первыхъ и вторыхъ было 2,8, а послѣднихъ — 22,2; эти цифры характеризуютъ сред-

 $Ta\delta n.~\mathcal{N}_2~15.$  Опыты со способомъ посадки (уч.  $\mathbf{N}_2$  A) 1911 годъ.

№М дѣлянокъ.	Разстояніе между	рядами.	Разстояніе между лунками.	Число растеній въ лункахъ.	І сборъ, урожай	на 1 казенную десятину.	II сборъ, урожай	на 1 казенную десятину.	III сборъ, урожай	на 1 казепную десятину.	ІV сборъ, урожай	на 1 казенную десятину.	Итого урожая	на I казепную десятину.
	арш.	верш.	верш.		пуд.	фун.	пуд.	фун.	пуд.	фун.	пуд.	фун.	пуд.	фун.
1	1	8	8	1	98	20	41	20	13		8	20	161	20
2	1	8	10	1	74	$24^{1/3}$	45	_	8	$34^{3/4}$	9	36	138	15
3	1	8	12	1	49		25	$34^{3/4}$	15	$16^{1/2}$	8	32	99	031/
4	1	8	14	1	29	281/3	22	23	12	$26^{1/3}$	7	6	72	032/8
5	1	8	16	1	29	183/4	20	073/4	9	321/3	11	34	71	128/4
6	1	4	8	1	42	31	26	39	13	$05^{1/2}$	8	06	91	011/2
7	1	4	10	1	36	181/4	35	128/4	18	32	5	ra <del>n</del> aa	90	23
8	1	4	12	1	28	04	68	$39^{1/2}$	29	$24^{3/4}$	36	03	162	311/
9	1	4	14	1	23	04	50	$34^{1/2}$	25	$34^{1/2}$	25	07	125	_
10	1	4	16	1	16	$25^{1/3}$	13	$02^{3/4}$	8	$36^{1/2}$	10	04	48	281/
11	1	8	8	2	82 .	30	20	20	10	-	6	30 .	120	-
12	1	8	10	2	93	$30^{1/2}$	21	$36^{1/2}$	19	12	5	71/2	140	061/
13	1	8	12	2	89	07	20	$36^{3}/4$	11	001/3	4	25	125	29
14	1	8	14	2	56	$28^{3/4}$	24	18	11	221/3	4	02	97	17
15	1	8	16	2	52	$331/_{2}$	26	$30^{3/4}$	20	$20^{3/4}$	6	27	100	07
16	1	4	8.	2	41	18	22	$14^{3/4}$	8	203/4	5	$33^{1/2}$	78	001/
17	1	4	10	2	31	35	30	15	14	02	6	391/2	83	051/
18	1	4	12	2	33	22	42	06	19	293/4	18	$39^{1/2}$	114	271/
19	1	4	14	2	32	23	55	203/4	35	15	15	341/2	139	131/
20	1	4	16	2	42	$35^{1/2}$	56	23	24	$34^{3/4}$	15	21	139	341/
21	1	8	8	3	73	34	14	09	7	18	14	36	110	17
22	1	8	10	3	80	17	11	191/2	8	12	3	33	104	02
23	1	8	12	3	68	28	15	$04^{3/4}$	8	23	1	39	94	143/
24	-1	8	14	3	48	18	26	$36^{1/4}$	13	$19^{1/4}$	5	151/4	88	331/
25	1	8	16	3	69	$21^{3/4}$	23	$32^{2/3}$	9	363/4	5	112/3	103	11
26	1	4	8	3	71	12	21	381/2	9	26	9	$34^{1/2}$	127	213/
27	1	4	10	3	43	11	31	$05^{3}/4$	14	8	8	28	97	123/
28	1	4	12	3	47	02	34	$35^{3}/4$	20	$26^{1/2}$	12	$34^{1/2}$	115	181/
29	1	4	14	3	39	$16^{3/4}$	38	$24^{1/2}$	20	20	14	11	112	321/
30	1	4	. 16	3	39	193/4	49	$37^{3/4}$	20	$16^{1/3}$	23	243/4	137	183/

ній одиночный кустъ при 14 верш. разстояніи. Въ общемъ, слѣдовательно, цвѣтовъ и коробочекъ было на одномъ простомъ кустѣ 25, и 50— на сложномъ; при 16 вершковомъ разстояніи между кустами, растенія имѣютъ въ среднемъ: коробочекъ 16,1, цвѣтовъ и бутоновъ 9,2, а всего на растеніи цвѣтовъ, бутоновъ и коробочекъ 25,3, сумма ихъ на сложномъ кустѣ— 50,6. На этой дѣлянкѣ полученъ большій процентъ 1-го сбора; урожай обѣихъ дѣлянокъ одинаковый— 189 пудовъ на десятину.

Послѣдняя серія дѣлянокъ занята сложными кустами, составленными изъ трехъ отдѣльныхъ растеній; величина междурядій, какъ и на предшествующихъ поляхъ, равна въ одномъ опытѣ 1 арш. 4 верш. и въ другомъ—1 арш. 8 верш. Разсмотримъ сперва первый случай, т. е., когда разстояніе между кустами въ междурядіяхъ равно 1 арш. 4 верш. Оптимальное развитіе растеній наблюдалось на дѣлянкѣ, гдѣ промежутки въ рядахъ соотвѣтствовали 16 вершкамъ. При разстояніи въ ряду, равномъ 8 верш., каждое растеніе сложнаго куста при подсчетѣ 9,10 и 11 августа имѣло 9,3 коробочекъ; растенія при разстояніи въ ряду 10 верш. имѣютъ, въ среднемъ, 10,2 коробочекъ; при 12 верш.—11,7 короб.; при 14 верш.—12,8 короб. и при 16 верш.—каждое растеніе сложнаго куста имѣетъ въ среднемъ 14,3 коробочекъ. Подсчеты, касающіеся этихъ опытовъ приведены въ таблицѣ № 16.

 $\it Taбл.~ Ne~ 16.$  Опыты со способомъ посадки (уч.  $\it Ne~ A$ ).

№. дъля- нокъ.	Разстояніе между расте- ніями.	Разстояніе между рядами.	Боковыхъ вътвей.	Коробочекъ.	Цвътовъ и бутоновъ.	Высота ра- стенія.	Длина боко- выхъ вът- вей.	Время под- счета.
31 32 33 34 35 36 37 38 39	8 верш. 10 " 12 " 14 " 16 " 8 " 10 " 12 " 14 " 16 "	1 арш. 8 верш. 1 "8" 1 "8" 1 "8" 1 "8" 1 "4" 1 "4" 1 "4" 1 "4"	11,6 13,5 13,5 13,2 14,3 14,6 13,6 13,2 13,5	9,6 13,3 14,5 15,4 19,1 11,2 14,3 14,2 13,6	14,2 5,1 6,5 6,2 5,0 10,2 9,3 11,1 11,0	14,0 18,1 19,0 17,6 18,3 18,2 17,5 18,2 18,7	3,0 3,0 4,3 3,9 3,9 3,7 2,7 4,0 3,8	6/VIII ". " " " " " " " " " "

Въ виду того, что дѣлянки со сложными кустами поливались перавномѣрно, ихъ нижніе концы получали воды болѣе, чѣмъ верхніе, поэтому растенія на этихъ частяхъ развивались весьма пышно и къ концу іюля достигали въ высоту болѣе 20 вершковъ. Для учета обѣ части дѣлянокъ были выдѣлены; каждая дѣлянка была раздѣлена на двѣ части, и на всѣхъ нижнихъ частяхъ 30 іюля произведена была чеканка. 6 августа на растеніяхъ этихъ дѣлянокъ, для каждой въ отдѣльности, былъ произведенъ подсчетъ коробочекъ, цвѣтовъ, бутоновъ и боковыхъ вътвей; кромѣ того измѣрены высота растеній и длина боковыхъ вѣтвей. Данныя приведены въ таблицѣ № 16.

Таблица показываетъ, что и тутъ лучшее развите растеній замъчается при разстояніи между гнъздами въ 16 верш.; при разстояніи между рядами 1 арш. 4 верш., каждое растеніе сложнаго куста имъетъ въ среднемъ 15,6 коробочекъ, итого на кустъ 46,8 коробочекъ; при разстояніи же между рядами 1 арш. 8 верш., каждое растеніе сложнаго куста имъетъ въ среднемъ 18,1 коробочекъ, итого — на кустъ 57,3 коробочекъ, т. е., лучшими были растенія съ наибольшимъ разстояніемъ гнъздъ въ ряду; максимальный же урожай дала дълянка съ наименьшимъ разстояніемъ между гнъздами, равнымъ 8 верш. и при разстояніи 1 арш. 4 верш. между рядами. Таблица № 17.

При разсмотрѣніи урожаевъ различныхъ дѣлянокъ въ таблицахъ №№ 15 и 17 бросается въ глаза неправильность измѣненій высоты урожаевъ на нѣкоторыхъ дѣлянкахъ; колебанія эти получаются, отчасти, вслѣдствіе неоднородности участка въ почвенномъ и топографическомъ отношеніи, отчасти же отъ неравномѣрности всходовъ (на нѣкоторыхъ дѣлянкахъ пришлось даже производить подсѣвъ). Поэтому объяснить полученные урожаи, какъ функцію одного изучаемаго фактора, представляется невозможнымъ. Тѣмъ болѣе невозможно учесть всю пестроту факторовъ, обусловившихъ результатъ, и выдѣлить вліяніе каждаго изъ этихъ факторовъ.

Постараемся все же сдѣлать выводы изъ настоящаго опыта. На основаніи данныхъ, приведенныхъ въ таблицахъ №№ 13, 14, 15, 16 и 17, можно сказать, что: 1) при одиночныхъ растеніяхъ въ лункѣ и при ширинѣ междурядій въ 1 арш. 8 верш. слѣдуетъ оставлять разстояніе въ ряду между растеніями равнымъ 8 верш.; 2) при оставленіи въ лункѣ двухъ растеній и при разстояніи 1 арш. 8 верш. между рядами слѣдуетъ отдѣлять

1
7/0
1

		0.	пыты со сп	OCOOOM B HO	садки (уч	. Jv A).		
№. дѣлянокъ.	Разстояніе между ря- ами.	Разстояніе. ме- жду лунками.	Число растеній въ лункъ.	I сборъ уро- жая на 1 ка- зенную деся- тину.	II сборъ уро- жая на 1 ка- зенную деся- тину.	III сборъ уро- жая на 1 ка- зенную деся- типу.	IV сборъ урожая на 1 ка- зенную деся- тину.	Итоги урожая на 1 казенную десятину.
31	1 ар. 8 верш.	8 верш.	3 растенія (очеканен.).	13 п. 35 ф.	дълянка	около ка	прагачей	13 п. 35 ф.
32	1 " 8 "	10 "	n	66 " 263/4 "	26 п. 26 <sup>2</sup> /з ф,	13 п. 131/2 ф.	18 п. 261/2 ф.	124 , 13 ,
33	1 " 8 "	12 "	, , ,	54 " 311/2 "	32 , 35 ,	13 " 28 "	10 " 38 "	112 " 121/2 "
34	1 " 8 "	14 "	n	45 " 28 "	43 , 291/2 ,	20 " —	34 " 11 "	113 " 281/2 "
35	1 " 8 "	16 "	<b>n</b>	60 " 32 "	33 ,, 32 ,,	22 , 211/3 ,	14 " 03 "	131 " 08¹/3 "
36	1 ар. 4 верш.	8 "	,,	93 " 02³/4 "	45 , 223/4 ,	17 " 328/4 "	25 " 291/2 "	182 " 07³/4 "
37	1 , 4 ,	10 "		81 " — "	30 " — "	24 " — "	17 " — "	152 " — "
38	1 , 4 ,	12 "	2)	48 " 19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	53 " 14 <sup>3</sup> /4 "	30 , 12 ,	40 , 16 ,	172 " 221/4 "
39	1 , 4 ,	14 "	,,	23 " 35 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> "	23 , 33 ,	8 , 373/4 ,,	19 , 183/4 ,,	76 " 051/4 "
40	1 " 4 "	16 "		25 " 06 "	43 " 021/2 "	17 , 383/4 ,,	26 " 37 <sup>3/4</sup> "	113 " 05 "

растенія въ ряду 10-ю вершками; 3) при сложномъ кустѣ, состоящемъ изъ трехъ растеній въ гнѣздѣ, и при разстояніи въ 1 арш. 8 верш. между рядами слѣдуетъ давать 16-ти-вершковыя промежутки между гнѣздами или дѣлатъ густую посадку на 8 верш.; 4) при оставленіи въ гнѣздѣ по одному растенію при разстояніи 1 арш. 4 верш. между рядами, слѣдуетъ оставлять между растеніями въ ряду разстояніе въ 12 вершковъ; 5) при оставленіи въ гнѣздѣ по два растенія, при разстояніи 1 арш. 4 верш. между рядами, слѣдуетъ оставлять разстояніе между растеніями въ ряду 14 или 16 вершковъ; при оставленіи въ гнѣздѣ по два растенія и при разстояніи между рядами 1 арш. 4 верш., слѣдуетъ давать разстояніе между рядами 1 арш. 4 верш., слѣдуетъ давать разстояніе между растеніями въ ряду не меньше 16 вершковъ или дѣлать густую посадку на 8 вершковъ.

Кром'в участка № А, опыть съ густотой стоянія растеній быль заложень на двухь дълянкахь участка № 8. Послѣ поливки листернымъ бороздкамъ, прямыя гряды были засвяны способомъ, т. е. съмена задълывались руками туземнымъ вдоль обоихъ краевъ грядъ по линіи смачиванія ихъ водой, напущенной въ арыки. Въ каждой лункъ впослъдствіи оставлялось по три растенія. Ширина междурядій равнялась 1 арш. 8 верш., въ рядахъ же растенія отстояли одно отъ другого на 8 верш. для первой дълянки и на 12 верш. для второй. Разница въ урожаяхъ получилась очень высокая, снова подтверждающая выгодность густой посадки. Изъ приводимой таблицы (№ 18) видно, что съ первой дълянки собрано 117 пудовъ (на десятину), а съ другой — 80 пуд. (на десятину). Таковы результаты опытовъ настоящаго года. Для болве точныхъ выводовъ необходимо было бы опыть текущаго года распространить на большую площадь съ повторными дёлянками, но тогда пришлось бы вычеркнуть изъ программы работъ опытнаго поля всё другіе вопросы изъ-за недостатка полевой площади.

*Табл. № 18.* Опыты со способомъ посадки (уч № 8).

	Площадь	Разстояніе между расте-		I		IL	I	II	Итого у на дес	
1	дѣлянки.	ніями.	п.	Φ.	и.	Φ.	п.	Ф.	пуд.	Φ.
	146 кв. саж. 205 кв. саж.	8 12	62 67	18 7	32 24	25 17	21 19	39	117 80	2 25

Опыты съ поливками. Для выясненія вліянія количества поливокъ на урожай хлопчатника, на участкѣ (№ 3) разбито три дѣлянки, площадью по 240 кв. саж. каждая.

Обработка участка была такова: первая весенняя вспашка 19 марта, предпосъвная поливка сплошнымъ заливомъ всего участка 6 апръля, предпосъвная вспашка 19 апръля; для разбивки комьевъ послъ плуга пущена была борона «Зигзагъ» и послъ нея французская борона-катокъ; посъвъ сорта «Аунсъ Болъ» былъ сдъланъ съялкою Баннера 21 апръля, (съмена предварительно смачивались въ теченіе 1½ сутокъ); прорастаніе началось 23 апръля. Послъ выпавшаго въ апрълъ дождя образовалась корка, для разбиванія которой 27 апръля по дълянкамъ была пущена французская борона-катокъ.

Всходы начали появляться 29 апрёля, а 2 мая обозначились ряды всходовъ на всъхъ дълянкахъ; 7 мая показался первый листъ, 9 второй, 14 мая кое-гдъ у лучшихъ растеній пачаль появлятся третій листь; 15 мая растенія въ среднемъ достигали высоты 6-7 см.; 16 была дана первая поливка всёмъ дълянкамъ, при чемъ вода пускалась протокомъ по арыкамъ, проръзаннымъ культиваторомъ передъ поливкой; всъ послъдующія поливки ділянокъ также производились пропускомъ воды по арыкамъ. 17 мая началъ появляться четвертый листъ на растеніяхъ встхъ дълянокъ. Передъ первой прорывкой коннымъ культиваторомъ произведено окучивание растений, и вслъдъ за этимъ дълянки были промотыжены. Послъ прорывки лунки отстояли въ ряду приблизительно на 8 вершковъ, и каждая изъ нихъ имъла по 3 куста. 25 мая развился на растеніяхъ пятый листь, и появился кое-гдъ шестой. Второй поливъ быль 29 мая, при чемъ заливались не всѣ междурядія; смежныя борозды оставались сухими и были политы 3 іюня. 31 мая всв растенія имъли по 6 листьевъ и 6-ой листь въ началв его развитія. 1 и 6 іюля междурядія были вэрыхлены конной пропашкой. Въ это время болъе крупныя и развитыя растенія имъли молодые бутоны (2 іюня); на запоздавшихъ дълянкахъ появленіе ихъ отм'ятено 7 іюня. 15 іюня дана третья поливка съ учетомъ воды водомвромъ Фута.

Изм'вреніе частей растенія было произведено 19 іюня, при чемъ средняя высота ихъ для вс'єхъ д'єлянокъ доходила до 7 верш., н'єкоторыя боковыя в'єтви им'єли такую же длину, хотя на куст'є ихъ было не больше 6; количество бутоновъ рав-

нялось 10. Черезъ 10 дней измърение было повторено, за этотъ промежутокъ высота кустовъ увеличилась на 1 верш. Къ этому времени относится начало опаденія бутоновъ. Дальнъйшія поливки распредёлены были такъ: первая дёлянка получила 4-ую и вмъстъ послъднюю поливку 24 іюля; по періодамъ развитія растеній поливки на этой ділянкі распреділились по схемъ 3—1—0; вторая дълянка получила 4-ую 11 іюля и 5-ую — послъднюю — 2 августа; примънительно къ періодамъ развитія растенія поливки расположились: 3—1—1; третья дълянка получила 4-ую поливку 11 іюля, 5-ую — 24 іюля и 6-ую (посл'єднюю) — 2 августа, итого по періодамъ развитія растеній: 3—2—1. Посл'в поливки вс'в ділянки однообразно обрабатывались культиваторомъ съ момента спѣлости почвы. 15 іюня, по учету водом'вромъ Фута приходящей на участокъ воды, первая дълянка получила 164 куб. саж. на дес., вторая — 156 куб. саж. и третья 294 куб. саж.; 11 іюля первая дълянка не поливалась, второй — дано 200 кубовъ, третьей — 173 куба; 24 іюля первой д'влянк'в дано 236 кубовъ, вторая не поливалась, третьей — дано 156 кубовъ; 2 августа первая дълянка не поливалась, второй дано 226 кубовъ и гретьей 197 кубовъ.

Распредъленіе учетныхъ поливокъ по дълянкамъ и количество затраченной воды приводится въ слъдующей таблицъ (№ 19), при чемъ цифры выражаютъ расходъ воды на десятину.

Taбл. № 19. Опыты еъ поливками (уч. № 3).

A STATE OF THE STA	15/vı	11/vn	24/vII	2/viii
Дълянка 1-ая	164 кб. саж.		236 кб. саж.	
Дълянка 2-ая	156 " "	200 кб. саж.	_	226 кб. саж
Дълянка 3-ья	294 " "	173 " "	156 кб. саж.	197 " "

Техника поливки примънялась одна и та же, а именно, вода сливалась на дълянку небольшой струей, въ междурядныя сквозныя борозды. Такой поливъ продолжался 4—5 ча-

совъ, въ зависимости отъ наступленія момента, когда засѣянныя гряды достаточно напитаются водою и сухими остаются только самыя поверхности грядъ. При такомъ способѣ полива расходъ воды на десятину за каждый разъ равнялся, въ среднемъ, приблизительно 200 куб. саж.

Цвътеніе хлопчатника началось 25 іюня, созрѣваніе—3 августа. Обильное опаденіе бутоновъ и завязей замѣчено было 2 августа на дѣлянкѣ 1-ой и 2-ой. 10 августа для выясненія вліянія поливокъ на развитіе растеній и опаденіе бутоновъ и завязей, былъ произведенъ на 180 растеніяхъ каждой дѣлянки подсчетъ опавшихъ бутоновъ и завязей, а также и числа боковыхъ вѣтвей. Полученные результаты приведены въ таблицѣ № 20.

*Табл. № 20.* Опыты съ поливками (уч. **№** 3).

	№№ дѣлянокъ.	Число опавшихъ коробочекъ на 1 ра- стеніе.	Число боковыхъ вътвей на 1 ра- стеній.	Число онавшихъ коробочекъ прибавлено къ 10 вътвямъ на 1 растеніе.
		and a subject to the	n de Haras - Green de	arranga a reas na
	1	5,1	8,6	5,8
	2	4,3	11,5	3,7
1	3	3,9	11,8	3,3

Какъ показываетъ таблица, наибольшее опаденіе коробочекъ было на первой дѣлянкѣ, получившей съ дѣлянкой второй, хотя и одинаковое число поливокъ до 24 іюля, но въ разное время; въ періодъ образованія бутоновъ и начала цвѣтенія первая дѣлянка получила на одну поливку меньше по сравненію съ второй дѣлянкой, что и отразилось на степени опаденія бутоновъ и коробочекъ. 4 сентября, когда должно было сказаться вліяніе поливки, произведенъ подсчетъ и обмѣръ 90 растеній съ каждой дѣлянки. Полученные результаты даетъ слѣдующая таблица (№ 21).

*Табл. № 21.* Опыты съ поливками (уч **№** 3).

№№ дѣдянокъ.	Высота ра- стеній.	Число бо- ковыхъ вѣтвей.	Длина бо- ковыхъ вѣтвей.	Число ко- робочекъ на растен.	Время подсчета.
1	15,7	11,2	3,0	10,4	4 сентября.
2	16,6	12,3	3,5	11,0	5 сентября.
3	17,1	12,9	3,8	12,3	6 сентября.

Отсюда слѣдуетъ, что наилучшимъ развитіемъ растеній отличается дѣлянка № 3, получившая достаточное количество поливокъ во всѣ фазы развитія хлопчатника.

Худшія растенія получились на дѣлянкѣ № 1, не получавшей поливокъ въ продолженіе 38 дней (отъ 16 іюня до 24 іюля), при чемъ этотъ недостатокъ во влагѣ пришелся на періодъ цвѣтенія и образованія коробочекъ. Лучшій урожай полученъ съ дѣлянки № 3 (6 поливокъ), меньшій — съ дѣлянки № 2 (5 поливокъ) и наименьшій — съ дѣлянки № 1 (4 поливки). Результаты урожаевъ на различныхъ дѣлянкахъ показаны въ нижеслѣдующей таблицѣ (№ 22).

Табл. № 22. Опыты съ поливками (уч. № 3).

№№ дълянокъ.	Площадь дълянокъ.	Число поливокъ.	I сборъ.	П сборъ.	III сборъ.	Итого на десятину.
1	264 кв. саж.	4	24 пуд.	26 пуд.	9 пуд.	59 пуд.
2	264 " "	5	30 "	48 "	18 "	96 "
3	264 " "	6	39 "	49 "	23 "	111 "

Лишеніе дѣлянки № 1 поливки въ началѣ іюля отразилось на величинѣ 1 и 2 сборовъ; отсутствіе поливки въ началѣ созрѣванія на этой же дѣлянкѣ сказалось особенно счльно на 3-мъ сборѣ, послѣдняго на ней почти не было.

Подсчитывая количество поливной воды, пропущенной на дѣлянки черезъ водомѣръ Фута, находимъ, что дѣлянка № 1 получила 1000 кубовъ, дѣлянка № 2—1182 куба и дѣлянка № 3—1420 кубовъ. Эти цифры показываютъ, что поливъ дѣлянокъ стокомъ воды по сквознымъ бороздамъ требуетъ очень большое количество ея; для поливки одной десятины хлопка въ теченіе вегетаціоннаго періода необходимо подвести къ участку 1400 куб. саж. воды, при чемъ часть этого количества уходитъ съ участка неиспользованной.

Учетъ неиспользованной воды производился вычисленіемъ площади поперечнаго сѣченія арыка, измѣреніемъ ширины и глубины его и скорости теченія воды въ немъ; по подсчетамъ оказалось, что сбросъ съ участка неиспользованной воды не болѣе 5—10 куб. саж. за каждую поливку. Учетъ воды водомѣромъ Фута не ограничился въ отчетномъ году настоящими дѣлянками; на другихъ участкахъ также велась запись оросительной воды, но разница состояла въ томъ, что въ послѣднемъ случаѣ былъ измѣненъ самый пріемъ орошенія. Дѣлянки были изборождены листеромъ, образовавшіеся арыки и края участка плотно замыкались и наполнялись водой. Кромѣ того, учитывались поливы туземныхъ грядъ (джояковъ).

Эти учеты производилсь на 8 участкахъ, на дълянкахъ площадью отъ 300 до 500 кв. саж. каждая. Расходъ воды на десятину за каждую поливку въ среднемъ равенъ 56 кубамъ съ колебаніями отъ 35,5 куб. саж. и до 74 куб. саж.; при этомъ сартовскіе джояки требовали воды столько же, сколько и прямыя гряды, сдъланныя листеромъ.

Изъ сопоставленія полученныхъ данныхъ получаются интересные выводы. Полагая, что оптимальная вегетація хлопчатника требуетъ восьми поливокъ за весь свой періодъ, мы находимъ, что общій расходъ воды при этомъ выразится величиной въ 448 куб. саж. (при спускѣ воды въ листерныя арыки, оканчивающіеся на дѣлянкѣ тупикомъ). Такая трата воды оказывается въ три раза менѣе, чѣмъ при предыдущемъ способѣ. Однако, слѣдуетъ помнить и имѣть въ виду, что такое экономное водопользованіе требуетъ большаго количества рабочихъ, а также и спѣшности въ работахъ.

Сравнение сортовъ хлопчатника. Опыты съ испытаніемъ и сравненіемъ сортовъ хлопчатника были поставлены въ настоящемъ году на двухъ участкахъ, на участкахъ 9 и 4.

На участкъ 9-мъ въ междурядіяхъ промышленнаго сада были высъяны слъдующіе сорта: Руссельсъ, Диксонъ Кларкъ, Флорадора, Андижанскій Абасси, Христофоръ Лярджъ, Алленъ Кингъ, Кингъ Алленъ, Тиндаль, Эксцельзіоръ, Блю Риббонъ, Аунсъ Болъ, Кингъ, Ашмуни, Тріумфъ, Кара-чигитъ, Мельсъ Селектъ, Афифи, Гольдъ Стандартъ, Саудзернъ-Гопъ, Прайдъофъ-Джорджіа, Бендересъ, Кокъ-чигитъ и Труитъ, — всего 169 №№ разнообразной массовой и индивидуальной селекціи. Сортъ Руссельсъ высъянъ 7-ю чистыми линіями отобранными осенью 1910 года и съменами массоваго отбора на скоросиълость (сбора 23 августа). Сортъ Диксонъ Кларкъ высъянъ 2-мя чистыми линіями, съменами массоваго отбора на скоросиълость и урожайность, а также съменами 5-ти гиъздныхъ коробочекъ. Сортъ Флорадора высъянъ былъ 5-ю чистыми линіями.

При измъреніи длины волокна было замъчено, что наибольшая длина его приходится на 3-й сверху ярусъгнъзда. Для выясненія вопроса, имъеть ли смысль отбирать съмена въ предълахъ чистой линіи, т. е. сохраняютъ ли наибольшую длину волокна съмена 3-го яруса одной чистой линіи, или это простая случайность, т. е. длина волокна въ предвлахъ чистой линіи есть только флюктуація м'єста и питанія, сорть Флорадора выс'вянь быль с'єменами отд'єльных коробочекь разнообразныхъ по ярусамъ; отдъльно также высъяны были съмена этого сорта, им'вющія разную длину волокна отъ 28 мм. до 37 мм. (максимумъ). Намъченную программу опытовъ не удалось выполнить до конца въ виду недостатка личнаго персонала и служащихъ. Прикомандированные Управленіемъ Земледълія на лъто практиканты въ августъ и въ сентябръ до сбора хлопчатника всъ разъвхались. Собрать отдъльно всъ номера не было возможности, а поэтому объ урожайности растеній разныхъ номеровъ говорить не приходится. Однако, наблюденія за развитіємъ ихъ все же позволяють намъ сдълать нъкоторые выводы. Было отмъчено, что растенія изъ съмянъ съ наибольшей длиной волокна и изъ съмянъ 3-го яруса развиваются слабъе, они не достигають большой высоты, имъють наименьшее число боковыхъ вътвей, бутоновъ, цвътовъ и коробочекъ. Произведенные обмъры растеній, для характеристики группъ растеній, съмянъ и разныхъ ярусовъ, говорятъ о правильномъ пониженіи цифръ и снова объ ихъ повышеніи отъ 1-го яруса къ послъднему. Растенія, развивавшіяся изъ съмянъ 1-го и послъдняго

ярусовъ (таблицы № 23 и 24), отличаются лучшимъ развитіемъ, чѣмъ растенія, получившіяся изъ сѣмянъ средняго яруса; о той же правильности свидѣтельствуютъ произведенные обмѣры типичныхъ растеній изъ сѣмянъ разобраннаго сырца разныхъ коробочекъ (таблицы №№ 25 и 26); но въ виду того, что здѣсь не были учтены отдѣльно урожаи каждаго номера, дѣлать какіялибо выводы преждевременно.

Табл. № 23. Зависимость развитія растеній отъ расположенія съмянъ въ коробочкъ.

	Высота	Число	Длина	Р	и с л	0.
Ярусъ.	растепій.	боковыхъ вътвей.	боковыхъ - вътвей.	Бутоновъ.	Цвътовъ.	Коробо- чекъ.
1	17,5	16,0	3,9	21,5	4,0	31,0
2	18,0	17,0	2,9	2,0	1,5	23,5
3	11,8	11,0	1,9	9,3	18 498	13,5
4	14,5	16,0	2,6	22,0	4,0	16,5
5	16,7	16,5	4,0	17,5	5,5	30,0
	Harald Hari	ndari sasas		films and		

 $Taбл. \, \, {\cal N} \, \, 24.$  Зависимость развитія растеній отъ расположенія съмянъ въ коробочкъ.

	Высота	Длина		ч и е	с л о	·oardag
Ярусъ.	растеній.	боковыхъ вътвей.	Боковыхъ вътвей.	Бутоновъ.	Цвътовъ.	Коробо- чекъ.
1	27,0	5,9	20,0	51,5	4,5	36,5
2	22,2	3,4	17,5	27,0	5,9	27,0
3	15,7	2,5	13,0	24,5	2,0	5,5
4	18,0	4,3	17,0	45,0	3,0	20,0
5	H .	е бы	лъ.	в ы с	<b>в</b> я н	ъ.
Rest Stone	Barbart 14					

Табл. № 25. Зависимость развитія растеній отъ расположенія съмянъ въ коробочкъ.

	Высота	Длина		H N (	О Л О	•
Ярусъ.	растеній.	боковыхъ вътвей.	Боковыхъ вътвей.	Бутоновъ.	Цвѣтовъ.	Коробо- чекъ.
1	16,5	3,8	15,9	28,3	2,8	13,4
2	16,0	2,9	15,8	22,8	3,7	23,4
3	16,1	3,8	14,9	17,0	3,6	23,1
4	18,0	4,0	18,1	23,6	4,5	31,7
5	19,0	4,7	15,4	27,7	3,4	21,7

Табл. № 26.

## Зависимость развитія растеній отъ расположенія съмянъ въ коробочкъ.

	Высота	Число	Длина	Ч	и с л	0.
ЯРУСЫ.	растеній.	боковыхъ вътвей.	боковыхъ вѣтвей.	Бутоновъ.	Цвѣтовъ.	Коробо- чекъ.
Верхній	22,0	18,4	5,5	57,9	5,6	22,8
Средній	16,2	17,3	4,1	26,8	1,9	19,1
Нижній	18,8	15,4	4,6	23,4	1,4	20,6

Сортъ Андижанскій Абасси высѣянъ былъ 2-мя чистыми линіями: сѣменами массоваго отбора на скороспѣлость и сѣменами 5-ти гнѣздныхъ коробочекъ. Сортъ Христофоръ высѣянъ 2-я чистыми линіями и сѣменами 5-ти гнѣздныхъ коробочекъ. Сортъ Алленъ высѣянъ 11-ю чистыми линіями, сѣменами 5-ти гнѣздныхъ коробочекъ и сѣменами разной длины волокна. Такіе признаки чистыхъ линій, какъ цвѣтъ листьевъ, стебля и вѣтвей, скученность коробочекъ на короткихъ вѣтвяхъ, гроздевидность остались постоянными; урожайность же чистыхъ ли-

ній, каждой въ отдъльности, учесть не удалось. Сортъ Кингъ Алленъ высъянъ былъ двумя чистыми линіями и съменами 5-ти гнъздныхъ коробочекъ. Тиндаль Селектъ высъянъ одной чистой линіей, а скоросп'влость и урожайность его испытывались съменами массоваго отбора. Эксцельзіоръ Пролификъ высъянъ одной чистой линіей и съменами 5-ти гитздныхъ и 4-хъ гнъздныхъ коробочекъ для испытанія, насколько константенъ признакъ 4, 5-ти гивздныхъ коробочекъ. Когда на растеніяхъ подсчитали коробочки, оказалось, что растенія изъ сёмянъ 5-ти гивздныхъ коробочекъ дали послвднихъ — 45,7% и 54,3% 4-хъ гнъздныхъ, а растенія изъ съмянъ 4-хъ гнъздныхъ коробочекъ дали 5-ти гивздныхъ коробочекъ только 28,8% и 71,2% 4-хъ гнъздныхъ коробочекъ; путемъ дальнъйшаго отбора въ этомъ направленіи возможно получить сорть съ еще большимъ процентомъ 5-ти гитздныхъ коробочекъ и даже сортъ, имтющій исключительно эти послъднія. Сорть Блю Риббонъ высъянъ былъ двумя чистыми линіями и съменами 5-ти гитздныхъ коробочекъ.

Аунсъ Болъ высъянъ тремя чистыми линіями и съменами массоваго отбора на урожайность и скороспълость. Кингъ былъ высъянъ шестью чистыми линіями и съменами массовой селекціи на скороспълость и урожайность.

Сортъ Ашмуни высъянъ былъ 3-мя чистыми линіями и съменами массовой селекціи на скороспълость. Тріумфъ высъянъ былъ съменами массовой селекціи на урожайность и скороспълость и съменами 5-ти гнъздныхъ и 4-хъ гнъздныхъ коробочекъ.

Осенью быль произведень подсчеть коробочекь на 200 растеніяхь, развившихся какъ изъ сѣмянь 5-ти гнѣздныхъ, такъ и 4-хъ гнѣздныхъ коробочекъ; при этомъ оказалось, что растенія, развивавшіеся изъ сѣмянь 5-ти гнѣздныхъ коробочекъ дали 68% такихъ же и 32% 4-хъ гнѣздныхъ, а растенія изъ сѣмянъ 4-хъ гнѣздныхъ коробочекъ дали 5-ти гнѣздныхъ коробочекъ только 51,3% и 4-гнѣздныхъ 48,7%. Кара-чигитъ высѣянъ былъ 6-ю чистыми линіями и сѣменами массоваго отбора на скороспѣлость. Кромѣ того отдѣльно высѣяны сѣмена 4-хъ и 5-и гнѣздныхъ коробочекъ одного растенія одной чистой линіи. Послѣ подсчета 115-и растеній изъ сѣмянъ 4-хъ гнѣздныхъ коробочекъ, оказалось, что таковыя растенія имѣютъ 85,1% 4-хъ гнѣздныхъ коробочекъ коробочекъ и 14,9% 5-и гнѣздныхъ; на растеніяхъ же

изъ сѣмянъ 5-ти гиѣздныхъ коробочекъ послѣ подсчета 200 растеній, оказалось, что таковыя имѣютъ на каждомъ кустѣ въ среднемъ 31,1% 5-ти гиѣздныхъ коробочекъ и 68,9% 4-хъ гиѣздныхъ, т. е. 5-ти гиѣздныхъ коробочекъ на растеніяхъ изъ сѣмянъ 5-ти гиѣздныхъ коробочекъ во второмъ случаѣ оказалось въ два раза больше. Мельсъ Селектъ высѣянъ былъ двумя чистыми линіями и сѣменами массоваго отбора по цвѣту волокна; окраска волокна этого сорта въ одиѣхъ коробочкахъ была обычной, т. е. бѣлаго цвѣта, въ другихъ — красиваго желтаго, даже коричневатаго, и, наконецъ, нашлись коробочки, оттѣнки волокна которыхъ приближались къ прежнимъ обоимъ цвѣтамъ и которые можно назвать блѣдно-желтоватыми. Сырецъ собранъ по окраскѣ, сѣмена отдѣлены были такъ же по цвѣту ихъ опушенія и высѣяны. Результатъ получился вполнѣ удачнымъ, признаки волокна въ новомъ урожаѣ въ совершенствѣ сохранились, подтвердивъ свою константность и постоянство.

Растенія изъ сѣмянъ съ желтымъ волокномъ— какъ чистыхъ линій, такъ и массоваго отбора дали желтое волокно; растенія изъ сѣмянъ съ бѣлымъ волокномъ дали бѣлое волокно и растенія изъ сѣмянъ съ слабо-желтымъ волокномъ дали слабожелтоватое волокно.

Въ 1909 году (отчетъ 1909 года), у этого сорта, явно гибриднаго происхожденія, на одномъ растеніи имѣлись коробочки съ желтымъ и бѣлымъ волокномъ, въ настоящемъ же году всѣ растенія каждаго номера имѣли тотъ опредѣленный цвѣтъ волокна, который имѣлось въ виду за ними закрѣпить.

Въ 1910 году среди кустовъ чистаго египетскаго Афифи оказался одинъ ярко выраженный гибридъ: его внѣшній видъ, листья и другія подробности приближались къ типу американскихъ упландовъ; сѣмена также носили признаки американскихъ сортовъ, т. е. не были черными голыми, а съ зеленоватымъ пушкомъ. Въ 1911 году сѣмена этого сорта были высѣяны отдѣльно, и полученъ тотъ же гибридизированный типъ съ длиннымъ, крѣпкимъ, слабо-желтаго оттѣнка волокномъ. Кромѣ того Афифи былъ высѣянъ въ 1911 году и двумя чистыми линіями. Сортъ Гольдъ Стандартъ былъ высѣянъ двумя чистыми линіями и сѣменами 5-ти гнѣздныхъ коробочекъ. Саудзернъ былъ высѣянъ одной чистой линіей и сѣменами 5-и гнѣздныхъ коробочекъ. Сортъ Прайдъ-офъ-Джорджіа былъ высѣянъ одною чистой линіей и сѣменами массоваго отбора на урожай-

ность и скороспълость. Бендересъ высъянъ съменами 5-и гнъздныхъ коробочекъ и съменами массоваго отбора на скороспълость. Растенія изъ съмянъ 5-и гнъздныхъ коробочекъ дали въ среднемъ 54,6% такихъ же коробочекъ и 45,4% 4-хъ гнъздныхъ. Кокъ-чигита посъяны были двъ чистыя линіи и съмена массоваго отбора на урожайность и скороспълость.

Участокъ, на которомъ испытывались перечисленные сорта, быль вспахань въ концъ февраля и серединъ марта. 9, 10 апръля онъ весь быль залить водой, после чего, съ наступленіемъ спълости почвы, была произведена ручная вспашка. Далъе, послъ выравниванія поля листеромъ, были наръзаны гряды, съ промежутками между ними въ 1 аршинъ 4 вершка. Затъмъ 26, 27, 29 и 30 апръля гряды до краевъ наполнялись водой и одновременно засъвались ручнымъ способомъ. Въ лунку задълывалось по 4—5 съмянъ черезъ каждые 12 вершковъ. Впослъдствіи, при прорывкъ, въ лункахъ оставляли по одному кусту. Первый послъ посъва поливъ былъ 12, 13, 14 и 15 апръля, и когда междурядія достаточно просохли, они были пропаханы коннымъ культиваторомъ. Второй поливъ (такимъ же наполненіемъ междурядныхъ арыковъ) былъ данъ 30, 31 апрёля и 1 мая; послудующія пять поливокь даны были тумь же способомъ; послъ поливокъ междурядія обрабатывались культиваторомъ. Поливки даны: три во время цвътенія и 2 во время созръванія. За весь вегетаціонный періодъ участокъ былъ обработанъ 4-мя ручными мотыженіями и 5-ю конными пропашками.

Изъ сравниваемыхъ сортовъ (№ 9) самымъ раннимъ оказался Кокъ-чигитъ, созрѣвшій на 92-й день послѣ посѣва; за нямъ по послѣдовательности созрѣванія идутъ Кингъ и Аунсъ Болъ, созрѣвшій на 93-й день послѣ посѣва, Кара-чигитъ и Андижанскій Абасси — на 94-й день, Бендересъ и Тиндаль Селектъ, созрѣвшій на 97-й день, и такъ далѣе. Данныя приведены въ таблицѣ фенологическихъ наблюденій (№ 27-й).

Для характеристики сортовъ по числу и длинъ боковыхъ вътвей, числу листьевъ, цвътовъ, бутоновъ и коробочекъ на растеніи, на сравниваемыхъ сортахъ, съ 22 іюля по 29 августа, производились измъренія на типичныхъ для сорта растеніяхъ длины всъхъ боковыхъ вътвей, подсчетъ листьевъ, цвътовъ и бутоновъ, числа раскрывшихся и нераскрывшихся коробочекъ и числа опавшихъ цвътовъ и бутоновъ. Среднія величины измъреній приведены въ таблицахъ № 28, 29, 30, 31, 32 и 33.

названіе сорта.	Время посѣва.	Начало по- вленія всхо- довъ.	Начало по- явленія буто- новъ.	Начало цвѣтенія.	Начало рас- крытія коро- бочекъ.	Число дней отъ посъва до созръванія.
Андижанскій Абасси	28/IV	2/v	2/vi	22/vi	1/vIII	94
Эксцельзіоръ пролификъ	28/IV	2/v	2/vi	18/vi	9/vIII	102
Бендересъ	28/IV	2/v	3/vi	20/vi	4/vIII	97
Христофоръ Лярджъ	28/IV	2/v	3/vi		11/viii	104
Прайдъ-офъ-Джорджіа	29/IV	5/v	3/vi	22/vi	7/vIII	100
Кара-чигитъ	28/IV	4/v	3/vi	21/vi	1/vIII	94
Мельсъ Селектъ Иджии- шенъ	28/IV	5/v	3/v1	25/v1	10/vIII	104
Гольдъ Стандартъ	29/IV	5/v	4/vi	25/vi	8/vIII	101
Алленъ Кингъ	30/IV	5/v	4/vi	23/vi	21/vIII	114
Тріумфъ	30/IV	6/v	2/vi	() <del>-</del> (()	15/VIII	107
Тиндаль селектъ пролификъ	1/v	7/v	4/v1	28/vi	5/vIII	97
Кокъ-чигитъ	1/v	7/v	4/vi	20/vi	31/vII	92
Саудзернъ Гопъ	1/v	6/v	4/vi	24/vi	7/vIII	99
Диксонъ Кларкъ	1/v	7/v	4/v1	30/vi	8/vIII	100
Блю Риббонъ	1/v.	7/v	4/vi	27/vi	20/vIII	112
Руссельсъ	28/IV	27v	3/v1	18/vi	1/vIII	95
Аунсъ Болъ	1/v	7/v	4/vi	20/vi	1/vIII	93
Флорадора	1/v	6/v	4/vi	25/vi	20/vIII	112
Афифи	1/v	7/v	4/v1	27/vi	20/vIII	112
Кингъ	29/iv	6/v	4/v1	$22/v_{\rm I}$	30/v11	93
Ашмуни	7/1v	7/v	4/vi	25/vi	20/viii	112

Таблица сравненія сортовъ хлоп иатника по длинъ вътвей (уч. № 9).

		1a	оли	ща	Сра	три	CHI	n CC	JPI	OBE	AJ	IOII	1	чал	ГНИ	ка	110	цли	нь	ВБЛ	ВС	n (y	۹٠,	145 6	9).								
HARRAHIE GORMA	из-	Время					Н		0		M	Ė		P	A			В	7	Б	Т		В		Е		й.						я дли- вей.
НАЗВАНІЕ СОРТА.	Число из слъдов. р стеній.	подсчета.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Средняя дли- на вътвей.
																																	верп
Кингъ Алленъ	13	30/vII	10,6	13,0	12,2	11,3	8,1	5,9	5,5	4,8	5,3	5,0	*	4,7	4,4	3,7	3,5	2,7	2,7	2,0	1,4	1,2	0,5	0,2	0,07	-	-	-	-	_	-		4,9
Алленъ Кингъ	18	29/vII	10,0	10,2	10,3	7,3	5,3	5,1	5,0	5,5	4,5	4,4		3,8	3,7	*2,8	2,3	2,0	1,5	1,2	0,8	0,6	0,2	0,16	0,4	0,01	-	-	-	-	-70		3,8
Руссельсъ	17	9/vIII	10,1	13,0	10,3	9,3	9,7	9,0	12,2	8,8	8,0	9,5		8,4	7,7	6,7	6,5	5,2	3,0	3,3	2,2	1,7	1,4	1,2	0,9	0,6	0,2	0,1	0,05	0,02	-	-	6,3
Кокъ-чигить	10	24/vii	10,0	12,0	7,8	10,8	9,4	8,8	9,7	8,7	9,1	7,5		8,2	7,0	6,5	5,7	5,4	4,0	2,6	1,7	1,1	0,7	0,2	0,5	0,5	-		-	<i>:</i> —	-	-	6,0
Гольдъ Стандартъ	10	20/vIII	8,3	11,5	10,6	11,9	7,2	6,6	3,9	5,4	4,4	5,4		5,0	6,1	4,6	4,4	3,3	3,1	2,5	1,8	1,4	0,9	0,5	0,2	-	-	-	_	.—		-	4,9
Диксонъ Кларъ	3	4/viii	12,5	9,0	17,1	13,8	4,3	12,3	6,6	6,3	5,6	6,6		5,8	7,6	3,5	5,8	5,6	6,6	2,6	2,9	2,2	1,5	1,0	1,5	0,1	0,1	-	-	-	-		5,9
Мельсъ Селектъ Иджип- шенъ	8	18/vIII	12,1	10,7	8,3	10,0	9,5	8,6	8,8	8.8	8,3	8,3		7,5	6,5	5,5	4,8	3,9	3,0	2,4	1,4	0,9	0,2	0,08	_	-	_	-	-		-		6,2
Труитъ	10	$22/\mathrm{vII}$	8,1	9,5	11,0	10,9	6,9	6,4	5,5	5,3	5,4	4,5		4,0	4,0	3,0	2,6	2,1	1,3	0,7	0,3	0,2	-	-	-	-		-	-	_	-	-	4,8
Гиндаль Селектъ	10	26/vIII	6,8	8,4	11,9	12,7	10,4	10,3	7,1	6,6	5,8	4,7	F	4,2	5,0	3,6	3,9	3,9	2,9	2,2	1,6	1,4	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1	0,5	-	_	(100)	-	4,6
Кара-чигитъ	12	14/vIII	10,4	12,1	10,8	9,3	9,2	9,1	9,3	10,2	11,0	11,5		12,0	11,2	10,5	9,1	7,7	7,1	5,8	5,3	4,4	3,7	3,0	2,3	1,7	0,7	0,4	0,2	_	-	_	6,9
Блю Риббонъ	10	4/IX	12,5	13,0	13,8	13,4	12,3	6,3	5,5	4,7	3,9	2,7		2,9	2,7	3,3	2,9	2,7	2,4	2,0	2,4	2,3	1,4	1,4	0,6	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,05	-	4,
Прайдъ-офъ-Джорджія	10	16/vIII	9,8	12,5	12,7	7,9	6,7	8,0	7,9	6,8	8,2	5,8		7,9	7,7	5,0	5,9	4,8	4,5	3,7	2,4	2,1	1,4	1,2	0,8	0,3	0,1	0,05	, —	-	-		5,5
Христофоръ Лярджъ	10	12/vIII	10,5	10,2	13.3	12,5	9,7	10,6	9,4	4,9	6,9	7,6		6,5	6,4	5,8	6,3	7,8	4,7	4,4	3,2	2,2	1,7	1,5	0,7	0,3	0,2	0,1	0,03	-	-	-	5,7
Бендересъ	7	5/vIII	8,8	9,6	7,7	6,4	6,4	6,1	6,6	6,1	8,2	5,2		4,5	4,5	3,0	2,6	1,2	1,0	0,8	0,6	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	_	-	-	4,4
Эксцельзіоръ пролификъ.	10	26/vIII	8,4	3,7	2,2	2,7	2,4	4,0	3,3	3,4	2,8	3,1		2,7	2,5	2,1	1,6	1,1	1,1	1,1	0,6	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-	-		-	-	2,4
Аунсъ Болъ	5	20/vII	6,8	12,5	12,8	13,5	4,6	8,7	10,4	8,6	6,7	6,9		6,5	5,0	5,1	3,8	4,2	3,5	2,6	1,6	0,5	0,4	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	5,7
Афифи	5	29/vIII	14,0	14,5	13,3	13,4	11,7	13,2	3,1	5,9	8,8	11,9		8,5	12,4	12,8	12,3	10,0	10,9	9,2	8,8	8,5	6,9	5,2	5,5	4,0	4,6	3,6	2,6	1,6	0,9	0,5	8,2
Ашмуни	. 10	28/vIII	17,3	15,9	13,8	13,4	7,7	9,3	8,2	10,2	9,6	11,7	4	12,1	11,5	10,2	9,5	9,6	8,6	8,2	7,2	6,2	6,0	3,8	3,0	1,8	1,5	1,0	0,9	0,4	0,3	0,2	7,5
<b>Рлорадора</b>	8	10/v <del>1</del> 11	15,6	14,3	16,6	16,5	8,0	6,3	7,7	5,2	5,4	5,2	1	4,6	5,0	4,5	3,5	4,3	3,5	2,2	1,8	1,8	1,5	1,1	0,8	0,5	0,3	0,1	-	-	-		5,5
Саудзернъ Гопъ	8	27/vIII	13,1	12,3	14,0	9,3	9,1	7,8	6,1	7,1	6,8	6,8		5,8	4,8	4,8	5,5	4,0	3,5	2,8	2,0	2,1	1,0	0,7	0,1	0,06	s	-	-	-	-	-	5,6
Андижанскій Абасси	5	26/vIII	10,6	12,2	7,0	7,4	4,8	3,8	3,8	3,0	3,0	2,6		2,8	2,2	1,6	1,8	1,6	0,8	0,5	0,2	0,5	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-		3,2
Кингъ	10	26/v111	12,5	10,8	8,6	6,3	5,3	6,2	6,9	6,4	5,8	6,4		5,9	5,5	4,6	4,9	3,5	2,8	2,7	2,0	1,5	2,3	0,6	0,3	0,1	-	-	-	_	-	-	4,8

Таблица сравненія сортовъ хлопчатника по числу листьевъ на растеніяхъ (уч. № 9).

	Iuo	лица (	рав	IICI.	1111	OPI						110	-																			
	cars-	- Тол					]	II	0		M	Е	2		4			В	1	В	T		В		Е	į	ĺ.					ли-
НАЗВАНІЕ СОРТА.	Число изслудованныхъ растеній.	Время п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Число ли- стьевъ на
шторо																																
Кингъ Алленъ	13	30/vII	16,7	21,0	18,9	17,6	11,0	9,2	6,9	5,6	6,0	5,9	<b>3</b> ,6	5,7	5,3	5,0	4,4	4,0	3,3	2,5	2,0	1,3	0,9	),3	1	-	-	-	-	218/54	1	159,
Алленъ Кингъ	18	29/v11	12,9	14,1	16,2	11,5	7,1	6,0	5,3	5,6	4,5	4,1	3,9	4,0	3,4	3,1	3,2	2,5	2,1	1,6	1,8	0,8	0,3	),27	0,05	-	-	-	-		-	114
Руссельсъ	17	9/vIII	20,1	23,5	20,1	18,1	17,5	11,9	13,0	12,5	10,1	12,7	10,0	9,7	9,4	7,9	7,6	5,7	5,4	4,0	3,2	2,5	2,0	,7	1,1	0,5	0,2	0,1	0,1	-	-	230
Кокъ-чигитъ	10	24/уп	10,4	13,6	12,6	14,7	13,0	10,8	8,6	7,9	8,0	6,1	6,6	5,7	5,9	5,2	4,8	3.6	2,6	2,0	1,3	1,1	0,2	),2	0,2	-	-		-	-	-	145
Гольдъ Стандартъ	10	20/vIII	10,9	16,7	16,3	20,2	12,1	11,1	6,8	8,1	6,2	6,6	6,0	6,6	6,0	5,0	4,4	3,9	3,6	3,1	2,4	2,0	1,0	),6	-	-	-	-		-	$\overline{a}$	159,
Диксонъ Кларкъ	.3	4/v111	23,0	11,0	29,0	19,0	10,3	11,3	10,3	8,3	7,6	8,6	8,0	9,6	8,0	9,6	8,3	10,1	4,6	4,0	3,0	2,0	2,0	,6	0,6		-	-		-	-	135,
Мельсъ Селектъ Иджип- шенъ	8	18/viii	16,3	14,1	10,7	12,0	7,6	6,7	6,6	6,3	5,8	5,2	5,3	5,0	4,5	4,1	3,3	3,1	2,8	2,3	1,2	0,7	0,3	_	<u></u>	-	_		_	_	_	123.
Груитъ	10	22/vII	9,3	11,6	14,4	13,4	8,8	7,4	6,3	5,6	5,0	5,0	4,7	4,9	4,1	3,7	2,8	2,6	1,5	0,8	0,4	-	-	-	11.7	-	-	-	-	-	-	112
Гиндаль Селекть	10	26/v11	10,0	13,7	19,0	21,6	20,1	15,6	10,7	11,1	9,4	7,8	8,9	8,1	7,2	6,6	5,9	4,9	4,1	3,5	3,0	1,9	1,1	),6	0,5	0,3	0,2	-		+	-	145
Кара-чигитъ	12	14/viii	15,1	23,1	21,2	14,6	12,6	11,6	7,6	6,5	8,2	7,5	8,3	8,1	80	7,5	6,0	6,1	5,0	4,6	4,2	3,6	3,1	2,8	2,4	1,6	0,8	0,4			_	200
Блю Риббонъ	10	4/IX	10,2	10,3	11,0	11,2	10,2	5,7	5,9	5,0	5,3	4,3	4,3	4,6	5,0	4,5	4,5	3,6	3,3	3,8	3,5	2,2	1,9	,0	0,9	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	-	123
Прайдъ-офъ-Джорджіа.	10	16/vIII	13,5	15,2	17,9	13,2	9,1	8,0	8,4	7,6	9,6	7,6	8,5	8,7	6,4	6,6	5,9	5,1	4,3	3,8	3,1	2,6	1,7	9,9	0,8	0,5	0,2	-	-	-		169,
Христофоръ Лярджъ .	10	12/vIII	13,8	14,4	20,4	18,1	15,9	15,0	15,1	7,5	8,8	9,7	8,4	7,6	7,5	7,4	8,0	6,4	4,9	4,0	3,1	2,6	1,9	,2	0,9	0,5	0,2	0,2	-			203
Бендересъ	7	5/vIII	14,5	14,7	12,1	9,8	10,2	7,7	7,0	7,0	6,4	6,1	5,2	5,5	4,7	3,5	3,0	2,5	2,2	1,0	0,5	0,1	-	_	20	-	-	-	-	-	_	123,
Эксцельзіоръ пролиф	10	26/vIII	7,8	4,1	2,9	3,6	3,5	4,5	3,5	4,0	3,2	4,1	3,6	2,9	3,1	2,6	2,2	1,9	1,1	1,3	0,7	0,5	0,2	-		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	-	-	-	-	-	61,
Аунсъ Болъ	5	·20/vII	10,0	23,6	22,8	21,2	8,2	11,0	11,8	10,4	7,8	7,8	7,4	6,2	6,4	6,0	4,6	4,2	3,4	3,4	1,8	1,6	1,0	,6	_	-	-	-	-	-	_	181,
Афифи	5	29/vm	14,4	13,2	14,0	12,4	11,2	11,6	2,2	5,0	8,6	7,6	5,2	11,2	10,3	11,0	9,5	8,6	7,5	7,0	7,0	5,6	4,5	,0	4,1	4,5	0,3	2,5	1,5	0,2	0,3	208,
Ашмуни	10	28/viii	13,1	12,0	8,9	9,7	4,2	5,5	3,5	5,0	4,9	5,2	,3	5.2	4,7	4,4	4,3	3,6	3,5	3,7	2,6	1,9	1,7	,4	0,9	0,7	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	117,
Рлорадора	8	10/viii	12;0	11,6	13,7	13,2	7,6	5,3	6,6	5,0	5,8	6,0	3,0	5,3	5,5	4,5	5,2	4,5	2,5	2,6	2,5	2,0	1,3 1	,0	0,8	0,5	0,1	-	-	-	-	130,
Саудзернъ Гопъ	8	27/vIII	11,5	11,6	10,7	8,2	7,7	6,5	4,5	5,3	4,7	4,5	£,5	3,5	3,7	3,5	3,2	2,7	2,0	1,8	1,7	1,0	0,7	,3	0,1	-	-	-	-	67	_	103,
ндижанскій Абасси .	5	26/vIII	13,0	17,6	8,4	8,4	5,8		4,8	4,2	4,0	2,8	3,2	3,0	2,6	2,2	2,0	1,6	0,8	0,6	0,8	0,4	0,2	,4	-	-	-	-	-	-	_	91,
Сингъ	10	26/vIII					5,2	5,8	6,6	6,4	5,6	6,2	5,6	4,4	5,3	4,8	3,8	3,0	2,6	3,0	2,2	1,7	1,5	,8	0,2	-	-	-	-	-	_	112,

Табл. № 30.

Таблица сравненія сортовъ хлопчатника по цвѣтамъ и бутонамъ на растеніяхъ (уч. № 9).

парраців порта	Время	из- з. ра-					H		0	1	MI .	E	P	Α	C.			В		Ъ		T	В		Е		й.					буто- 1 цвѣ-
HA3BAHIE COPTA.	подсчета.	Число из сл'ядов. ] стеній.	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Число новъ и
																			ı		,											
Кингъ Алленъ	30/vII	13	5,4	6,9	6,0	5,8	2,8	1,6	1,1	0,8	1,7	1,3	1,6	2,07	2,8	2,2	2,6	2,7	2,5	1,9	1,8	1,2	1,2	1,0	),2	-1	-	-	-	-	-	55,0
Алленъ Кингъ	29/vII	18 .	3,5	6,4	8,1	4,0	1,7	1,6	1,6	2,2	1,5	1,7	1,8	2,1	1,6	1,8	2,6	1,65	2,1	1,7	1,3	0,8	0,4	0,3	),05		-	-	-		-	50,5
Руссельсъ	9/vIII	17	2,2	2,9	1,8	1,35	0,6	0,6	0,65	0,3	0,9	0,8	0,65	0,65	0,8	0,7	0,9	0,6	1,05	0,7	0,9	0,55	1,17	0,7	),5	0,2	0,1	),05	0,05	-	-	22,3
Сокъ-чигитъ	24/v11	10	3,2	3,6	3,1	4,3	2,8	2,0	1,6	1,5	2,8	2,1	1,9	2,2	3,2	2,3	2,2	2,8	2,0	1,8	1,2	0,6	0,2	0,2	0,2		-	-		-	-	47,8
Сольдъ Стандартъ	20/vIII	10	0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	-	0,1	-	0,1	0,2	0,3	0,5	0,2	0,1	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	5,7
Циксонъ Кларкъ	4/viii	3	7,3	2,3	8,6	4,9	1,2	1,0	1,6	2,3	2,6	3,2	4,6	4,9	1,3	3,6	5,6	4,6	1,6	3,0	2,3	1,6	1,6	1,3	0,6	0,6	-	-	-		_	72,2
Мельсь Селектъ Иджип-									, .																							
шенъ	18/vIII	8			0,1		_	-	-	0,1			0,2			-	0,1			0,2	0,1	-	0,1	-		-		-		-	-	1,9
руитъ	22/vII	10	100			6,2			1,3			6	•	2,6			2,0			1,1				-	-	-	-	-		-		45,8
Гиндаль Селектъ	26/vII	10				10,3	7,5	6,6	4,1	3,6					3,5				3,2						0,5	0,4	0,2	-	-	-	-	93,4
Кара-чигитъ	14/vIII	12	1,2	1,8	1,2	0,7		1,39	0,3	-	0,4	0,5	1,18	1,09	1,09	1,0	0,8	0,8	0,5	0,9	1,0	0,8	0,9	0,8	0,6	0,5	0,2	0,2	-	_	-	19,9
Блю Риббонъ	4/IX	10	-	-	0,1	_	-	-	-	-	_	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		_	_	-	-	-	0,1
Ірайдъ-офъ-Джорджія	16/vIII	10	1,1	1,1	1,1	1,5		1000	0,3	0,4			1,0			1,1	0,9	1,5	1,6	1,2	0,9	1,1	1,0	0,6	0,4	0,2	-	-	-	-	-	20,
Христофоръ Лярджъ	12/vm	10	1,2	1,3	1,5	1,7	1,0	0,5	0,9	-	0,6	0,7	0,5	0,7	1,2	1,5	2,0	1,3	1,3	1,5	1,1	1,4	1,0	0,4	0,5	0,3	1,2	0,1	-	-		24,
Бендересъ	5/viii	7	2,6	1,4	0,6	0,4	0,3	0,2	0,8	0,6	0,5	0,6	0,5	0,9	0,8	1,1	1,1	1,1	1,0	0,5	0,2	0,1	-321	-	+	_	-	_	_	-	1370	15,
Эксцельзіоръ пролиф	26/vIII	10	0,8	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-	0,3	-	0,4	0,3	0,1	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0.4	0,4	0,1	-	-	_	-	-	-	_	-	5,
Аунсъ Болъ	20/vII	5	3,8	7,4	9,4	6,6	2,0	3,8	3,8	5,4	3,2	2 4,2	4,2	3,6	0,2	0,4	0,2	0,2	-	-	_	-	-	_	_	-	-	-	_	-	-	68,
Афифи	29/vIII	5	1,9	1,9	2,0	2,0	1,8	3 1,5	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,3	0,8	0,6	0,4	0,6	0,5	1,3	0,8	1,2	0,8	0,8	1,0	0,5	0,5	22,
Ашмуни	28/vIII	10	6,6	5,0	2,0	2,3	1,1	0,6	0,5	0,2	1,0	0,6	1,2	1,0	1,0	0,9	1,1	1,2	1,4	1,1	1,5	1,4	0,9	1,0	0,6	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	36,
Флорадора	10/vIII	- 8	4,3	4,5	3,6	4,3	0,8	8 0,6	0,3	0,2	0,1	0,6	1,1	0,5	1,2	0,3	1,0	1,1	0,7	1,5	0,8	0,5	1,1	0,5	0,6	0,3	0,1	-	_	_	_	30,
Саудзернъ Гопъ	27/vIII	8.	1,1	0,3	0,9	-	-	0,1	-	-	-	-	-		0,1	0,1	-	_	-	-	0,2	0,1	0,1	-	0,1	-	-	_	-		-	3,
Андижанскій Абасси	26/vII	5	1,2	2 1,2	2 -	0.6	0,8	8 -	-	-	-	-	-	-	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	-	0,2	_	_	_	_		-	-	_	_		5,
Кингъ	26/vIII	10	0,6	3 -	0,1	0,3	0,	1 -	0,2	0,3	-	0,5	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	_	0,1	0,2	_	_	_		_	-	-	-	_	_	-	- 3,

Табл. № 31.

Таблица сравненія сортовъ хлопчатника по числу зеленыхъ коробочекъ на растеніи (уч. № 9). 1911 г.

B Й. Число Число из-сл'ядов. рас-стеній. пераскры-Время тыхъ коро-HABBAHIE COPTA. 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 17 18 19 20 21 22 | 23 24 | 25 | 26 | 27 | 28 бочекъ. подсчета. 5 8 2 3 4 6 2,3 | 2,0 | 1,4 | 1,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 37,9 0,3 | 3,6 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 2,8 30/vII 13 2,1 | 2,5 | 1,6 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,05 | 0,05 35,0 1,5 | 2,6 | 3,2 | 4,7 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,8 18 29/vII Алленъ Кингъ . . . . . . . 3,3 | 3,9 | 2,8 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 60,4 3,5 | 5,1 | 4,2 | 3,8 | 4,8 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 4,0 17 9/vIII 3,3 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | 1,1 | 0,4 | 0,1 36,1 1,2 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 4,2 | 3,2 | 3,3 10 24/vII 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.10,1 0,1 0,1 0,1 42,8 \_ - | 0,2 | 0,2 | 0,10,1 10 20/vIII Гольдъ Стандартъ . . . . . 2,6 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,3 41.1 1,6 | 2,3 | 6,3 | 4,6 | 2,0 | 3,3 | 4,3 | 3,6 | 4,0 | 3,3 Диксонъ Кларкъ . . . . . 3 4/vIII Мельсъ Селектъ Иджин-2,2 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 0,7 0,1 0,3 39,2 1,8 | 3,1 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 2,8 | 3,1 | 2,6 | 3,0 18/vIII шенъ . . . . . . . . . . 1,2 0,9 0,8 0,6 21,5 0,2 1,1 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 1,5 | 1,9 22/vII 10 3,1 2,4 2,1 1,2 1,2 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1 41,7 0,7 1,3 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 3,1 | 3,6 | 2,8 Тиндалъ Селектъ. . . . . . 26/vII 10 3,8 | 2,1 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 1,3 1,0 0,5 0,5 58,5 2,4 5,4 | 4,5 | 3.0 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 4,0 12. 14/vII 1,7 1,8 1,9 1,3 1,5 1,5 1,3 1,2 1,1 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 34,2 1,6 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 1,7 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 1,1 10 1,5 Блю Риббонъ . . . . . . 4/IX 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,1 0,6 0,1 0,1 42,3 Прайдъ-офъ-Джорджія . . 16/vIII 0,2 1,8 | 3,9 | 3,5 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 2,2 10 2,8 3,1 2,9 2,3 2,4 1.5 1,4 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 48,1 1,9 3,3 4,1 2,4 2,4 5,7 2,6 2,5 2,9 Христофоръ Лярджъ . . . 10 12/vIII 1,5 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,1 35,0 3,0 | 2,4 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | 2,5 Бендерсъ . . . . . . . . . . . . 5/VIII 1,7 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 0,2 0,1 23,5 Эксцельзіоръ пролиф.... 10 26/VIII 1,9 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 3,0 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,2 42,0 Аунсъ Болъ ...... 1,2 2,8 2,6 4,2 2,6 3 4 4,4 4,0 3,6 3,4 5 20/vII 2,2 | 3,3 | 3,7 | 1,2 | 2,6 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 55,8 3,7 | 3,7 | 5,5 | 4,0 | 3,1 | 5,5 | 0,5 | 1,7 | 3,2 | 3,2 29/vIII Афифи...... 4,7 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 79,4 Ашмуни . . . . . . . . . . . . . . . . 10 28/VIII 9,3 | 12,6 | 7,4 | 3,7 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 4,5 | 3,9 | 5,3 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,115,7 0,5 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,2 0,5 Флорадора . . . . . . . . . . . . 10/vIII 2,0 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,2 0,6 0,1 0,3 37,9 2,5 | 3,7 | 3,5 | 4,5 | 2,3 | 2,7 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 2,2 Саудзернъ Гопъ. . . . . . 27/VIII 1,4 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 26.0 3,2 | 4,0 | 3,6 | 2,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 1,0 Андижанскій Абасси. . . . 26/vIII 2,4 2,0 1,7 1,8 1,7 1,1 0,9 0,8 0,5 0,5 0,2 0,2 37,2 10 26/viii 3,3 2,6 3,2 2,3 2,2 1,8 2,5 2,1 2,1 1,3

Табл. № 32.

Таблица сравненія сортовъ хлопчатника по числу опав шихъ цвѣтовъ и бутоновъ на растеніи (уч. № 9). 1911 г.

паранта доржа	изсл <sup>†</sup> ыхъ ій.	Время					Н		0	N	I	Е	P		A			В		B		T	H		E		Й.				Число опав
HA3BAHIE COPTA.	Число изслъ- дованныхъ растеній.	подсчета.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	8 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	шихъ цвѣт и бутон.
Кингъ Алленъ	13	30/vII	1,0	0,8	1,3	1,2	1,6	1,0	0,7	0,6	1,2	1,0	0,9	0,	5 0,	0,9	0,4	0,3	0,1	0,3	0,1	0,07	_	0,07	-	_	_	_	_	_	14,7
Алленъ Кингъ	18	29/vII	0,5	0,4	0,8	0,2	0,3	0,6	0,7	0,3	0,9	0,2	0,8	5 0,	2 0,3	3 0,4	0,1	0,1	0,2	0,05	0,05	0,1	_	0,05	_	_	-	_	_	_	6,9
Руссельсъ	17	9/vIII	1,9	2,4	2,5	3,0	2,5	1,7	1,3	1,5	1,6	2,1	1,4	<b>1</b> ,	7 1,7	1,8	1,5	1,1	1,0	1,0	0,7	0,7	_	_	_	_	_	_	_	_	32,8
Кокъ-чигитъ	10	24/vII	0,1	0,5	0,2	0,5	0,7	0,5	1,0	0,9	0,7	0,8	1,	0,	6 0,3	0,2	0,4	0,3	0,5	0,1	0,2		_	_	_	_	_	_	_	_	9,6
Гольдъ Стандартъ	10	20/vIII	0,4	1,2	0,8	1,4	0,3	1,4	0,9	1,4	1,3	1,7	1,	1 1,	3 2,5	1,4	1,1	1,0	0,9	1,0	0,4	0,4	0,3	_	_	-			_	_	22,2
Диксонъ Кларкъ	3	4/vIII	1,3	1,6	2,0	2,3	2,0	1,3	1,0	0,3	0,6	1,6	0,6	$\begin{vmatrix} 2 \end{vmatrix}$	6 1,0	1,6	1,0	0,6	1,3	0,3		0,3	_	_		_	_	_	_	_	23,3
Мельсъ Селект. Иджип-																															3
шенъ	8	18/viii	2,2	1,5	2,1	2,6	1,5	1,6	2,1	1,5	1,8	1,3	1,	1 1,	7 0,8	3 1,0	0,8	1,2	1,0	0,7	_	0,3	-	-	-	-	-	-		-	26,8
Груитъ	10	• 22/vII	0,2	0,1	0,7	0,1	0,5	0,8	0,7	0,3	0,9	0,5	0,3	0,	4 0,8	0.1	-	-	-	_	-	_	_	-	_	-		-	-	_	6,1
Гиндаль-Селектъ	10	26/vII		0,2	0,5	0,5	0,7	1,0	0,3	0,7	0,6	0,5	0,5	0,	2 0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	-	_	_	_	_	-	_	7,3
Кара-чигитъ	12	14/vIII	1,0	2,8	3,2	2,5	2,5	2,0	2,2	1,7	1,5	2,3	1,6	3 1,	1,8	1,5	1,4	0,9	1,0	1,0	0,5	0,3	0,5	0,5	0,2	_	_	_	_	_	34,9
Блю Риббонъ	10	4/IX	2,1	2,7	3,2	3,9	3,8	1,6	2,6	1,9	1,7	1,2	1,6	3 1,	2 1,1	1,5	1,1	1,2	1,3	0,8	1,0	0,8	0,8	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	38,7
Прайдъ-офъ-Джорджія	10	16/vIII	1,2	1,9	1,6	1,4	1,7	1,7	2,0	1,7	1,7	1,0	1,4	1,	0,7	0,9	0,3	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	_	0,2	_	_	_	_	_	22,3
Христофоръ Лярджъ	10	12/vIII	1,2	1,8	2,7	3,3	2,2	2,5	3,1	2,0	1,6	1,9	2,2	2 1,	1,7	1,3	1,3	1,3	0,6	0,5	0,4	_	0,3	0,2	0,3	0,1		_			34,2
Бендересъ	7	5/vIII	0,7	0,8	2,0	1,4	1,8	2,2	1,7	1,7	1,7	1,8	1,5	2 0,	0,7	0,4	0,8	0,5	0,5	0,2	_	0,2	_	_	_	_	_	_	_		21,0
Эксцельвіоръ пролиф	10	26/vIII	2,3	1,5	0,4	1,0	0,8	1,3	1,2	1,3	1,1	1,2	1,0	0,9	0,5	0,7	0,6	0,3	0,2	0,2	_	_	_	_	_	_		_	_	-	16,5
Аунсъ Болъ	5	20/vII	-	-	_	_	-	0,2	0,2	0,4	_	0,4	0,2	0,5	0,2	-	-	_		0,2		1	_	_			_	_	_		2,0
Афифи	5	29/vIII	-	-	_	0,2	_	_	0,2	0,2	_	0,2	0,5	3 -	0,1	-	-	-	_	_	_	0,1	_	_		_	-	_	_		1,3
Ашмуни	10	28/viii	_	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2	_	_	0,1		0,	5 -	-	0,1	0,1	_	0,1		_			_	_		_	_	_	2,2
<b>Р</b> лорадора	8	1.0/vIII	5,2	4,3	6,5	6,6	4,5	4,3	4,0	3,5	3,8	3,1	2,5	2,5	2 1,8	1,5	2,3	1,6	1000	100	0,6	0,2	0,1		_		_				60,7
Саудзернъ Гопъ	8	27/vIII	0,3	1,2	2,7	1,5	1,6	2,1	1,6	1,1	1,0	1,1						0,3					_	_	_			_		_	18,1
Андижанскій Абасси	5	26/vIII	3,0	4,2	2,2	3,0	1,6	1,6	1,2	1,6	1,4	1,2						0,6				_	_	_	_			_			26,6
Кингъ	10	26/viii	1,5	1,7	2,8	2,8	1,3	2,3	1,5	1,6	1,9	1,8						0,6				0,2	0,1	0,1	_	_	_	_	_	_	27,2
														1			,		-,3												

 $Taбл. \ \mathcal{N} \ 33.$  Таблица сравненія сортовъ хлопчатника по числу раскрывшихся коробочекъ на растеніи уч. **№** 9. 1911 г.

название сор-	зслъ- геній.	Время				Н		0	M		Е	P		A			В	Ŧ	3	T		В		Е		Й.		•		рас- ъ ко-
товъ.	Число изслъ- дов. растеній.	под- счета.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 2	20 2	1 2	22 2	23 2	24 2	5 26	3 27	28	Число рас крытыхъ
Руссельсъ	17	9/v111	_	0 <b>,</b> 05	_	0,1	0,1	0,05	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100			<u></u>		_	_					-			_ -	- -	_ -			-		0,8
Мельсъ Селектъ Иджипшенъ	8	18/vIII		0,1	0,5	0,3	0,2	0,1	_	-	-			_	_			_	_			- -		- -	- -			-		1,5
Кара-чигитъ	12	14/v111	-	-		0,1	0,1	0,2	0,09	-	-	-	-		_	-			_	-		- -	- -	-	- -	- -		-	-	0,4
Блю Риббонъ	10	4/IX	0,3	0,4	0,1	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	0,8	0,5	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	-		-	- -		- -	- -	- -	- -	- -	-	-	8,1
Эксцельсіоръ пролиф	10	26/v111	0,3	0,3	1,1	1,1	0,6	0,2	_	0,1		_		_	-	_		_	_	_	-	_ -		- -	-	-		_	-	3,
Флорадора	. 8	10/vIII	0,1	1,1	1,2	1,0	0,6	1,2	1,6	0,6	0,6	0,7	0,1	0,2	0,7	0,6	0,1	0,2	0,1	0,2		-			- -	-			.	10,9
Саурдзенъ Гопъ	8	27/v111		_	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	-	-	-	_	_		_	-	_	-	-		- -	- -	-	-		-	1,5
Андижанскій Абасси	5	26/v111		_	0,5	0,2	0,5	0,5	0,6	0,2	0,3	0,1		_		_			_	_			_ -							2,9
Кингъ	10	26/vIII	0,2	0.6	1,0	1,0	1,3	1,2	0.8	0,7	0,3	0,2	_		_		_		<u> </u>	_	_				_	_ -	_			7,3

Въ виду того, что подсчеты производились неодновременно на всёхъ сортахъ, данными приведенныхъ таблицъ нельзя пользоваться, какъ сравнительными для всёхъ сортовъ; данныя эти интересны для характеристики каждаго сорта въ опредъленный періодъ развитія; полное сравненіе становится, конечно, возможнымъ для одновременно изследованныхъ сортовъ.

Мзъ таблицы № 28 слъдуетъ, что небольшимъ числомъ боковыхъ вътвей и наименьшей средней длиной ихъ характеризуется сортъ Эксцельзіоръ Пролификъ и Андижанскій Абасси; 26 августа растенія перваго имъли въ среднемъ 21 вътвь со средней длиной въ 2,4 вершка; растенія второго имъли тогда же 22 вътви со средней длиною въ 3,2 вершка; тогда какъ сорта Кокъ-чигитъ, Кингъ Алленъ, Алленъ Кингъ, Труитъ и Тиндаль Селектъ въ концѣ іюля имъли среднюю длину вътвей: Кокъ-чигитъ 6 вершк. при 23-хъ вътвяхъ, Аунсъ Болъ 5,7 верш. при 22-хъ вътвяхъ, Алленъ Кингъ 3,8 вершк. при 23-хъ вътвяхъ, Труитъ 4,8 вершк. при 19 вътвяхъ и Тиндаль Селектъ 4,6 вершк. при 26-ти вътвахъ.

Наибольшимъ количествомъ боковыхъ вътвей и наибольшей ихъ длиною обладаютъ Египетскіе сорта Афифи и Ашмуни, имъвшіе 28 августа 29 вътвей при средней длинъ 8,2 вершка и 7,5.

26 августа, когда былъ произведенъ подсчетъ растеній, оказалось, что листва сорта Эксцельзіоръ въ среднемъ им'ветъ 61,3 листа, а на вътвяхъ Андижанскаго Абасси ихъ насчитано 91,4. Напротивъ, такіе сорта, какъ Руссельсъ, Кара-чигитъ и Христофоръ им'вютъ большую многолистную крону; еще 9 августа первый носилъ на себъ 230,6 листьевъ (въ среднемъ), Кара-чигитъ лишь немногимъ уступалъ ему: среднее число его листьевъ равнялось 200,5, а у Христофора — 203,5.

Изъ таблицы № 30 видно, что наибольшимъ количествомъ цевтовъ и бутоновъ отличались сорта Тиндаль Селектъ, Аунсъ Болъ, Кокъ-чигитъ, Кингъ Алленъ и Алленъ Кингъ, имъвшіе въ концѣ іюля: первый 93,4 цвѣтка и бутона (въ среднемъ на одно растеніе), второй 68,4 цвѣтовъ и бутоновъ, третій 47,8, четвертый 55,0 и пятый 50,5. Большое количество цвѣтовъ и бутоновъ въ августѣ имѣли Диксонъ Кларкъ (4 августа) — 72,2 и Аунсъ Болъ (20 августа) — 68,4; изъ таблицы № 31-й и 33-й

слъдуеть, что въ концѣ іюля наибольшимъ количествомъ коробочекъ 42,0 и 41,7 въ среднемъ на растеніи обладали сорта Аунсъ Болъ и Тиндаль Селектъ Пролификъ. Сортъ Кара-чигитъ имѣлъ 14 августа въ среднемъ 59 коробочекъ на растеніи, изъ нихъ 0,5 раскрытыхъ; Руссельсъ 9 августа имѣлъ 60,7 коробочекъ — изъ нихъ 0,3 раскрытыхъ; сортъ Флорадора 10 августа имѣлъ 26,6 коробочекъ — изъ нихъ 15,7 нераскрытыхъ и 10,9 раскрытыхъ. Кингъ (26 августа) имѣлъ въ среднемъ 44,5 коробочекъ, изъ нихъ 37,2 не раскрытыхъ и 7,3 раскрытыхъ; Блю Риббонъ 4 сентября — 42,3 коробочки, изъ нихъ раскрытыхъ 8,1.

Таблица опаденія цвѣтовъ, бутоновъ и коробочекъ № 32 показываетъ, что особенно пострадалъ отъ массоваго опаденія органовъ цвѣтенія сортъ Флорадора, на вѣтвяхъ котораго 10 августа найдены слѣды 60,7 опавшихъ завязей (средняя величина для кустовъ). Можно думать, что сортъ попалъ въ ненормальныя для себя условія, хотя обстановка вегетаціи была однородна для всѣхъ сортовъ. Сравнительно обильное опаденіе цвѣтовъ, бутоновъ и коробочекъ (4 сентября) было у сорта Блю Риббонъ — 38,7 на растеніе, у сорта Руссельсъ 9 августа — 32,8, у Кара-чигитъ 14 августа — 34, и у Христофоръ 12 августа — 34,2 (въ среднемъ на одно растеніе). Египетскіе сорта обнаружили большую, если можно такъ выразиться, стойкость органовъ цвѣтенія. Число опавшихъ съ куста не провышало въ среднемъ 1,3 для Афифи и 2,2 для Ашмуни.

Далѣе слѣдуетъ остановиться на разсмотрѣніи урожайности сортовъ высѣянныхъ на участкѣ девятомъ. (Таблица № 34).

Наиболъ скороспъльми, съ урожаемъ свыше 50-и пудовъ на десятину въ первомъ сборъ, оказались сорта Аунсъ Болъ, давшій 1-го сбора 59 пудовъ на десятину, Кокъ-чигитъ — 56 пудовъ, Кара-чигитъ — 54 пуда и Труитъ — 53 пуда. Наиболъ цънными по результатамъ урожая 1-го и 2-го сборовъ, давшими въ суммъ болъ е 70-и пудовъ оказались Аунсъ Болъ — 77 пудовъ, Кара-чигитъ 74 пуд., Блю Риббонъ 72 пуд. и Саудзернъ Гопъ 70 пуд. урожая на десятину 1-го и 2-го сборовъ. Наиболъ урожайными по суммъ всъхъ 3-хъ сборовъ оказались Христофоръ Лярджъ, давшій 133 пуда сырца на десятину, Мельсъ Селектъ Иджипшенъ бълый — 101 пудъ и Гольдъ Стандартъ 98 пудовъ.

Табл. № 34. Урожайность сортовъ хлопчатника (уч. № 9).

названіє сортовъ.	Плошадь въ кв.			permoun nuogo I	r coops ypowan	на десятину.			п сооръ урожая	на десятину.			ш сооръ урожая	на десятину.		Итого урожая на	десятину.
	RIF																
Афифи	28	кв.	c.		10			10	п.	28	ф.	21	п.	17	ф.	32	пуд
Андижанскій Абасси	10	,,	,,	28	п.	05	ф.	14	"	02	,,	7	,,	02	,,	49	,,,
Эксцельзіоръ проли- фикъ	32	"	,,,	34	"	17	"	20	"	08	,,	14	"	27	"	69	,,
Руссельсъ	58	,,	,,	44	"	38	"	24	"	33	"	19	,,	26	,,	88	"
Бендересъ	44	, 11	,,	38	,,	07	"	22	"	20	,,	25	"	36	,,	86	,,
Христофоръ Лярджъ	73	,,	"	38	,,	08	"	27	,,	37	,,	46	"	34	,,	113	"
Прайдъ - офъ - Джор- джія	36	ינ	"	27	"	20	,,	31	"	26	"	38	"	13	"	97	"
Кара-чигитъ	52	"	,,	53	,,	37	"	20	,,	30	"	19	"	24	"	94	,,
Мельсъ Селекть Ид- жипшенъ	108	"	"	29	"	06	"	22	,,	09	"	24	"	17	"	75	,,
Мельсъ Селектъ Ид- жипшенъ	122	n	,,	38	"	24	"	26	"	02	"	36	"	15	"	101	,,
Гольдъ Стандартъ	140	"	"	39	"	17	"	30	"	17	"	28	"	11	,,	98	,,
Кингъ	154	"	"	48				15	"	07	"	8	,,	15	"	71	
Алленъ Кингъ	100	,,	"	31	"	32	"	21	"		"	18	"	-	"	70	"
Кингъ Алленъ	72	'n	,,	36				1	"	20	"	27	"	12	"	85	"
Тріумфъ	185	,,	"	39	,,	29	"	29	"	07	"	19	"	05	"	88	,,
Тиндаль Селектъ Про- лификъ	169	,,	"	33	"	36	"	25	"	36	"	21	"	12	,,	81	"
Саудзернъ Гопъ	49	"	"	48	"	14	,,	22	,,	01	,,	20	"	32	,,	91	,,
Кокъ-чигитъ	100	""	<b>'</b> "	56	,,	28	"	10.0		32		1 de		_		76	"
Диксонъ Кларкъ	128	,,	"	13.		37				38		1		38		76	,,
Влю Риббонъ	99	, ,,	"	45	,,	18	"	27	"	12	,,	21	"	08	,,	93	"
Труить	3	"	"	55	"	_	,,	100				100				75	,
Аунсъ Болъ	87	"	"	59	"	12	"	1700		24		1		02		88	,,
Флорадора	64	"	,,		-					22		100		20			
Ашмуни	57	"	,,	22	"	35	,,	18	,,	38	"	21	"	02	. "	62	, ,,

Испытанія и сравненія сортовъ производились дополнительно на участкі четвертомъ— 4-е поле пятипольнаго сівооборота (озимь, хлопокъ, пропашное, хлопокъ, бобовое). Высівяны были слідующіе сорта: Бендересъ, Прайдъ-офъ-Джорджія, Христофоръ Лярджъ, Кара-чигитъ, Мельсъ Селектъ, Гольдъ Стандартъ, Тріумфъ, Тиндаль Селектъ Пролификъ, Кокъ-чигитъ, Флорадора, Ашмуни, Афифи, Алленъ, Моссъ Импрувдъ, Тулъ Пролификъ, Труитъ, Абасси, Яновичъ.

Участокъ вспаханъ въ концъ февраля и въ концъ марта, послъдняя вспашка произведена была послъ предпосъвной поливки заливомъ. Перваго апръля произведенъ былъ посъвъ съялкой Баннера въ прямыя гряды съ полутора-аршиннымъ разстояніемъ между грядами, сдъланными листеромъ; послъ посъва — второго и третьяго апръля — для обезпеченія влагою всходовъ произведена поливка наполненіемъ листерныхъ арыковъ; когда всходы на всъхъ грядахъ подросли, послъдовала вторая поливка (18, 19, 20 апръля) и вслъдъ за нею начата прорывка всходовъ въ рядахъ, послъ которой лунки отдълилисъ разстояніемъ въ 12 вершковъ и въ каждой изъ нихъ росло по три куста. Въ дальнъйшемъ даны участку три ручныхъ мотыженія, пять поливокъ и шесть конныхъ пропашекъ культиваторомъ. Всходы почти на всъхъ сортахъ появились 6 и 7 мая, и только у сорта Труитъ 8 мая.

Цвътеніе прежде всего началось у сорта Кокъ-чигитъ (21 іюня), тогда же началось цвътеніе на сортъ Мельсъ Селектъ; 24 іюня началось цвътеніе на сортахъ Тиндаль Селектъ, Кара-чигитъ, Моссъ Импрувдъ и Алленъ; 25 іюня— на сортахъ Бендересъ, Тріумфъ, Христофоръ, 27 іюня на сортъ Флорадора, 28 іюня зацвълъ Гольдъ Стандартъ, 30 іюня Тулъ Пролификъ, 1 іюля началось цвътеніе у Труита и Абасси, и 6 и 7 іюля на Египетскихъ сортахъ Ашмуни и Афифи.

Черезъ 93 дня послѣ посѣва начали созрѣвать Кокъ-чигитъ и Кара-чигитъ, сорта культивируемые на Андижанскомъ Опытномъ Полѣ съ основанія его; изъ новыхъ сортовъ, культивируемыхъ на Андижанскомъ Опытномъ Полѣ съ 1909 года, на 97 день началъ созрѣвать сортъ Тиндаль Селектъ; самымъ поздноспѣлымъ оказался Египетскій сортъ Афифи, начавшій созрѣвать на 137-й день послѣ посѣва. Данныя о другихъ сортахъ приведены въ таблицѣ № 35.

Tабл. № 35. Таблица фенологическихъ наблюденій (уч. № 4).

1/v	6/v			
	6/7			
	()/ V	24/vi	20/vIII	112
'n	. "	25/vi	n n	. 112
	7/IV	1/vII	22/vIII	114
n	6/v	25/vi	20/vIII	112
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		24/vi	2/vIII	93
n	, ,,	21/vi	22/vIII	114
"	'n	28/v1	20/vIII	112
"	,,	25/vi	22/vIII	113
	7/v	94/701	5/vIII	97
			0	93
	7/v	27/vi	20/vIII	112
	6/v	6/vII	28/vIII	120
	7/v	7/v11	15/IX	137
"	6/v	24/vi	7/vIII	100
,,	,,	30/vI	25/vIII	117
"	8/v	1/vII	,	117
n	7/v	1/1111	n	117
	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	" 6/v " " " " " " " 7/v " 6/v " 7/v " 6/v " 6/v " 8/v	" 6/v 25/vi 24/vi 24/vi " 24/vi " 24/vi " 24/vi " 25/vi " 25/vi " 25/vi " 25/vi " 25/vi " 25/vi " 7/v 24/vi " 7/v 27/vi " 6/v 6/vii " 7/v 7/vii " 6/v 24/vi " 30/vi " 8/v 1/vii	" 6/v 25/vi 20/viii " 24/vi 2/viii  " 22/viii  " 22/viii  " 28/vi 20/viii  " 25/vi 22/viii  " 7/v 24/vi 5/viii  " 6/v 21/vi 1/viii " 7/v 27/vi 20/viii " 6/v 6/vii 28/viii " 7/v 7/vii 15/ix " 6/v 24/vi 7/viii " 8/v 1/vii "

Съ 26 августа по 2 сентября быль произведенъ подсчетъ и обмъръ 15-и растеній каждаго сорта по вътвямъ (таблицы №№ 36—41); подсчетъ показалъ, что наименьшее число боковыхъ вътвей (16 вътвей) имълъ сортъ Христофоръ Лярджъ; Прайдъофъ-Джорджія при 18-и боковыхъ вътвяхъ развилъ длину каждой лишь до 1,98 вершковъ въ среднемъ. Большою длиной боковыхъ вътвей характеризуются Египетскіе сорта; на сортъ Яновичъ сосчитано 22 вътви, при чемъ длина каждой вътви не менъе 5-и вершковъ, отдъльныя же нижнія вътви достигали длины въ 10,5 вершковъ.

Табл. № 36.

Таблица сравненія сортовъ хлопчат иника по длинъ вътвей (уч. № 4). 1911 г.

HADDAHID GODBORG	Число изслъ-	Время				Н	0		M	Е	I	P	A		В		Ъ	Т		В	E	Ì	İ.				длина 3ъ
HASBAHIE COPTOBЪ.	дов. ра- стеній.	подсчета.	1	2	3	.4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Средн. длина вътв. въ
Моссъ Импрувдъ	15	26/viii	1,3	2,5	3	3,4	3,5	3,3	2,8	2,8		2,7	2,4	2,3	2,2	2	1,3	1,5	0,9	1,2	1,5	0,7	0.5				2,1
Бендересъ		28/viii	3,4	3,6	3	1,9	2	2,4	2,2			1,7	2,3	2,3	1,7	1,9			1,4	1,6	1,0	2	3				2,1
8. I limited 05 100 to 15 to 15 to	3	27/vIII	1,4	2,6	4,4	3,4	2,2	2,2		2,8		3	3,1	2	2	1,5		1,3	1,4	1,5	2						
Сольдъ Стандардъ			3,2			en sid	2,9															1,5					2,1
Прайдъ-офъ-Джорджія		27/vIII			3	2,5		2,6	2	2,4		2,1	2	1,6	1,6	1,6			0,6	0,5	1	Ī		-		-	1,9
Афифи	8 — 8 83   188	28/vIII	4,9	0,5	6,5	8,1	7	6,6	8	5,6		6	5,1	4,1	4	3,1	2,9	3	3,5	3,2	_	Ī	-	-			3,7
Ашмуни		29/vIII	4,1	4	5	6	6,2	6,5	7	6,6		6,6	6	4,4	3,9	2,8		1,8	1,1	1,1	1	Ī	-		-		4,2
Кристофоръ Лярджъ	_	30/vIII	3	3,1	4	3	2,6	2,3	2,7	2,7		2	1,7	1,3	1,8	1,2	1	1,2	0,7		5 <b>—</b> 7	-	-	-	-		2,
Гріумфъ	-	31/vIII	3,7	4,3	4,8	4,5	4,3	4,2	3,8	3,3		2,8	2,5	2	1,4	1	0,8	1,2	1	0,5	10 <del></del> 17	-	-	-	-		2,
Сокъ-чигитъ		1/1 <b>x</b>	3,7	3,2	3,6	3,3	3,6	3,1	2,4	-2,3		2,3	2,1	1,9	1,5	1,3	1,6	1,3	1,7	0,9	0,8		-	-		-(-1	2,5
Рлорадора	-	2/1 <b>x</b>	6	3,6	3,2	3,8	3,8	4	4,5	4,4		3,8	3,8	3,6	2,9	2,1	2	1,7	1,2	1,2	1,1	0,5	0,5	_			2,9
Мельсъ Селектъ Иджипш.	-	27/vIII	3,8	2,5	2,8	2,6	4,1	4	4	3,6		3,4	3	3	2,6	2,5	2,1	1,7	1,5	1,8	1,1	1,1	1,2	0,5	0,5	5 ( ) 1 (1	2,4
Гулъ Пролификъ	_	29/vIII	4,3	5,3	5,3	5,3	6	6,4	6	5,7		5,6	4,5	4,2	4,2	4,1	3,4	3	2,1	1,6	1,8	1,6	1,1	1	0,5	_	3,8
Груитъ		30/viii	9	3,8	3,3	3,6	3,8	4,8	5,6	5,6		5,3	4,5	4,6	4,1	3,6	3,3	2,7	1,8	1,6	1,7	1,5	1	0,6	0,5	-	3,5
Абасси		30/vIII	10,9	9,6	8,3	4,6	4	4,3	4,5	4,2		4,9	3,7	4,4	4,1	3,8	3 6	3,2	3,1	3	2.	1,6	1,5	2	1,2	0,5	4,0
Сара-чигитъ	<u> 134</u>	1/1x	4,1	5,6	5,5	6	5,8	6	5,6	4,2		3,5	3,5	3,3	4,2	3,6	3,3	2,9	2,4	2	1,7	1,7	1,1	1,2	1	-	3,5
Гиндаль Селекть Пролиф.		2/1x	2,2	2,2	2,2	1,8	2,6	2,6	2,5	2		2,1	2	1,7	1,7	1,6	1	1,4	1,3	1,2		_	-	-	_		1,8
Алленъ		2/1x	3,7	4,4	3,5	4	3,7	4,4	4,1	3,7		3,2	3	3,4	2,4	2,4	2,3	2,5	1,9	1,7	1,1	2,2	1,7	2		-	2,9
Новичъ	_	2/IX	8,8	10,5	8,1	7,8	. 6	6,7	7	6,6		7	6,3	4,7	4,9	5,3	3,6	3,8	2,2	3,5	2,7	2	1	0,5	0,5	_	5,0
an marke compl. (1869 1846) harby kinges of					011	 	111																				

Табл. № 37.

	злѣ-	Dnova				Н		0	M	E	P	A		В	Ъ	T		В	Е	Й.					Число
названіе сортовъ.	Число изслѣ- дованныхъ растеній.	Время подсчета.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	листье на раст
Моссъ Импрувдъ	15	26/vIII	2,1	2,7	3,2	3,7	3,6	2,8	2,6	2,8	2,7	2,8	2,3	2,1	1,9	1,5	1,1	1,6	1,5	1,5	1	_	-	<b>—</b>	43,5
Зендересъ	_	28/vIII	8	5,6	4,5	2,2	2,9	2,5	3,3	3,6	2,4	3	3,5	2	2,5	1,9	1,9	2	1,8	1	3	2	_	-	59,6
Сольдъ Стандардъ	-	27/vIII	3 9	3,3	6,6	4,9	2,6	2,7	3	3,2	3,1	2,6	2,6	2,1	2,1	2	1,8	1,4	1,3	2	2	1	-	( <del>-</del>	54,
Ірайдъ-офъ-Джордж.		27/vIII	3,8	3,6	3,1	2,3	2,9	3	2,6	3	2,6	1,7	2	1,7	1,6	1,3	1,3	1	1	_	-	-	-	_	38,
фифи	_	28/vIII	4,1	4,3	2,6	4,3	3,5	2,9	3,3	2,5	2,1	1,8	1,5	1,4	0,9	0,8	1	1,5	1	1	_	-		_	40,
шмуни	_	29/vIII	5,9	3,2	3,6	3,6	3,6	4	3,9	3,2	3,5	2,8	2,5	2	1,6	1,3	1	0,7	0,6	1	-	_	-	_	48
Гристофоръ Лярджъ.	-	30/vIII	5,5	4	4,6	2,9	2.4	2,5	2,9	2,9	2,5	2	1,7	2,2	1,6	1	2,5	1,5	\$ <b>-</b>	-	-	-	-	-	42
ріумфъ	-	31/vII	4,7	5,4	4	3,3	3,3	3, 1	2,9	2,6	2,4	2,2	1,7	1,4	1	0,9	1 .	1	1	-	-		_	_	41
Сокъ-чигитъ		1/IX	3,9	2,6	3,7	2,6	2,6	2,5	2,3	2,7	2,7	2,2	2,1	1,7	1	1,9	1,5	1,3	0,7	0,3	_	-	-	-	38
Рлорадора	-	2/IX	8,2	4,4	2,6	3	3	3,2	3,5	3	3	2,7	2,6	2,3	1,7	1,3	1,5	0,5	1	1	1	-	-	-	49
ельсъ Селектъ Иджип- шенъ	-	27/vIII	3,8	2,5	2,8	2,6	4,1	4	4	3,6	3,4	3	3	2,6	2,5	2,1	1,7	1,5	1,8	1,1	1,1	1,2	0,5	0,5	53
улъ Пролификъ	-	29/vIII	5,7	5,9	6,2	3,5	4,2	5	٦,3	3,8	6	2,9	3	3	2,7	2,4	2	1,7	1,6	1	1	0,3	1	1	68
руитъ	-	30/vIII	9	3,8	3,3	3,6	3,8	4,8	5,6	5,6	5,3	4,5	4,6	4,1	3,6	3,3	2,7	1,8	1,6	1,7	1,5	1	0,6	0,5	. 76
баеси	-	30/vIII	9	1,7	9,3	5,2	2,9	3	3,2	3,5	3,8	3,3	3	3,7	3,5	3,4	2,3	2	2	1,5	1,1	0,8	1	1	70
Сара-чигитъ	-	1/IX	4,1	5,6	5,5	6	5,8	6	5,6	4,2	3,5	3,5	3,3	4,2	3,6	3,3	2,9	2,4	2	1,7	1,7	1,1	1,2	1	78
индаль Селектъ Прол.	_	2/IX	2,5	2,3	2,7	2,3	2,9	2,6	2,6	2,3	2,3	2,2	1,6	1,7	1,8	2,4	ı	1,3	2	-	-	-	_	-	36
Алленъ	-	$2/_{IX}$	3,7	4,4	3,5	4	3,7	4,4	4,1	3,7	3,2	3	3,4	2,4	2,4	2,3	2,5	1,9	1,7	1,1	2,2	1,7	2		61
Нповичъ	-	2/IX -	10,5	13,1	8,8	6	2,6	3	3	2,5	2,7	2,6	1,8	2,2	2,1	1,8	1,2	1,1	1,2	1	1	1	1	_	70

Табл. № 38.

Таблица сравненія сортовъ хлопчатника по цвътамъ и бутонамъ (уч. № 4) 1911 г.

ГАЗВАНІЕ СОРТОВЪ.	и <b>в-</b> зан. сій.	Время			Н		0	M		E	Р	A			В	Ъ	7	ľ	В	Е		Й.		a Vak		6yT.
AMARA AMARA	Число ив- слѣдован. растеній.	подсчета.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 -	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Число б
оссъ Импрувдъ	15	26/vIII	0,06		0,06	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,6	0,5	0,5	0,5	1,1	1,3	1	1	1	2,5			121	11,4
ендересъ	"	28/vIII	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,06	0,8	0,3	0,7	0,3	0,7	0,6	0,3	0,8	0,7	1,2	1,3	1,5	2	_			_	12,2
ольдъ Стандартъ	n	27/viii	0,1	0,5	0,5	0,3	-	0,06	0,2		0,2	0,06	0,3	0,3	0,06	0,6	0,8	0,5	1	1,3	_		_	_	11 <u>100</u>	6,7
райдъ-офъ-Джорджія	,,	27/vIII	-	0,1	-	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	1,2	1,6	1,3	0,3	2	2	_	-	_	_	_	11,5
фифи	. "	28/viii	0,1	1,2	0,06	0,8	0,9	0,4	1,3	0,9	1	1,6	1,1	1,9	1,8	1,4	2	3	3	3	4		_	_	-	29,9
шмуни	n	29/viii	0.6	0,5	0.9	0,3	0,6	0,5	0,9	1	1,4	0,9	1,2	1	1,6	1,2	1,8	1,6	1,6	1	-	_	_	_	-	18,6
оистофоръ Лярджъ	"	30/v111	0,2	0,06	0,1	0,2	-	0,1	0,06	0,3	0,06	0,2	0,1	0,4	0,5	1,1	0,6	2	_			-		1111	_	5,9
іумфъ	,,	31/vIII	0,06	-	-	-	-		-	0,1	-	-9	-/	-	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,06	-	-	-	-	1	1,0
атилир-ажо	,	1/1x	0,5	0,4	0,2	0,3	0,06	0,1	0,06	0,5	0,1	0,3	0,3	0,08	0,9	0,8	1,7	2,3	1,3	2,3			-	-	-	12,3
лорадора	"	2/1x	1,6	0,4	0,2	0,3	0,3	0,5	0,3	0,6	0,7	0,4	0,7	0,8	0,6	1,5	1	1,4	1,6	1,7	1,5	2	_	-		18,1
ельсъ Селектъ Иджипш.	,,	27/vIII	0,3	0,2	0,06	-	0,3	0,5	0,6	1	0,6	0,5	0,7	1,5	1,4	0,7	1,6	1,4	2	1	2	0,5	1,5	3		21,
улъ Пролификъ	n	29/vIII	0,6	0,9	1,2	0,5	0,4	0,6	1,1	0,7	2,3	0,9	1,7	1,1	2	2,1	1,4	1,9	1,4	2	1,3	1,6	2 ·	2		29,7
оуитъ	,,	30/vIII	2,9	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3	0,6	0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	0,9	1,1	0,9	0,9	1	1,1	1,5	1,1	2	2		23,
басси	'n	30/vIII	2,6	2,8	1,2	0,4	0,1	0,2	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	1,2	1,1	0,9	1,6	1,5	1,5	2,1	1,9	2	2	1	27,
ара-чигить	n	1/IX	5.5.5	0,06	-	0,1	_		0,06		-	0,06	0,06	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2		1	2		4,9
индаль Селектъ Пролиф.	, "	2/1x	0,3	0,7	_			0,06			0,1	0,1	0,4	0,3	0,4	0,7	0,7	0,6	-	0,2	-	_	-	Electronic Control	-	4,
пленъ	'n	2/ix .	0,6	0,7	Acc.	0,06			0,3	0,1	0,5	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,6	-		0,3			-	-	-	4,
новичъ	'n	2/1x	4,1	6	3,7	2	1,2	1,5	1,5	1	1,5	2,1	1,3	1,8	2,2	1,3	1,6	1,9	1,6	1,2	2,2	2	2	2	-	45,7

Табл. № 39.

			-																						
	nac.rk- bixb iñ.	Время				Н		0	M	E	Р	A		В	ъ		Т	В	Е	ĺ	İ.				He- ITSIXT
АЗВАНІЕ СОРТОВЪ.	Число изсл дованныхъ растеній.	подсчета.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Число не- раскрытыхъ
Іоссъ Импрувдъ	15	26/viii	0,4	0,5	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	0,5	0,7	0,5	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3		-	_	_	_	_		10,
Бендересъ	_	28/vIII	1	1	1,1	1,3	1	1,4	1	0,7	0,5	1	0,7	0,3	0,2	-	_		-			_	-	-	11,
ольдъ Стандарть	_	27/vIII	0,5	0,6	1,4	1,3	1,5	1,2	1,5	1,4	1,3	1	0,8	0,4	0,5	0,1	0,1	_	_	-	_		-	_	13
райдъ-офъ-Джорджія		27/vIII	1,6	2	1,4	1,2	1,6	2	1,3	1,7	1,7	1,4	1,6	1,1	1,1	0,6	0,6	1	0,5	1	-	) <del>-</del> ()		-	23.
фифи	_	28/viii	1,2	1,8	2,2	3	2,3	2	2	1,4	1,1	0,6	0,6	0,5	0,3	0,2	0,5	0,5	-	-	-		-	_	20
шмуни	_	29/vIII	1,4	1,4	2,1	1,9	2,3	2	1,7	1,4	1,3	1	0,3	0,2	0,06	_	-	_	-		_	_	-	_	17
Гристофоръ Лярджъ.		30/vIII	0,5	0,9	ı	0,9	1	0,9	1	1	0,9	0,5	0,3	0,6	0,7	0,7	0,5		10-	-	-		-		11
ріумфъ	_	31/viii	0,4	0,8	0,9	1	1	0,3	0,9	1	0,6	0,8	0,9	0,4	0,07	0,1	0,2	0,3	-	-	-	-		-	9
сокъ <b>-</b> чигитъ	_	1/1 <b>x</b>	0,06	0,4	0,3	0,6	0,7	0,6	0,9	0,4	0,8	0,1	0,09	i — i	1-0	-	-	_	-		_	-	_		4
Элорадора	_	2/IX	0,6	0,6	1	0,9	1	0,9	1,1	0,8	0,3	0,4	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	-	-	- <del>- 7</del>	_	_	-	_	8
ельсъ Селектъ Иджип-		0.00 /		0,9	1	1	1,8	1,3	1,3	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0.1	_			_				10
шенъ	_	27/viii	1		1		2,2	2	1,7	1,3	1,6	1,2	0,6	0,5	0,2	0,09	0,1	_			_	_	98378		18
		29/viii	1,1	1,4	2,4	2,5		2		1,5	1,9	1,3	1,5	1,2	0,9	0,6	0,6	0,2	0,5	-			_		22
Груитъ	0.11	30/vIII	2,3	0,9	1,5	1,6	1,7		2,3	1,0	1,7	1,2	1,1	1,3	0,7	0,7	0,8	0,4	0,5	0,1			_		26
Лбасси	_	30/v111	2,7	4,3	2	2	1,6	1,8	1,7	1,0	1	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,3	0,4	0,2	0,1	0,7		_	_	15
Сара-чигитъ		1/IX	0,4	1,8	1,3	1,3	1,6	1,3	1,4	0.8	0,6	0,7	0,3	0,2	0,5	0,1	0,2	_			district	09II.	isman		9
Гиндаль Селектъ Прол.	_	2/1x	0,6	0,7	0,9	1	1	1,2	1	,	0,7	0,7	0,6	0,6	0,3	0,4	0,4	0,6	0,2	0,5	1	1		_	16
Алленъ	_	2/IX 2/IX	0,4	1,5	0,9	1,2 0,6	0,9	1,4	1,1	0,8	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1				9.4	_				8

Табл. № 40. ъ пвътовъ бутоновъ и колобочекъ (уч. № 4). 1911 года

	P <sub>4</sub>									_								_				9				÷ .
TARLAIR GORAGRA	излс <sup>.</sup> ыхъ ій.	Время				Н	0		M	Е		P	A		В		Ъ	T	В	. l	E	Й.				опал цвѣт лвъ и
названіе сортовъ.	Число изле дованныхъ растеній.	цодсчета.	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Число опав- шихъ цвът , бутоновъ и
											THE PERSON															
Моссъ Импрувдъ	15	26/vIII	0,5	0,9	0,9	1,3	2	1,4	1,4	1,9	0	1,8	1,5	1,2	1,2	1,5	1,2	0,7	0,9	1,5	1,5	0,5	0,5	-	-	24,3
Зендересъ	15	28/vIII	2,4	2,6	2	1,3	1,7	1,5	1,5	2		1,6	2	1,3	1,7	1,7	1,4	1,2	1,6	1,2	0,5	2	1	-	-	32,2
Гольдъ Стандартъ	15	27/viii	1,5	1,6	2	2	0,8	1,5	1,7	1,9		1,9	1,9	1,8	1,6	1,4	1,4	1,4	1,0	1	2	1	1	-	-	30,4
Прайдъ-офъ-Джорджія	15	27/vIII	1,5	2,0	1,2	1,2	1,6	2,0	1,3	1,7		1,6	1,4	1,7	1	1,2	0,6	0,6	1,0	0,5	1	1	-	-	_	24,1
Афифи	15	28/vIII	0,9	1,4	0,4	0,8	0,5	0,4	0,8	0,6		0,3	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	1,0	-	-	-	-	-	-	8,8
Ашмуни	15	29/viii	0,9	0,9	0,6	1,0	0,6	1,5	1,0	0,7		0,6	0,9	1	0,8	0,5	0,4	0,09	0,1		-	_	_	-	-	11,5
Христофоръ Лярджъ	15	30/vIII	1,2	1,6	2,1	1,3	1,4	1,5	1,8	1,4		1,3	1,5	1,5	1,2	1,0	0,9	1,5	2,0	_	_		_	1 <u>16</u> 9	_	23,2
Гріумфъ	15	31/vIII	1,2	1,8	2	1,8	2,3	2,2	1,9	1,6	4	1,7	1,4	1,0	1,0	1,1	1,1	0,6	0,3	0,5	1	-	-		_	24,5
Кокъ-чигитъ	15	1/IX	0,9	0,9	1,9	1,6	1,6	1,5	1,7	2		1,7	1,9	1,9	1,7	0,6	1,2	0,7	0,3	0,5	1,3	-		-		23,9
Флорадор <b>а</b>	15	2/xi	1,6	1,4	1	1,5	1,6	1,6	1,7	1,5		2,1	2	1,7	1,1	1,3	0,5	1	0,6	0,2	0,3	_	_	_		22,7
Мельсъ Селекть Иджипш.	15	27/viii	1,9	1,1	1,3	1,1	1,4	2,0	2	2	The second second	1,5	1,3	1,3	1,2	1,0	0,8	1,1	0,6	1,3	1,3	1	1,5	0,5		27,2
Тулъ Пролификъ		29/vIII	0,8	1,3	1,6	0,8	1,3	1,6	1	1,3	A LANGE TO SERVICE	2,4	1,1	0,9	1,3	1,0	0,7	0,8	0,3	0,4	0,1	0,6	_			19,3
manifestations - 1 -		30/viii	4,1	1,6	0,9	1,4	1,6	2,0	1,3			1,6	1,6	1,3	1	1,3	1,4	1	0,4	0,7	0,7	0,5				26,7
Трунть		432 1.32	7,6	6,0	3,5	2,3	1,1	1,0			ill	1,3	1,2	1,8	1,3	1,3	0,7	0,6	0,7	0,4	0,5	0,1				33,9
Абасси	15	30/vIII										2,4						2			1,2		0,7	0,7		42,0
Кара-чигитъ	15	1/ix	1,4	3,0	3,4	3,6	2	2,5			1		2,3	2,3	2,3	2,1	1,5		1,5	1,3		0,9				
Тиндаль Селекть Пролиф.	15	2/IX	0,1	0,7	0,8	0,8	1,6	1,3				1,5	1,4	1,1	1,4	1,1	1,4	0,7	1,0	1,0	_	· <del>-</del>	-	-	-	19,1
Алленъ	15	2/IX	1	2,0	1,4	1,4	2,5	2,2	2,1	1,6		2,0	1,7	2,3	1,2	1,5	1,2	1,4	1,8	1,5	1,3	1,5	1,0	1,0	-	33,6
Яновичъ	15	2/IX	1,3	1,3	0,6	0,9	0,3	0,7	0,5	0,8	3	0,9	0,2	0,1	0,3	0,4	0,4	0,1	0,1	0,2	0,5	-		_	-	9,6

 $\it Taбл.\,\, {\it N}\!\!\!/\,\, 41.$  Таблица сравненія сортовъ хлопчатника по открытымъ коробочкамъ (уч. № 4).

HADDANID GODMA	Число изслв- цованныхъ застеній.	под-			3	№ №		В	Ъ		T	В	-	Е	j	Й.			Tucho otkpsi- fext kopo60-
НАЗВАНЈЕ СОРТА.	Число изсл дованныхъ растеній.	Время счета.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Hucho Teixe
		100																	
Моссъ Импрувдъ .	15	26/vIII	0,06	0,06	0,06			_		_	-		_	_	_	_		_	0,18
Бендересъ	. ,,	28/vIII		_	0,1	0,6	_	-	_		_	-	-	_			_	-	0,7
Гольдъ Стандартъ	,,	27/vIII		0,06	_	0,06	0,06	_	_	_		-		-		-	<u> </u>	-	0,18
Афифи	,,	28/vIII	_	_	_	_		-	_	_	_	-	-	-	-	_	_	_	0
Аммуни	,,	29/vIII	_	_		_	_	_	_	_	_	_		-	-	_	_	-	0
Христоф. Лярджъ.	"	30/vIII	0,06	0,06	_				-	-	_	-		_	-	-		_	0,12
Тріумфъ	"	31/vm	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	_	-		_	_	-	-			_	_	0,8
Кокъ-чигитъ	,,	1/ix	0,6	0,9	0,7	0,4	0,3	0,2	0,06	0,1	_	-		-	-		_	-	3,26
Флорадора	, ,	2/ix		0,1	0,1	1		-	_	_	_	<u></u>	-	_	-	_	-	_	1,2
Мельсъ Селектъ																			
Иджипшенъ	,,	27/viii		_			-	-	-	-	_		-	-	-	-	-	-	0
Тулъ Пролификъ .	'n	29/viii	0,06	0,1	- 1			-	-	-	_		-	-		-	-	_	0,16
Труитъ	,,	30/viii	0,06	0,06	0,1		_	<u> </u>	_	-	_		-	-	-	_		_	0,22
Абасси	"	30/viii	_	0,1	-	0,06	0,1	_	_	-	-	_	- 1	-	-	-	-	_	0,26
Кара-чигитъ	'n	1/1x	0,3	0,6	0,6	0,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,1	0,06	0,06		-	_		-	2,9
Тиндаль Селектъ																			
Пролификъ	- 33	2/IX	_	0,2	0,4	0,3	0,1	0,1	0,06	-	-	_	-	-	-	_	_	_	1,16
Алленъ	",	2/ix	0,2	0,2	0,06	_	0,06		_	0,06	-	_	_	-	-	-	-	-	5,8
Яновичъ	,,	2/IX	_			-				_		_	-		_				0

Малымъ числомъ листьевъ на растеніяхъ отличаются сорта: Тиндаль Селектъ Пролификъ — 36,5 листьевъ, и Кокъ-чигитъ 38,3; съ наибольшимъ числомъ листьевъ — 78,2 оказался сортъ Кара-чигить. Обильнымъ цвътеніемъ въ концъ августа и началъ сентября отличались египетскіе сорта: Яновичъ — 45,7 цвътовъ и бутоновъ, Афифи — 29,9, Абасси — 27,9 и американскіе поздносиълые Упланды: Туль Пролификъ — 29,7 Труитъ — 23,5, меньше всего цвътовъ и бутоновъ (31 августа) было на сорт'в Тріумфъ 1,02 цв'втовъ и бутоновъ на одномъ растеніи и на сортахъ Кара-чигитъ, Тиндаль Селектъ Пролификъ и Алленъ по 4 цвътка и бутона. Всъ эти цифры выражаютъ среднія величины для одного растенія. Наибольшимъ количествомъ коробочекъ отличается Абасси, имъющій въ среднемъ 26,4 на растеніи, изъ нихъ 0,26 раскрытыхъ (30 августа); второе мъсто заняль Прайдъ-офъ-Джорджія— 23,4 коробочки; наименьшимъ количествомъ коробочекъ отличается сортъ Кокъ-чигитъ, имъвшій 8,2 коробочки на растеніи, изъ нихъ 3,26 раскрытыхъ (1 сентября); большимъ количествомъ коробочекъ отличается такъ же сорть Кара-чигить, имъющій въ среднемъ (1 сентября) на одно растеніе 2,9 раскрытыхъ коробочекъ при 15,6 нераскрытыхъ и при 42 опавшихъ цвътахъ, бутонахъ и коробочкахъ. Большое количество цвътовъ, бутоновъ и коробочекъ опало у сортовъ Алленъ, Абасси, Бендерсъ и Гольдъ Стандартъ: на первомъ было въ среднемъ на одномъ растеніи опавшихъ 33,6, на второмъ 33,9, на третьемъ 22,2 и на четвертомъ 30,4.

Египетскіе сорта Яновичь, Афифи и Ашмуни по опаденію завязей и на этомъ участкі выділялись отъ американскихъ; проценть опавшихъ относительно ничтоженъ, особенно если сопоставить съ таковымъ на сорті Флорадора. Ашмуни сбросиль бутоновъ боліве остальныхъ: въ среднемъ съ растенія опало 11,6 штукъ; даліве у Яновича на кустъ приходится 9,6 штукъ и у Афифи число опавшихъ опустилось до 8,8.

Изъ сравненія результатовъ всёхъ сборовъ оказывается, что наиболёе урожайнымъ оказывается сортъ Моссъ Импрувдъ, давшій урожай 133 пуда на десятину; за нимъ въ порядкё урожайности слёдуютъ: Гольдъ Стандартъ съ урожаемъ 119 пудовъ на десятину, Бендересъ съ урожаемъ въ 117 пудовъ, Христофоръ Лярджъ—108 пудовъ и Тиндаль Селектъ—102 пуда. Дальнѣйшія данныя приведены въ таблицѣ № 42.

Tабл. N 42. Урожайность сортовъ хлопчатника (уч. N 4).

	Площадь		Урож	ай на	1 дес	ятину.		Ито	го
НАЗВАНІЕ СОРТА.	ВЪ	І сбо	ръ.	II сб	оръ	III co	ачо	урожа: 1 деся:	
	квадр. саж.	Пуд.	Ф.	Пуд.	Φ.	Пуд.	Φ.	Пуд.	Φ.
	g transpay				91		116		
Алленъ	38	41	26	24	27	21	24	87	37
Тиндаль Селектъ Пролификъ	92	58	01	26	03	18	23	102	28
Флорадора	100	29	16	19	32	21	12	70	20
Кокъ-чигитъ	128	52	12	12	24	7	09	72	05
Кара-чигитъ	296	66	11	18	09	12	10	96	31
Тріумфъ	468	55	31	27	12	25	20	108	24
Христоф. Лярджъ.	214	37	08	25	07	45	23	107	38
Моссъ Импрувдъ .	177	56	31	28	15	48		133	07
Бендересъ	118	41	17	34	03	41	17	116	38
Гольдъ Стандарт.	164	40	05	31	29	47	24	119	18
Прайдъ - офъ - Джорджія	97	29	27	22	10	46	28	98	26
Мельсъ Селекть Иджипш. бълый	100	22	27	25	15	35	34	83	35
Мельсъ Селектъ Иджипш, желт.	97	22	30	15	28	25	34	64	12
Афифи	39	1	20	10	23	19	26	31	30
Ашмуни	43	11	06	9	30	11	34	32	31
Тулъ Пролификъ.	32	15	-	16	35	36	22	68	17
Труитъ	18	8	13	_ 10	-	26	26	45	-
Абасси	10	23	09	11	24	23	09	58	02

Наиболтве скороспълымъ по первому сбору оказался сортъ Кара-чигитъ, съ котораго собрано въ первомъ сбортъ 66 пудовъ на десятину, за нимъ идутъ: Тріумфъ съ урожаемъ 55 пудовъ, Тиндаль Селектъ 58 пуд., Моссъ Импрувдъ 56 пуд., Кокъчигитъ съ урожаемъ 1-го сбора на десятину 52 пуда и такъ далъе.

По сумм'в перваго и второго сбора лучшими сортами нужно считать Моссъ Импрувдъ, давшій въ сумм'в перваго и второго сборовъ 85 пудовъ на десятину, Тиндаль Селектъ и Карачигитъ — 84 пуда и Тріумфъ 83 пуда; нѣсколько мен'ве урожайными и скороспѣлыми по сумм'в перваго и второго сборовъ оказались Бендересъ 75 пудовъ на десятину и Гольдъ Стандартъ 71 пудъ (таблица № 42).

Опыты съ чеканкой. Опыты съ чеканкой поставлены въ настоящемъ году на участкъ № 8 на сортъ Кингъ, на участкъ № 12 на сортъ Эксцельзіоръ Пролификъ, на участкъ № 15 на сортъ Алленъ Кингъ, на участкъ № 3, на сортъ Аунсъ Болъ. Чеканка производилась въ послъднихъ числахъ іюня и лучшіе результаты дала на участкъ № 8 на сортъ Кингъ; дълянка эта была удобрена передъ посъвомъ хлопковыми жмыхами въ количествъ 40 пудовъ на десятину. Участокъ получилъ слъдующую обработку: весною, въ началъ марта, произведена вспашка плугомъ; 18 апръля передъ первымъ весеннимъ поливомъ, по участку листеромъ были проведены прямые арыки, и тотчасъ же послъдніе были затоплены водой. Черезъ нъсколько дней, когда русла арыковъ покрылись коркой, по дну ихъ руками были разбросаны хлопковые жмыхи. Затъмъ гряды участка тъмъ же листеромъ были развернуты такъ, что на руслахъ прежнихъ арыковъ образовались новыя гряды, закрывшія собою внесенное удобреніе. Участокъ быль засъянь сортомъ Кингъ, при чемъ посъвъ произведенъ рядовой съялкой Баннера. 17 мая, послъ проръживанія и легкаго мотыженія въ рядахъ, по арыкамъ быль пущень листерь для углубленія арыковь передь первой поливкой послъ всходовъ; 22 мая, послъ поливки, междурядія дважды взрыхлены культиваторомъ; 31 мая арыки вторично углублены листеромъ, и дана вторая поливка послѣ всходовъ, и вслъдъ за нею, когда просачивание сквозь арыки закончилось, произведена еще одна поливка. Въ началъ іюня было произведено вторичное мотыжение. Послъ каждаго полива борозды пропахивались коннымъ культиваторомъ до того времени, когда разросшіеся кусты сомкнулись въ междурядіяхъ настолько, что трогать ихъ пропашникомъ стало опасно. Дальнъйшихъ поливокъ было 4, пропашекъ — 3. Чеканка произведена 27 іюля. Въ результатъ очеканенная дълянка дала подавляюще высокій урожай въ 192 пуда на десятину, неочеканенная же только 97 пудовъ (таблица № 43).

Табл. № 43.

## Опыты съ чеканкой (уч. № 8).

НАЗВАНІЕ ДЪ- ЛЯНОКЪ.	Площадь дёлянокъ въ кв. саж.	I сборъ.	II сборъ.	III сборъ.	Итого на десятину.
Контрольная	328	56 п. 27 ф.	30 п. 4 ф.	10 п. 14 ф.	97 п. 5 ф.
Чеканенная	84	103 " 23 "	35 " 5 "	54 , 6 ,	192 " 34

Съ участка 12-го, гдѣ произведена чеканка кустовъ Эксцельзіоръ Пролификъ, собрано сырца 107 пудовъ на десятину, противъ 81-го пуда, собранныхъ съ контрольной (таблица № 44).

Табл. № 44. Опыты съ чеканкой (уч. № 12).

НАЗВАНІЕ ДЪЛЯ- НОКЪ.	Площадь дёлянокъ вт. кв. саж.	I сборъ.	II сборъ.	Итого на десятину.
Контрольная	796,5	32 п.12 <sup>8</sup> /4ф.	48 п. 81/2 ф.	80 п. 21 <sup>1</sup> /4ф
Чеканенная	125,0	48 " — "	59 " 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	107 " 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "

Участку дано двѣ весеннихъ вспашки (вторая вспашка послѣ предпосѣвнаго полива); посѣвъ произведенъ 2 мая сѣялкою Баннера, по ровному полю; послѣ всходовъ и прорывки участокъ получилъ три ручныхъ мотыженія, 7 поливокъ и 6 конныхъ пропашекъ.

Опыть чеканки кустовь на третьемь участкѣ оказался не столь удачнымь, и разница урожая не столь показательна, какь на участкѣ 12-мъ; возможно, что это объясняется свойствами сорта; здѣсь высѣянъ былъ Аунсъ Болъ. Очеканенная дѣлянка дала урожай на десятину 97 пудовъ, а нечеканенная 88 пудовъ (таблица № 45).

Табл. № 45. Опыты съ чеканкой (уч. № 3).

назва <b>н</b> іе дъ- лянокъ.	Площадь дёлянокъ въ кв. саж.	I сборъ.	II сборъ.	III сборъ.	Итого на десятину.
Контрольная	192	24 п. 19 ф.	42 п. 27 ф.	21 п. 9 ф.	88 п. 15 ф
Чеканенная	204	33 " 1 "	42 , 26 ,	22 ,, 2 ,,	97 " 28 "

Передъ чеканкой, 26 іюля произведенъ былъ подсчетъ и обмѣръ растеній на намѣченныхъ для чеканки дѣлянкахъ. 8 сентября послѣ чеканки подсчетъ и обмѣръ на дѣлянкахъ былъ повторенъ. Результаты опыта изложены въ таблицѣ № 46.

Табл. № 46. Опыты съ чеканкой (уч. № 3). Средняя величина на 1 растеніе.

Vist and attended to the control of		Ч И	C	Л 0.		Въ веј	ршкахъ.	Danie
НАЗВАНІЕ ДЪЛЯ- НОКЪ.	Изслъдо- ванныхъ лунокъ.	Растеній въ лункъ.	Коробо-	Бутоновъ и цвѣ- товъ.	Боковыхъ вътокъ.	Высота растенія.	Длина боковыхъ вътвей.	Время под- счета.
До чеканки	20	3	6,5	16,6	11,4	15,25	2,6	29/vII
Послъ чеканки: нечеканенная .	22	3	10,32	0,9	13,49	15,7	2,5	} 8/1 <b>x</b>
чеканенная	22	3	12,25	0,33	11,35	14,9	3,75	)

Изъ таблицы слъдуетъ, что растенія чеканенной дълянки отличаются большимъ количествомъ коробочекъ, длинными боковыми вътвями, малымъ количествомъ цвътовъ и бутоновъ на нихъ; боковыхъ вътвей на растеніяхъ чеканенной дълянки также меньше, чъмъ на растеніяхъ контрольной дълянки.

На участкъ № 15 чеканка произведена на четырехъ дълянкахъ сорта Алленъ Кингъ: двъ очеканенныя дълянки дали

урожай на десятину повышенный противъ дѣлянокъ нечеканенныхъ (таблица № 47), и двѣ дѣлянки (таблица № 48) дали урожай на десятину ниже контрольныхъ.

Табл. № 47. Опыты съ чеканкой (уч. № 15).

НАЗВАНІЕ ДЪЛЯ- НОКЪ.	I сборъ.	II еборъ.	III сборъ.	Итого на десятину.
Чеканенная	70 пуд.	30 пуд.	16 пуд.	116 пуд.
Контрольная	54 "	21 "	13 "	88 "
Чеканенная	91 "	7 "	10 "	108 "
Контрольная	48 "	26 "	15 "	89 "

*Табл. № 48.* Опыты съ чеканкой (уч. № 15).

НАЗВАНІЕ ДЪЛЯ- НОКЪ.	I сборъ.	II сборъ.	III сборъ.	Итого на де-
	пуд.	пуд.	пуд.	пуд.
Чеканенная	49	20	12	81
Контрольная	58	19	14	91
Чеканенная	72	12	10	94
Контрольная	76	19	9	104

Такимъ образомъ чеканка въ послѣднихъ числахъ іюля не всегда даетъ повышеніе урожая; полезно чеканить въ концѣ іюля только пышно развитыя растенія. Двѣ чеканенныя дѣлянки на участкѣ № 15, давшія повышенный урожай, находились на части участка съ неистощенной почвой; смежныя имъ другія двѣ очеканенныя дѣлянки того же участка № 15 находились на истощенной почвѣ и дали урожай ниже контрольныхъ. На участкѣ № 8 особенно рѣзкое повышеніе урожая дала чеканка на дѣлянкахъ, удобренныхъ хлопковыми жмыхами.

Вліяніе предшествующихъ растеній. На участкъ двухпольнаго съвооборота первый посъвъ по ровному полю съялкою Баннера сорта Кингъ былъ произведенъ з и 4 апръля; всходы начали появляться отдъльными группами. Послъ выпав-

шихъ 9 апръля дождей образовалась корка, подъ которой много есходовъ погибло; пришлось сдълать пересъвъ по ровному полю; 16 мая, когда ряды всходовъ ясно обозначались, по всему участку произведена была первая поливка протокомъ воды по скеознымъ арыкамъ, сдъланнымъ культиваторомъ. 21 мая, послъ конной пропашки культиваторомъ, ряды развившихся растеній были проръжены руками. Густота стоянія на всемъ участкъ принята одинаковая, съ шириною междурядій въ 1 арш. 8 верш. и съ промежутками между лунками въ 12 вершк.; въ лункъ оставалось по 3 лучшихъ куста. Послъ прорывки поле промотыжено. Въ дальнъйшемъ участку дано еще два ручныхъ мотыженія, 6 поливокъ и 7 конныхъ пропашекъ культиваторомъ. Высшій урожай — 131 пудъ съ десятины — полученъ на дълянкъ послъ чернаго пара; наименьшій урожай, 76 пудовъ на десятину, дала дълянка послъ хлопчатника (табл. № 49).

 $Taбл. \,\, \mathcal{N} \,\, 49.$  Вліяніе предшествующихъ растеній на урожай хлопчатника.

Площадь въ квадр. саж.	Хлопчатникъ послъ:	I сборъ.	II сборъ.	III сборъ	Итого урожая на десятину.		
		10 10 1	00 00 0	99 99 V			
81	Кукурузы	48 п. 18 ф.	26 п. 26 ф.	32 п. 23 ф.	107 п. 16 ф.		
208	Свеклы	44 " 28 "	25 " 24 "	25. " 15 "	95 " 28 "		
225	Джугары	68 ,, 7 ,,	30 , 14 ,	12 " 9 "	105 " 33 "		
216	Машанавел. уд.	74 , 13 ,	20 , 24 ,	15 " 33 "	111 " —		
223	Маша на зерно	63 " 9 "	30 , 27 ,	12 , 4 ,	106 " 10 "		
223	Чернаго пара.	57 ,, 1 ,,	46 ,, 32 ,,	28 " 1 "	131 " 34 "		
223	Кунжута	53 , 20 ,	36 , 35 ,	28 " 10 "	118 " 25 "		
223	Чумизы	47 " 14 "	35 " 20 "	24 , 03 ,	107 " 03 "		
223	Овса	44 " 5 "	47 , 30 ,	28 " —	118 " — "		
137	Хлопка	35 " 1 "	21 " 36 "	19 " 28 "	76 " 26 "		
1.					TRIE, SI		

Опыты съ глубиною задвлки свмянъ. Небольшая часть двлянки участка № 8, удвлена была опытамъ съ глубиной задвлки свмянъ хлопчатника. Постановкой этого опыта имълось цвлью выяснить вліяніе глубины задвлки свмянъ на время и энергію прорастанія. Для этой цвли была взята двлянка, вполнъ приготовленная для машиннаго посвва хлопчатника. Опыть этотъ повторяется уже третій разъ. Въ первые два раза, вслъдствіе случайныхъ причинъ, не получено точныхъ цифровыхъ данныхъ, но выводы ихъ приблизительно тожественны съ выводами послъдняго опыта.

Всѣ работы, — какъ проведеніе рядовъ, посѣвъ, задѣлка сѣмянъ, — произведены ручнымъ способомъ. За максимальную глубину принята глубина задѣлки въ 14 см., минимальная же глубина — въ 2 см.; проведено 13 рядовъ съ разстояніемъ между ними въ 22 вершка; въ каждомъ ряду высѣяно опредѣленное число лунокъ, на разстояніи 3 вершк. одна отъ другой. Для выясненія энергіи проростанія въ зависимости отъ количества сѣмянъ, задѣлываемыхъ въ лункѣ, высѣвались въ разные ряды, смотря по глубинѣ задѣлки, различныя количества сѣмянъ (отъ 3 до 8 сѣмянъ въ лунку). Всѣ наблюденія надъ появленіемъ всходовъ велись въ продолженіи 4-хъ дней; результаты этихъ наблюденій помѣщены въ нижеслѣдующей таблицѣ (№ 50).

 $Taбл. \,\, \mathcal{N} \,\, 50.$  Опыты съ глубиной задълки съмянъ хлопчатника.

a.	BЪ			Ч	И	С Л	0.	1 34 4			5, 518		
цувлк	растрній	На 1-й	і день.	Ha 2-i	і день.	Ha 3-i	і день.	Ha 4-i	і день.	взошедш	0	взошедш й.	0/
Глубина задълки.	число рас ряду.	Взошедш. лунокъ.	Взошедш. растеній.	Взошедш. лунокъ.	Взошедш. растеній.	Взошедш. растеній.	Взошедш. лунокъ.	Взошедш. лунокъ.	Взошедш.	Сумма взо лунокъ.	<sup>0</sup> /o	Сумма взо растеній.	0/0
4см.	73	3	3	1	5	5	8	5	6	14	48,2	22	30.1
5 ,	73	3 7	11	6	2		5	V	2	17	58,4	38	30,1 52,7
6 "	73	16	42	6 8	22	4 5	9			29	100	73	100
7 ,,	131	27	75	1	12	_	10	-	9	28	96,5	106	80,9
8 "	131	24	64	3	16	2 7	19	_	17	29	100	116	88,5
9 ,,	131	12	33	10	44	7	11	_	- 9	29	100	97	74,0
10 ,	189 189	19	62	8 8	48 51	2	20.	-	15	29	100	145	76,7
11 ,,	189	12 2	44	6	29	6 3	19	3 . 6	15 7	29 17	100 58,6	137 48	72,9 21,8
113	218	2	4		2	6	17	2	5	10	34,4	26	11,9
14 ,	218	<u>-</u>	_		_	6	17	-	8	6	20,5	25	11,4

Посъвъ произведенъ былъ въ апрълъ; первые всходы появились на пятый день. Изъ приведенной таблицы видно, что раньше всъхъ появились всходы съ глубины 7—8 см., раньше всъхъ и закончились. Съ глубины 2 см., 3 см. всходовъ совсъмъ не было. Съ глубины въ 11 см., 12 см., 13 см., 14 см. всходы хотя и появились, но мало и съ опозданіемъ. На основаніи этого опыта съ увъренностью можно считать лучшей глубиной задълки 7—9 см., т. е. 1½—1¾ вершка. Вообще же вполнъ допустима глубина задълки съмянъ отъ 6 до 11 см. (1¼—2¾ вершковъ). Это ясно видно изъ прилагаемой ниже діаграммы № 51.

При глубокой задёлкё сёмянь, создается цёлый рядь неблагопріятныхь условій, а именно: недостатокъ воздуха, малая прогрёваемость почвы, кром'є того при глубокой задёлкё росткамъ приходится пронизывать большой слой почвы, чтобы достигнуть поверхности, благодаря чему растенія часто загнивають на глубин'є, не увид'євъ свёта. При очень мелкой зад'єлк'є, какъ 2 см., 3 см., 4 см. и даже 5 см. главнымъ неблагопріятнымъ обстоятельствомъ, особенно при позднемъ пос'єв'є, является недостатокъ влаги; верхній слой почвы сильно прогрієвается, всл'єдствіе чего с'ємена высыхають, не усп'євая прорости.

Энергія проростанія въ зависимости отъ количества сѣмянъ, высѣваемыхъ въ одну лунку, видна изъ слѣдующей таблицы (№ 52).

 $Taбл. \, \, \mathcal{N} \, \, 52.$  Энергія проростанія въ зависимости отъ количества высъянныхъ съмянъ.

Глубина	Сѣмянъ высѣян-	Число лунокъ съ проросшими съменами.					
задёлки.	задълки. ныхъ въ лунку.	На 1-й день.	На 2-й день.	На 3-й день.	На 4-й день.	Всего лунокъ съ проросш. съменами.	
onegot i	aperas	Cast of State		3 0001 3000			
5 см.	3-4	7	16	4		17	
7 "	45	27	1	_	_	28	
9 ,	6-7	12	10	7	102-103	29	
12 "	7-8	2	6	3	6	17	

Энергія всходовъ увеличивается въ зависимости отъ числа съмянъ въ лункахъ, такъ какъ съ увеличениемъ высъваемыхъ съмянъ возрастаетъ сила, съ которой ростки пронизываютъ покрывающій ихъ слой почвы. Правильное было бы ставить опыть проростанія, заділывая въ лунку по одному сімени на всі глубины или по одному опредъленному числу ихъ. Но въ нашемъ опытъ большее появление всходовъ съ глубины 7 см. по сравненію съ глубиной въ 5 см., нельзя отнести только за счетъ вадълки потому, что увеличение глубины задълки на 2 см. врядъ ли такъ сильно повышаетъ энергію проростанія. Возьмемъ, далъе, для сравненія глубину задълки съмянъ въ 9 см. и 5 см.; разница въ глубинъ задълки 4 см.; условія влажности почвы и ея аэраціи — неодинаковы; на глубинъ 9 см. большій проценть влажности, малая прогръваемость почвы солнечными лучами, недостатокъ воздуха должны сказыватся сильнъе, чъмъ на глубинъ 5 см., а всходовъ съ глубины 9 см. появились больше, чёмъ съ глубины въ 5 см. Причиной этому служитъ то обстоятельство, что въ первомъ случав высввалось въ 2 раза больше съмянь, чъмь во второмь (въ 5 см.); и такимъ образомъ здѣсь, очевидно, вліяеть на энергію всходовъ количество съмянъ, а также и большій проценть влаги. Если возьмемъ для сравненія сумму луновъ съ проросшими съменами съ глубины 12 см. и 5 см., то увидимъ, что всходы съ глубины 12 см. не отстали отъ всходовъ съ глубины 5 см. и только чуть запоздали, хотя очевидно, что недостатокъ воздуха на глубин в 12 см. весьма сильно сказывается на проростаніи съмянь; болье значительная энергія проростанія и въ данномъ случав объясняется какъ большимъ количествомъ съмянъ, высъянныхъ на глубину 12 см., такъ и большимъ процентомъ влаги.

Резюмируя приведенные факты, касающіеся глубины задёлки сёмянь, можно сдёлать слёдующіе выводы: Въ зависимости отъ времени посёва и состоянія почвы можеть быть допустима какъ глубокая, такъ и мелкая задёлка сёмянъ хлопчатника. При позднемъ посёв'в бол'ве глубокая задёлка обезпечиваеть лучшую всхожесть. Въ это время температура пахотнаго слоя настолько высока, что и на глубинть въ 10 сант. стымена хорошо согр'яваются; съ другой стороны поздній постывь предполагаеть время, когда повышенная солнечная инсоляція вынуждаеть почву испарять всты запасы влаги, поверхностный слой изсущается, и заключенныя въ немъ стымена просыхають, теряя

возможность нормальной всхожести. На глубинъ же въ 9—10 сант. съмена въ почвъ лучше защищены отъ испаряющаго вліянія солнца. Наобороть, ранній посъвъ удается полнъе, если съмена задълываются на небольшую глубину— въ 6—7 сант. Верхній слой почвы теплъе, радіація солнца не такъ интенсивна, и высыханіе этого слоя происходитъ настолько медленно, что съмена успъваютъ прорости.

Опыть съ листеромъ. Изъ новыхъ вопросовъ большое вниманіе удѣлено было опытамъ съ листеромъ, поставленнымъ на Андижанскомъ Опытномъ Полѣ по предложенію Департамента Земледѣлія. Подъ эти опыты былъ отведенъ участокъ № 8, площадью болѣе десятины; опыты производилсь студентомъ Моск. Сел.-Хоз. института г. Массалитиновымъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ Завѣдывающаго Опытнымъ Полемъ. Докладъ о результатахъ опытовъ съ листеромъ, написанный г. Массалитиновымъ, прочитанъ на второмъ съѣздѣ сельскихъ хозяевъ въ Ташкентѣ осенью 1911 года.

Поставленные опыты показали, что листеръ, какъ окучивающее орудіе — представляеть для Туркестана очень практичную, выгодную и необходимую новинку. Онъ легко, быстро и прекрасно наръзаетъ высокія мощныя гряды для поства хлопчатника, столь же хорошо углубляеть арыки, какъ междурядные, такъ и распредълительные, и особенно удобно съ этой цълью пользоваться имъ, когда кусты хлопчатника еще не развили сильно корневую систему. Въ цёляхъ испытанія, насколько, если можно такъ сказать, бережливо это орудіе, были подсчитаны расходы по возд'ялыванію хлопчатника на листерныхъ грядахъ и на джоячныхъ, и оказалось, что листерная обработка удещевляетъ культуру десятины хлопка на 50 руб. противъ джоячной. Правда, учитывались преимущества не одного листера, а вообще машиннаго способа обработки, при которомъ кромъ того примъняется съялка и культиваторъ; но разъ говорится о работъ листера, то, тъмъ самымъ, предръщается и связанная съ нимъ работа культиватора и даже съялки. Данныя показываютъ, что джоячная система хлопководства требуетъ 164 руб. 38 коп. на десятину, а листерная обработка — только 114 руб. 33 коп. Сумма эта вообще неточна и должна значительно понизиться, такъ какъ въ отчетномъ году рабочіе еще недостаточно умъло работали новымъ орудіемъ, не примънились къ нему и лошади; въ будущемъ же, когда явится сноровка, расходъ на обработку, нужно полагать, будеть менѣе 100 руб. Этимъ преимущества листера не исчерпываются; всѣ участки, воздѣланные листеромъ, дали лучшій урожай, и, какъ это указано въ таблицѣ № 53, средній урожай съ десятины при машинной системѣ хозяйства получился 138 пуд., а при туземныхъ пріемахъ—126 пудовъ.

 $Ta\delta A$   $\delta \delta$   $\delta \delta$ . Вліяніе обработки на урожай хлопчатника.

Площ. въ кв саж.	дълянка.	I сборъ.	II сборъ.	III сборъ.	Итого урожая на десят.
379	Посъвъ ручной джо- ячный	81,5 пуд	23,5 пуд	21 пуд.	126 пуд
1700	Посввъ свялкою	101 "	25,5 "	11,5 "	138 "

Корневая система хлопчатника. Съ цълью изученія біологіи хлопчатника, способностей его охватывать корнями питательный субстрать и опредъленія слоя и площади почвы, въ которыхъ нуждается хлопчатникъ для своего культурнаго развитія, было произведено изследованіе его корневой системы. Для изследованія брались образцы растеній съ разныхъ участковъ, а также и различные сорта ихъ въ различныя фазы развитія. Образцы брались слъдующимъ образомъ: со всъхъ сторонъ или съ трехъ сторонъ растенія окапывалась площадь предполагаемаго распространенія его корневой системы Извлеченные образцы съ массой почвы переносились въ ящикъ и подвергались отмывкъ, при помощи слабой струи воды изъ опрыскивателя Вермореля; впослъдствіи, когда растенія достигали такого возраста, что нельзя было применять этоть способъ, корневая система отмывалась на мъстъ; и въ этомъ случат растеніе опять-таки окапывалось или съ трехъ сторонъ или съ одной стороны во всю ствну проникновенія корня. Въ последнемъ случав отмывка производилась на мъстъ. Омытая корневая система, освобожденная отъ комьевъ и комочковъ земли, осторожно извлекалась; послё этого немедленно приступали къ изучению ея, путемъ измъреній.

Собранный до сего времени матеріалъ позволяеть сдълать лишь общія заключенія. Прежде всего, главный стержневой корень хлопчатника, пронизывая всю почву, проникаетъ до относительно большихъ глубинъ. Развътвленія же корня, его боковая периферическая съть настолько сложна, что напоминаетъ узоръ нъкоторыхъ грибницъ. Такъ, напримъръ, у сорта Кингъ 17 мая на 11-й день со дня посъва, при длинъ основного корня въ 5 вершк. имъется 50 боковыхъ корней. У сорта Эксцельзіоръ Пролификъ на 15-й день жизни (17 мая) основной корень достигаетъ 4½ вершк., длина боковыхъ корней доходитъ до 2¾ вершк.; капиллярная же съть очень вътвиста и учету не поддается. У сорта Кокъ-чигитъ 20 мая, въ возрастъ 20 дней, на боковыхъ корняхъ имъются уже чуть замътныя развътвленія; нъкоторые боковые корни достигають длины въ три съ половиною вершка, а длина главнаго корня доходить до 81/2 вершк. У одного растенія сорта «Флорадора» — на 23 день жизни (23 мая) корневая система оказалась сильно развитою въ своихъ боковыхъ отвътвленіяхъ. Стержень корня имълъ длину лишь въ 51/4 вершковъ, но зато энергія корнеобразованія значительно ушла на вътвленія. Боковыхъ корней насчитано было 61, при чемъ длина пъкоторыхъ достигла 2,7 вершк. Среди вторичныхъ корней, образуемыхъ боковыми, попадались иные съ длиною въ 2-3 см. У другого растенія того же сорта, и въ томъ же возрастъ, главный стержень имълъ длину въ 10 верш.; боковыхъ и вторичныхъ было такъ же много и максимальная длина ихъ совпадала съ величинами для 1-го растенія. Наконецъ, третье растеніе этого сорта имъло главный корень въ 9 верш. длины, боковыхъ было 58, при максимальной длинъ въ 3 верш. Всъ боковые корни главнымъ образомъ отходятъ отъ главнаго корня на протяженіи 3 верш. отъ корневой шейки, глубже трехъ вершковъ боковыхъ корней уже меньше. У сорта Аунсъ Болъ 27 мая на 36 день на основномъ корнъ длиною въ 4 верш. было 70 боковыхъ корней, и нъкоторые изъ нихъ достигали 4-хъ вершк. У сорта Алленъ Кингъ з іюня, на 43-й день со дня поства, отмъчено 33 боковыхъ корня 1-го порядка; главный корень на глубинъ 51/2 вершковъ порванъ; всъ отмытые боковые корни, начинаясь отъ корневой шейки главнаго корня, занимали узлами своихъ вътвленій пространство въ 2 вершка основного стержня. Нъкоторые боковые корни, какъ и основной, были оборваны во время отмывки; всего оборванныхъ отмыто и собрано 9 кон-

цовъ; одинъ изъ такихъ длиною и формой совершенно напоминалъ главный корень, имълъ длину въ 71/2 вершковъ и 41 боковыхъ отпрысковъ 1-го порядка съ максимальной длиной въ 2 вершк. Остальные оборванные концы, предполагается, относятся къ корнямъ 1-го порядка. Одинъ изъ нихъ былъ длиною 9 верш. съ 30 боковыхъ корнями 2-го порядка съ максимальною длиною въ 1,5 вершк., слъдующій оборванный быль длиною 6,5 вершк. съ 23-мя боковыми корнями 2-го порядка, — достигающими въ отдъльныхъ случаяхъ 1,5 вершк., и имъвшими боковые корни 3-го порядка; 3-й оборванный длиною 6 вершковъ съ 12-ю боковыми корнями вторичнаго порядка до 1,5 вершк. длины; 4-й — 5,5 вершк. длины съ 22-мя боковыми корнями вторичнаго порядка длиною до 1-го вершка максимумъ. Остальные оторванныя 4 корневыя вътви были длиною въ 4 вершка, съ 41 боковымъ корнемъ 2-го порядка въ суммъ; длина таковыхъ колебалась отъ 0,5 до 2 вершк. Изъ боковыхъ корней 1-го порядка, вмъстъ съ растеніемъ обмытыхъ, самый крупный достигалъ 11 вершк., на каковой длинъ онъ былъ оторванъ при отмывкъ; на 11-и вершковой части его, уцълевшей на растеніи, находилось 54 боковыхъ корня 2-го порядка; остальные 32 боковыхъ корня 1-го порядка были: одинъ — длиною 10,5 вершк., два — длиною 10 вершк., два — 9 вершк., три — 7,5 вершк., одинъ — 7-и, одинъ — 6-и, одинъ — 5,5 вершк., два — 5-и вершк., одинъ — 4,5 вершк., два — 4-хъ вершк., четыре — 3-хъ вершк., одинъ — 2,5 вершк., восемь—2-хъ вершк., одинъ—1,5 вершк. и два корня длиною 1 вершокъ. Нъкоторые изъ перечисленныхъ боковыхъ корней перваго порядка имъли боковые корни второго, третьяго и четвертаго порядка.

Если мы вычислимъ общую сумму всёхъ боковыхъ корней, то увидимъ, что 33 боковыхъ корня перваго порядка достигаютъ длины 12½ аршинъ. Сумма же всёхъ боковыхъ корней второго, третьяго и четвертаго порядка (556 штукъ) будутъ равны 556 вершкамъ, предполагая среднюю ихъ длину въ 1 вершокъ. Предположеніе это возможно сдёлать въ виду того, что нёкоторые боковые корни второго порядка достигали длины 4-хъ вершковъ, и нёкоторые боковые корни третьяго порядка достигали 3-хъ вершковъ; но большая часть ихъ была въ 1 вершокъ. Если вытянуть всё корневыя вётви въ одну линію, то получится прямая линія длиною въ 15 саженей. Такова корневая система хлопчатника въ условіяхъ воздёлыванія на Андижан-

скомъ полъ. При разсмотръніи корневой системы напрашивается выводъ, что весь въеръ своихъ боковыхъ вътвей, въ поискахъ за питательными веществами, корень распространяетъ въ верхнихъ слояхъ почвы.

29 мая на 58-й день посл'в пос'вва была изсл'вдована корневая система трехъ растеній сорта Кингъ; при этомъ замічено, что корневая система наиболъ сильно развивается въ направленіи къ арыкамъ, а не въ стороны ряда; основной корень у нъкоторыхъ растеній достигаль длины 10 вершк., боковые корни шли въ сторону на 10 вершк. З іюля на 93-й день послъ посъва была изслёдована корневая система одного растенія сорта Кингъ; основной корень его былъ длиною 17 вершк.; боковые перваго порядка достигали длины 20 вершк. и, разв'ятвляясь, давали боковые корни второго порядка длиною 10-15 вершк., а эти имъли свои боковые корни третьяго порядка, достигающіе 7 вершк. и т. д., но мелкіе корни при отмывкѣ большею частью отламывались. 15 августа на 117-й день со дня посъва была изслёдована корневая система одного растенія сорта Кингъ; его основной корень шелъ въ глубину до 3 аршинъ, и нъкоторые боковые достигали длины 2 арш.

Опыты испытанія константности свойствъ разныхъ сортовъ хлопчатника. Объ этихъ опытахъ ръчь была выше, при изложении сравнения различныхъ сортовъ хлопчатника на участкъ 9; но кромъ участка 9-го, такіе же опыты поставлены и на участкъ № 14, гдъ быль высъянъ сортъ Кингъ, но лишь одними отобранными изъ этого сорта зелеными съменами. Задачей ставилось выяснение, не обладають ли эти свмена низкимъ выходомъ, присущимъ зеленымъ свменамъ сорта Кокъ-чигитъ. Обработка участка была обычной для этого года: весной поле вспахано 2 раза, при чемъ 2-й разъ послъ предпосъвной поливки, — посъвъ совершенъ 1 мая съялкой Баннера, по ровному полю. Своевременно участокъ пропаханъ культиваторомъ, а въ рядахъ произведена прорывка. 20 мая участокъ быль залить водой. За весь вегетаціонный періодъ кусты заливались 6 разъ (не считая предпоствной поливки), конныхъ пропашекъ было 4 и два ручныхъ мотыженія. Сумма трехъ сборовъ сырца составила урожай въ 140 пудовъ на десятину: изъ нихъ 1-го сбора 83 пуда на десятину, 2-го — 33 пуда и 3-го — 24. Но высокаго выхода не получилось, сохранившійся зеленый цвётъ сёмянъ повлекъ за собою и низкій выходъ, присущій чистому сорту Кокъ-чигить. Бѣлыя сѣмена сорта Кингъ дали выходъ 33%, зеленыя же только—30%, откуда ясно видно, что зеленыя сѣмена, отобранныя изъ сорта Кингъ, не обладаютъ качествами присущими этому сорту.

Всего въ отчетномъ году подъ хлопчатникомъ находилось 9 участковъ, общей площадью въ 7 десятинъ 2318 кв. саж.; среднюю общую урожайность на десятину для каждаго сорта на всѣхъ участкахъ даетъ нижеслѣдующая таблица № 54, изъ которой видно, что наиболѣе продуктивными по средней урожайности всѣхъ участковъ и разнообразныхъ опытныхъ дѣлянокъ оказались сорта Моссъ Импрувдъ съ урожайностью въ 133 пуда на десятину, Кокъ-чигитъ 126 пуд. на десятину и Кингъ 117 пуд. на десят.; съ высокимъ выходомъ волокна оказались сорта: Моссъ Импрувдъ — 36,24%, Тріумфъ — 35,11%, Гольдъ Стандартъ — 33,86% и Кингъ — 33,66%. Наиболѣе крупныя и тяжелыя сѣмена свойственны сортамъ: Прайдъ-офъ-Джорджія, 1000 штукъ сѣмянъ котораго вѣсятъ 156 граммовъ, Христофоръ Лярджъ вѣсомъ того же количества сѣмянъ въ 137 граммовъ и Тріумфъ съ вѣсомъ 133 грамма.

Для всѣхъ участковъ, занятыхъ хлопчатникомъ, велись подробныя записи расходовъ по обработкѣ и культурѣ этого растенія, собранныя въ таблицѣ  $\mathbb{N}$  55.

При составленіи настоящей таблицы стоимость за сутки работы одной лошади и одного постояннаго и мѣсячнаго рабочаго, принималась за одинъ рубль, при чемъ поденщины полурабочихъ переводились на поденщины взрослыхъ рабочихъ. Поденная плата въ теченіе года колебалась отъ 60 коп. до 1 руб. 50 коп. взрослому рабочему и отъ 25 коп. до 75 коп. полурабочему. Средній расходъ на десятину до сбора по участкамъ приводится въ таблицѣ № 56. Изъ этой таблицы слѣдуетъ, что расходы по обработкѣ почвы и культурѣ хлопчатника нѣкоторыхъ участковъ, отъ начала вегетаціоннаго года до сбора 'урожаєвъ не превышаютъ и ста рублей, на иныхъ же участкахъ достигаютъ 179 рублей.

#### Продовольственныя и кормовыя растенія.

Изъ прочихъ растеній въ отчетномъ году высѣвалась кукуруза Чинквантино и Кутаисскій Гибридъ, кормовая свекла Маммутъ, ячмень озимый кавказскій черный, яровой овесъ Ша-

тиловскій, Шведскій и Канадскій, высѣянные озимыми осенью прошлаго года.

Кукуруза и свекла кормовая. Кукуруза и свекла кормовая были высъяны на участкъ 1-мъ— (третьемъ клинъ пятиполья); участку была дана весенняя вспашка 2 марта, 12 мая листеромъ приготовлены гряды и произведена поливка напускомъ воды; по наступленіи спълости почвы гряды развернуты тъмъ же листеромъ, и на одной части поля, на вновь образовавшихся грядахъ, посъяна была свекла, на другой части— въ арыкахъ кукуруза. За весь вегетаціонный періодъ свеклъ дано 6 поливокъ, а кукурузъ 8; послъ поливокъ производилась конная пропашка культиваторомъ, а кромъ того дано два ручныхъ мотыженія. Кукурузы «Кутаисскій Гибридъ» собрано 161 пудъ съ десятины; кукурузы Чинквантино— 139 пудовъ. Кормовой свеклы Маммутъ собрано 875 пудовъ съ десятины.

Машъ. Машъ высъянь былъ на шестомъ участкъ (5-мъ клинъ пятиполья); участку было дано 2 весеннія вспашки, (послъдняя предъ посъвомъ 13 мая, послъ поливки); посъвъ былъ произведенъ 14—15 мая; за весь вегетаціонный періодъ участку дано 4 поливки; созръваніе маша было неравномърно: въ мъстахъ высокихъ, плохо поливаемыхъ сплошнымъ поливомъ, машъ раньше вызрълъ и началъ осыпаться, когда въ низкихъ мъстахъ только что началось созръваніе; при сборъ часть урожая утеряна, и собрано было только 30 пуд. по расчету на десятину.

Озимый ячмень и овесъ. Озимый ячмень черный кавказскій и овсы Шведскій, Канадскій и Шатиловскій были высвяны на участкъ 5-мъ въ первомъ клинъ пятипольнаго свюоборота; овесъ — 8 октября, ячмень 19 октября. Всходы того
и другого сорта овса появились 19 октября, ячменя 28 октября;
17 ноября выпалъ снъгъ, все поле покрылось сплошь снъгомь;
какъ ячмень, такъ и овесъ попали подъ снъгъ нераспустившимися; снъжный покровъ держался на полъ сплошнымъ до5 япваря, когда появились кое-гдъ проталины. 9 января снъгъ
весь сошелъ съ поля, но въ ночь на 12-е января выпалъ снова
и держался сплошнымъ слоемъ на озими до 23 января. Кущеніе
ячменя началось 26 февраля, кущеніе же на овсъ замъчено
только 2 марта. 28 марта ячмень пошелъ въ трубку; Шведскій
и Шатиловскій овсы пошли въ трубку 7 апръля, Канадскій
9 апръля; 23 апръля дана была всему участку первая поливка;

Табл. № 54.

# товъ хлопчатника въ 1911 году.

### Средній урожай различныхъ сор

названіе сорта.	. BT.	I c	боръ.	II e	еборъ.	III	сборъ.	IV	сборъ.	Итого	урожая.		і урожай есятину.	Средній въсъ 1000 съмянъ въ граммахъ.	ій выходъ 0/0 при кт изъ
HASBAHIE COPTA.	Площадь кв. саж.	Пуд.	Φ.	Пуд.	Φ.	Пуд.	Φ.	Пуд.	Φ.	Пуд.	Φ.	Пуд.	Φ.	Средн 1000 въ гр	Средній 1 въ 0/0/0 очисткъ 1
The salaces about discount on the	zajenije Kao Goda			0.00		0.0	059/.	24			201/-	115	10	100.0	00.04
Кингъ	9117,24	242	21/2	115	37	66	253/4	21	05	445	301/4	117	13	109,8	33,66
Аунсъ Болъ	2629,4	43	161/2	44	331/2	26	15	-		114	25	104	25 29	115,66	30,4
Алленъ Кингъ	1594,1	42	29	16	10	10	$13^{1/2}$	_	_	69	221/2	104	36	110,70	31,96
Сокъ-чигить	$1085^{1/2}$	34	321/2	13	11/2	9	4	-		56	$\frac{28}{9^{3/4}}$	125	24	124,00	30,24 30,29
Эксцельзіоръ Пролиф	954,16	13	273/4	19	14		$\frac{8}{38^{3/4}}$		_	33	$\frac{99/4}{10^{1/2}}$	83 83	24	111,24	31,04
Сара-чигитъ	553	12	63/4	4	5	6				19	181/2	100	36	101,34	35,11
ріумфъ	$653^{1/4}$	13	181/2	7	19	5	21		_	27	$\frac{10^{2}/2}{3^{1/2}}$	100	10	133,20. 137,42	32,95
Кристофоръ Лярджъ	$287^{1/2}$	4	191/2	3	4	4	$\frac{20}{36^{1/2}}$			13 13	361/	109	26	108,20	33,86
ольдъ Стандартъ	$304^{1/2}$	5	2	3	38	2	$\frac{30^{1/2}}{8^{1/2}}$				26	88	29	100,40	31,8
индаль Селектъ Прол.	261	4	241/2	2	33	3	22	1-1		9	34	133	7	121,04	36,24
Госсъ Импрувдъ	$177^{1/2}$	4	8	2	4	3				8	26	93	12	121,04	30,25
Іельсъ Селектъ Инжипш. бѣл.	$222^{1/2}$	2	361/2	2	$15^{1/2}$	2	14 6			6	1		14	115,99	29,43
Гельсъ Селектъ Инжипш. жел	$205^{1/2}$	2	91/2	1	251/2		35			3	35	70 93	37	102,06	30,26
лю Риббонъ	99	1	35	1	5		$\frac{55}{20^{1/2}}$			7	$13^{1/2}$	108	28	102,00	29,52
бендересъ	162	2	291/2	2	$3^{1/2}$	1	9			4	4	76	35	105,86	32,19
[иксонъ Кларкъ	128	1	26	1	9	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\frac{9}{18^{1/2}}$			5	18	98	14	156,70	28,51
Ірайдъ-офъ-Джорджія	133	1	$24^{1/2}$	1	15	1	$\frac{16^{5/2}}{3^{1/2}}$			- 3	$28^{1/2}$	54	13	114,56	25,56
Элорадора	164	1	9	1	16		19			2	$\frac{40^{4}/2}{5^{1/2}}$	88	18	116,66	31,87
уссельсь.	58	1	$2^{1/2}$	_	24		17			900	$34^{1/2}$	91	04		31,11
аудзернъ Гопъ	49	1	391/2	_	18		14	131	7	1	17	87	38	115,40	30,27
лленъ	388/9		27		16		281/2			2	$\frac{17}{3^{1/4}}$	49	38		29,23
шмуни	100	370	293/4		25		191/2	1		_	$36^{1/2}$	68	17		20,20
уль Пролификъ	32	inger an	8	_	9		81/2				$17^{1/4}$	49	11		
руить	21		51/4	_	31/2		11/4				83/4	49	9		
ндижанскій Абасси	$10^{2/3}$	o at	5		21/2		1 1				10	58	3		
басси	101/3		4	_	2		23				36	31	36		
фифи	$67^{2/3}$	63. <u>2.1</u> 7.31	1	_	12		40			8	$\frac{50}{4^{1/2}}$	- 51	_		
азные сорта всёхъ сбор.	-				-			1 30		0	4-/4				

# Стоимость культуры хлоп чатнижа по участкамъ.

				ультуры хлоп	TATHURA III Y TACINAM B.	
	Уч. № 4. 1 дес. 90 кв. с.	Участокъ 1 дес. 64 кв. ма- шин. посъвъ.	№ 8. З79 кв. саж. Джоячный посѣвъ.	Уч. № А. 2 дес. 150 кв. саж.	1	№ 9. есятина.
НАЗВАНІЯ РАБОТЪ.	Число. 4 9	Число.	50- щ. уб.	Число.	Число. да Число. да Число. да Число. да Число.	. ا
	Pago-чихъ.         Поша-пей.           Дощая стоп-мость въ руб.	Рабо- чихъ.         Рабо- поша- дей.         Остана- пость въ руб.	Число рабочихъ и лош. Общая стоимость въ руб.	Рабо- чихъ. Лоша- дей. Стопмость въ рубляхъ.	Рабо- чихъ.  Тоша- дей.  Стоимость въ рубляхъ. Гоша- дей.  Тоша-	дей. Стонмость
Зесенняя вспашка и бороньба Іоливка передъ вспашкой Зспашка плугомъ (и листеромъ). Іриготовленіе грядъ, арыковъ и	$\begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 3 & - \\ 2 & 4 \end{bmatrix}_{30}$	$\begin{bmatrix} \frac{4}{2} & \frac{8}{4} \\ 2 & 4 \end{bmatrix}_{33}$	$\left\{ egin{array}{c} 1^{1/2} \ 3^{1/4} \ - \end{array} \right\} = 5^{1/4}$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{vmatrix} -1 \\ 5^{1/2} \end{vmatrix}$ 4
выравниваніе	$ \begin{bmatrix}     6 & 3 \\     \hline     1^{1/2} & 1 \end{bmatrix} $ $ \begin{bmatrix}     6 & 3 \\     \hline     1 & 1 \end{bmatrix} $ $ \begin{bmatrix}     2^{1/2} \\     \hline     6 & - \end{bmatrix} $	$ \begin{array}{c cccc} 4 & 5 & \\ 6 & - & \\ 2 & 1 & \\ 1 & 1 & \\ 4 & - & \\ \end{array} $	$\left  \begin{array}{c} 3 \\ \hline 1 \\ \hline \\ \hline \end{array} \right  \left  \begin{array}{c} 1 \\ \hline \\ \hline \end{array} \right $	$\left[ egin{array}{ccc} 7^{1/2} & - & J \\ - & - & 2 \\ 4 & 2 \end{array} \right]  6  \left[ egin{array}{ccc} 4 & 3 \\ 5 & - & J \end{array} \right]$	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$\begin{bmatrix} 2 \\ - \\ \end{bmatrix} $ $\begin{bmatrix} 1/4 \\ - \end{bmatrix} $ 1
ливкой	$egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$ \begin{vmatrix} 1 & \\ 9^{3/4} & \\ 5 & \\ 4 & \\ 3^{1/2} & \\ 4^{3/4} & \end{vmatrix} \} 35 $	$egin{bmatrix}$	$egin{bmatrix} - & - & - & 0 \\ 6 & 3^{1/2} & - & 0 \\ 10 & - & 0 \\ 5^{1/2} & - & 0 \\ 2 & - & 0 \\ \end{bmatrix} 41$	$ \begin{bmatrix} 2 & - \\ 1^{1/2} & - \\ 2^{1/4} & - \\ 2 & - \\ 2 & - \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15^{1/4} & 2^{1/4} & - \\ 3^{2} & - \\ 2^{21/4} & - \\ 2^{3/4} & - \\ 2^{3/4} & - \\ 2^{3/4} & - \\ 1 & - \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 21^{1/4} & 2 & - \\ 2^{3} & - \\ 1^{1/2} & - \\ 1^{1/2} & - \\ 1^{1/4} & - \\ 1^{1/4} & - \\ 1^{1/4} & - \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7^{1/4} & 5 & - \\ 6^{1/2} & - \\ 2^{1/4} & - \\ 3^{3/4} & - \\ 1^{1/2} & - \\ 1^{1/2} & - \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7^{1/4} & 5 & - \\ 6^{1/2} & - \\ 2^{1/4} & - \\ 4^{3/4} & - \\ 5^{1/4} & - \\ 5^{1/4} & - \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7^{1/4} & 5 & - \\ 6^{1/2} & - \\ 2^{1/4} & - \\ 1^{1/2} & - \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7^{1/4} & 5 & - \\ 6^{1/2} & - \\ 2^{1/4} & - \\ 1^{1/2} & - \\ 1^{1/2} & - \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7^{1/4} & 5 & - \\ 6^{1/2} & - \\ 2^{1/4} & - \\ 1^{1/2} & - \\ 1^$	_     s
бота культиватора 1-я послѣ 1-го полива	$\begin{bmatrix} 1^{1/2} \\ 3 \\ 2^{8/4} \\ 1^{1/4} \\ 3/4 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1^{1/2} \\ 3^{2^{2/3}} \\ 1^{1/4} \\ 3/4 \end{bmatrix}$ $20^{1/3}$	$\begin{bmatrix} 2^{1/4} & 2^{1/4} \\ 1^{1/4} & 1^{1/4} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$		$ \begin{vmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 21/4 & 21/4 \\ 31/4 & 31/2 \\ 21/2 & 21/4 \\ 21/4 & 23/4 \end{vmatrix}                                   $	$ \begin{bmatrix} 21/2 & 21/2 & & & & 11/2 & 11/2 \\ 11/4 & 11/4 & & & & & \\ 11/4 & 11/4 & & & & \\ 11/4 & 11/4 & & & & \\ 21/2 & 21/2 & & & \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}  \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & & & \\ 21/2 & 21/2 & & & \\ 13/4 & 13/4 & & \\ 11 & 1 & & & \\ 17/2 & 1/2 & 1/2 & \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & \\ 2 & 2 & & \\ 2 & 2 & & \\ 2 & 2 & & \\ 23 & & & & \\ 1 & & & & \\ 1 & & & & \\ 1 & & & &$	
,	$ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -7^{1/2} & - \\ 7 & - \\ 10 & - \\ 21^{1/2} & - \\ - & - \end{vmatrix}                          $	$ \begin{vmatrix} & \\ 13 & \\ 12 & \\ 8^{1/2} & \\ & \\ & \end{vmatrix} 331/_2 $	$\begin{bmatrix} - \\ - \\ 3^{1/4} \\ 4^{1/2} \\ 2 \\ 3^{1/2} \\ 2^{1/2} \end{bmatrix} 15^{3/4}$	-	$ \begin{vmatrix} 1^{1/4} & 1^{1/4} & 1^{1/4} \\ 3/4 & 3/4 & 3/4 \\ 7^{1/2} & - & - \\ 5^{1/2} & - & - \\ 16^{3/4} & - & - \\ 26^{1/4} & - & - \\ - & - & - & - \end{vmatrix} \\ 26 \begin{vmatrix} 1 & - & 1 & 1 & 1 & 1 \\ - & - & - & - & - \\ 41 & - & - & - \\ 35^{3/4} & - & - \\ - & - & - & - \end{vmatrix} \\ 76^{3/4} \begin{vmatrix} 123/4 & - & - & - & - \\ 223/4 & - & - & - \\ 63/4 & - & - & - \\ - & - & - & - \end{vmatrix} \\ 47^{3/4} \begin{vmatrix} 31/4 & - & - & - \\ 38/4 & - & - \\ 33/4 & - & - \\ - & - & - \\ - & - & - & - \end{vmatrix} \\ 10^{1/2} \begin{vmatrix} 83/4 & - & - \\ 10^{1/2} \begin{vmatrix} 83/4 & - & - \\ 14^{1/2} & - & - \\ - & - & - \\ 22^2 & \end{vmatrix} $	
	$100^{1/2}  26^{1/4} - \frac{126^{3/4}}{126^{3/4}}$	91 261/2 1171/2	26	2061/4 39 2441/4	$90^{1/2} 22^{1/4} \frac{1}{112^{3/4}} 12^{11/4} 23^{1/4} \frac{1}{144^{1/2}} 75^{1/4} 13^{1/2} \frac{36}{88^{3/4}} 36 \frac{6^{1/4}}{42^{1/4}} \frac{25^{1/8}}{6^{5/8}} \frac{6^{5/8}}{31^{3/4}} 153 26$	5 <sup>3</sup> /4

Табл. № 56.

#### Стоимость культуры хлопчатника по участкамъ.

	1000	№ 4. 90 кв. с.		№ A. 150 k.c.		№ В. кв. <b>с</b> аж.		38 K. c.			15. кв. саж.		12. в. саж.		14. в. саж.		9.	THE RELEASE	машинн. кв. саж.		джоячн. св. саж.
НАЗВАНІЯ РАБОТЪ.	4 1000			P	A	O , X	0	Д Ы		В Ъ	P	y.	Б	R I	X	Ъ				·djal	DEG
	На уча- стокъ.	На деся- тину.	На . уча- стокъ.	На деся- тину.	На уча- стокъ	На деся- тину.	На уча- стокъ.	На деся-	*	На уча- стокъ,	На деся- тину.	На учат стокъ,	На деся- тину.	На уча- стокъ.	На деся- тину.	На уча- стокъ.	На деся- тану.	На уча- стокъ.	На деся- тину.	На уча- стокъ.	На деся-
І. Подготовка почвы къ посъву: двъ весеннія вспашки и бороньба, поливка передъ посъ- вомт. Выравниваніе и пригото- вленіе грядъ	30	28,91½ 2,41	44 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	$21,69^{3}/4$ $2,90^{3}/4$	16 2½	$\frac{16,78^{1/4}}{2,62^{1/4}}$	25 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	21,32½ 3,17		14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 3 <sup>8</sup> / <sub>4</sub>	21,50 5,62½	5	13,03 3,90½	$9^{3/4}$ $1\frac{1}{2}$	27,30 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 4,20	46 <sup>3</sup> /4	46,75	33	$32,10^{1/4}$ $2,91\frac{1}{2}$	5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	33,20 6,33
II. Уходъ за посѣвомъ:																					
1. Поливка	273/4	26,741/2	41	19,78	151/4	161/3	211/4	17,97		15½	23,25	$9^{3/4}$	25,40	$7^{1/4}$	20,301/4	331/4	33,25	35	34,463/4	4	25,38
2. Прорывка и мотыженіе.	46	44,34½	126	61,9	56	58,74	76 <sup>3</sup> /4	64,90½		473/4	71,62½	211/4	55,371/2	10½	29,40½	738/4	73,75	33½	32,63	15 <sup>8</sup> /4	99,47
3. Работа культиватора .	20½	19,75	27½	13,33 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	23	24,121/2	17½	14,69		71/2	11,25	$4^{3}/4$	12,37	23/4	6,70	11	11,00	13	12,21	- -	<u> </u>
Итого расхода	$126^{3/4}$		$245^{1/4}$		1128/4		$144\frac{1}{2}$			883/4		421/4		31 <sup>3</sup> /4		$179^{3/4}$		117½		26	
Итого расходовъ на десят. до сбора		122,16		118,8	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	118,271/4		122,6	Comment of the second		133,25		110,8		88,91		179,75		114,33		164,3

24 апръля ячмень выбросиль метелку; 2 мая началось его цвътеніе; 3 мая выбросиль метелку овесъ Канадскій, и 7 мая овесъ Шведскій и Шатиловскій; 10 мая участку дана вторая поливка, 12 мая начали цвъсти овсы Шведскій и Канадскій и 17 мая—овесъ Шатиловскій; 19 мая дана всему участку третья и послъдняя поливка. 9 іюня началась уборка ячменя и 18—овсовъ. Въ виду того, что, какъ ячмень, такъ и всъ сорта овса были сильно поъдены воробьями, то не удалось точно опредълить урожай; собрано было на десятину ячменя кавказскаго 39 пудовъ, овса Шатиловскаго 38 пуд., Шведскаго 58 пуд. и Канадскаго 47 пудовъ на десятину.

Люцерна. Люцерны туркестанской, посъва 1907 года, собрано было въ настоящемъ году за 4 укоса 629 пудовъ съ десятины; люцерны англійской съ 7-го участка, посъва 1909 года, было собрано за 4 укоса 846 пудовъ съ десятины, съ другихъ участковъ люцерны туркестанской было собрано за 4 укоса отъ 665 пудовъ до 726 пудовъ на десятину. Люцерна англійская, французская и туркестанская, высъянныя для сравненія въ 1910 году на части участка А, дали за 4 укоса сухого съна на десятину: люцерна англійская—734 пуда, французская—688 пудовъ и туркестанская—622 пуда; наиболъе обильнымъ былъ второй укосъ—до 200 и болъе пудовъ на десятину. Послъ каждаго укоса всъ люцерны поливались дважды. Съ люцерны англійской, высъянной въ 1908 году на части участка 1-го, было собрано въ настоящемъ году за 4 укоса 537 пудовъ.

Ворсянка. Ворсильная шишка, высъянная на небольшомь участкъ въ 1910 году, была собрана въ настоящемъ году по созръвании съмянъ; имълось въ виду собрать съмена для дальнъйшаго ихъ размноженія. Весь урожай шишекъ текущаго года посланъ былъ въ Москву, одной изъ фирмъ, торгующей ими, для опредъленія качества шишекъ. Фирма сообщила слъдующее:

Шишки получаются изъ Франціи и сбываются въ Москва въ количествъ около 5—6 тысячъ бочекъ ежегодно. Москва снабжаетъ ими кромъ подмосковскаго района также востокъ, юговостокъ и отчасти югъ Россіи. Урожай снимается осенью и доставляется въ Москву, начиная съ декабря мъсяца.

Въ шишкахъ цѣнятся слѣдующія качества: жесткость, прочность, правильная форма, нужные размѣры, хорошая сортировка по качеству и размѣрамъ.

При сжиманіи шишки пальцами сбоку и отчасти снизу вверхъ, шишка должна быть жесткой; перышки не должны быть отогнуты книзу; при сжиманіи не должны мяться и ломаться. Шишка должна быть желтаго цвѣта, иногда съ зеленоватымъ оттѣнкомъ; слишкомъ зеленый цвѣтъ указываетъ на недоспѣлость; слишкомъ желтый, переходящій въ бурый — на переспѣлость; въ обоихъ случаяхъ шишка непрочна, если даже она и жестка.

Форма шишки должна быть возможно ближе къ цилиндрической, поэтому формы, приближающіяся къ грушт или шару, нежелательны.

Въ каждой бочкъ должны быть шишки одного приблизительно размъра по длинъ и діаметру. Въ приведенной ниже таблицъ указана сортировка шишекъ; размъры шишекъ взяты съ пробъ «обыкновеннаго» сорта (по 10—20 шт. каждаго размъра); у «отобраннаго» сорта колебанія въ размърахъ въ одной бочкъ менъе указаннаго.

Шишки сортируются не только по размѣрамъ, но и по качеству на «отборныя» и «обыкновенныя». Въ Москвѣ требуются, главнымъ образомъ, «отборныя» (по жесткости, формѣ и т. д.), и только въ случаѣ недостатка спросъ удовлетворяется (въ количествѣ 10%) «обыкновенными». Наиболѣе ходкимъ товаромъ являются размѣры 18—20 тысячъ, а также 10—15 тысячъ (для грубыхъ суконъ); въ меньшемъ спросѣ размѣры 40—60 (для тонкихъ суконъ); промежуточные размѣры 25—38 тысячъ почти не идутъ. Цѣны франко Москва указаны ниже; въ ихъ составъ входитъ: провозъ и пошлина около 20 рублей на бочку и комиссія московскаго продавца 5—8 руб. на бочку. Цѣны колеблются по городамъ; вообще говоря, цѣны на «отборныя» обыкновенно выше указанныхъ, а на «обыкновенныя»—ниже. (Таблица № 57).

Размъры бочекъ около 2½ аршинъ высотой, около 1½ арш. діам. и около 10—12 пудовъ въсомъ. Сортировка имъетъ чрезвычайно важное значеніе. Если шишки будутъ различными по кръпости, то однъ изъ нихъ износятся въ машинъ раньше другихъ; если онъ будутъ отличатся по діаметру, то одна шишка будетъ работать, а сосъдняя потоньше не будетъ; длинныя шишки не будутъ умъщатся между зажимными планками и должны будутъ обръзаться. Сортировка должна производиться на мъстъ, такъ какъ фабриканту требуется обыкновенно

лишь одинъ опредъленный размъръ, продавецъ же не склоненъ заниматься пересортировкой.

Передъ упаковкой ножка шишекъ обрѣзается обычно до длины 7—12 см.; обрѣзаются также прицвѣтные листочки.

*Табл. № 57.* Цъна ворсильной шишки.

Число тысячъ	Цѣна бочки з	въ рубляхъ.	ages in naith	Діаметры
въ бочкъ.	Обыкновенныхъ.	Отборныхъ.	Длина въ см.	въ мм.
duich sin	to the letter.			
10—12	180—200	240 - 250	9 — 13	32—50
13—15	170—180	210—220	8 — 11	32—45
18—20	160—175	190—210	6,5— 9	32—40
22—25	146—160	175—190	6 — 7	30-40
25—30	145-160	170—180	5,5— 7	30—40
30—35	135—150	150—160	5 — 6	27—40
35—38	140—150	150 <b>—1</b> 60	5 — 6	27—40
40-45	135—150	150—160	5 — 5,5	27-40
50—55	135—150	160180	5 — 5,5	27—35
5860	145—160	175—195	3,5— 5	25—35

Представленныя шишки съ Андижанскаго Опытнаго Поля урожая 1911 года можно раздълить почти пополамъ на «отборныя» и «обыкновенныя»; но «обыкновенныя» настолько слабы и ломки, что онъ едва ли могутъ быть употреблены; нъсколько штукъ изъ «отборныхъ» отличны, остальныя хороши; но ихъ цвътъ (почти безъ зеленаго оттънка) и впечатлъніе на ощупь позволяютъ думать, что онъ не особенно прочны, и въроятно потому, что переспъли.

По размърамъ среди шишекъ много употребительныхъ въ Москвъ; по формъ есть хорошіе и плохіе экземпляры.

Въ общемъ представленные образцы лучше полученныхъ раньше въ Кокандъ, и разведение ихъ могло бы имъть успъхъ, но при этомъ должно быть обращено внимание на слъдующее:


# Планъ Андижанскаго опитнаго поля въ 1911 году.

#### ЭКСПЛИКАЦІЯ.

Хлопчатникъ	8 д	ec. 15	KB.	c.
Люцерна	. 2 дес.	1.522	))	))
Разныя культуры	. 3 дес.	2.185	D	))
Питомникъ		860	))	))
Виноградникъ				))
Промышленный садъ				))
Маточный садъ				))
Садъ при усадьбъ			))	))
Усадьба, дороги, арыки и				
межи	3 дес.	2.078	))	))
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	01	4 000		
Итого	/I TIEC	1 200	VD	0

#### постройки.

- 1) Метеорологическая станція.
- 2) Квартира завѣдывающаго и при-кащика.
- 3) Старый навѣсъ для дровъ.
- 4) Квартира для рабочихъ.
- 5) Помѣщеніе для животныхъ.
- 6-7) Помъщеніе для локомобиля и джина.
- 8-9) Хлопковый и съменной амбаръ.
- 10) Старый сарай для инвентаря.
- 11) Новый сарай для инвентаря.
- 12) Навозохранилище.



- 1) Желательно приспособиться къ полученію возможно болѣе жесткихъ и прочныхъ шишекъ.
- 2) Слабыя шишки, а также имѣющія очень неправильную форму не должны пускатся въ продажу.
- 3) Слъдуетъ строго сортировать шишки при укладкъ въ бочки: 1) по размърамъ, 2) по жесткости и формъ.
  - 4) Прицвътные листочки слъдуетъ обръзать.

Въ заключение прилагается планъ Опытнаго Поля (таблица  $N_2$  58).

# Асхабадское Опытное Поле

въ 1911 году.

Отчетъ завъдывающаго полемъ П. А. Козика.

#### Метеорологическія условія.

Отчетный годъ по сравненію съ предшествовавшимъ отличался болѣе обильными осадками, которыхъ выпало въ общей сложности 249,8 mill., тогда какъ въ 1910 г. только 150,8 mill.; большей относительной средней влажностью, достигшей 59% (въ 1910 году 53%); большей средней облачностью — 5,2 (въ 1910 году 3,8); меньшей средней температурой воздуха, поднявшейся только до +15,3° С. (въ 1910 году 16,7° С.) и меньшимъ барометрическимъ давленіемъ, которое въ среднемъ за годъ выразилось цифрой 740,0 mill. (въ 1910 году 751,8).

Распредѣленіе главнѣйшихъ метеорологическихъ элементовъ по отдѣльнымъ мѣсяцамъ года было слѣдующимъ:

Январь. Средняя температура воздуха — 1,9° С.; абсолютный maximum  $10.7^{\circ}$  С. и абсолютный minimum — 11,7. Средняя мѣсячная температура поверхности земли —  $0.5^{\circ}$  С.; между прочимъ январь отчетнаго года является единственнымъ мѣсяцемъ со средней температурой воздуха и поверхности земли ниже 0; въ 1910 году такіе мѣсяца совершенно отсутствовали.

Осадковъ въ теченіе января выпало всего 29,0 mill.

Февраль. Средняя температура воздуха =  $4,1^{\circ}$  С., абсолютный мах.  $20,7^{\circ}$  С. и абсолютный міп. —  $4,2^{\circ}$  С.; средняя температура поверхности земли земли  $4,8^{\circ}$  С. Осадковъ, главнымъ образомъ въ видѣ дождя и снѣга, выпало 15,3 mill.

Мартъ. Средняя температура воздуха = 6,6° С.; абсолютный тахітим 24,8° С. и тіпітит + 0,3° С.; средняя температура поверхности земли = 8,4° С. По количеству выпавшихъ осадковъ, 72,6 mill., мартъ занимаетъ первое мѣсто.

Апръль. Средняя мъсячная температура воздуха въ апрълъ дълаетъ быстрый скачекъ вверхъ и достигаетъ 16,0° С., въ то же время абсолютный тах. поднимается до 34,1° С. Послъдній довольно сильный утренникъ — 3,2° С. наблюдался 1 числа. Средняя температура поверхности земли также значительно поднялась и достигла 21,8° С. Осадковъ въ теченіе апръля выпало 39,9 mill., почти исключительно въ видъ дождя, такъ какъ со снъгомъ наблюдался только одинъ и при томъ послъдній день.

Май. Средняя мѣсячная температура воздуха 22,8° С., абсолютный maximum 41,7° С. и minimum 18,9; средняя температура поверхности земли 27,8° С. По количеству осадковъ— 41,8 mill., май занимаетъ второе мѣсто.

I ю н ь — единственный мѣсяцъ безъ осадковъ; средняя температура воздуха = 28,8° С., абсолютный тахітит 40,6° С. и тіпітит 19,7° С. Средняя температура поверхности земли поднимается до 37,7° С. и является наивысшей температурой въгоду.

Іюль отличался наивысшей въ году средней температурой воздуха, которая въ этомъ мѣсяцѣ поднялась до 31,8° С., при абсолютномъ maximum'ѣ 42,9° С. и minimum'ѣ 21,9° С. Средняя температура поверхности земли въ іюлѣ опускалась до 3,95° С. и съ этого мѣсяца начинаетъ уже постепенно падать. Въ іюлѣ наблюдалось съ дождемъ два дня, давшихъ въ общей сложности 9,7 mill., и 7 дней съ сильнымъ, горячимъ вѣтромъ; средняя мѣсячная облачность только 2,1.

Августъ. Средняя мѣсячная́ температура воздуха =  $30.9^{\circ}$  С. т. е. на 0.9 меньше, чѣмъ въ іюлѣ; вообще съ августа начинается постепенное паденіе температуры воздуха; средняя температура поверхности земли =  $34.4^{\circ}$  С., осадковъ 3.8 mill., облачность 2.9; съ сильнымъ горячимъ вѣтромъ 7 дней.

Сентябрь. Средняя температура воздуха =  $22,6^\circ$  С., абсолютный тах.  $38,6^\circ$  С. и тіп.  $12,6^\circ$  С.; средняя температура поверхности земли =  $26,3^\circ$  С., облачность 2,7, осадковъ 10,7 mill., съ сильнымъ и пыльнымъ вѣтромъ 2 дня.

Октябрь при четырехъ дняхъ съ осадками, давшими только 4,1 mill. и небольшой облачности 3,9 простоялъ совершенно тихимъ. Средняя температура воздуха =  $13,0^{\circ}$  С. 30 октября наблюдался первый осенній заморозокъ —  $1,4^{\circ}$  С., убившій только травянистыя части кустовъ хлопчатника.


Ноябрь. Средняя температура воздуха  $7.9^{\circ}$  С., абсолютный тахіт.  $25.4^{\circ}$  С. и тіпіт. —  $5.0^{\circ}$  С.; температура поверхности земли  $17.5^{\circ}$  С.; съ морозомъ наблюдалось 10 дней и съ осадками 5 дней, давшихъ въ общей сложности 6.1 mill.


Декабрь. Температура воздуха колебалась отъ  $-7,2^{\circ}$  С. до 5,7° С., средняя температура поверхности земли упала до 5,0° С. Съ дождемъ отмъчено въ теченіе мъсяца 7 дней и съ крупой 3 дня, осадковъ выпало всего 16,8 mill.

Отдъльныя времена года, принимая во вниманіе вышеизложенный краткій мъсячный обзоръ метеорологическихъ элементовъ, можно охарактеризовать слъдующимъ образомъ.

Зима. Въ теченіе декабря 1910 года, января и февраля 1911 года выпало осадковъ всего 48,8 mill., т. е. почти втрое меньше средняго количества, приходящагося на зимній періодъ за послъднее пятилътіе (1907—1911 г.г.); такимъ образомъ, зиму 1911 года слъдуетъ признать бъдной атмосферными осадками, что въ смыслъ обогащенія почвы влагой было далеко неблагопріятно, но удобно, всл'вдствіе отсутствія грязи, для производства подготовительныхъ работъ: устройства грядокъ, оросительныхъ валиковъ, выравниванія участковъ, вывозки, разбрасыванія и запашки навоза. Бъдная осадками зима 1911 года оказалась въ то же время и самой суровой зимой за послъднія шесть лътъ. Какъ указано выше, средняя температура воздуха въ январъ была — 1,9° С., и она оказалась наинизшей мъсячной температурой не только для даннаго года, но и за послъднія шесть лътъ (1906—1911 г.г.). Январьская средняя температура поверхности земли также оказалась наинизшей температурой за послъднее шестилътіе; кромъ того декабрь 1910 г. былъ наиболъе холоднымъ для указаннаго выше періода. Всъ эти обстоятельства, въ связи съ засушливымъ 1910 годомъ, давшимъ въ общей сложности только 150,8 mill. осадковъ, и отсутствіемъ подножнаго корма и зимнихъ заготовокъ, были причиной сильнаго падежа крупнаго и главнымъ образомъ мелкаго домашняго скота въ некоторыхъ уездахъ Закаспійской области (напр. въ Мангиплакскомъ).


Температура поверхности земли въ 1911 году.







### Температура воздуха въ 1911 году.

Среднія мѣсячныя.



Распредъление осадковъ по мъсяцамъ въ 1911 году.





Весна. По количеству выпавшихъ осадковъ—154.3 mill. весна оказалась наиболъ́е дождливымъ временемъ года, какъ это и вообще наблюдается ежегодно въ Закаспійской области.


Начало весны было холоднымъ, и только съ апръля (по новому стилю) установилась теплая погода; къ посъву хлопчатника возможно было приступить только съ половины апръля (по новому стилю); мартовскіе дожди дали возможность обойтись безъ предпосъвной поливки нъкоторыхъ полей, предназначенныхъ подъ хлопчатникъ, и посъвы, сдъланные подъ атмосферную влагу, въ дальнъйшемъ развивались вполнъ нормально, поддерживаемые дождями, перепадавшими въ апрълъ и маъ; однако, дожди второй половины весны оказались въ то же время и неблагопріятными, способствуя усиленному росту сорной растительности и образованію корки, для борьбы съ которыми пришлось дать посъвамъ хлопчатника не менъе трехъ ручныхъ мотыженій.

Лѣто отличалось обиліемъ тепла и свѣта и было бы вполнѣ благопріятно для развитія хлопчатника, если бы не горячіє сильные вѣтры, которыхъ отмѣчено въ теченіе іюня, іюля и августа 17. Кромѣ того въ первой половинѣ лѣта повсемѣстно въ Закаспійской области и въ особенности въ Мервскомъ уѣздѣ замѣчено было массовое появленіе гусеницы свекловичной совки — Caradrina exiqua, причинившей значительный вредъ посѣвамъ хлопчатника и первымъ двумъ укосамъ люцерны; изъ мѣръ борьбы противъ гусеницы примѣнялась обильная поливка пораженныхъ участковъ, въ моментъ ухода гусеницы въ почву для окукливанія, и эта мѣра оказалась въ достаточной степени дѣйствительной.

Осень. Начало осени отразилось неблагопріятно на качеств'є хлопковаго волокна, которое всл'єдствіе пыльныхъ в'єтровъ, бывшихъ въ сентябр'є, и посл'єдовавшихъ зат'ємъ дождей, сильно загрязнилось; такимъ образомъ первый сборъ хлопка въ 1911 году былъ хуже второго сбора. Первые осенніе заморозки начались только въ конц'є октября, были незначительны и вреда хлопку не принесли; вс'є коробочки созр'єли и раскрылись. Такъ, впрочемъ, обстояло д'єло только въ Асхабадскомъ у'єзд'є; въ Мервскомъ же у'єзд'є, являющемся центромъ хлопководства Закаспійской области, осенніе заморозки начались раньше, при этомъ были очень сильные, и землед'єльцамъ пришлось потерять до 30% сырца. Ц'єны на хлопокъ-сырецъ стояли осенью и зи-

	Барометръ при 0°.	Темп	ерату	ра	возду	x a.	Абсол. влажн.	The second of the second of the second of	тельная ность.	Облач- ность.	0 с	адк	и.	Темпе на пове зем	ратура рхности или.
мъсяцы.	Среднее.	Средняя.	Мах. абсол.	Число.	Міп. абсол.	Число.	Средняя.	Средняя.	Min.	Средняя.	Сумма.	Max.	Число.	Средняя.	Max.
Январь	Барометръ былъ на по- въркъ въ г. Ташкентъ.	-1,9	10,7	17	- 11,7	9	3,6	87	31	6,4	29,0	11,0	22	-0,5	15,0
Февраль	740,8	4,1	20,7	9	- 4,2	14	4,6	7.7	47	6,7	15,3	3,8	14	4,8	24,4
Мартъ	740,4	6,6	24,8	2	- 0,3	24	5,6	78	46	8,2	72,6	16,8	31	8,4	26,1
Апрѣль	738,5	16,0	34,2	14	- 3,2	1	7,9	61	31	5,4	39,9	23,5	10	21,8	3,8,6
Май	737,6	22,8	41,4	26	18,9	8	10,7	53	28	4,8	41,8	24,0	3	27,1	48,0
Іюнь	736,1	28,8	40,6	9	19,7	6	9,9	36	17	9,0	_	-	-	37,7	55,0
Іюль	735,9	31,8	42,9	13	21,9	26	13,1	39	11	2,1	9,7	8,8	27	35,9	58,5
Августъ	735,1	30,9	40,4	3	15,2	31	13,2	46	14	2,9	38	3,8	29	33,4	52,1
Сентябрь	738,7	22,6	38,6	6	12,6	28	9,6	44	14	2,7	10,7	10,0	25	26,3	50,5
Октябрь	745,4	13,0	33,5	16	- 1,1	30	5,7	53	16	3,9	4,1	2,8	20	17,5	35,5
Ноябрь	746,1	7,9	25,4	2	- 5,0	17	4,7	61	20	4,0	6,1	1,5	16	24,8	32,1
Декабрь	745,8	1,7	5,7	28	- 7,2	1	4,3	82	23	6,3	16,8	6,0	18	5,0	17,0
Сумма	8140,4	184,3	358,9	_	55,3	100	92,9	717	298	62,4	249,8	112,0	-	242,2	452,8
Среднее	740,0	15,3	29,9	2.	4,6	_	7,7	59	24	5,2	20,8	9,3	AL LESS	20,1	37,7

### Относительная влажность въ 1911 году.



# Выводы изъ метеорологическихъ наблюденій Асхабадской станціи за 1911 годъ. Число дней съ

мъсяцы.	Осадками.	Сифгомъ.	Градомъ.	Крупой.	Туманомъ.	Гровою.	Сильнымъ вътромъ.	Росою.	Инеемъ.	Ясн. небомъ.	Пасм. небомъ.	Температур. мах. ≤ 00.	Температур. міп. <u>&lt; 0</u> 0.
Январь	9	8		1	14		1	1	7	4	10	13	29
Февраль	10	4			6		1	4	1	4	11	3	7
Мартъ	17	4	-	1	3	_	1	3	1	2	21	-	6
Апръль	8	1		_	2	1	2	. 1	1	5	8	1	1
Май	12	-		-	2	5	2	_	_	7	7		-
Іюнь	_	-		-	2	_	3	_		25	_	-	-
Іюль	2			_	1	1	7		-	19	2	-	-
Августъ	1	<u>-</u>		-	2	1	7	_	_	15	2	_	
Сентябрь	1	_	_	-	5	_	2	_	_	15	4	_	_
Октябрь	4	_		_	12		_	1	-	14	6	-	-
Ноябрь	5	_	-		8	-	2	4	5	14	4	_	10
Декабрь	7	,—	_	3	17	_	1	1	3	14	14	4	22
Сумма	76	17	- 1 37 m dec	5	74	8	29	14	18	138	89	21	75

#### Выводы изъ метеорологическихъ наблюденій Асхабадской станціи за 1911 годъ.

8 10 — — 5 5 — — 16 19 3 3 6 6 — —	- 3 3 - 4 5 3 2 2	Н   Число.	1 1 3 8 1 4 1 3	3 — 4 —	  -  - 	6 6 4 5		і Сила.	Число.	- дисло	Спла.	. огон Тисло.	3 -	Сила.	. Число.	Сила.	1 1	3	11	13	Число.
5 5 — — 16 19 3 3 6 6 — —	-     4     5       3     2     2		3 8	1		4 5				2	2			-			1				
16	3 2 2	   	1 4	1					- -	2	2	6 2	1 -	_	6	19	1				
6 6 — —		_   _				11 1:									0	15	-	4	11	18	2
	_ 5 6 	-	1 3	3 2			1		3 4	_	-	1	1 -	_	2	2		-	19	29	13
	- - -		1000		4	9 12				-	-	8 1	1 -	_	5	5	1	3	18	26	8
5 5			1 1	1	2	5 6	3 -	-	4 4	-	-	1	2 1	1	6	10	2	5	18	29	8
8 10 — —	<b>-</b> 6 6	_  -	7 11	1	3	_	-	-	_ -	_	-		-	-	9	16	2	3	13	28	27
9 18 4 10	10 7 20	- -	6 13	3		2 5			1 1	1	3	1	1 2	6	5	13	5	16	9	26	8
8 14 1 5	5 6 23	_	10 36	j		3 8	s -	-	1 1		-	3	9 -	_	5	9	2	9	10	35	7
10 11	- 8 13	2 5	1 3	3 -	_	2 2	2 -	-		1	2	3	8 -	-	3	11	1	2	7	9	7
10 11 1 2	2 4 4	_	7 8	3 -		2 6	3 -		-   -		-	1	1 -	-	4	5		-	7	8	12
6 7	- 1 1	_  -	3 7	7 -	-60	7 7	-		1 1		-		-	-	7	14	-	_	13	18	1
14 14	<b>-</b>   6   6		2 8	3 1	2	1 1	-	-	1 1		-	1	1 2	8	_	_	-	_	12	12	8
6	11 1	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	11 1 2 4 4 — — 7 — — 1 1 — — 14 — — 6 6 — —	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$											

мой 1911 г. низкія: за лучшіе сорта хлопка заводы платили 2 руб. 80 коп. — 3 руб. за пудъ. Въ довершеніе всего, циклонъ, пронесшійся надъ Закаспійской областью въ ноябръ 1910 года и сопровождавшійся пониженіемъ температуры до — 15° С., совершенно убилъ озими, вслъдствіе чего цѣны на ячмень въ 1911 году поднялись съ 50—60 коп. до 1 р. 15 к. — 1 р. 20 к. за пудъ, а саманъ (битая солома), одинъ изъ главныхъ кормовыхъ продуктовъ для скота, предавался вмъсто 20—25 коп. по 40—50 коп. за пудъ. Такимъ образомъ, какъ видно изъ вышеизложеннаго краткаго обзора, 1911 годъ въ сельско-хозяйственномъ отношеніи оказался далеко не благопріятнымъ.

#### Опыты съ пшеницей.

Первое поле пятипольнаго сѣвооборота послѣ обычной подготовки, предпосѣвной поливки, вспашки 7" плугомъ Сакка на глубину 3½ вершковъ и боронованія въ два слѣда, было засѣяно 8-го октября 1910 года мѣстной озимой пшеницей «Акъ-бугдай»; быль поставленъ опытъ со способами посѣва: 1) ручной разбросной посѣвъ подъ плугъ, 2) такой же посѣвъ по пласту, 3) сплошной рядовой посѣвъ и 4) ленточный трехстрочный съ шириною лентъ въ 5 верш. и междурядій въ 9 вершковъ, часть которыхъ предположено было обработать ручнымъ культиваторомъ и часть коннымъ. Всходы пшеницы появились своевременно и, благодаря теплой погодѣ, развивались вполнѣ нормально вплоть до 15-го ноября 1910 года, когда неожиданно налетѣвшимъ ураганомъ, сопровождавшимся необыкновенно густой пылью и сильнымъ, рѣзкимъ пониженіемъ температуры до — 15° С., были совершенно уничтожены.

Ко второй половинъ февраля 1911 года окончательно выяснилось, что озимь погибла, и потому ръшено было 28 февраля 1911 года сдълать пересъвъ, не прибъгая къ предпосъвной поливкъ, т. к. почва была достаточно влажна. Для пересъва были взяты съмена яровой пшеницы «Арнаутка», имъющей оригинальный колосъ, съ черными остьями, сизыми пленками и стекловиднымъ зерномъ. «Арнаутка» первый разъ высъвалась на Асхабадскомъ Опытномъ Полъ и, попавъ сюда изъ Кубанской области, не вполнъ хорошо себя чувствовала. Ко времени

уборки, зёрна многихъ колосьевъ оказались щуплыми, преждевременно высохшими. Всходы появились 20 марта, колошеніе началось съ 30 апръля, къ уборкъ приступлено было 20 іюня. Въ теченіе вегетаціоннаго періода «Арнаутка» получила три поливки: 1, 14 и 28 мая. Результаты урожая, сведенные въ нижеслъдующую таблицу, показываютъ постепенное увеличеніе урожая въ зависимости отъ увеличенія густоты поства. Вообще же урожаи зерна при перечисленіи на десятину оказались незавидными во встать трехъ случаяхъ, что можно объяснить, во-первыхъ, происхожденіемъ поствного матеріала (станена, какъ указано выше, изъ Кубанской области и выстяны первый годъ на Опытномъ Полто и, во-вторыхъ, позднимъ поствномъ, который въ силу необходимости пришлось сдтать въконцъ февраля.

		C	ъдъ	лян	к и.	На	а дес	яти	н у.
густота посъва.	Площадь кв. с.	Зер	рна.	Can	ана.	3ej	рна.	Сам	ана.
Control Controls	Плоп	п.	ф.	ii.	ф.	п.	φ.	п.	ъ.
6-пуд. на десятину	343	6	35	11	10	48	04	78	28
5 пуд. на десятину		5	38	7	20	41	25	52	19
4 пуд. на десятину		4	28	6	0.00	32	35	41	39

# Опыты съ подсолнечникомъ, кормовой тыквой и кукурузой.

Третье поле пятипольнаго съвооборота, послъ предпосъвной поливки, начавшейся 17 марта, и, вслъдствіе временнаго отсутствія воды, законченной только 24 марта, было вспахано 7" плугомъ Сакка на глубину 4 вершковъ, пробороновано бороною Лина въ два слъда, и затъмъ произведенъ посъвъ: сначала подсолнечника — 25 марта рядовой съялкой Гельферихъ-Саде, затъмъ 26 марта, ручной гнъздовой посъвъ кормовой тыквы и наконецъ 1 апръля посъвъ той же съялкой Гельферихъ-Саде — кукурузы.

Подсютнечникъ взошель 6 апръля и послъ прорывки на разстояніи 12-ти вершковъ между растеніями въ ряду, при аршинной ширинъ междурядій, подвергался обычному здъсь уходу: поливкамъ и рыхленію коннымъ культиваторомъ до тъхъ поръ, пока эта работа не грозила поломкою стеблей; когда растенія достигли ½ аршинной вышины, было сдълано окучиваніе, а незадолго до цвътенія, начавшагося 3 мая, на половинъ участка произведено пасынкованіе, съ послъдовавшей двъ недъли спустя провъркой. Результаты урожая, какъ и въ предыдущіе годы, показали пользу примъненія чеканки: «Чеканенный» \*) участокъ далъ по разсчету на десятину 74 пуд. 8 фунт. отсортированнаго, полновъснаго зерна, а контрольный — 65 пуд. 24 фунта.

Кормовая тыква, посъянная 26 марта ручнымъ гнъздовымъ способомъ въ разстояніи 2 арш. гнъздо отъ гнъзда и рядъ отъ ряда, дала всходы 6 апръля, а зацвъла 15 мая. На части участка, по примъру прошлаго года, было произведено окучиваніе или върнъе присыпка землею плетей въ двухътрехъ мъстахъ на разстояніи 1—1½ арш., съ цълью лучшаго укорененія, а, слъдовательно, и болъе полнаго использованія питательныхъ веществъ почвы. Убрана была тыква 18 августа, и послъ взвъшиванія оказалось, что контрольная дълянка дала на десятину 430 пуд. 8 фунт. сырой массы (не считая плетей), а дълянка съ окучиваніемъ 1105 пуд. 32 фунта.

Кукуруза «Кутаисскій гибридъ», посѣянная сухими сѣменами 1 апрѣля, взошла 11 апрѣля. По достиженіи растеніями 3—4 вершк. вышины, было сдѣлано прорѣживаніе на разстояніи 8, 10 и 12 вершковъ въ ряду между растеніями, при 12-ти-вершковыхъ междурядіяхъ. Вліяніе густоты расположенія растеній очень рѣзко сказалось на величинѣ урожаєвъ. 8 вершковъ въ ряду дали урожай на десятину только 7 пуд. 17 фунт. зерна, 10 вершковъ — 54 пуд. 06 фунт. и 12 вершковъ — 31 пуд. 6 фунтовъ. Однако, и самый лучшій урожай въ данномъ случаѣ слѣдуетъ признать ничтожнымъ по сравненію съ урожаями «Кутаисскаго гибрида», получающимися въ благопріятныхъ условіяхъ, напр., въ Ферганской области или на Кавказѣ, и достигающими 200—300 пуд. на десятину.

<sup>\*,</sup> Участокъ съ примѣненіемъ пасынкованія.

Причина низкихъ урожаевъ кукурузы въ Закаспійской области указывалась въ предыдущихъ отчетахъ и можетъ быть объяснена совпаденіемъ момента цвѣтеній кукурузы съ горячими вѣтрами — «гармсилями», обжигающими женскія соцвѣтія, вслѣдствіе чего початки получаются неполными, а многіе изънихъ несутъ всего лишь по нѣсколько зеренъ.

#### Бобовыя.

На основаніи опытовъ предыдущихъ лѣтъ выяснилось, что наиболѣе подходящимъ растеніемъ изъ бобовыхъ въ смыслѣ урожайности и доходности является нутъ (Cicer Ariethinum), поэтому въ отчетномъ году большая частъ пятаго поля, а именно 1620 кв. саж., и была занята нутомъ, съ цѣлью опредѣленія вліянія способовъ его посѣва на урожай зерна. Кромѣ того на томъ же полѣ на пространствѣ 330 кв. саж. былъ посѣянъ шабдаръ на сѣно, въ качествѣ однолѣтняго растенія, каковымъ онъ въ дѣйствительности и оказался, на основаніи наблюденій двухъ предыдущихъ лѣтъ.

Послѣ предпосѣвной поливки, продолжавшейся съ 14 по 17 марта и вспашки на 3½ вершк. 7" плугомъ Сакка, участокъ, предназначенный подъ нутъ былъ раздѣленъ на двѣ дѣлянки, одна изъ которыхъ, площадью въ 875 кв. саж., послѣ двукратнаго боронованія, была засѣяна рядовой сѣялкой «Гельферихъ-Саде», а другая ручнымъ способомъ, по пласту, съ боронованіемъ въ два слѣда послѣ посѣва; того же дня, 22 марта, былъ посѣянъ руками вразбросъ и шабдаръ, съ боронованіемъ въ одинъ слѣдъ до посѣва и въ два слѣда послѣ него.

Всходы нута появились 30 марта, цвѣтеніе началось 10 мая, а плоды были замѣчены 19 мая. Къ уборкѣ приступлено 10 іюня. Въ періодъ развитія нутъ получилъ три поливки 1, 15 и 31 мая и два рыхленія коннымъ планетомъ—18 апрѣля и послѣ первой поливки. Разбросный посѣвъ не разрыхлялся вовсе и получилъ тоже три поливки; сорныя травы уничтожались здѣсь только одинъ разъ при помощи туркменскихъ серповъ.

Учетъ урожая показалъ преимущество рядового машиннаго посъва передъ разброснымъ ручнымъ: рядовой далъ на десятину 42 пуда 21 фунтъ зерна, а разбросной—27 пуд. 21 фунтъ.

Шабдаръ, посъянный 22 марта, взошелъ 26 марта; попавъ затъмъ подъ дождь и образовавшуюся послъ него корку, онъ на первыхъ порахъ развивался туго. Въ дальнъйшемъ оказался такимъ же требовательнымъ къ обильному орошенію и чувствительнымъ къ жаръ, какъ и въ предшествовавшіе года. До 1 іюня, времени перваго укоса, шабдаръ пришлось полить четыре раза: 25 апръля, 10, 19 и 27 мая; первый укосъ, оказавшійся и послъднимъ, далъ по разсчету на десятину 184 пуда 13 фунт. сухого съна. Послъ перваго укоса, несмотря на своевременныя поливки, шабдаръ изръдился, совершенно выгорълъ, и съмянъ получить не удалось.

Люцерна. Два внѣпольныхъ участка люцерны, засѣянныхъ въ 1909 г., общей площадью въ 600 кв. саж., продолжали существовать и въ отчотномъ году; всего было снято четыре укоса, давшихъ въ общей сложности 238 пуд. 08 фунт. сухой люцерны, что составитъ на десятину 952 пуда 32 фунта.

На участкъ, засъянномъ въ 1910 году, со внесеніемъ въ почву нитрагина, продолжалъ производиться учетъ вліянія послъдняго. Какъ и въ предшествовавшемъ году, выяснилось преимущество русскаго нитрагина бактеріолого-агрономической станціи передъ нитробактериномъ проф. Ботомлея и американскимъ нитрагиномъ д-ра Мооръ.

кв. с. 27,3	п.	Ф.	и.	φ. 08	п.	Φ.	п.	Φ.	п.	Φ.	И.	Φ.
27,3	5	02	3	08	0					-14		
					2	23	1	28	12	21	1101	03
26,5	4	37	2	38	2	32	1	18	12	05	1098	04
25,6	3	05	. 2	08	2	16	1	15	9	04	852	32
27,5	2	36	2	18	2	18	1	06	8	38	781	03
25,6	4	02	2	10	2	14	1	13	9	39	935	06
	25,6	25,6 3	25,6 3 05 27,5 2 36	25,6 3 05 2 27,5 2 36 2	25,6 3 05 2 08 27,5 2 36 2 18	25,6 3 05 2 08 2 27,5 2 36 2 18 2	25,6   3   05   2   08   2   16     27,5   2   36   2   18   2   18	25,6   3   05   2   08   2   16   1     27,5   2   36   2   18   2   18   1	25,6 3 05 2 08 2 16 1 15 27,5 2 36 2 18 2 18 1 06	25,6   3   05   2   08   2   16   1   15   9     27,5   2   36   2   18   2   18   1   06   8	25,6 3 05 2 08 2 16 1 15 9 04 27,5 2 36 2 18 2 18 1 06 8 38	25,6     3     05     2     08     2     16     1     15     9     04     852       27,5     2     36     2     18     2     18     1     06     8     38     781

#### Хлопчатникъ.

Программа опытовъ съ хлопчатникомъ въ отчетномъ году была расширена закладкой «двухпольнаго сввооборота», имъющаго цълью изучение вліянія предшествующаго растенія на урожай и развитіе хлопчатника. Участокъ, площадью 1200 кв. саж. быль раздёлень на двё равныя части, и каждая изъ нихъ въ свою очередь была разбита на десять равныхъ дълянокъ. Первое поле двухпольнаго съвооборота было засъяно хлопчатникомъ, а второе — слъдующими растеніями: 1) хлопчатникъ, кукуруза, 3) подсолнечникъ, 4) джугара, 5) 6) нутъ, 7) чечевица, 8) машъ на зерно, 9) машъ на зеленое удобреніе и 10) черный паръ. Учесть результаты вліянія перечисленныхъ сейчасъ растеній, а также зеленаго удобренія и чернаго пара, можно будеть только въ будущемъ году, во второй годъ двиствія свиооборота; въ отчетномъ же году, ради использованія 1/4 десятины, занятой первымъ полемъ съвооборота, засъяннымъ хлопчатникомъ, былъ поставленъ опытъ, имъвшій цёлью выясненіе вліянія чеканки на урожай хлопка и опреділеніе наиболье выгоднаго момента для производства ея. Данныя урожая подтвердили пользу примъненія чеканки во время и послъ цвътенія.

время чеканки.	Площадь.	1-ый	сборъ.	2-ой сборъ.	3-ій	сборъ.	OHADA	DOELO.	На деся-	тину.
	кв. с.	п.	Φ.	и. Ф.	п.	Φ.	П.	Φ.	и,	Φ.
Чеканка до цвётенія	 120	1	11	<b>-</b> 27	-	23	2	21	50	20
Чеканка во время цвѣтенія. Чеканка послѣ цвѣтенія Контроль.	240	$\begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{vmatrix}$	29 19 39	$ \begin{array}{c cccc} 1 & 03 \\ 1 & 07 \\ 1 & 34 \end{array} $	1 1	09 18 19	$\begin{vmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} 01 \\ 04 \\ 12 \end{vmatrix}$	80 82 63	20

Въ поясненіе этой таблицы слідуеть указать, что участокъ, на которомъ быль поставлень опыть съ чеканкой, не удобрялся какъ въ годъ посіва, такъ и въ теченіе двухъ предыдущихъ літь, поэтому урожай сравниваемыхъ ділянокъ невелики; тімь не меніе, польза приміненія чеканки и здісь ясно видна: чеканка во время цвітенія увеличиваеть урожай на десятину при сравненіи съ контрольной ділянкой на 17 пуд. 20 ф.; а чеканка послів цвітенія на 19 пудовъ. Здісь

нъсколько страннымъ можетъ показаться то обстоятельство, что чеканка послъ цвътенія вызвала большее увеличеніе урожая, чёмъ чеканка во время цвётенія, тогда какъ опыты предшествующихъ лътъ указываютъ на преимущество болъ ранней чеканки, именно, чеканки до цвътенія; противоръчіе это въ данномъ случав можетъ быть объяснено следующими обстоятельствами: во-первыхъ, осень отчетнаго года была весьма благопріятна для созр'вванія вс'вхъ, а, слівдовательно, и поздно сформировавшихся коробочекъ, вслъдствіе слабыхъ и поздно наступившихъ заморозковъ; а, во-вторыхъ, дълянка съ чеканкой во время цвътенія, расположенная ближе къ люцернъ, пораженной Caradrin'ой, больше пострадала отъ последней, что, конечно, не могло не отразиться на величинъ урожая сырца. Во всякомъ случав, данныя отчетнаго года, подтвердивъ выводы предшествовавшихъ лътъ по вопросамъ чеканки, въ то же время показали, что умълое, своевременное примънение этой операции можетъ до извъстной степени служить мърой поднятія урожаевъ хлопка даже на земляхъ неудобренныхъ.

#### Сравненіе сортовъ хлопчатника.

Въ отчетномъ году опытъ сравненія сортовъ хлопчатника въ отношеніи ихъ скороспѣлости, урожайности и проч. былъ соединенъ съ чеканкой всѣхъ сравниваемыхъ сортовъ, для чего каждая дѣлянка, занятая даннымъ сортомъ, была раздѣлена въ свою очередь на двѣ, изъ которыхъ одна чеканилась во время цвѣтенія, а другая оставалась для контроля.

Учетъ урожая показалъ, что всѣ, безъ исключенія, сравнивавшіеся сорта положительно реагируютъ на чеканку, но далеко не въ одинаковой степени: такъ, напримѣръ, «Кингъ» чеканенный по сравненіи съ нечеканеннымъ далъ увеличеніе урожая на десятину на 19 пуд., «Аунсъ Болъ»— на 38 пуд., «Кокъчигитъ» на 33 пуда, «Кара-чигитъ» — на 8 пуд., «Маллячигитъ» — на 40 пуд. и «Ашмуни» на 64 пуда. Послъдняя цифра красноръчиво указываетъ на то, что своевременное примъненіе чеканки можетъ служить върнымъ средствомъ полученія корошихъ урожаевъ даже такихъ поздноспълыхъ сортовъ, какъ египетскіе.


Въ двухъ нижеслъдующихъ таблицахъ показаны результаты урожая и важнъйшіе моменты развитія сравниваемыхъсортовъ.

Сорта.	дъля	ΗÌ	кі	И.	1-ый	coops.	2-ой	сборъ.	3-ій	coops.	В	ЕГО.	На деся-	THHV.
Had ading t	TOOT TARE				п.	Φ.	п.	Φ.	п.	Φ.	n.	Φ.	п.	q
rodo Namberi	Чеканка				-	29		$4^{3/4}$		5	9/3E	383/4	155	
Кингъ.	Контроль				-	17	. –	7		10	-	34	136	1
	Чеканка					22	_	8	_	(	-	36	144	
Аунсъ Болъ.	Контроль					8	_	$6^{1/2}$	_	7	-	$21^{1/2}$	86	
	Чеканка				_	25	_	7	_	3	_	35	140	-
Когъ-чигитъ.	Контроль				_	14	_	$6^{3/4}$		6		$26^{3/4}$	107	
	Чеканка					22		6		4		32	128	
Кара-чигитъ. {	Контроль				-	9	-	11	-	10		30	120	1
	Чеканка				-	23	-	8		6		37	148	
Малдя-чигитъ. {	Контроль				_	10		.8	1.2	9	- -	27	108	
	Чеканка	i.	•		-	34			-	-		34	136	
Ашмуни.	Контроль					18	_	_	_	_	_	18	72	

COPT.b.	Предпоствияя поливка.	Вспашка.	Посѣвъ.	Веходы.	Начало цвъте- нія.	Первая раскрыв- шаяся коробочка.	1-й сборъ.	2-й сборъ.	3-й сборъ.	Длина волокна, миллиметры.	0/0 выхода (джин- ная очистка).
Кингъ	31/m	4/IV	5/IV	14/iv	15/vi	22/vII	16/1x	30/1x	12/x1	24	31,8
Аунсъ Болъ.	"	,,	"	,,	'n	25/vII	,,	"	"	24,5	30,1
Кокъ-чи-	'n	יי	,,		12/vi	22/vII	n	"	n	25	30,1
Кара - чи-	,	n.	,,	13/iv	14/vi	26/v11	n	n .	"	26	29,2
Малля - чи- гитъ	,,	'n	,,	"	14/vi	·24/v11	. "	,,	n	24	29,8
Ашмуни	<b>3</b> 7	,,	"	12/iv	22/vi	20/vIII	1/IX	-	1.00	34	

### Отношеніе къ чеканкѣ различныхъ сортовъ хлопчатника.

По даннымъ 1911 года.



# Опыть съ разстояніемъ между кустами и числомъ растеній въ кустѣ.

Второе поле пятипольнаго съвооборота, два дня спустя послъ дождя 27 марта, было вспахано, обычнымъ порядкомъ подготовлено къ посъву, который произведенъ 30 марта, Баннеровской съялкой съменами «Кинга», вымоченными въ водъ въ теченіе ½ сутокъ.

Всходы появились 5 апръля, первая прорывка сдълана 25 апръля, а окончательная 20 мая; при аршинной ширинъ междурядій, въ рядахъ были оставлены разстоянія 8,12 и 16 вершковъ и для каждаго изъ этихъ разстояній по 1, 2 и 3 растенія въ кустъ.

Съ момента появленія всходовъ и до первой поливки, которую хлопчатникъ потребоваль только на 50-ый день послѣ посѣва, пришлось, въ виду сильнаго роста сорныхъ травъ, дать три ручныхъ мотыженія, а послѣ каждой изъ первыхъ трехъ поливокъ по одному рыхленію коннымъ культиваторомъ.

Въ теченіе вегетаціоннаго періода хлопчатникъ получиль всего шесть поливокъ въ слъдующіе сроки: 20 мая, 10 іюня, 25 іюля, 24 іюля и 11 августа.

Цвътеніе началось 16 іюня, первая коробочка раскрылась 24 іюля, къ первому сбору приступлено 8 сент., ко второму — 26 сент. и къ третьему 1 ноября. Какъ видно изъ нижеслъдующей таблицы, наибольшіе урожаи почти для всъхъ разстояній получились при одиночныхъ кустахъ: такъ — одиночные кусты, расположенные въ разстояніи 12 вершковъ другъ отъ друга въ рядахъ, дали на десятину 182 йуда сырца; одиночные кусты при 8-вершковыхъ разстояніяхъ — 171 пуд. 13 ф., и одиночные кусты, расположенные въ разстояніи 1 арш. другъ отъ друга, дали на десятину 123 пуда 13 фунт. Двойные кусты дали наилучшій урожай, будучи расположенными въ разстояніи 12 вершковъ въ рядахъ — а именно 112 п. 26 ф. на десятину. Для тройныхъ кустовъ наиболъе подходящимъ разстояніемъ оказался 1 аршинъ; при этомъ условіи получилось 126 пудовъ 26 фунтовъ сырца на десятину.

ereatory is		Площадь.	1- <b>с</b> бо			!-й оръ.	3- c60	1130	Все	го.	На десяти	
		кв. с.	п.	Φ.	п.	Φ.	п.	Φ.	. п.	Φ.	п.	Φ
	ALL SH		sqis/	Que:	il e	What		111		MARL!		
ь ряду.	1 растеніе въ кустъ	90	2	27	1	31	1	39	6	17	171	1:
вершковъ въ ряду	2 растенія въ кустъ	,,	2	08		15 <sup>1</sup> /2	tacis —		2	231/2	68	20
8 верш	3 растенія въ кустѣ	,,	1	38	12.13 18.13	17			2	15	63	1
ь ряду.	1 растеніе въ кустъ	"	2	03	2	10	2	20	6	33	182	
вершковъ въ ряду.	2 растенія въ кустъ	3 ( <b>)</b> "	2	38	80	38	-	13	4	09	112	2
12 верг	3 растенія въ кустъ	,,	2	32		31		17	4	00	106	1
	1 растеніе въ кустъ	11.58 ± 3	2	04	1	09	1	12	4	25	123	1
16 вершковъ въ ряду.	2 растенія въ кустъ	,,	3	05	-	33		_	3	38	105	1
16 вері	3 растенія въ кустѣ	"	3	14	1	16		-	4	30	126	2

#### Вліяніе удобреній.

Опыть съ удобреніями быль поставлень на IV-мъ полѣ изтипольнаго сѣвооборота; предпосѣвная поливка произведена 1 и 2 апрѣля, вспашка — 4 и 5 апрѣля и посѣвъ сѣялкой Баннера, мочеными сѣменами «Кинга» 6 апрѣля. Всходы появились 12 апрѣля, первая прорывка сдѣлана 6 мая и окончательная 21 мая; ширина междурядій 1 аршинъ, въ рядахъ одиночные кусты на разстояніи 12 вершковъ другъ отъ друга.

Число мотыженій и рыхленій коннымъ культиваторомъ хлопчатникъ получилъ такое же, какъ и въ описанномъ выше опытъ. За все время было дано, не считая предпосъвной, шесть поливокъ, произведенныхъ въ слъдующіе сроки: 1 іюня, 20 іюня, 5 іюля, 20 іюля, 4 августа и 25 августа. Цвътеніе началось съ 18 іюня, первая раскрывшаяся коробочка замъчена 25 іюля, первый сборъ продолжался съ 10 по 15 сентября, второй—съ 28 по 30 сентября и третій съ 8 по 10 ноября. Результаты урожая показаны въ нижеслъдующей таблицъ.

дълянки.	Площадь.		·й ръ.	2- сбо			-й оръ.	Вс	его.	Н десят	
	кв. с.	п.	Φ.	п.	Φ.	п.	Φ.	п.	Φ.	п.	Φ.
										in la	
Лошадиный навозъ 2400 пуд. на дес	60	2	16	_	15		30	3	21	141	# <u>+</u>
Овечій навозъ 2400 пуд на дес	.60	2	25	1	06	2	41/2	5	$35^{1/2}$	235	20
Жмыхи хлопковые 60 п. на дес	60	2	07	1	05	1	26	4	38	198	_
Жмыхи хлопковые 40 п. на дес	60	2	10		38	1	10	4	18	178	_
Суперфосфать 30 пуд. на дес	120	4	18	1	02	1	37	7	17	148	20
Суперфосфать 15 пуд. на дес	60	1	20		19	_	33	2	32	112	_
Жмыхи 40 п. + Супер- фосфать 15 пуд	60	1	34	1		1	10	4	04	164	_
Жмыхи 60 п. + Супер- фосфать 7 <sup>1</sup> /2 пуд	60	2	21	_	33	1	05	4	19	179	_
Контроль	60	1	27	_	7		13	2	07	87	

Примъненіе указанныхъ въ таблицъ удобреній во всъхъ случаяхъ сопровождалось увеличеніемъ урожая; при этомъ оказалось, что наименьшій эффектъ даетъ суперфосфатъ, внесенный въ количествъ 15 пуд. на десятину; онъ поднимаетъ урожай только на 25 пудовъ противъ контрольной дълянки. Овечій навозъ поднимаетъ урожай до колоссальной цифры — 235 п. 20 ф. на десятину, т. е. на 148 п. 20 ф. больше противъ контрольной дълянки. Сильно дъйствующими удобреніями оказываются

также и хлопковые жмыхи, внесенные въ количествъ 60 и 40 пуд. на десятину; въ первомъ случат урожай хлопка сырца доходилъ до 198 пуд. на десятину, а во второмъ до 178 пуд., тогда какъ лошадиный навозъ, внесенный въ количествъ 2400 п. на десятину, — даетъ только 141 пуд. сырца.

Что касается затъмъ совмъстнаго дъйствія жмыховъ и суперфосфата, то здъсь замъчается довольно значительное угнетеніе суперфосфатомъ дъйствія жмыховъ, такъ какъ въ обоихъ случаяхъ комбинаціи жмыховъ и суперфосфата даютъ урожаи меньшіе, чъмъ жмыхи, взятые въ чистомъ видъ. Въ то же время оказывается, что суперфосфатъ способствуетъ ускоренію созръванія коробочекъ: 40 пуд. жмыховъ въ чистомъ видъ даютъ 96% созръвшихъ коробочекъ, а тъже 40 пуд. жмыховъ вмъстъ съ 15 пуд. суперфосфата даютъ 98,2% созръвшихъ коробочекъ; сказанное подтверждается нижеслъдующей таблицей:

	Санти	метры.	XÆ		B- I.	хся
дълянки.	Высота ра- стенія.	Длина боко- выхъ вътвей.	Число боковыхъ вътвей.	Общее число коробочекъ.	Число раскрыв- шихся коробоч.	% раскрывшихся коробочекъ.
potential to the						1
Лошадиный навозь 2400 пул. на десятину	110	34	16	22,7	20	88
Овечій навозъ 2400 пуд. на десятину	125,5	36,5	19,2	45	38	84,4
Жмыхи хлопковые 60 пуд. на десятину	119,5	36,4	17,4	28,2	27	95,7
Жмыхи хлопковые 40 пуд. на десятину	117,9	34	17	25	24,2	96
Суперфосфать 30 пуд. на десятину	97,5	32,3	15,7	21,9	21,5	98,1
Суперфосфать 15 пуд. на десятину	95,8	27,9	15,7	19	18,7	98,4
Жмыхи 40 нуд. + суперфосфать 15 нуд. на десятину.	110,9	36,8	16,5	23,2	22,8	98,2
Жмыхи 60 пуд. + суперфос фатъ 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> пуд	113,5	38,1	17,9	27	26,4	97,7
Контроль	93,4	29	15	16	15	93,7

#### Опытъ съ числомъ поливокъ и временемъ ихъ.

Опыть съ числомъ и временемъ поливокъ быль поставленъ на томъ-же четвертомъ полѣ основного сѣвооборота и имѣлъ цѣлью, какъ и въ предшествовавшіе годы, разрѣшеніе вопроса о наиболѣе выгодномъ распредѣленіи поливокъ по отдѣльнымъ періодамъ вегетаціи хлопчатника, которыхъ, какъ извѣстно, различается три: первый періодъ — отъ момента появленія всходовъ до начала цвѣтенія, второй — періодъ цвѣтенія и образованія коробочекъ и третій — періодъ созрѣванія коробочекъ.

Данныя 1911 года подтверждають выводы предшествовавшихь лѣть: какъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы, наибольшіе урожаи получаются въ томъ случаѣ, когда преобладающее число поливокъ приходится на періодъ цвѣтенія; тѣ-же данныя вполнѣ ясно и опредѣленно указываютъ, что многократныя поливки являются убыточными, какъ въ смыслѣ уменьшенія урожая, такъ и въ смыслѣ непроизводительной траты воды и труда поливальщика; сравнивая дѣлянки 8 и 18, мы видимъ, что семь поливокъ (2—2—3) даютъ на десятину только—49 пуд. 15 фун. сырца, тогда какъ пять поливокъ (1—3—1) 146 пуд. 1 фун., т. е. на 96 пуд. 26 фунтовъ больше.


Описанные выше опыты съ хлопчатникомъ и другими растеніями были поставлены на старой площади Опытнаго Поля. Осенью 1910 года, какъ объ этомъ уже упоминалось въ предшествовавшемъ отчетъ, къ Опытному Полю былъ присоединенъ участокъ цълины площадью около 9 десятинъ; въ виду значительныхъ неровностей поверхности, пришлось затратить много труда на выравниваніе новаго участка; когда эта работа будетъ вполнъ закончена, то вся площадь Опытнаго Поля представитъ террасы, постепенно понижающіяся въ направленіи съ юга на съверъ. Осенью 1910 года и частью весною 1911 года было приведено въ должное состояніе около 23/4 десятины цёлины; которыя и были заняты тремя растеніями: подъ озимый ячмень отошло 2 десятины, подъ кунжутъ 846,72 кв. саж. и подъ хлопчатникъ 927,5 кв. саж. Урожаи кунжута и хлопчатника въ первый годъ посъва ихъ на цълинъ получились невысоки; кунжуть даль по разсчету на десятину только 20 п. 36 ф. зерна, а хлопчатникъ «Кингъ» — 43 п. 31 ф. сырца.

Nene Abus-	ъ.	Площадь кв. саж.	п	оливо теріод		Общее число поливокъ.	1-й 2-й 3-й сборъ сборъ 15/1х 24/х1 — Ф у н т ы.		Всего.	На десяти		
N <u>e</u> N	HOK	ILEC KB.	I	II	III	06п	Ф 2	и т	ы.	ФУНТЫ.	п.	Φ.
		person Desgr				eressani.			5 3 4 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5			
1	L	12	1	1,	0	2	3,75	1,125	-	4,875	24	15
2	2	12	1 .	2	0.	3	4,5	0,625	-	5,125	25	25
3	3	12	1	1	1	3	7	0,5	-	7,500	37	02
4	1	12	1	i	2	4	10	2,125	<u> </u>	12,125	60	25
5	5	12	1	2	1	4	12	1,750	_	13,750	68	03
6	3	12	2	1	1	4	10,5	2,375	811 <u>-8</u> 119	12,875	64	15
7	,	12	2	2	1	5	15	6,875		21,875	109	15
8	3	12	1	3	1	5	1,25	8		29,250	146	01
9	)	12	3	2	0	5	14	5,5	Len.	19,500	97	02
10		12	1	2	2	5	14	7,750		21,750	108	03
11		12	2	3	0	5	12,25	8,250	<del></del>	20,500	102	02
12	2	12	3	2	1	6	18,25	5,125	 	23,375	116	35
13	3	12	2	2	2	6	16	6,750	Sergista —	22,750	113	03
14		12	1	3	2	6	12,5	4		16,500	82	02
15		12	2	3	1	6	12	4,250	_	16,250	81	01
16		12	2	3	2	7	15	3,125		18,125	90	25
17		12	3	2	2	7	9	3,750		12,750	63	03
18		12	2	2	3	7	7,5	2,375		9,875	49	15

Лучше всего удался ячмень; хотя на 1800 кв. саж. всходы совершенно погибли отъ мороза 15 ноября 1910 г., но остальная площадь, поздно засъянная, покрылась зеленью только весною 1911 года, и благодаря этому обстоятельству всходы уцълъли, хорошо раскустились, и съ площади 300 кв. саж. получилось 135 пуд. зерна, что составляетъ на десятину 108 пудовъ.

Вст выстянныя на цтлинт растенія— ячмень, кунжутъ и хлопчатникъ оказались очень нетребовательными къ орошенію;

#### АСХАБАДСКОЕ ОПЫТНОЕ ПОЛЕ ВЪ 1911 ГОДУ.



такъ, напримъръ, ячмень хорошо себя чувствовалъ и при одной поливкъ, данной ему въ періодъ налива зерна (при этомъ не считается, конечно, предпосъвная поливка); кунжутъ пришлось полить два раза, а хлопчатникъ три раза. Между прочимъ здъсь слъдуетъ отмътить одно нелишенное интереса обстоятельство; хлопчатникъ, посъянный поздно, 10 мая и давшій всходы 15, потребовалъ первую поливку только 22 іюля т. е. 2½ мъсяца спустя послъ посъва, тогда какъ въ обычныхъ условіяхъ Опытнаго Поля, на старопахотныхъ земляхъ, удобренныхъ навозомъ въ количествъ 2400 пуд. на десятину, первую поливку приходится давать хлопчатнику черезъ 40 и много 50 дней спустя послъ посъва.

#### Объясненія къ плану опытнаго поля.

LKMNOP — старая площадь Опытнаго Поля.

MNOPRS — участокъ, присоединенный осенью 1910 г.

I — яровая пшеница «Арнаутка», опыть съ густотою посъва.

II — хлопчатникъ, опыты съ удобреніями и поливками.

III — подсолнечникъ — чеканка и контроль; кормовая тыква — окучиваніе и контроль; кукуруза — опыть съ разстояніями въ рядахъ.

IV — хлопчатникъ — опыть съ разстояніями въ рядахъ и числомъ растеній въ кустахъ.

V — нутъ и шабдаръ — способы поства.

А — хлопчатникъ — сравнение сортовъ.

В — двухпольный ствообороть.

С — джугара.

D — палисадникъ.

Е — усадьба.

а, в, b — люцерна.

с — египетскій хлопчатникъ.

2 — кунжутъ на цълинъ.

4 — хлопчатникъ «Кингъ» на цёлинъ.

6 — озимый ячмень на цёлинъ.

1, 3, 5, 7 — участки, подлежащіе выравниванію