# Г. У. З. и З. Департаментъ Земледълія.



о состоянии и дъятельности

# опытныхъ хлопковыхъ учрежденій

въ Туркестанъ и Закаспійской области

въ 1907 году.

- 1. Опытное поле Голодная степь, Самарканд. обл.
- 2. Асхабадское опытное поле, Закасп. обл.
- 3. Мервская показательная хлопковая плантація.

Выпускъ ІІ-й.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія В. Ө. Киршбаума, д. М-ва Финансовъ, на Дворц. площ. 1910.



# ПРЕДИСЛОВІЕ.

Дъятельность вошедшихъ въ настоящій сборникъ опытныхъ полей Департамента Земледълія въ Туркестанскомъ крато сосредоточена на главнъйшей для нашихъ Средне-Азіатскихъ владъній культурь — хлопчатникъ, останавливаясь на другихъ культурахъ постольку, поскольку онъ связаны съ хлопчатникомъ условіями съвооборота, а также имъютъ кормовое и продовольственное значеніе для края.

Изъ двухъ послъднихъ вопросовъ наибольшимъ вниманіемъ по своему значенію пользуется вопросъ о кормовыхъ растеніяхъ, главнымъ образомъ бобовыхъ, однолѣтнихъ (машъ) и многолѣтнихъ (люцерна), необходимыхъ какъ для обезпеченія мѣстнаго хозяйства кормовыми средствами, такъ и въ качествѣ азото-собирателей, обогащающихъ почву и повышающихъ урожай другихъ растеній въ сѣвооборотѣ. Продовольственные хлѣба—пшеница и ячмень для орошаемыхъ знойныхъ районовъ являются уже мало подходящими и менѣе выгодру и культурами, такъ какъ хлѣба эти воздѣлываются съ бо́ имъ успѣхомъ и при незначительныхъ, сравнительно, затратахъ въ районахъ богарныхъ посѣвовъ (подъ дождь), тѣмъ болѣе, что съ проведеніемъ Ташкентско-Оренбургской ж. д. и облегченіемъ подвоза продовольственныхъ хлѣбовъ изъ другихъ областей и губерній Россіи цѣны на эти хлѣба понизились.

Неблагопріятно сложившіяся метеорологическія условія отчетнаго года, къ сожалѣнію, весьма затрудняли производтво опытныхъ работъ, ставя ихъ въ совершенно исключительныя условія, что сказалось на ихъ результатахъ, и заставляєть съ большими поправками и значительной осторожностью принимать выводы этого года, не получившіе еще достаточнаго обоснованія въ прошлой д'ятельности полей.

Отчетъ по Андижанскому опытному полю за 1907 годъ не могъ быть включенъ въ настоящій сборникъ, такъ какъ, благодаря перемѣнѣ завѣдующаго и продолжительному отсутствію замѣстителя, данныя 1907 г. явилось возможнымъ использовать лишь одновременно съ составленіемъ отчета 1908 года, вмѣстѣ съ коимъ они и будутъ напечатаны въ слѣдующемъ очередномъ (Ш-мъ) сборникѣ отчетовъ хлопковыхъ учрежденій.

obaseren à rydeonin Pocela monta un era xiron-romanum et.

Raga my Ginerum bonnadrolronorogu m

# оглавленіе.

	СТРАН.
Опытное поле Голодная степь въ 1907 г. Отчеть завъдующаго полемъ	
М. М. Бушуева.	
Программа дъятельности опытнаго поля и обзоръ общихъ условій года	
I. Метеорологическія условія въ 1907 году	
Вредители	. 17
II. Полеводство	. 19
Озимые посъвы (пшеница и ячмень)	21-24
Яровые посъвы (зерновые хлъба, масличныя и бобовыя)	
III. Опыты съ хлопчатникомъ	
IV. Плодовый садъ, питомникъ, виноградникъ и пасѣка.	
V. Рабочій и молочный скоть опытнаго поля	
The second secon	2000
Асхабадское опытное поле въ 1907 году. Отчетъ завъдующаго полемъ	
инструктора по хлопководству И. Г. Ермакова.	
Опыты съ озимой пшеницей	74
» » хлопчатникомъ (въ сѣвооборотѣ)	75
» » яровыми хлъбами (пшеница, ячмень и овесъ)	79
» » сортами хлопчатника	
» » однолътними бобовыми (машъ, нутъ, фасоль)	
Люцерна	
Опыты внъ съвооборота.	
Опыты съ различными сортами хлопчатника	84
» » числомъ и временемъ поливокъ хлопчатника	
Учетъ стоимости отдъльныхъ культуръ	
Мервская показательная хлопковая плантація	
исроская показатемьная клопковая плантація	90

### СПИСОКЪ РИСУНКОВЪ.

		Стр
1.	Опытное поле «Голодная степь» зимой	16
2.	Взметь поля осенью подъ хлопчатникъ	16
3.	Показательное крестьянское хозяйство въ Голодной степи	17
4.	Хлопчатникъ сорта Ounce boll (по люцернъ)	24
5.	Машъ (Phaseolus Mungo)	25
6.	Кормовая свекла	32
	Прессовка люцерны	33
8.	Плодовый питомникъ опытнаго поля	64
9.	Улей Дадана на пасъкъ хозяйства опытнаго поля	65

у эт уранул этгэлийн төм төм хуны ургы ү

# Опытное поле Голодная степь\*

въ 1907 году.

Отчетъ завъдующаго полемъ М. М. Бушуева.

Въ отчетномъ году (седьмомъ по основаніи), голодностепское опытное поле (рис. 1) продолжало разработку вопросовъ, связанныхъ съ изученіемъ условій развитія въ раіонъ Голодной степи культуры хлопчатника и другихъ цънныхъ растеній и отчасти разрабатывало вопросы: а) о съвооборотахъ для мъстнаго района, б) о солонцахъ, в) о вліяній удобреній, г) о культур'в другихъ растеній, какъ входящихъ въ основной съвооборотъ (кромъ хлопчатника), такъ и новыхъ растеній; на ряду съ этими основными вопросами, опытное поле пыталось разр'яшить н'якоторыя задачи раціональнаго садоводства, скотоводства (главнымъ образомъ относящіяся къ выработк' кормовыхъ раціоновъ для молочнаго стада при см'вшанномъ кормленіи люцерной, свеклой, хлопковыми сфменами и проч.) наконецъ, завфдывающій опытнымъ полемъ велъ лично разработку вопросовъ метеорологіи по даннымъ наблюденій на метеорологической станціи, производилъ нъкоторыя изследованія почвъ Голодной степи, воды канала Николая І, а также, въ цъляхъ распространенія улучшенныхъ земледъльческихъ орудій и машинъ среди мъстнаго населенія, руководиль имъющимся при опытномъ полъ с.-х. складомъ. Кромъ того, при опытномъ полъ было устроено по порученію переселенческой организаціи въ Голодной степи «показательное образцовое хозяйство» (рис. 3) крестьянскаго типа \*\*.

<sup>\*</sup> Почт. адр. ст. Голодная степь, Самарканд. обл. (Средне-Азіатск. ж. д.). \*\* Подробное описаніе пом'єщено въ январской и др. книгахъ Туркест. Сел. Хоз. за 1908 г.

Согласно выработанной подробной программ'я работь опытнаго поля, въ 1907 году предполагалось охватить сл'ядующія детали указанныхъ основныхъ вопросовъ:

- а) По обработк в почвы: 1) вліяніе мелкой и глубокой вспашки (рис. 2) на хлопчатникъ и хлёбныя растенія; 2) осенній и весенній (глубокій и мелкій) взметь подъ хлопчатникъ; 3) паръ черный не удобренный, удобр. навозомъ и зеленымъ удобреніемъ—подъ озимое.
- б) По вопросу о посъвъ: 1) посъвы сухими и замоченными стерилизованными съменами; 2) разбросный посъвъ (озимыхъ и хлопчатника), рядовой (озимыхъ и яровыхъ—съялкой-крестьянкой, а хлопчатника съялкой Banner'a), гнъздовой (хлопчатника)—на широкихъ, двухрядныхъ грядахъ—джоякахъ, сдъланныхъ ручными кетменями, и на узкихъ грядахъ, сдъланныхъ окучникомъ; 3) густота посъва: 1, 2, 3 растенія (хлопчатника) въ гнъздъ.
- в) Уходъза посъвами: 1) проръживаніе, пропашка культиваторомъ, мотыженіе кетменями, боронованіе; 2) чеканка, пасынкованіе.
- г) Вліяніе числа и времени поливокъ на хлопчатникъ и озимыя.
  - д) Вліяніе удобреній на хлопчатникъ и люцерну.
- е) Сорта полевыхъ культуръ и сравнительная урожайность съучетомъ выгодности ихъ воздѣлыванія (хлопчатникъ, свекла, кукуруза, озимыя зерновыя, бобовыя, люцерна, масличныя); сорта хлопчатника, свеклы и проч.
- ж) II лодосмёнъ и сёвообороты для хлопчатника, злаковъ, бобовыхъ и проч.
- з) Новыя культуры: сахарное сорго, гаолянь, тефъ и др.
- и) Урожайность различныхъ сортовъ плодовыхъ деревьевъ и продолжительность сохраненія плодовъ.
  - к) Огородныя растенія.
- л) Кормовые продукты и травы; вліяніе ихъ на удойность коровъ.
  - м) Пчеловодство.
- н) Метеорологическія наблюденія и почвенныя изслъдованія.
- о) Борьба съвредителями сельскаго хозяйства, главнымъ образомъ—хлоичатника.

Указанные опыты и изслъдованія производились частью на особомъ, такъ назыв. «опытномъ участкъ» (въ одну десятину), выдълен-

номъ въ свверо-западномъ углу опытного поля, частью же на поляхъ, входящихъ въ тотъ или иной сввооборотъ.

Приступая къ изложенію результатовъ опытовъ отчетнаго года, слъдуетъ упомянуть, что, къ сожальнію, многіе изъ нихъ не могли дать опредъленныхъ и точныхъ данныхъ для отвъта на поставленные программой вопросы, въ силу различныхъ причинъ, какъ то: необыкновенно дождливой и холодной погоды въ течепіе весны, лъта и осени, нашествія саранчи и, наконецъ, массоваго поврежденія завязей хлопчатника и кукурузы гусеницей яровой совки (Heliothis armiger).

Эти неудачи въ постановкъ полевыхъ опытовъ заставляють насъ высказать пожеланіе, чтобы въ будущемъ параллельно съ такими опытами обязательно велись еще и вегетаціонные опыты (по крайнсй мъръ съ хлопчатникомъ)—въ сосудахъ, поставленныхъ въ такъ называемой вегатаціонной тепличкъ, при чемъ устраняется вліяніе если не всъхъ, то хотя части внъшнихъ неблагопріятныхъ условій (саранчи, совки, града и проч.) на постановку опытовъ.

Отчетный годъ для сельскихъ хозяевъ Голодной степи, какъ и вообще для хозяевъ всего Туркестана, кромѣ, пожалуй, хозяевъ богарныхъ районовъ (гдѣ преобладаютъ посѣвы хлѣбныхъ злаковъ— подъ естественную атмосферную влагу, давшихъ въ 1907 г. обильный урожай), надо признать однимъ изъ самыхъ неудачныхъ и тяжелыхъ; неблагопріятныя для культуры хлопчатника метеорологическія условія въ теченіе всего года привели къ необычайно низкому урожаю хлопка съ преобладаніемъ малоцѣнныхъ вторыхъ и 3-хъ его сортовъ.

Особенно тяжело неурожай хлопка отразился на массъ мелкихъ хлопководовъ, благодаря господству въ ихъ хозяйствахъ посъвовъ хлопчатника и задолженности хлопководовъ торговымъ фирмамъ и скупщикамъ хлопка. Выдающійся урожай хлопка въ 1906 г., побудилъ хлопководовъ расширить его посъвы въ 1907 г. до предъловъ возможности въ ущербъ остальнымъ культурамъ, забравъ значительныя ссуды подъ урожай хлопка. Между тъмъ даже въ Ферганской области, съ наиболъе высокой культурой хлопчатника и благопріятными естественными условіями, въ отчетномъ году туземцы хлопководы получали 20—30, максимумъ 50 пудовъ съ десятины хлопка-сырца, вмъсто обычныхъ—80—120 пудовъ, 'да и этотъ хлопокъ, собранный съ опозданіемъ при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ погоды, получился низкаго качества и потому малоцънный.

Такимъ образомъ мелкій хлопководъ, не снявшій почти пшеницы и распахавшій большую часть люцерника подъ хлопокъ, оказался и безъ хліба, и безъ кормовъ для скота, и безъ денегъ на покупку ихъ, такъ какъ выручка отъ хлопка даже не всегда покрывала задолженность и денежныя повинности плантаторовъ.

Въ Голодной степи, гдъ къ неблагопріятнымъ для развитія хлопчатника метеорологическимъ условіямъ присоединились и другіе вредные факторы, какъ-то-саранча, яровая совка, ржавчина (на озимыхъ) и помоха, крестьяне и мелкіе арендаторы—туземцы, получили съ десятины хлопчатника по 10—20 пудовъ сырца 2—3 сорта, одинъ сборъ котораго при дороговизнъ рабочихъ рукъ въ Голодной степи (собирали пудъ сырца сначала по 35 коп., подъ конецъ по 90 коп.) обходился около 20% всей стоимости полученнаго сырца.

Въвиду этого плантаторы большею частію, если не были связаны денежными обязательствами съ фирмами, рѣшили въ 1908 г. сократить посѣвы хлопка, перейдя къ болье устойчивымъ и необходимымъ для продовольственныхъ и кормовыхъ нуждъ посѣвамъ пшеницы и люцерны, а также мѣстами къ посѣвамъ сахарной свеклы (первый опытъ среди крестьянъ Голодной степи), о выгодности воздѣлыванія которой они узнали отъ жителей Каунчинскаго района 1) (подъ Ташкентомъ).

Въ заключение слъдуетъ, однако, отмътить, что, несмотря на всъ неудачи съ хлопкомъ въ Голодной степи, культура его здъсь все болъе и болъе развивается на ряду съ прочими продуктами полеводства, какъ то: пшеница, ячмень, люцерна и друг., находящими себъ върный сбытъ на Туркестанскихъ и Ферганскихъ рынкахъ. Это подтверждается слъдующими данными:

- 1) Площадь арендаторскихъ посѣвовъ по каналу Николая І-го возрасла съ 1901 года по 1905 годъ съ 1.100 десятинъ до 3.300 десятинъ.
- 2) Доходность этихъ земель для казны за то же время возрасла съ 2.400 рублей до 18.000 рублей.
- 3) Площадь подъ хлопчатникомъ увеличилась съ 1905 по 1907 годъ съ 250 десятинъ до 1.000 десятинъ въ 1906 и 1907 годахъ.
  - 4) Въ 1906 и 1907 году отправлено по Сред.-Азіат. жел. дорогъ 2)

<sup>1)</sup> Въ 1907 г. здѣсь получились громадные урожаи сахарной свеклы—до 2.000 пуд. и болѣе съ десятины. Свекла сдавалась на Каунчинскій сахарный заводъ по 16—18 коп. Заводъ обѣщалъ Голодностепскимъ крестьянамъ выдавать ссуды подъ посѣвы свеклы до 80 руб. за десятину съ обязательствомъ принимать урожай по 18 к. за пудъ съ погрузкой въ вагонъ на ст. Голодная степь. Однако опасенія нашествія саранчи заставили многихъ повременить съ посѣвами свеклы, несмотря на выгодность условій.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Выдано пассажирскихъ билетовъ: въ 1906 г.—5719, въ 1907 г.—9547.

со станціи "Голодная степь":

Названіе продуктовъ.	Въ 1906 г.	Въ 1607 г.
1. Хлопка-сырца	7.099 пуд.	18.583 пуд.
2. Пшеницы, ячменя, кунжута, лю- церны и проч	72.883 "	220.299 "
3. Прочихъ мелкихъ грузовъ	28.180 ",	46,412 "

• Небезынтересно отмътить, что Голодная степь тяготъетъ въ торговомъ отношеніи, главнымъ образомъ, къ Ферганскимъ (Кокандъ и др.) и Самаркандскимъ (Ходжентъ) рынкамъ и меньше всего къ Ташкенту, что подтверждается тъмъ, что въ 1907 году, напримъръ:

Хлопка отправлено:

n	))	въ Кокандъ и проч 10.463 п	уд.
»	))	» Ташкентъ 8.120	>>
Пшеницы,	люцерны	и др.	
»	»	въ Кокандъ 184.660 п	уд.
»	"	» Ташкентъ 35.639	))

Такимъ образомъ, значительная часть голодностепскаго хлопка проходить по средне-азіатской желѣзной дорогѣ два раза: отъ Голодной степи до Коканда и отъ Коканда обратно черезъ Ташкентъ— Оренбургъ въ Европейскую Россію. Очевидно, такое ненормальное явленіе прекратится лишь тогда, когда какая-либо фирма построитъ хлопко-очистительный заводъ въ самой Голодной степи и будетъ очищать сырецъ на мѣстѣ производства. Въ послѣднемъ случаѣ хлопководы будутъ имѣть возможность пріобрѣтать акклиматизированныя сѣмена хлопчатника для посѣва на мѣстѣ, не переплачивая за нихъ въ Кокандѣ или Ташкентъ. Кромѣ того, при такомъ заводѣ могло бы быть оборудовано еще и маслобойное производство, что дало бы возможность мѣстнымъ хозяевамъ имѣть дешевый концентрированный кормъ дли молочнаго скота—въ видѣ хлопковаго жмыха и прекрасное удобреніе для полей.

# I. Метеорологическія условія въ 1907 году.

Изъ приводимыхъ ниже таблицъ видно, что метеорологическія условія 1907 года значительно отличались отъ среднихъ условій Голодной степи за прошлые годы (по количеству осадковъ, напримъръ, отчетный годъ былъ однимъ изъ самыхъ сырыхъ за послъднее пятильтіе).

 $Taблица \ \mathcal{N} \ 1.$  Метеорологическія данныя 1907 года на опытномъ полѣ въ Голодной степи.

М всяцъ.	]	Баромет <sub>]</sub> давл		e	(	Сухой те	рмометръ		См	оченый	гермомет	ръ.	Максимумъ.	Манимумъ.
	7	1	9	Среди.	7	1	9	Средн.	7	1	9	Средн.	Макс	Мини
	1	10-1	3º C.					THE REAL PROPERTY.	es let ris				7-го	1 14-
Январь	744,4	744,0	744,5	744,8	- 6,3	- 0,9	- 5,3	-4,16	- 6,4	1,24	- 5,5	-4,37	+ 9,5	-22
		11-15	and the second second					- CE - T					13-го	20-
Февраль	741,9	738,1		739,5	+0,13	+ 7,1	+ 2,5	+ 3,2	-0,28	+ 5,0	+ 1,9	+1,87	+18,0	-17
		14 -17		740	10-	1.15	1.11	110-		1.11.	1.0.	10.	19-ro	1-
Мартъ	740,9	740,7   17-20		740,8	+ 8,2	+17,5	+11,1	+12,3	+ 6,6	+11,8	+ 8,9	+ 9,1	+31,0 30-ro	28-
Апръль	740,2	740,3		740 00	+ 13,1	+21,9	+15,0	+16,6	12,0	16,0	13,3	13,7	33,0	+ 4
апрыв	140,2	210		140,28	T 15,1	721,9	710,0	710,0	12,0	10,0	10,0	10,1	15-го	11-
Май	738,7	738,7	0.	738.75	+ 18,9	22,6	19,5	20,3	19,2	20,9	17,2	19,1	36,0	1
	,	22-28		,,,									22-го	10-
Гюнь	735,6	735,5	735,2	735,4	23,1	34,1	23,0	26,6	17,4	22,3	17,9	19,2	38,5	5
		25-30											3-го	31-
Іюль	734,1	733,4		733,7	23,8	36,4	26,2	28,8	18,3	25,5	20,2	21,3	41,5	13
		22-25		=00	10	0.	90	00		00	10 -	10 -	1-ro	21-
Августь	757,6	736,0		736,9	16,4	31,2	20,7	22,8	12,9	20,9	16,0	16,3	38,0 2-ro	26-
Сентябрь	742,9	740 0	742,8	742,2	9,6	23,5	14,2	15,8	7,7	15,8	11.1	11,5	34,5	1
сентиоры	142,9	16-13		144,2	3,6	20,5	14,2	10,8	1,1	10,0	11,1	11,0	26-го	8-
Октябрь	746.3		746,1	746.1	4,2	14,2	7,6	8,7	3,4	9,0	5,2	5,8	27,0	- 5
	0,0	14-12	2º C.	,.	-,-								4-ro	16-
Ноябрь	747,1	747,0	747,3	747,1	+0,08	5,5	+1,48	+2,3	-0,5	+4,I	+ 0,9	+ 1,5	14,0	13
		120	C.	10.12									7-го	27-
Декабрь	741,9	739,7 {	741;	740,9	-15,1	+4,4	+0,17	+ 1,22	-2,07	+2,45	-0,75	-0,01	14,5	12
Среднія годовыя за			tell 1	E.		3 15							3/VII	14
	740,96	740.02	740,5	740,5	+9,14	18,12	+11,36	+12,87	7,36	12,7	9,0	9,58	+41,5	-22
		,,,,,	,		, ,,								Іюль	Янва
Среднія за 5 лѣть	-	-	_	739,0	+10,1	19,3	12,6	14,0	-	_	_		42,1	23
													Іюль	Янва
Среднія за 1906 годъ	-	-	-	738,0	+10,0	20,0	13,0	14,3		-	-	-	42,5	16

and was a fig			Нап	равле	еніе и	сила	вѣтр	a.		Си	ла вѣтр	a.	Обл	ачно	сть.	Влажн	ость.		ніе.
М всяцъ.	THXO.	N	NE	Е	SE	s	sw	w	NW	7	.1	9	7	1	9	Абсолют- ная.	Относи-	Осадки.	Испареніе.
	E						. 55									A BE	O F	mm.	mm.
Январь	58	1/1	2	_ /	42/226	2/0	15/0	25/53	7/6	87	121	100	7,2	5,3	5,0	1,3	30	54,5	8,
Февраль	35	2/3	_	4/3	29/122	3/12	13/2	19/25	14/26	81	82	29	5,6	4,4	4,4	4,45	77	28,6	15,
Мартъ .	42	5/7	3/5	7/34	18/119	7/4	16/12	15/10	22/30	81	90	50	5,0	4,3	3,7	6,7	63	15,9	60,0
Апръль	56	7/5	4/4	4/8	26/55	5/0	11/9	18/26	14/31	66	74	12	4,3	5,5	3,0	9,9	70	38,8	52,
Май	66	13/10	7/0	7/3	17/25	6/5	3/0	22/17	15/33	42	34	18	3,7	3,3	2,5	15,7	89	36,8	83,
Іюнь	62	13/12	2/0	11/4	21/47	9/8	6/2	10/8	14/18	51	26	21	2,3	2,1	1,3	12,0	47	1,9	126,
Іюль	64	6/8	2/1	4/0	9/7	5/13	5/6	41/14	17/8	24	21	14	0,8	0,6	0,5	14,2	49	2,5	134,
Августъ	62	10/12	_	5/0	5/6	8/3	3/0	43/29	14/42	13	64	20	0,8	0,5	0,6	9,8	48	0	103,
Сентябрь	63	10/5	-	8/1	10/9	2/0	5/5	30/13	23/12	9	31	11	4,0	3,5	1,3	7,5	56	16,3	57,
Октябрь .	52	3/1	6/3	_	25/313	1/0	_	24/18	33/41	133	143	101	5,5	4,0	4,3	5,2	61	39,0	73,
Ноябрь	54	2/1	-	-	20/246	-	15/5	26/26	14/12	94	94	102	7,6	6,3	5,6	4,7	85	49,0	16,
Декабрь	39	12/12	3/0	2/3	41/463	1/0	4/6	15/9	13/21	182	198	134	6,0	5,0	4,0	3,95	78	16,8	23,
Среднія годо- выя за 1907 г.	653	84/76	27/13	52/56	263/1640	51/45	96/47	288/247	200/236	7,2/2,4	8,2/2,7	5,1/1,7	4,4	3,73	3,01	7,95	62,7	300,1	774,:
Среднія за 5 лѣтъ Среднія за	317	120	40	63	222	39	67	189	196	2,1	2,2	1,9	3,08	2,4	2,5	6,3	60,5	267,0	
1906 годъ	666	143	39	20	254	43	54	216	325	1,8	2,0	1,8	3,3	3,0	2,8	5.4	59,0	239,0	275,

Avjourant Avionanti		grift at		Ч	ис	о т	д н	е й.			Мор	озъ.
М всяцъ.	Ясныхъ.	Пасмур-	Съ осад-	Съ дожд.	Со сић-	Съ гра-	Heen u, poca ⇔, Tymans	Съ моро-	Съ силь- нымъвъ- тромъ.	Съ гро-	Послъд- пій вес- пой.	Первый осенью.
Январь	5	11	6	4	5		≡5 u1	26	2	- 1		-
Февраль	9	10	. 9	8	1	1	8	14	1	`√1	-	_
Мартъ	14	7	2	2	- 0100 1 <del>-</del> 0	-star	ш6 ≡1 4	3	2	<b>√</b> 3	14/III	a eggl
Апръль	8	4	6	6	-	-	= 16 = 1	_	1	`∡7	-	_
Май	10	2	2	2	1 1000	1	<b>-</b> 16	-	-	7	-	_
Іюнь	21	2	1	1	-	-	- 11	-	-	√8	-	_
Іюль	28	-	1	1	200	-	- 16	-	-	∖1	-	_
Августь	27	-	-	-	-	_	- 16	-	-	-	-	-
Сентябрь	10	2	4	4		-	- 17	_	-	-	_	_
Октябрь	9	8	3	15.81	2	<del>-</del> 1	□3 □8 □1 □1	14	8	_		2/X
Ноябрь	5	14	5	_	6	<b>o</b> 2	ш7 ≡3	17	4	_	′	
Декабрь	8	8	4	1	3	_	7	-21	11	- I	_	
Среднія годовыя за 1907 г	154	68	43	23	17	% 1 1 ♣ 2 ♣	■ 41 ■ 10 ■ 64	96	30	>27	14/ĬII	2/X
Среднія за 5 лѣтъ	205	40	50	24	12	1,2	64	101	20	36	19/III	18/IX
Среднія за 1906 годъ	204	52	40	27	11	_	70	99	32	90	5/IV	1/X

Поназанія почвенныхъ термометровъ въ Голодной степи (поставлены съ ноября 1907 года) 1).

		кновен мперат		Максимумъ.			пый мъ.	Ми	ниму	м ъ.	ный Б.		а глуби 10 сант			25 сая	ĸ.
М всяцъ.	7 ч.	1 4.	9 ч.	7 ч.	1 ч.	9 ч.	Абсолютный максимумъ.	7 ч.	1 ч.	9 ч.	Абсолютны минимумъ.	7 ч.	1 ч.	9 ч.	7 ч.	1 ч.	9 4
Ноябрь	+1,53	7,31	+2,58	2,91	7,8	7,3	+ 16,5	+ 0,86	+ 7,6	+ 2,1	-4,5	2,4	4,9	3,2	4,7	4,9	4,
Декабрь	-1,9	4,7	+ 0,1	1,3	6,7	6,0	12,5	1,5	+5,7	0,4	- 7,5	0,4	2,8	1,26	2,5	2,8	2,

	_ (	50 саж.		100 саж.			Днейсъ									
М всицъ.	7 ч.	1 ч.	9 ч.	7 ч.	1 ч.	9 ч.	Ясныхъ.	Пасмур-	Осадка- ми.	Сивгъ.	Дождь.	Градъ.	0/	Морозъ.	×	Горячій вѣтеръ.
Ноябрь	7,3	7,4	7,3	1,6	11,6	11,6	5	14	5	6	_	1	11	17	4	_
Декабрь	5,07	5,06	5,02	8,6	8,6	8,5	8	8	4	3	1	193 <u>13</u> 1932	7	21	11	sured.

<sup>1)</sup> Наблюденія производились зав'ядывающимъ опытнымъ полемъ М. Бушуевымъ.

## Климатическія условія по временамъ года.

		180,01	roer	ngose	H. 40 k	3	a,	19	0 7	г о	Д	1.00	a. Rimpiche	orl.	15 6 80	
Sircery Course	p.5.	- Commence	Темпе	ратура	. grandari			Наг	равл	еніе	и сил	а в ѣ т	pa.		вѣтра.	TE.
Времена года.	Барометръ	Средн. сухой термом.	Средн. смочен. термом.	Макси- мумъ.	Мини-	Тихо.	N	NE	Е	SE	S	sw	w	NW	Свла вѣт	Облачность
Зима	741,8	+0,08	- 0,8	+ 18,0	- 22,5	44	5/5,3	1/0	2/2	88 331   37/270 91	2/4	10/27	20/29	11/18	111,0	5,2
Весна	739,9	+16,4	13,9	36,0	- 3,5	54,6	8,3/7,3	4,6/3	6/15	50   20,3/66 94	6/3	10/7	18,3/18	18/31	$\frac{54,1}{(1,8)}$	3,8
Лъто	735,8	26,0	18,9	41,5	4,0	63	9,6/15,6	1,3/0,3	18,6/1,3	87   12/20   44	7/8	4,6,2,6	3/16	15/23	28,0 (0,9)	0,1
Осепь	745,1	+18,9	+ 6,2	34,5	— 13,5	56,3	5/2,3	2/1		255  18,3/189	1/0	6,6/3,3	26,6/19	23/22	78,0	4,6

				3	a	1 9	0 7	Г	0	Д Ъ.				
All almost	Влажно	сть.		in H		1.3		Ч	исло	дней				
Времена года.	Абсолюти,	Относител.	Осадки.	Испаревіе.	Ясныхъ.	Пасмурныхъ.	Съ осадками.	Сиѣгомъ —	Дождемъ —	Градомъ —	Инеемъ — и росой —	Морозомъ.	Сильнимъ Вфтромъ.	Грозой —
Зима	3,2	.62	41.0	13,6	7,3	9,6	6,3	3	4,3	0,3	7	13,3	4,6	0,3
Весна	10,8	74	27,2	68,4	10,6	4,3	3,6	-	3,3	0,3	14,6	1	1	6
Лъто	12,0	48	1,4	121,4	25,3	0,6	0,6	_	-	-	14,3	_	-	3
Осень	5,8	67	34,4	49,1	8	8	4,3	2,6	10214 <u>-</u> 619	1	12,3	13	10,3	4

				C p	е д	н і	я	з а	5 л	ъ т	г ъ.		
Времена			Тем	пература.				Напр	равленіе и	сила вѣ	тра.		75 k
года.	Баром. давлен.	Средн. сух. терм.	Ср. см. терм.	Максимумъ.	Минимужъ.	N	NE	Е	SE	S	SW	W	NW
Зима	742,0	0,7	_	+13,2	-16.5	5/9	2	7/3	33,16	2/9	6,5	13,5	12,1
Весна	739,9	15,9	-	31,0	+ 1,7	15/3	5,4	7/1	15,6	3,7	6,1	19,2	16,5
Лъто	735,0	28,6	_	41,0	10,7	19/8	6,6	2,7	11,4	3,4	6,2	16	20,9
Осень.,	710,7	12,3	÷	28,9	-3,06	7,1	0,9	4,6	19	4,4	4,5	23,2	14,6

			c	p e	д н	і я	3	a	5	л В	т ъ.	Sp. pr. No	A A	
Времена года.			Влая	кность.		1000		Ţ	и с	л о	дн	е й.	100	
	Сила вѣтра.	Облачность.	Абсолютно.	Относител.	Осадки.	Испареніе.	Ясныхъ.	Пасмурныхъ.	Осадками.	Снѣгомъ —	Дождемъ —	Градомъ —	Морозъ.	Сит вытом
Зима	3,18	3,7	4,3	84,1	24,6	16	13,6	. 6	5/5	2,9		_		-
Весна	1,8	3,1	7,4	56,0	33,4	65	15	3,3	6,6	1,8	-	_	-	-
Лъто	1,5	0,9	10,9	45,5	20	132	26	0,16	0,9	0	-	-	-	-
Осеиь	1,7	2,7	5,8	56,0	14,8	66	17,4	3,8	2,8	0,3		-	_	-

11

# Метеорологическія условія по періодамъ роста озимыхъ, пропашныхъ, хлопчатника и бобовыхъ растеній въ 1907 году.

	Названіе растеній.	Періодъ роста.	Дней въ пе- ріодѣ.	Количество осадковъ.	Сумма испареній.	Облачность.	Число яс- ныхъ дней.	Число без- морз. дней.	Cymma rem- nepar. Bos- Ayxa.	Примъчаніє
		A. Отъ посъва до всходовъ.								
1	Озимая пше-	7 октября по 20 окт	14	0	15,7	2,2	13	6	128,0	
2	Кукуруза	5 мая по 12 мая	8	18,0	20,4	5,9	2	8	172,8	
3	Свекловицы .	11 апръля по 18 апр.	8	38,8	25,4	7,9	1	8	135,2	
4	Хлопчатникъ.	15 » » 22 » .	8	26,3	8,8	8,1	0	8	126,4	
5	Бобовое (машъ)	20 мая по 26 мая	7	0	16,7	1,1	6	7	160,3	
6	Люцерна	5 марта по 16 марта.	12	0	12,8	3,8		10	104,4	
1	Озимая пше-	<b>Б</b> . Отъ всходовъ до колошенія или цвътенія.								
	ница	20 октября по 1 мая	194	219,8	192,8	6,2	1 3/2		1.312,8	
2	Кукуруза	12 мая по 2 іюля .	52	1,9	187,5	2,5		52	1.319,6	
3	Свекловица	• mesma • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, ))	"	n	))	))	))	))	
4	Хлопчатникъ.	22 апръля по 29 іюня .	69	38,8	225,8	3,2	40	69	1.556,9	
5	Бобовое (машъ)	26 мая по 15 іюля	51	1,9	219,0	1,3	41	51	1.395,9	
6	Люцерна	16 марта по 10 мая	56	86,4	122,5	4,7	18	56	. 856,8	
	,	16 » » 25 » .	71	86,4	160,2	5,6	25	71	1.297,3	
		в. Отъ цвътенія до созръванія.						ir tin	zebu	
1	Озимая пше-	1 мая по 1 іюня	32	36,8	86,3	3,2	14	32	649,4	
2	Кукуруза	2 іюля по 15 августа.	45	2,5	186,0	2,7	11 1	45	1.212,0	
3	Свекловица.	2 hours no 15 abiyeta.	»	»	) )	-,·	))	- ))	»	
4	Хлопчатникъ.	29 іюня по 1 сентября.	64	2,5	249,8	0,6	1.17	64	E REGISTER	
	»	29 іюня по 15 октября.	108	18,8	219,6	1,7	attended to the	101	2.082,3	
5	Бобовое	15 іюля по 20 августа	37	2,5	136,0	0,7		37	888,0	
6			»	_,o	»	))	))	))	))	
1	Озимая пше-	Г. За весь вегетаціон- ный періодъ: отъ по- съва до съвооборота.								
	ница	7 октября по 1 іюня	240	256,6	294,8	6,1	99	189	2.107,2	
2	Кукуруза	5 мая по 15 августа .	105	22,4	393,9	4,5	77	105	2.704,4	

	Названіе растеній.	Періодъ роста.		Количество осадковъ.	Сумма испареній.	Облачность.	Число яс- ныхъ дней.	Число без-	Сумма тем- перат. воз- духа.	Примѣчаніе
		good erler spaler. Lylica			10000		0,1	19,140	.000	(888)
3	Свекловицы .	11 апр. по 10 сентября.	147	71,1	512,4	1000	101	+	11.77	
1	Хлопчатникъ.	15 апр. по 1 сентября	141	67,6	484,2	2,5	98	141	3.182,9	DA 2018
	"	15 » по 15 октября	185	83,9	554	3,1	115	178	3.755,6	STATE OF
)	Бобовое (машъ)	20 мая по 20 августа.	95	4.4	371,7	2,1	80	95	2.444,2	3366
;	Люцерна	5 марта по 10 мая.	68	86,4	135,3	5,9	24	66	961,2	0.151
	» .	5 » » 25 ».	83	86,4	173,0	6,9	31	81	1.401,7	DESERTE -
	» .	5 » » 5 августа.	155	90,8	472,2	4,6	89	155	3.300,4	uages
	Озимая пшеница	Вегетаціонный періодъза вычетомъ зимнихъ мъсяцевъ: (отъ 20 ноября 1906 г. по 15 февраля 1907 г.)		75,7	131,5	5,5	54		1.147,2	
	I b we Action	вія за весь вегетаціо	нны	и пер	лодъ	pac	тені	и ві	5 1900	году.
- 1				4.7	1					
	Озимая пше-	7 октября по 1 іюня	152	204,6	»	6,4	95	64	2.104,7	за вычетом
		7 октября по 1 іюня 5 мая по 15 августа .		204,6 42,9	» »	6,4 1,5	95 80	64 105	2.104,7 2.408,8	зимнихъ му
	ница		105			,				
	ница Кукуруза	5 мая по 15 августа.	105	42,9	n	1,5	80	105	2.408,8	зимнихъ м
	ница Кукуруза Свекловица .	5 мая по 15 августа. 11 апр. по 10 сентября.	105 147	42,9 49,2	n n	1,5 1,8	80 118	105 147	2.408,8 3.602,6	зимнихъ м

Среднее барометрическое давленіе въ 1907 году (740,5 мм.) было выше прошлогодняго, что указываеть на усиленный притокъ колоднаго воздуха къ области Туркестанскаго антициклоническаго кольца съ высокимъ давленіемъ, слѣдствіемъ чего явилось обычное при высокомъ давленіи пониженіе  $t^0$  воздуха со всѣми сопутствующими ему явленіями: значительной облачностью, увеличеннымъ количествомъ осадковъ и проч.

Средняя годовая  $t^0$  равнялась + 12,87 $^0$ С и была ниже нормальной годовой (+14,0С) на 1,18 $^0$ С.

Осадковъ за годъ выпало 300,1 м.м., т. е. на 33 м.м. больше средняго годового ихъ количества въ Голодной степи; испареніе (774,3 м.м.) было меньше обычнаго на 6,77 м.м.; влажность же воздуха была поповышена: абсолютная (7,95 м.м.) на 1,65 м.м. и относительная на 2,2%

(по сравненію съ нормальной); облачность (3,77) выше нормальной на 1,05 (или на 10,5%).—Вътры дули въ 1907 году чаще обычнаго, повторяемость ихъ—въ суммъ 1.066 противъ 931 за 5 лътъ), при чемъ средняя сила вътровъ равнялась 1,7 метр. въ секунду (на 0,4 метра менъе нормальной). Наиболъе частый вътеръ отчетнаго года—западный (288) съ силой 0,85 метр. въ секунду, далъе юго-восточный (263), дувшій съ силой 6,2 метра;—между тъмъ, за предыдущія 5 лътъ самымъ частымъ вътромъ былъ юго-восточный (222), а за нимъ слъдоваль съверо-западный, уже на третьемъ мъсть—западный.

Число дней съ осадками было почти нормальнымъ (43), но такъ какъ всего осадковъ за 1907 годъ выпало 300 м.м. (нормально выпадало 267 м.м.), то въ каждомъ отдъльномъ случаъ выпадало осадковъ гораздо больше нормальнаго (7,0 противъ 6,2 м.м.).

Ясныхъ дней было на 51 день меньше нормальнаго (205); пасмурныхъ же—на 18 дней больше. —Между прочимъ, дней съ инеемъ, туманомъ и росой было почти вдвое больше нормальнаго. Послъдній весенній морозъ (14 марта) наблюдался почти на недълю ранъе обычнаго, а первый осенній (2-го октября) морозъ на ½ мъсяца раньше нормальнаго, погубивъ урожай хлопчатника.

Что касается температуры почвы, то въ ноябръ и декабръ 1907 года была:

1) на поверхности почвы въ ноябръ 4,0С., а въ декабръ 1,26 ( при средней t воздуха въ 10 сантиметровъ+ 3,5 +1,452) » глубинъ ноябрѣ — +2,725 +4,53) " 2,30С въ де-4) » 7,3 )) 50 5,05 кабрѣ 5) » 100 11,6

Вообще температура почвы болъе всего колебалась на поверхности и на глубинъ 10 сантиметровъ; на большихъ же глубинахъ колебаніе меньше и, начиная съ 25 сантиметровъ, t<sup>0</sup> ни разу не опускалась ниже—0,4С (даже въ январъ и февралъ), такъ что на глубинъ 4—5-вершковаго слоя почва здъсь уже не промерзаетъ. На глубинъ 100 сантиметровъ колебанія t<sup>0</sup> наблюдаются въ весьма узкихъ предълахъ.

Зима была холоднъе обычнаго почти на 1,0°С; средняя t° зимы 1906/7 г.—0,08°), при чемъ наиболъе низкая t° наблюдалась 14 января (—22,5°С), —высшая (—18°С) 13 февраля. Осадковъ за зиму выпало немного менъе половины годового количества ихъ (123 м.м.) и почти на 48 мм. больше нормальнаго ихъ количества за прежніе зимы; испареніе незначительное (13,6 мм.). Облачность (5,2) выше средней на 1,5. Число ясныхъ дней (22) почти въ два раза меньше нормальнаго, число же пасмурныхъ (29) вдвое больше обычнаго. Зимой дули наиболъе сильные вътры (со средней скоростью 3,7 метра въ секунду и самымъ частымъ и сильнымъ вътромъ былъ SE, дувшій зимой 111 разъ со

средней скоростью 7 метровъ въ секунду. Барометрическое давленіе было н'всколько ниже зимою (741,5), нежели осенью, когда оно достигало годового maximum'a—745,1 мм.

Весна 1907 года была теплъе нормальной на  $0.5^{\circ}\mathrm{C}$  со средней t въ  $16.4^{\circ}\mathrm{C}$ .

Количество осадковъ было весной нѣсколько меньше средняго, котя достигало почти <sup>1</sup>/<sub>3</sub> количества осадковъ за 1907 годъ; самымъ дождливымъ мѣсяцемъ былъ а пр ѣ лъ, много осадковъ выпало и въ маѣ, въ мартѣ же всего меньше; эти то апрѣльскіе и майскіе дожди не только помѣшали произвести ранній посѣвъ хлопчатника, но еще, прибивая молодые всходы его и препятствуя росту ихъ вслѣдствіе образовавшейся почвенной корки, заставляли многихъ по два—по три раза пересѣвать хлопчатникъ. Облачность была выше (3,8) средней на 0,7. Ясныхъ дней (32) меньше нормальнаго на 13 дней; пасмурныхъ больше средняго на 3. Преобладающимъ вѣтромъ былъ ЅЕ, тогда какъ обычно весной чаще дулъ W и NW.—Слѣдуетъ отмѣтить, что дѣйствію горячаго NW вѣтра здѣсь приписываютъ захватъ озимыхъ хлѣбовъ въ стадіи молочной спѣлости, вслѣдствіе чего урожай ихъ въ Голодной степи получился незначительный и зерно оказалось щуплымъ. Барометрическое давленіе весной было равно 739,9 м.м.

Лѣто 1907 года было значительно холоднѣе нормальнаго, облачнѣе, съ меньшимъ числомъ ясныхъ дней и съ большимъ пасмурныхъ. Средняя температура лѣта была + 26,0° С, то есть на 2,6° С ниже нормальной, причемъ minimum достигалъ въ августѣ + 4,0° С, тогда какъ нормально онъ ниже 8,4° С не опускался. Количество осадковъ было почти нормальное (4,4 мм.), за то дней съ инеемъ, росою и туманомъ (43) было почти вдвое больше нормальнаго. Испареніе было уменьшено (121,4 мм.). Число ясныхъ дней было около 76, нормально же 79; пасмурныхъ дней было почти въ четыре раза больше нормальнаго. Абсолютная влажность (12) была выше нормальной (10,9 мм.), относительная тоже (48%). Барометрическое давленіе лѣтомъ было самое низкое—735,3 мм., особенно въ іюлѣ. Преобладающимъ вѣтромъ былъ западный, но онъ дулъ со слабой скоростью (0,48 метра въ секунду), затѣмъ съ еще болѣе слабой скоростью дулъ частью восточный вѣтеръ, рѣже, но съ большой силой дулъ юго-восточный.

Осень 1907 года отличалась необыкновенно низкой t<sup>0</sup> воздуха (+ 8,9°), — почти на 3,5° С ниже нормальной, при чемъ minimum t<sup>0</sup> достигаль въ первыхъ числахъ октября — 5,0°С, а въ среднихъ — ноября—13,5° С, тогда какъ нормально даже въ ноябрѣ minimum не опускался ниже—7,5° С.—Еще больше осень настоящаго года отличалась отъ нормальной по количеетву осадковъ, которыхъ выпало (103,2) почти въ два съ половиной раза больше обычнаго; особенно обильные дожди были въ октябрѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ, когда надо было убирать хлопокъ, а потому большая часть его подмоченнаго и подмороженнаго,

оказалась плохого качества — съ желтизной, слабаго на разрывъ и отошла во вторые и третьи сорта. Облачность также была почти въ два раза больше средней (4,7). Число ясныхъ дней (24) было меньше нормальнаго въ два съ четвертью раза; пасмурныхъ же дней (24) было почти въ три раза больше обычнаго. Если еще добавить, что очень 1907 года была не только холодная, сырая и пасмурная, но и вътряная и морозная, то станеть очевиднымъ, что при такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ во весь вегетаціонный періодъ «дитя солнца»— хлопокъ не могъ дать хотя бы сноснаго урожая, и было ясно, что хлопковая кампанія въ этомъ году не удалась, а для хлопководовъ настали тяжелые дни.

Чтобы установить связь метеорологическихъ условій съ развитіємъ полевыхъ культуръ, приводимъ эти условія по періодамъ роста главнѣйшихъ нашихъ растеній. (См. особую таблицу № 4-ый).

Въ частности, сумма температуръ за весь 1907 годъ была = 4533°, то-есть меньше нормальной на 577,0, а по временамъ года она колебалась такъ:

Время и годъ.	Весна.	.Ifro.	Осень.	Зима.	За весь годъ.	
mor O -0.4 ároyran ag ara	24(139E)	mumin	im aug	PROT A		
Средняя за 5 лътъ.	11590	2631°	1119°	75,00	51100	
" " 1907 годъ	14760	2340°	801,0°	7,20	45330	

Какъ видно изъ сопоставленія этихъ данныхъ за лѣто и осень сумма средней температуры въ 1907 году была меньше нормальной на 609°, а за зиму на 67,8, и этотъ лѣтне-осенній недочетъ въ суммѣ тепла не могъ скомпенсироваться, напримѣръ, для хлопчатника, повышенной температурой весны, потому что тогда хлопчатникъ или еще не былъ посѣянъ (изъ-за дождей), или прибитый дождями, едва всходилъ, или даже перепахивался для новаго посѣва.

Тотъ же хлопчатникъ, какъ видно изъ таблицы № 1, по сравненію съ 1906 годомъ, за весь вегетаціонный періодъ 1907 года получилъ только 3755° тепла (сумма температуръ), т. е. на 563° меньше, чъмъ въ 1906 году; особенно это уменьшеніе касается лѣтне-осенняго періода вегетаціи, когда хлопчатникъ не дополучилъ, сравнительно съ 1906 годомъ около 400° тепла. Что касается другихъ культуръ, то свекловица также получила на 223° меньше тепла за весь вегетаціон-



Рис. 1. Опытное поле "Голодная степь" зимой.



Рис. 2. Взметъ поля осенью подъ хлопчатникъ.



Рис. 3. Показательное крестьянское хозяйство въ "Голодной степи".

ный періодъ, люцерна— на 872° и машъ—на 690°; пшеница же получила одинаковое количество тепла, а кукуруза—больше на 300°.

По числу ясныхъ дней культуры получили въ 1907 году:

хлопчатникъ на 35 дней меньше, чъмъ въ 1906 году,

кукуруза	"	3	дня	"	"	,
свекловица	,,	17	дней	"	"	, ,,
люцерна	,,	17	,,	"	"	"
пшеница	"	14	,,	"	"	,,

Безморозный періодъ въ 1907 тоду быль:

для хлопчатника 178 дней, а въ 1906 году 182 дня.

17	свекловицы	153	дня .	"	"	"	147	,,	
"	кукурузы	105	дней	"	"	"	105	"	
"	ишеницы	89	"	"	"	"	64	"	
			(за вы	четом	ъ зи	мних	ъ мъ	сяцев	ь).

#### Облачность въ вегетаціонный періодъ:

для	хлопчатника	ВЪ	1907	году 2,8,	а въ	1906	Γ.	1,7
"	свекловицы		,,	2,6		,,,		1,8
"	кукурузы		"	4,5		"		1,5
"	пшеницы		,,	5,5		27		6,4
"	люцерны		,,			,,		

Къ числу неблагопріятныхъ факторовъ для полеводства въ 1907 г. надо отнести также нѣкоторыхъ вредныхъ насѣкомыхъ, животныхъ (воробьи, скворцы) и грибныя болѣзни, нападенію которыхъ подвергались хлопчатникъ, кукуруза, люцерна, озимыя, овесъ, плодовыя деревья и кунжутъ. Первымъ съ открытіемъ весны былъ отмѣченъ люцерновый долгоносикъ (Hipera densminanda) на люцернѣ, объѣдавшійлистья, цвѣточныя почки и цвѣты люцерны до перваго укоса (9-го апрѣля); поэтому первый укосъ, главнымъ образомъ старый люцернъ (1902—4 года), былъ почти весь попорченъ, изрѣшеченъ этимъ слоникомъ; мѣры въ видѣ оприскиванія растворомъ хлористаго барія (1½%) и парижской зелени (0,1%) особаго эффекта не произвели, такъ какъ примѣнялись поздно.

Затьмъ на яблоняхъ, грушахъ, персикахъ въ концъ апръля замъчена курчавость листьевъ вслъдствіе нападенія листовыхъ тлей (Aphis mali и др.) и ржавчина на листьяхъ абрикоса; противъ тлей примънялся настой табака со смъсью керосина съ мыломъ, а противъ ржавчины — опрыскиваніе изъ Верморелевскаго аппарата бордосской жидкостью.

Еще болъ вреда и хлопотъ надълала летная саранча появившаяся съ съверо-запада изъ степи 4 іюня на границъ крестьянскихъ посъвовъ, а 18 іюня на крайнемъ съверномъ полъ нашего Стебутовскаго съвооборота, гдъ довольно основательно повредила овесъ, яровой ячмень и свекловицу; затъмъ она обошла почти всю юго-восточную часть опытнаго поля и съ 18 по 25 іюня повредила довольно много хлопчатника сорта King's и другихъ въ 8-ми польномъ съвооборотъ. Немного пшеницы и ячменя было поражено ржавчиной и еще больше - головней, при чемъ особенно сильно быль пораженъ Шатиловскій овесъ. Въ началъ іюня появились на капустъ гусеницы капустницы (Pieris brassicae) и послъ опрыскиванія см'єсью керосина съ мыломъ он'є пропали, но потомъ опять нъсколько разъ появлялись новыя покольнія ихъ. Около 15 іюля замъчено массовое опаденіе завязей хлопчатника, продолжавшееся до осени, вызванное пораженіемъ ихъ гусеницей яровой совки (Heliothis armigera), нападавшей тогда же на початки кукурузы, при чемъ больше всего поражались ею початки (въ 20-хъ числахъ августа) «конскаго зуба» и «кутаисскаго гибрида». Между прочимъ, слъдуетъ отмътить, что практиковавшійся здёсь обычай отдълять одинъ сорть хлопчатника отъ другого рядами кукурузы, если только не слъдить за этими рядами и не уничтожать во-время появившихся на кукурузъ гусеницъ совки, очень легко приводитъ къ появленію гусеницы на сосъднемъ хлопчатникъ, такъ какъ первая генерація совки именно обитаетъ сначала на рано созрѣвающей кукурузѣ, откуда уже распространяется и на хлончатникъ; такимъ образомъ, кукуруза, на ряду съ сорной растительностью, можеть явиться распространителемъ совки. Поэтому въ тъхъ случаяхъ, когда кукурузой нельзя воспользоваться для уничтоженія гусеницъ совки, какъ ловчимъ растеніемъ (опрыскивая инсектисидомъ пораженные ряды кукурузы), лучше всего избъгать посъвовъ рядомъ съ хлопчатникомъ кукурузы, замъняя ее для изоляціи сортовъ хлопчатника хотя бы джугарой или гаоляномъ, который очень хорошо удается въ Голодной степи. Интересно отмътить, что, по словамъ члена хлопковой комиссіи Варзара, бывшаго здёсь лётомъ, въ Закаспійской области одинъ плантаторъ-хлопководъ наблюдаль любопытное явленіе, какъ осы массами собирали съ хлопчатника гусеницъ совки и стаскивали ихъ въ свои гнъзда; хлопководъ этотъ 1), основываясь на этомъ наблюденіи, думаеть даже разводить осъ, съ цълью освобожденія хлопковыхъ плантацій отъ такого бича, какъ гусеница яровой совки. Последнимъ опаснымъ врагомъ полеводства былъ грибокъ Neocosmospora vasinfecta, вызывающій бользнь «ракъ» шейки корня у кунжута и бухарскаго хлопчатника; слъдствіемъ такого заболъванія, наблюдавшагося на многихъ посъвахъ кунжута въ Голодной степи, является быстрое увяданіе, а затімъ и гибель растенія еще до цв'ьтенія или во время цв'ьтенія; къ счастью, пока поражается въ Туркестанъ, видимо, одинъ лишь бухарскій сорть,

<sup>1)</sup> Г. Арржъ въ Тедженъ.

почти не высѣваемый, и потому опасаться за сорта упланда пока нѣть основанія. Изъ животныхъ много вреда принесли на огородѣ черепахи, а въ полѣ и саду воробьи и скворцы, особенно первые,— ими «выпивалось» иногда до ½ зерна пшеницы, проса и проч. (между прочимъ, голый гималайскій ячмень ими почти не былъ тронутъ), скворцы сильно нападали на вишни, частью сливы, уничтожили первый урожай винограда «Мальбекъ». Въ амбарѣ на зерно пшеницы напалъ амбарный долгопосикъ противъ него боролись окуриваніемъ сѣроуглеродомъ.

#### II. Полеводство.

Въ отчетномъ году, какъ сказано выше, полевой участокъ введенными съвооборотами былъ разбить на нъсколько клиньевъ:

І. — Клинъ со Стебутовскимъ сѣвооборотомъ въ 4 десятины (по сѣверной границѣ опытнаго поля): 1) паръ (черный удобренный, черный неудобренный и паръ съ зеленымъ удобреніемъ); 2) озимое—бѣлая и красная мѣстная пшеница; 3) свекловица эккендорфская желтая, оберндорфская и сахарная (Вильморена и Клейнванцлебена); 4) яровое—овесъ (Шатиловскій, Шведскій, Австралійскій) и ячмень (швалье голый).

П.—Основной съвооборотъ, шестипольный, въ 6 десятинъ (къ юго-западу отъ перваго): 1) озимое (бълая и красная пшеница по люцернику); 2) хлопчатникъ (опыты съ количествомъ оросительной воды); 3) кукуруза (сорта: чинквантино, бессарабская, кутаисскій гибридъ и конскій зубъ); 4) хлопчатникъ (сравненіе сортовъ упланда); 5) бобовое (машъ и соя); 6) люцерна (съ покровнымъ растеніемъ и безъ него).

III.—Клинъ съ 2-хъ польнымъ сѣвооборотомъ въ 4 десятины: 1) хлопчатникъ 2 десятины и 2) разныя культуры: кукуруза, просо, хлопчатникъ, паръ, машъ на зерно, зеленое удобреніе (машъ), кунжутъ, джугара, свекла, озимое—всего на 2-хъ десятинахъ.

IV.—Андижанское пятиполье (съ 6-мъвыводнымъ полемъ люцерны) въ 5 десятинъ: 1) хлопчатникъ (опыты съ вліяніемъ качества сѣмянъ хлопчатника на урожай); 2) бобовое (машъ съ посѣвомъ разнаго количества сѣмянъ); 3) озимое (рядовой и разбросный посѣвъ); 4) хлопчатникъ (способы посѣва хлопчатника); 5) пропашныя (кукуруза, свекла, джугара).

V.—Трехпольный сѣвооборотъ въ 3 десятины: 1) хлопчатникъ (опыты съ вліяніемъ различныхъ удобреній); 2) озимое (пшеница); 3) яровое (овесъ—сравненіе сортовъ и сравненіе рядового и разброснаго посѣва).

VI.—Восьмипольный съвообороть на 18 десятинахъ: 1) хлопчатникъ; 2) озимое; 3) яровое (овесъ и ячмень) — люцерна; 4) люцерна;

5) хлопчатникъ; 6) хлопчатникъ + удобреніе; 7) пропашное (кукуруза, свекла, картофель); 8) машъ на зерно. Но послѣдній сѣвооборотъ не быль осуществленъ вполнѣ, такъ какъ въ немъ, во 1-хъ, отсутствовали оба поля люцерны и замѣнены одно озимой пшеницей, а другое яровыми (просомъ, кунжутомъ и пр.), во-2-хъ, одно изъ трехъ полей, отведенныхъ подъ хлопчатникъ, пришлось оставить подъ паромъ, вслѣдствіе чрезвычайной его засоренности (раньше все 8-полье было «во власти» арендаторовъ-издольщиковъ) и выпаханности, и въ-3-хъ, машъ (бобовое) не былъ посѣянъ на 8 полѣ, а замѣненъ другими яровыми, такъ какъ былъ перенесенъ на одно крайнее поле (внѣ сѣвооборотовъ) опытнаго поля, съ цѣлью (отчасти) очищенія этого поля при помощи маша отъ сорной растительности.

Кромѣ этого, въ "промышленномъ участкѣ" нѣсколько полей были заняты кукурузой, хлопчатникомъ и озимой пшеницей (всего площадью въ 5 дес.).

Наконець, въ С.-З. углу опытнаго участка выдѣленъ еще особый "о п ы т ны й участо къ" въ 1 десятину, на которомъ ставились, во 1-хъ, тѣ же опыты, что и на поляхъ сѣвооборотовъ, но въ малыхъ размѣрахъ—для контрольнаго учета, во-2-хъ, испытывались новыя культуры и, въ 3-хъ, дѣлались попытки полученія гибридизаціей новыхъ сортовъ хлопчатника—смѣшанныхъ.

Такимъ образомъ, площадь всёхъ посёвовъ въ полевомъ клинѣ въ 1907 году достигла 55 десятинъ; всего же подъ разными культурами, включая садъ, огородъ, виноградникъ и пр., въ 1907 году было 64½ десятины; остальныя 127½ десятинъ частью служили пастбищемъ для рогатаго скота опытнаго поля (60 дес. солонцоваго участка по каналу Николая І-го), частью содержались подъ паромъ (54 дес.), и, наконецъ, подъ усадьбой, неорошаемыми высокими мѣстами, дорогами, арыками и пр. (13 дес.).

Вся площадь земель опытнаго поля (192 дес.) распредѣлялась въ 1907 году слѣдующимъ образомъ:

А. Подъ полевыми культурами было:

- 1) подъ хлопчатникомъ 141/2 дес.
- 2) » свекловицей 21/4 дес.
- 3) » кукурузой 7½ дес.
- 4) » картофелемъ 1/4 дес.
- 5) » подсолнечникомъ  $\frac{1}{3}$  дес.
- 6) » разн. яровыми 2½ дес. (машъ, кунжутъ, просо, джугара, гречиха).
- 7) » оз. пшеницей 7 дес.
- » оз. ячменемъ 1 дес.
- 9) » яр. пшеницей 2 дес.
- 10) » яр. ячменемъ 1/3 дес.

- 11) подъ овсомъ  $2/_3$  дес.
- 12) » машемъ 2½ дес.
- 13) » люцерной 9 дес.
- 14) » новыми культурами 1½ дес. (тефъ, чумиза, соя);
- 15) » паромъ въ 8-польъ и 2-п.—2½ дес.

### Б. Подъ древесными посадками:

- 1) подъ старымъ плод. садомъ 2½ дес.;
- 2) » новымъ плод. садомъ 1 дес.
- 3) » молодымъ питомникомъ 2½ дес.
- 4) » плод. и древесн. питомникомъ 1 дес.
- 5) » виноградникомъ 1 дес.
- 6) » паркомъ 1 дес.
- 7) » огородомъ ½ дес.
- В. Подъ солонцовымъ пастбищемъ 60 дес.
- Г. Подъ паромъ 54 дес.
- Д. Подъ усадьбой, дорогами и проч. 13 дес.

Озимые поствы. Поствъ озимыхъ, начавшись 7 октября, послъ предварительной поливки, растянулся до 6 ноября 1906 года и происходилъ вначалъ при повышенной температуръ воздуха и отсутствіи осадковъ; однако, въ 20-хъ числахъ октября было значительное пониженіе температуры (до-9,0° С.) и сѣвъ можно было производить лишь послъ полудня, когда оттаивала почва. Вслъдствіе пониженной въ октябръ температуры, всходы озимыхъ тянулись слабо и къ концу осени подъ снъгъ попали со слабой куститостью и ростомъ. Со сходомъ снъга (въ 20-хъ числахъ февраля) развитіе озимыхъ пошло очень быстро, и черезъ какіе-нибудь двъ недъли теплой погоды поля были покрыты кустистыми, сочными, сразу поднявшимися на четверть злаками. Обиліе дождей и сравнительно высокая температура весною 1907 г. способствовала пышному и быстрому развитію озимой пшеницы и ячменя; благодаря этому, даже на солончаковыхъ плъшинахъ эти злаки достигли сравнительно большой густоты. Въ срединъ апръля пшеница колосилась, а къ концу этого мъсяца и въ началъ мая цвъла. Въ стадиціи молочной спълости пшеница была прихвачена раннимъ суховъемъ N и NW, бывшимъ здъсь 7 мая, и его дъйствію, въроятно, слъдуетъ приписать щуплость зерна, которой отличался почти весь урожай пшеницы настоящаго года въ Голодной степи; это, конечно, сильно понизило урожай пшеницы-зерна-при отличномъ развитіи стеблей.

Впрочемъ, пониженіе урожая зерна озимыхъ произошло, въроятно, еще и отъ ржавчины и головки, развитію которыхъ этой весною способствовала влажная погода.

Созрѣваніе озимаго ячменя (чернаго, караязскаго) наступило около 25 мая (полное); а озимой пшеницы (мѣстн. бѣлая и красная усатки—

изъ мягкихъ пшеницъ) около 1 іюня. Нѣсколько дней спустя, началась спѣшная уборка озимыхъ, потому что, съ одной стороны, угрожало нападеніе лётной саранчи, уже повреждавшей крайніе посъвы опытнаго поля, а съ другой-опустошенія производимыя изо дня въ день тучами воробьевъ, привлекаемыхъ опытнымъ полемъ, какъ культурнымъ оазисомъ въ районъ Голодной степи. Общіе выводы объ урожай озимыхъ въ 1907 году таковы: урожай получился средній и даже ниже средняго, озимые вышли главнымъ образомъ въ солому, и процентное отношеніе зерна къ солом' было очень низкое. Особенно слабый урожай получился на дёлянкахъ съ двумя поливками весной и гораздо лучшій-на получившихъ одно орошеніе: очевидно, выпадавшей въ видъ атмосферныхъ осадковъ влаги было вполнъ достаточно для полнаго развитія и созръванія озимыхъ. Въ самомъ дъль, если за весь вегетаціонный періодъ озимыхъ (7 октября—1 іюня) выпало атмосферныхъ осадковъ, исключая зимніе (такъ сказать, непосредственно неиспользуемые) 112,5 мм., т. е. около 134 куб. саж., то этого количества влаги достаточно для образованія сухого вещества урожая (зерна и соломы) въ 168 пудовъ или около 80 пудовъ одного зерна, принимая по Вольни, что для образованія одного пуда сух. вещества пшеницы необходимо около 500 пуд. воды; поэтому одна поливка, данная нами озимыхъ въ стадіи колошенія, могла быть еще отчасти полезной, покрывая траты на испареніе, фильтрацію и проч., но вторая уже была, очевидно, излишней и даже вредной, вызывая вытягиваніе стебля на счеть колоса и удлиняя періодъ созръванія зерна и тъмъ открывая его вредному дъйствію раннихъ майскихъ суховъевъ; кромъ того, обиліе влаги вызвало здъсь обильное развитіе сорныхъ травъ, ржавчины и головни. Въ общемъ на солонцеватыхъ земляхъ получено съ десятины 26 пудовъ пшеницы, на старопахатныхъ сорныхъ земляхъ (около солончаковъ) 30 пуд. пшеницы и 52 пуда ячменя; на среднихъ земляхъ (Стебутовскій съвообороть, сорное поле) 42 пуда пшеницы и на лучшей почвъ (по люцернику) 65 пудовъ (масса щуплаго зерна при необыкновенно пышномъ ростъ стебля). Невысокій урожай пшеницы по распаханному люцернику можно объяснить тъмъ, что пшеница на этомъ полъ, получившемъ двъ весеннія поливки, вслъдствіе буйнаго роста и густоты частью полегла, частью была еще болье другихъ "прихвачена" суховъемъ и ржавчиной. Интересно отмътить, что по опытамъ съ задълкой съмянъ разными орудіями лучшіе результаты получились при заділкі сімянь пшеницы сартовской бороной (сначала зубьями, а потомъ 2-3 раза гладкой стороной доски) и хуже всего-пятилапчатымъ культиваторомъ Раnet'омъ.

На десятину перевъсъ въ пользу сартовской бороньбы (по сравненію съ задълкой Planet'омъ и желъзной бороной) получился въ 45 пуд. противъ Planet'а и въ 37 пуд. противъ желъзн. бороны; ко-

нечно, этотъ единичный опытъ могъ фиксировать случайный фактъ, но все же, по мивнію завъдывающаго полемъ, ръзкую разницу въ урожав здъсь надо объяснить именно свойствомъ указанныхъ орудій задълывать съмена на различную глубину.

Очевидно при задълкъ легкой сартовской бороной (съ маленькими зубьями-ножами) съмена пшеницы задълывались мелко (сант. на 2-3) и послъ поверхность почвы на нихъ приглаживалась доской бороны, - этимъ создавались оптимальныя условія для проростанія съмянь: 1) достаточный доступь воздуха, 2) притокъ влаги изъ нижнихъ слоевъ почвы-(сглаживаніе уплотняло почву и усиливало капилярное движеніе воды) и 3) нагръваніе почвы; помимо того, прикатываніе почвы до всходовъ было полезно еще и въ смыслѣ ускоренія осадки почвы посл' пахоты, которая зд'єсь производится по многимъ причинамъ передъ самымъ посъвомъ-безъ обычной для двойки выдержки предъ поствомъ въ 2-3 недъли, такъ какъ такимъ путемъ предупреждается возможность обнаженія корней озимого растенія (и узла кущенія) и вреднаго дъйствія на нихъжары и мороза. Дъйствительно, только при такомъ позднемъ посъвъ (15 октября) пшеницы необходимо было, чтобы растенія взошли быстро, энергично, дружно, а ростки, поднявшись до поверхности почвы, дали изъ узла кущенія новые корни и стебли, -- тогда можно было надъяться, что озими попадутъ подъ снъгъ раскустившимися и здоровыми; такими именно и были озими на дёлянкъ съ задёлкой съмянъ сартовской бороной; они взошли ранъе другихъ, были гуще и зеленъе. Между тъмъ, задъланныя Planet'омъ съмена залегли на глубину 5-6 сантиметровъ и очень поздно дали всходы; появившіяся на св'єть растеньица были слабы, ръдки и почти не расскустившимися пошли подъ снъгъ. Тоже почти представляли и всходы на дълянкъ, гдъ съмена задълывались тяжелой жельзной бороной, очевидно, и здысь это объясняется значительной глубиной задълки съмянъ (4-5 сант).

Какъ было отмъчено выше, въ 1907 году высъвались изъ озимыхъ два сорта мъстной пшеницы: бълая и красная усатки (изъ мягкихъ) и черный караязскій 4-хъ рядный ячмень; всть они дали пониженный урожай, что, помимо опустошеній отъ склевыванія воробьями, находится въ связи съ дъйствіемъ суховъевъ, ржавчины и проч. Очевидно, необходимо для Голодной степи подыскать новые болъе устойчивые противъ послъдняго рода поврежденій сорта пшеницы, и болъе урожайные, иначе культура пшеницы становится совершенно не рентабельной. Изъ двухъ нашихъ пшеницъ красная въ 1907 году дала большій урожай, чтымъ бълая. Красная пшеница дала съ десятины 56 пуд., а бълая—46 п.

Въ виду того, что цѣны на пшеницу осенью 1907 года до января стояли очень низкія (60—80 коп.), большую часть урожая пришлось придержать въ амбарѣ не проданной, и только часть пшеницы

пошла на обсѣмененіе оз. полей осенью 1907 г.; въ амбарѣ на пшеницу напалъ жукъ—амбарный долгоносикъ. Для борьбы съ нимъ амбаръ внутри былъ окуренъ сѣро-углеродомъ: большая часть вредителя исчезла. Весь урожай ячменя 1907 г., кромѣ сѣмянъ, скормленъ своимъ рабочимъ лошадямъ; цѣны на него стояли тоже низкія: 65—70 коп. пудъ.

Яровые поствы. Ранніе яровые—овесъ, яр. пшеница и ячмень были высвяны въ концв февраля и въ началв марта; овесъ 26 февраля, ячмень 28 февраля, яровая пшеница 1—5 марта, а люцерна 5—7 марта. Средними посъвами были: посъвъ картофеля-3 апръля, кормовой свеклы 12 апръля, перваго хлопчатника и кукурузы 12/15 апръля. Позже всего свяли: траву тефъ-29 апрвля, поздній хлопчатникъ 1/5 мая и наконецъ, джугару, подсолнечникъ, машъ, просо, кунжутъ и чумизу 5/15 мая. Какъ видно изъ приведенныхъ выше метеорологическихъ данныхъ, весна 1907 года была неблагопріятна для роста такихъ яровыхъ, какъ хлопчатникъ, свекла, кукуруза, такъ какъ выпадавшіе частью въ апрълъ и маъ дожди сопровождались пониженіемъ температуры и образованіемъ почвенной корки и это, разум'вется, задерживало рость этихъ требовательныхъ къ теплу и рыхлой почвъ растеній; обыкновенно выражалось это д'яйствіе сырой погоды запаздываніемъ всходовъ (были даже поля, гдъ съмена хлопчатника, давъ слабые ростки, или раньше этого, загнивали и погибали; такіе участки приходилось перепахивать и вновь пересъвать), этіолированностью ихъ и вялымъ приростомъ. Что касается раннихъ яровыхъ-овса и пшеницы, то для роста каждаго изъ нихъ были свои неблагопріятныя условія: на овесь ръшающее вліяніе имъли температуры въ періодъ выбрасыванія метелокъ и условія почвенной влаги, а на пшеницу, кром'в того, вліяли почвенныя условія въ смысл'в запасовъ питательныхъ веществъ.

На основаніи опытовъ Плотнянской опытной станціи, Богородицкаго опытнаго поля и выводовъ И. А. Пульмана, оптимальными условіями для вегетаціи овса являются:

- 1) въ зависимости отъ сѣвооборота: посѣвъ за пропашными, хуже бобовыми, еще хуже—за озимыми и, наконецъ, за яровыми.
  - 2) отъ удобренія: внесеніе навоза и особенно вмъсть съ суперфосфатомъ
- 3)—отъ обработки почвы: осенняя пахота и весенняя вспашка, хуже—осен. безъ весен. вспашки, еще хуже одна весенняя вспашка.
- 4)—отъ способа посъва: при засухъ и плохой раздълкъ пашни—разбросный посъвъ и ръдкій (6 пуд.) лучше, а при противоположныхъ условіяхъ лучше рядовой посъвъ (6—7 п.).
- 5)—отъвремени посъва: ранній посъвь съ пониженной температурой обезпечиваеть хорошій урожай.
- и 6)—въ зависимости отъ метеорологическихъ условій, —которыя имъють на урожай овса ръшающее значеніе: а) осадки и почвен. влага: если ко времени выбрасыванія метелки и отчасти до молочной спълости овса выпадуть осадки и почвенная влажность будеть около 20% и болъе, то получается хорошій урожай овса, а при пониженіи почв. влаги на глубинъ 10—25 сант. до 12% урожай будеть плохой; в) лучше, если температура въ періодъ оть по-




Рис. 4. Хлопчатникъ сортъ- по люцернъ.



Рис. 5. Машъ (Phaseolus Mungo).

съва до всходовъ держится около  $5-6^{\circ}$ , а въ періодъ кущенія выметанія—около  $11-13^{\circ}$ ; при пониженіи температуры ниже  $5^{\circ}$  въ періодъ отъ всходовъ до выметанія и при повышеніи средней температуры до  $24^{\circ}$  (а максимальной до  $30^{\circ}$ ) въ періодъ отъ выметанія до молочной спълости—урожай овса сильно понижается.

Разбираясь въ условіяхъ вегетаціи на опытномъ пол'в въ 1907 г., мы найдемъ, что: 1) овесъ у насъ слъдовалъ за пропашнымъ-свеклой, (въ Стебутовскомъ съвооборотъ) и, слъдовательно, поставленъ былъ въ смыслъ съвооборота, какъ нельзя лучше; 2) обработка почвы подъ овесь была тоже наилучшая: глубокая вспашка поздней осенью, мелкая весной и надлежащая бороновка (предпосъвная и задълочная) сакковской бороной; 3) способы поства примънялись оба: рядовой (съядкой «крестьянкой» въ 11 рядовъ) съ посъвомъ 6 пуд. на десятину и разбросный-съ высъвомъ 8 пуд. съмянъ на дес.; 4) время посвва-28 февраля вполнъ соотвътствовало вышеуказанному требованію, чтобы температура до всходовь была около 5—60, а отъ всходовъ до выметанія не было пониженія ея до 5°; но въ дальнъйшемъ вегетація овса протекала въ неблагопріятных условіяхъ: температура въ періодъ выметанія была гораздо выше 11—130, а именно, около 170, а въ періодъ отъ выметанія до молочной спѣлости она была около 27%, и максимумъ температуры былъ за это время нъсколько разъ выше роковыхъ 300 доходя до 360. Очевидно, высокая температура въ періодъ выметанія до молочной спълости дъйствуеть угнетающе на овесъ-растеніе съверной полосы; поэтому здъсь, въ Голодной степи, овесъ можеть удаваться лишь въ томъ случав, если онъ успветь дозръть въ половинъ мая, когда температура еще не бываетъ выше 24° (средняя) и максимумъ ея не поднимается за 30°. При условіи посъва здъсь овса въ концъ февраля, очевидно приходится выбрать, во-1-хъ. наиболъ стойкій къ пониженіямъ температуры сорть, а во 2-хъ скороспълый-съ періодомъ вегетаціи въ 80-90 дней, или же остановиться на какомъ-либо озимомъ сортв овса, который бы вызрвваль до 20 мая; изъ яровыхъ овсовъ первому и второму условіямъ удовлетворяють овсы: «Рыхликъ», Желанный, «Канадскій» и «Немерчанскій», —всв они, однако, по опытамъ Плотнянской станціи гораздо менье урожайны, чъмъ, напримъръ, «Шатиловскій», - «Французскій», «Австралійскій»--овсы. Въ силу приведенныхъ выше соображеній, посъянные на опытномъ полъ въ 1907 году овсы: Шатиловскій, Шведскій и Австралійскій, какъ поздно-спълые, подверглись неблагопріятному вліянію высокой температуры, доходившей въ періодъ выметанія и молочной спълости (около 1 іюня) до 38,5 по максимальному термометру, — и дали низкій урожай. Соломой же овсы вышли хорошо, особенно австралійскій.

Съ цѣлью опыта въ 1907 году были высѣяны также яровые ячмень и пшеница; ячмень двухъ сортовъ: голый (гималайскій) и Шевалье, а пшеница—изъ области туркестанской богары—Яныкурганская. Какъ ячмень, такъ и пшеница были посъяны по пропашнымъ растеніямъ: ячмень послѣ кормовой свеклы (въ Стебутовскомъ съвооборотъ), а пшеница—послѣ хлопчатника, при чемъ поля подъ нихъ получили по двъ вспашки: осеннюю глубокую и весеннюю мелкую (предпосъвную); посъяны подъ борону и задъланы въ два слѣда бороной Сакка. Всходы ячменя появились 10-го марта, а пшеница 9-го марта (на 9-й день послѣ высъва) и сначала были довольно хорошіе, но потомъ, забитые сорными травами (главнымъ образомъ осотомъ), въ изобиліи появившимся послѣ дождей даже на этихъ, бывшихъ раньше подъ пропашными растеніями поляхъ, стали отставать въ ростѣ и почти не кустились.

Такъ какъ посъвъ этихъ яровыхъ былъ произведенъ въ разбросъ, а не ленточно (рядами), то помочь растеніямъ справиться съ сорными травами пропашкой культиваторомъ не представлялось возможности, и весь уходъ за ними ограничился лишь скашиваніемъ верхушекъ травъ во время цвътенія ихъ и двумя поливками, данными яровымъ во времени колошенія и молочной спълости 23 апръля и 16 мая. Голый гималайскій ячмень созр'яль на нед'ялю ран'ве ячменя Шевалье и сжать въ стадіи полной спълости 16 іюня; яровая пшеница созръла 12 іюня, запоздавъ противъ озимой пшеницы всего лишь на 10-12 дней. Интересно, между прочимъ, отмътить слъдующее преимущество «голаго» ячменя: онъ почти не выклевывался воробьями, тогда какъ посъянный съ нимъ рядомъ ячмень «шевалье» удалось сохранить отъ нихъ лишь постояннымъ окарауливаніемъ; эта особенность его, на ряду съ превосходными качествами его крупнаго, лишеннаго пленокъ зерна, дълаеть его цъннымъ растеніемъ нашихъ полей, и онъ заслуживаеть того, чтобы его ввести въ плодосмънъ-при условіи повышенія урожайности путемъ тщательной обработки почвы и поства изъ года въ годъ отборными стменами. Всв указанные яровые посввы дали, какъ сказано выше, малый урожай зерна и отличаются слабымъ стеблемъ-соломой. Хуже всего удалась яровая яны-курганская богарная пшеница, давшая съ десятины 18 пудовъ, и это показываетъ, что въ районъ знойныхъ долинъ съ искусственнымъ орошеніемъ такія (богарныя, высвваемыя въ Туркестанъ весной въ предгорьяхъ и подъ атмосферную влагу) пшеницы совствить не приспособлены, требуя, повидимому, болтье умтреннаго и влажнаго климата, значительнаго количества перегнойныхъ веществъ въ почвъ и болъе слабой концентраціи солей; оттого-то яровая пшеница у насъ оказалась наиболъе пораженной суховъемъ, дала щуплое зерно и была-очень низкорослой. Въ общемъ урожай яровыхъ злаковъ въ 1907 году по расчету съ десятины былъ слъдующій: голаго гималайскаго ячменя 30 пуд., шевалье 27 пуд., яровой пшеницы 18 пуд.

Изъ другихъ яровыхъ злаковъ, позднѣе всего высѣваемыхъ, въ 1907 году, испробованы впервые: чумиза, гречиха, гаолянъ и сорго

сахарное, а затъмъ въ 2-польъ высъвались въ то же время (15 мая) мъстные сорта кунжута и джугары. Наиболъе удачными вышли: чумиза, сах. сорго и джугара. Высъянная въ разбросъ и густо (предполагалось испробовать, какъ кормовое для скота растеніе) чумиза дала на 6 день отличные всходы и, перегнавъ просо, стала около 15 іюля выкидывать метелки, достигнувъ около 2 арш. въ высоту; около 20-го августа наступило созръваніе, послъ чего чумиза была сжата и обмолочена на съмена. Въ виду того, что чумизу почти не трогали воробьи, тогда какъ рядомъ посъянное просо почти до зерна было выклевано воробьями, и такъ какъ она даетъ довольно много (около 200 пуд.) и хорошей кормовой массы (стеблей), ее можно рекомендовать для поства въ Голодной степи, замъняя даже ею просо, особенно въ твхъ мвстахъ, гдв практикуется кормленіе лошадей зерномъ кунака (могара). При ръдкомъ яровомъ посъвъ можно достичь, повидимому, и здёсь огромныхъ урожаевъ чумизы, такъ какъ даже при густомъ разбросномъ посъвъ у насъ было много метелокъ, достигавшихъ длины 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> верш. и заключавшихъ до 6.000 зеренъ, въсившихъ (съ одной метелки) около 17 граммъ.

Гаолянъ и сахарное сорго, посъянные 10 мая, взощли 17 мая; гаолянъ, выкинувъ метелку, зацвълъ около 4 іюля, а сахарное сорго-около 18 іюля, при чемъ около этого времени они достигли высоты около 23/4 арш.; къ сожалѣнію, оба эти растенія подверглись безпощаднымъ нападеніямъ воробьевъ, которые еще въ стадіи молочной спълости зерна выклевали его почти до тла, хотя у сахарнаго сорго осталось все-таки на съмена. Между прочимъ, гаолянъ былъ, кром' того, сильно пораженъ головней и вообще производилъ менъе выгодное впечатлъние въ сравнении съ сахарнымъ сорго, которое имѣло гораздо болѣе развитые стебли и метелки, болѣе крупные сѣмена (они были въ чернаго цвъта оболочкъ, а у гаоляна-оранжевожелтые) и не порожались головней, хотя гаолянъ давалъ больше побъговъ при окучкъ и, слъдовательно, если ихъ не сръзать при появленіи, могъ быть использованъ събольшой выгодой, какъ кормовое для скота. Но, вообще говоря, ни то, ни другое растеніе не могуть сравниться съ мъстнымъ пониклымъ сорго-джугарой (Sorghum cernuum), которая даеть и болье сильные стебли и большіе урожаи зерна. Джугара, посъянная 15 мая рядовой съялкой съ разстояніемъ ряда отъ ряда въ 14 вершковъ (поле получило осеннюю глубокую и весеннюю мелкую вспашку, предъ посъвомъ 2-3 раза заборонено), при чемъ на десятину потребовалось 1¼ пуда съмянъ, —дала всходы 22 мая и сначала росла туго, но потомъ-послъ проръживанія (въ ряду растеніе отъ растенія отстояло вершковъ на 8-10) и мотыженія кетменями она быстро начала подниматься, кръпнуть и давать вторые и третьи стебли, которые, конечно, сръзались; послъ же пропашки Planet'омъ (вслѣдъ за цоливкой) и ручной окучки (до второго

междоузлія), данной предъ началомъ и во время выметанія метелокъ, джугара такъ мощно развилась, что казалась въ массъ дълянки цълымъ лъсомъ, при чемъ каждое растеніе достигало въ высоту около 3 и болъе арш. и несло массу широкихъ, сочныхъ листьевъ и на верхушкъ стебля большія пониклыя головки-метелки съ зерномъ. Часть джугары, для опыта, была сръзана серпомъ (у нижняго и второго междоузлій) 7 іюля, посл'в чего полита и окучена; оказалось, что она послъ сръзки выкинула по нъсколько новыхъ стеблей и часть изъ нихъ, догнавъ почти не сръзанные экземпляры, дали еще метелки (болъе мелкія), успъвшія вызрыть въ сентябрь. Такимъ образомъ, джугара можетъ явиться съ одной стороны хорошимъ кормовымъ средствомъ для рогатаго скота (сочные, сладковатые стебли ея и листья можно, какъ показаль опыть на нашемъ полъ, хорошо силосовать и силосъ получается отличный), а съ другой-дать еще хорошій урожай зерна, идущаго въ пищу и накормъ лошадямъ. Отдъльныя головки-метелки въсять около 160-180 грм., а одни зерна изъ нихъ около 130 граммовъ, такъ что, если оы на джугару не нападали воробьи, обычно даже и при окарауливаніи выклевывающіе до 1/2 и 2/3 съмянъ, она могла бы давать до 200-300 пудовъ зерна съ десятины; полусырой же, годной для силоса, стеблевой массы можно взять до 1.000 пуд. Въ текущемъ году, въ виду страшнаго опустошенія джугары воробьями и сильнаго пораженія головней, наша дізлянка джугары въ 2-поль дала всего то около 15 пуд. зерна, скормленнаго лошадямъ. Слъдуетъ отмътить, что изъ двухъ сортовъ ходжентской джугары-бълой и красной-послъдній меньше опустошался воробьями, чъмъ первый, кромъ того стебли его были выше.

Просо, посъянное 15 мая, взошло 22 мая; развившись довольно слабо, созръло около 5 іюля, однако зерно было выклевано воробьями почти до тла, такъ что удалось собрать не больше одного пуда и солому.

Наши усилія бороться съ этими врагами—стрѣльбой въ нихъ, подвѣшиваніемъ чучелъ, привязываніемъ ястребовъ и отпугиваніе трещетками, при всей дороговизнѣ такой борьбы, не привели ни къ чему: воробьи сначала пугались, но вскорѣ, убѣдившись въ безсиліи нашихъ пріемовъ, вновь начивали опустошать посѣвы. Повидимому, спеціальнымъ ядомъ (бактеріальнымъ или неорганическимъ) или при помощи обученныхъ птицъ-хищниковъ, которыя бы ловили воробьевъ, только и можно бороться съ этими бичами нашихъ посѣвовъ.

Пробный посъвъ гречихи, произведенный 12 мая, убъдилъ насъ въ возможности использовать здъсь гречиху на зеленое удобреніе, въ которомъ такъ нуждаются голодно-степскія старопахатныя почвы; гречиха, какъ и бобовое-машъ, развивая много листвы, прекрасно отъняеть почву даже при посъвъ на десятину рядами, какъ было у насъ, не болъ 4½ пудовъ съмянъ; но такъ какъ она развивается быстръе маша, достигая во время цвътенія у насъ около 1¾ арш. въ высоту, то въ нъкоторыхъ случаяхъ, когда, напримъръ, остается мало

времени до крайняго срока посвва следующаго по зеленому удобренію растенія, она будеть им'ть даже нікоторыя преимущества передъ машемъ, хотя, конечно, какъ азото-собиратель, зеленый машъ является болъе сильнымъ удобрительнымъ средствомъ. Всходы гречихи у насъ появились 16 мая, цвътеніе началось 9 іюня, а убирали созръвшую гречиху 21 августа. Урожай съмянъ гречихи получился весьма незначительный — около 10 пуд. на десятину; объясняется это, в роятно, тъмъ, что обыкновенная гречиха, какъ растеніе широколиственное и имъющее своеобразно устроенные цвътки, то съ болъе короткими, то съ болъе длинными, чъмъ тычинки, пестиками, требуетъ, во-1-хъ, большой, сравнительно, влажности почвы-не менъе 34%, особенно во время цвътенія, во-2-хъ, подвергается захватамъ при температуръ воздуха въ тъни около 30°, и въ-3-хъ, нуждается въ перекрестномъ опыленіи при помощи, главнымъ образомъ, насъкомыхъ, особенно пчелъ, а разъ она вегетируетъ при неблагопріятныхъ условіяхъ, урожай ее неизбъжно падаетъ съ 80-120 пудовъ до 0-60 пуд. на десятину, какъ показали опыты Пульмана съ рядовымъ посъвомъ и притомъ, сравнительно, раннимъ, когда температура почвы на глубинъ вершка бываеть около 15, и гречиха успъваеть еще уйти, имъя короткій вегетаціонный періодъ въ 60-65 дней, отъ высокой л'єтней температуры и суховъевъ, столь губительно дъйствующихъ на нее. Въ нашемъ районъ посъвы гречихи, въроятно, будуть болъе удачными, если ее высъвать въ первыхъ числахъ апръля, когда температура почвы на глубинъ задълки съмянъ бываетъ около 15 и ко времени цвътенія гречихи (до 15 мая) температура воздуха еще ръзко поднимается до роковыхъ 30°, а почвы до 25° (на глубинъ распространенія корней); это подтверждается между прочимъ тъмъ, что посъянная нами въ апрълъ не далеко отъ ульевъ (въ междурядьяхъ сада) гречиха отличалась отъ первой обильемъ крупныхъ, тяжелыхъ зеренъ и почти полнымъ отсутствіемъ пустыхъ «прихваченныхъ» завязей. Во всякомъ случав, намъ кажется, что на здвшнихъ засоренныхъ поляхъ посввы гречихи могуть быть умъстны, тъмъ болъе, что она обладая многочисленными и широкораспространяющимися корнями, является очень неприхотливымъ на почву растеніемъ.

Кунжутъ (Sesamum orientale), посъянный 15 мая въ двухъ польъ на 0,2 десятины взошелъ 24 мая и дальше росъ туго, а со времени цвътенія (4 іюля) началъ сохнуть и ко времени созръванія въ августъ здороваго кунжута почти не было, такъ что собрано съ этой дълянки съмянъ его около 10 фунт.

Кунжутъ въ множествъ посыхалъ также и у крестьянъ поселенцевъ и у арендаторовъ въ Голодной степи. При ближайшемъ изслъдованіи больныхъ, усыхающихъ экземпляровъ кунжута, оказалось, что у корневой шейки ихъ имъются утолщенія и на нихъ не равныя раны (язвы), окрашенныя въ бурый цвътъ: при нъкоторомъ слабомъ усиліи растеніе въ этихъ мъстахъ ломается и вся сердцевина кажется рыхлой темнаго цвъта. Сдъланный съ такихъ мъсть сръзъ, подъ микроскопомъ давалъ картину описанной спеціалистомъ А. А. Ячевскимъ бользви-рака шейки корня: полость стебля и сосудистые пучки заполнены сплетеніями нитей грибницы (съ перегородками), на вътвяхъ которой кое-гдъ замъчаются образованныя по одиночно-дугополумъсяца) микроконидіи, вызывающаго образно - согнутыя (вродъ грибка—Neocosmospora vasinfecta, изученнаго Е. Смитомъ. Надо замътить, что около того же времени подобной болъзнью былъ пораженъ (и посохъ) на опытномъ участкъ поля одинъ туземный сортъ хлопчатника (бухарскій), съмена котораго были опытнымъ полемъ получены съ Туркестанской сельско-хозяйственной станціи. Какъ извъстно, до сихъ поръ въ Туркестанъ изъ сортовъ хлопчатника поражается ракомъ шейки корня, къ счастью, только этотъ бухарскій хлопокъ и до сихъ поръ эта болъзнь еще не наблюдалась на американскомъ хлопчатникъ, между тъмъ, какъ въ Америкъ она очень распространена и производить значительныя опустошенія и убытки. Слёдуеть замётить, что имёя въ виду существованіе на кунжуть болёзни рака шейки корня въ цъляхъ предупрежденія ея развитія предъ поствомъ кунжута была произведена формалинизація съмянь въ 1:300 растворъ; однако болъзнь все же развилась и погубила кунжуть. Очевидно, микроконидіи и хломидоспоры грибка Neocosmospora находились въ самой почет дълянки, гдт былъ выстявъ кунжуть, и для предупрежденія растенія отъ заболъванія ракомъ шейки корня, слъдовало бы въ такихъ случаяхъ или дезинфекцировать почву дълянки, или занять ее другими растеніями, не подвергающимися заболъванію этой бользнью (наприм. люцерной, машемъ, злаками и проч.), допустивъ посъвъ кунжута на томъ же мъстъ не ранъе, какъ черезъ 5-7 лътъ. Опыть искуственнаго перенесенія бользни съ бухарскаго хлопчатника на рядомъ съ нимъ росшіе сорта американскаго хлопчатника Кингъ п Кара-чигить не привель ни къ чему: ни зараженія въ надръзъ у шейки корня, ни внесеніе кусковъ и порошка отъ пораженнаго бухарскаго хлопчатника въ почвукругомъ этихъ американскихъ сортовъ не вызвало заболъвание ихъ ракомъ; но все же на опытномъ пол'в каждый годъ предъ пос'ввомъ с'вмена хлопчатника для селекціоннаго участка дезинфекцируются (передъ мочкой въ водъ), въ цъляхъ предохраненія всходовъ хлопчатника не только отъ пораженія Neocosmospora, но и другими грибками.

Не безынтересно отмътить, что стерилизація въ формалинъ (1:300) на разныя съмена дъйствуетъ различно: у однихъ понижаетъ % всхожести, у другихъ повышаетъ. Такъ, по нашимъ опытамъ въ 1907 году, оказалась, что сильно понижена формалиномъ всхожесть съмянъ шатиловскаго овса (на 33%), затъмъ—люцерны (23 %), мъстной кукурузы (30%), кунжута (10%) и гаоляна (3%); повыше на же была всхожесть у кормовой свеклы (16%), подсолнечника (10%), хлопчатника (8%) и пшеницы (на 3,3%). При этомъ и энергія прорастанія оказывалась большей, въ случат повышенія % всхожести дня на два--на три, а въ случат пониженія—меньше тоже на 2—3 дня.

Машъ—Phaseolus Mungo (рис. 5) и соя (Soja hyspida) высѣвались въ 5-польѣ основного сѣвооборота, а машъ, кромѣ того, еще въ 2-польѣ въ андижанскомъ сѣвообротъ и, какъ зеленое удобреніе, въ 3-польѣ и Стебутовскомъ 4-польѣ подъ озимый ячмень. Выводы, которые нами были сдѣланы въ отчетъ за 1906 годъ относительно значенія маша, какъ зернового бобоваго и для зеленаго удобренія и преимущества передъ соей, подтвердились и въ отчетномъ году: несмотря на поздній посѣвъ (около 20 мая) машъ все-же далъ съ десятины около 48 пудовъ зерна—горошка и около 7 возовъ (120 пудовъ) сухой соломы, служащей хорошимъ кормомъ для рогатаго скота; между тѣмъ, соя дала въ среднемъ около 5 пудовъ зерна и ничтожное количество соломы, именно:

черная соя	H (OB	син	HCI	cai	(07					9	пуд.	зерна
коричневая	соя									$2^{3}/4$	пуд.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
бѣлая	,,									3	пуд.	,,

Посъвъ сои и маша былъ произведенъ одновременно (20 мая). При одинаковыхъ условіяхъ обработки почвы и пр. соя дала всходы 26 мая, а машъ—28 мая; цвътеніе у маша наблюдалось съ 11 іюля и созръваніе около 20 августа, соя же почти на двъ недъли раньше. Следуеть отметить, что все выгоды посева маша нередко теряются, если его посъвъ производять позже 20 мая и затягивають до 15 іюня, такъ какъ при этомъ машъ, во - 1-хъ, хуже развивается, а во 2-хъ, случающіеся въ періодъ его созръванія заморозки и дожди (въ сентябръ) побивають его и мъщають уборкъ, вслъдствіе чего получается пониженный урожай маша и зерно плохого качества. Поэтому-то здъсь и случается, что при практикъ посъва маша вторымъ въ лъто растеніемъ (по снятіи озимаго) онъ даеть неважный урожай и тогда на него страшно ростуть цены: въ 1907 году, напримеръ, пудъ маша къ концу года дошелъ 1 р. 50 коп. (вмъсто обычныхъ 75 коп.), а весной 1908 года его покупали на съмена даже по 2 р. 50 к.—3 рубля. Чтобы охарактеризовать значение маша въ качествъ зеленаго удобренія, мы сдълаемъ учеть производимой имъ при посъвъ на удобреніе зеленой массой (тогда маша высъвается вмъсто обычныхъ 2-21/2 пудовъ около 31/2 — 4 пудовъ) и вносимаго съ нею при запашкъ удобренія; оказывается, что при обычной густотъ посъва на зеленое удобреніе (4 пуда) на десятинъ посъва получается во время цвътенія маша около 350 пудовъ сухихъ ограническихъ веществъ (въ стебляхъ и корняхъ) и съ запашкой этой массы почва получаеть около 27 пуд. бълковъ или  $4^{1}/_{3}$  пуд. азота, а такое количество послъдняго, приблизительно, и вносится на десятину при удобреніи селитрой или 2.400 пуд. навоза, коэффиціенть использованія азота у коего равень 25%, тогда какъ у зеленой массы около 70%.

Изъ пропашныхъ растеній однимъ изъ послѣднихъ высѣвался въ 1907 г. подсолнечникъ. Посѣянный 12 мая сѣялкой Баннера съ разстояніемъ межъ рядовъ 16 и въ рядахъ 10 вершк., 36 ф. сѣмянъ на десят. на одномъ изъ осолоняющихся полей 8-полья, съ цѣлью опредѣленія способности его использовать такія почвы, подсолнечникъ далъ 16 мая дружные всходы (сѣмена передъ посѣвомъ замачивались), которые при сравнительно незначительномъ уходѣ (прорѣживаніе въ рядахъ поливка и пропашка междурядій Planet'омъ) хорошо развивались. Цвѣтеніе наблюдалось около 8 іюля, а созрѣваніе около сентября; срѣзанныя 13 сентября и оставленныя на сушку головки пострадали отъ дождей, вслѣдствіе чего много сѣмянъ было попорчено и урожай получился низкимъ, къ тому же большой % ихъ оказались пустыми. Съ десятины получено сѣмянъ грызового подсолнечника 30 пудовъ. Однако, въ виду того, что подсолнечникъ въ Го-

лодной степи еще болье, чымь свекла, способень мириться съ значительнымь осолонениемь почвы, такь какь онь довольно хорошо развивался на такихь осолоненныхь мыстахь (бугорки съ выцвытами соли), гды не давали всходовь ни свекла, ни даже люцерна, или машь, культура подсолнечника и здысь заслуживаеть вниманія.

Свекловица (рис. 6), какъ и въ 1906 году, съядась въ Стебутовскомъ кормовомъ съвооборотъ и отчасти въ 8-польъ; въ Стебутовскомъ испытывалась урожайность кормовыхъ сортовъ: эккендорфской желтой, маммуть и оберндорфской кормовыхъ, а затъмъ сортовъ сахарной свеклы: Вильморена и Клейнванцлебенъ; въ 8-польномъ же съвооборотъ были высъяны сорта сахарные № 1 и № 2, съмена которыхъ получены съ Каунчинскаго свекло-сахарнаго завода (подъ Ташкентомъ). Первый посъвъ (въ Стебутовскомъ съвооборотъ) произведенъ 12 апръля съялкой Banner'а, при чемъ съмянъ кормовой свеклы пошло на десятину (при разстояніяхъ между рядами въ 14 вершковъ и въ рядахъ 8 вершковъ) 1 пуд. 10 фун., а сахарной — около двухъ пудовъ; съмена свеклы предъ посъвомъ вымачивались сутки въ проточной водъ. Всходы свеклы появились 18 апръля и пошли сначала хорошо, но потомъ на нее напала свекл. блоха (Chaetocnema breviuscula) и они пріостановились; пришлось эти поля полить, и это спасло всходы, такъ какъ блоха-жучекъ съ нихъ исчезла. Послъ продергиванія всходовъ и послъдующей мелкой мотыжки всходы быстро пошли въ ростъ дальнъйшій уходъ за свеклой состояль въ однократномъ легкомъ пріокучиваніи сахарныхъ сортовъ, болъе сильномъ окучиваніи кормовыхъ, въ 4-хь и 5-кратномъ орошеніи и последующемъ 3-кратномъ пропахиваніи междурядій культиваторомъ Planet'a. Къ сожал'внію, вслъдствіе невыровненности полей подъ свекловицей, всходы орошались плохо и потому, а равно вслъдствіе невозможности внесенія подъ кормовую свеклу навознаго удобренія (за недостаткомъ такового), корни свеклы развивались туго и не достигли значительныхъ размъровъ; поэтому опыть съ посъвомъ свеклы въ 1907 году интересенъ, собственно, не по опредъленію абсолютной урожайности свеклы въ Голодной степи, а лишь по даннымъ сравнительной урожайности разныхъ сортовъ ея. Уборка свеклы произведена 1-5 октября и тогда же опредълялся урожай ея; оказывается, что самой урожайной здъсь является эккендорфская желтая, которая съ десятины дала въ 1907 году 1000 пудовъ бураковъ, затъмъ маммуть-480 пуд. и, наконецъ, оберндорфская красная—400 пуд.; изъ сахарныхъ же сортовъ урожайнъе другихъ былъ № 2 Каунчинскаго завода—800 пуд., затъмъ № 1— 600 пуд., далъе Клейнвацлебенъ-490 пуд. и, наконецъ, Вильморена-480 пуд. Въ то же время эккендорфская свекла была и самая крупная-въ среднемъ по 21/4 ф. буракъ (тахітит до 10 фунт.), меньше была оберндорфская—по 1¾ ф., затъмъ сахарная № 2—по 1,8 фунта, № 1 по 1,6 ф. и, наконецъ, маммутъ—по 1 ф. Вся свекла урожая



Рис. 6. Кормовая свекла.



Рис. 7. Прессовка люцерны для отправки по жельзной дорогъ.

1907 г. пошла на кормъ рогатаго скота, причемъ на голову задавалось не болъе 15 фунт.; свекла предварительно измельчалась на свеклоръзкъ и задавалась въ сыромъ видъ съ съменами хлопчатника 3-го сорта. При такомъ дополнительномъ кормъ коровы въ первые же 3 дня повышали удои на 1 кружку (1/10 ведра) и молоко становилось жирнъе.

Кукуруза въ 1907 году съядась, какъ пропашное, въ съвооборотахъ: основномъ, андижанскомъ и 8-польномъ по хлопчатнику; въ основномъ высъвались для опыта 4 сорта: чинквантино, бессарабская, конскій зубъ и кутаисскій гибридъ, а въ 8-польъ и андижанскомъ съвооборотъ-мъстная бълая кукуруза и чинквантино. Посъвъ кукурузы быль довольно поздній отъ 8 до 30 мая и это очень дурно отразилось на урожав, такъ какъ ко времени цветенія такихъ скороспълыхъ сортовъ, какъ чинквантино и бессарабская (около 2-го іюля) температура воздуха доходить въ тѣни до 42° С., сопровождаясь горячими вътрами, и выходящіе изъ подъ обертки початки нъжные, длинные, нитевидные столбики женскаго цвътка кукурузы, повидимому, усыхають оть такой температуры раньше, нежели произойдеть опыленіе; поэтому у насъ сплошь и рядомъ початки кукурузы бывають наполовину пустые. Кром'в того, къ этому же времени зд'ясь появляется вторая летняя генерація яровой совки, и ея гусеница нападаеть на свой любимый кормь-молочныя, нъжныя зерна кукурузы въ початкъ, уничтожая не ръдко до половины початковъ; въ 1907 году наблюдалось особенно сильное развитіе яровой совки какъ на кукурузъ, такъ и на хлопчатникъ. Поздноспълые сорта-конскій зубъ и кутаисскій гибридъ при посъвъ около 20 мая подвергаются тоже вреднымъ вліяніямъ: во первыхъ, около 20 августа, когда они находятся въ стадіи молочной спълости зерна, на нихъ нападаетъ третья генерація яровой совки ((Heliothis armigera)), приносящая особенно сильныя поврежденія початкамъ, а во 2-хъ, въ періодъ уборки (конецъ сентября и начало октября) початковъ этихъ сортовъ начинаются дожди и заморозки, и зерно кукурузы, не успъвъ просохнуть, часто покрывается плъсенью, теряетъ всхожесть и вообще портится.

Всв эти факторы имвли мвсто въ 1807 году, почему урожай кукурузы получился незначительный: чинквантино дала на десятину 30 п. зерна, бессарабская—35, конскій зубь—50 пуд., кутаисскій гибридь—80 пуд. и мвстная сартовская бвлая 45 пудовъ. По этимъ даннымъ выгоднве всего въ Голодной степи свять, какъ кормовые сорта, кутаисскій гибридъ и мвстную бвлую; конскій же зубъ хотя и болве урожаенъ, чвмъ мвстная, но въ виду его поздноспвлости и плохой лежкости (зерно загниваетъ даже въ початкахъ), отъ него приходится отказаться. Помимо зерна, кукуруза даетъ огромное количество стеблевой массы (кутаисскій гибридъ, напримвръ, даетъ съ десятины около 3.000 пудовъ полусухихъ стеблей), которую рогатый

скоть даже не въ зеленомъ видъ повдаеть съ большой охотой. Культура кукурузы на опытномъ полъ не сложна: подъ нее дается осенняя глубокая вспашка и весенняя мелкая, затымь двы предпосывныя бороновки; посъвъ дълается съялкой Banner'а гитадовой, съ растояніями для такихъ высокихъ сортовъ, какъ кутаисскій гибридъ, между рядами около 1 аршина и въ рядахъ <sup>3</sup>/<sub>4</sub> аршина, при чемъ высъвается съмянъ на десятину отъ 1 п. 30 ф. до 2 п. (на зерно); всходы съ 4-6 листковъ продергиваются, затъмъ мотыжатся ручными тяпками и до окучиванія 2—3 раза пропахиваются Planet'омъ посл'в поливокъ съ окучкой кукурузы, которая производится кетменями или коннымъ окучникомъ во время появленія мужскихъ метелокъ, кончается уходъ за кукурузой, не считая поливокъ и иногда одной пропашки Planet'омъ вслъдъ за поливкой; чеканки и пасынкованія кукурузы не практикуется. Посъянная 7 мая, кукуруза «чинквантино» дала всходъ 13 мая; цвътеніе наблюдалось со 2 іюля и созръваніе около средины августа. Уборка кукурузы производится двояко: если поле надо немедленно по созрѣваніи освободить для взмета, то убирается весь стебель съ початками-сръзываніемъ его уракомъ (туземнымъ серпомъ), и уже послъ свозки въ кучи подростки обламывають со стеблей початки и очищають ихъ отъ обертки; въ противномъ случав, початки обламываются на корню, а стебли убираются по мфрф возможности. Сохраняется кукуруза чаще всего въ початкахъ, такъ какъ въ такомъ видъ зерно его менъе портится, чъмъ обмолоченное. Молотьба кукурузы совершается или кукурузной молотилкой (Леппъ и Вальманъ) для съмянъ, или каткомъ при помощи лошадей (на току). Обычно весь урожай кукурузы скармливается своимъ рабочимъ лошадямъ, причемъ въ сутки на голову задается фунтовъ по 10 дробленнаго зерна.

Люцерна (рис. 7-прессовка люцерны) въ 1907 году занимала площадь 9 десятинъ, не считая той, которая осталась въ междурядьяхъ новаго плодоваго сада (около 1/2 десятины); изъ этой площади 3 десятины были засъяны весной 1907 года, а остальные посъвы 1904-6 г.г. Какъ и прежде, въ 1907 году подъ люцерну поступили наиболъ выпаханныя и осолоненныя поля, съ цълью исправленія ихъ многолътнимъ (6-7 лътъ) пребываніемъ люцерны. Подъ весенній посъвъ люцерны поле было вспахано глубоко одинъ разъ осенью, другой разъ мелко весной и послъ бороньбы въ 2 слъда съ дегкимъ заглаживаніемъ произведенъ посъвъ въ разбрось, при чемъ на десятину высъяно 1 п. 18 фунт. съмянъ Туркестанской люцерны (очистки г. Дюршмидта въ Ташкентъ, 6-7 руб. за пудъ). Всходы люцерны, посъянной 5-7 марта, появились 10-15 марта и, благодаря теплой погодъ, тронулись очень быстро въ рость, перегнавъ вскоръ даже посъянную осенью прошлаго года; эта новая люцерна дала два укоса, изъ коихъ первый былъ довольно сорнымъ, и кромъ того, къ осени имълась большая отава. Старая (3—5 лѣтняя) люцерна дала 4 укоса и отаву, по которой осенью пасся скотъ. Люцерна скашивалась косилкой Диринга и собиралась въ ряды конными желѣзными граблями. Съ десятины молодой люцерны накошено 150—200 пудовъ сѣна, а старой отъ 400 пудовъ (изрѣженная люцерна) до 800 пудовъ (густая люцерна на ½ десятинъ посѣва 1906 года): въ среднемъ же—около 500 пудовъ.

Поставленный въ 1907 году опытъ для выясненія удобреній по люцернь (въ февраль мьсяць того же года), и съ боропьбой люцерны (въ конць февраля) даль слъдующій результать:

	Уре	ожай сы	грой ма	ссы.	Bcero	Bcero	Стои-	Стоим.	Доходт
Какое удобреніе и проч.	Въ 1-мъ укосѣ.	Во 2-мъ укосъ.	Въ 3-мъ укосъ.	Въ 4-мъ укосъ.	сырой люцер- ны.	сухой люцер- ны.	мость удо- бренія.	урож.	+ въ кон- въной.
айзынгын Допокол4 я <sub>г</sub> арак эн-		Н	a	д е	c	я т	и н	y.	
PERSONAL LEPEDRESE SONOTO	annina	П	у д	0 В	ъ.	IQ. ISHE	P	убл	е й.
a proposition submission associated	Mich	118000	and the same	SY 186	30 316	laters.		Elebar.	Neg
Навозное —2400 п. на дес	868	500	558	393	2.319	695	20 2)	59	+39
Томасшлакъ—48 п. на дес.	666	510	585	450	2.211	663	60	49	-11
Суперфосфать—12 п. на дес	744	500	470	422	2.136	641	25	43	+18
Зола хлопковыхъ сѣмянъ и немного древесной—20 п	794	510	600	281	2.185	655	67	48	- 19
Жмыхи хлопковыхъ съмянъ 70 пуд. на дес	630	464	505	335	1.934	580	21	25	+ 4
Гипсъ-50 пуд	651	454	480	288	1.873	561	18	20	+ 2
Сърнокислый кали—10 п	400	400	420	264	1.484	445	20	<u>-</u>	-36
Вороньба весной	500	410	382	280	1.572	472	11/2	2180	- 9
Контрольная дълянка	510	450	403	295	1.658	497 1)	1	-	1

Примпъчаніе. Опытныя дълянки были взяты въ одинаковыхъ условіяхъ, каждая площадью въ 40 кв. саж.

Какъ видно изъ этой таблицы, наибольшій урожай свна собранъ съ двлянки, удобренной навозомъ (на 198 пуд. болъе противъ контрольной), затъмъ — съ двлянки, удобренной томасшлакомъ (на 166 пуд.), далъе по суперфосфату (на 144 пуда), по золъ хлопковыхъ свмянъ— на 158 пуд., по жмыхамъ хлопковыхъ свмянъ—на 83 пуда и, наконецъ, по гипсу—на 67 пуд.; сврно-кислый же кали и весенняя бороньба вызвали уменьшеніе урожая. Очевидно, рентабельнъе всего вносить удобреніе навозомъ, гдъ онъ имъется въ достаточномъ количествъ, затъмъ хорошо оплачивается урожаемъ люцерны внесеніе двойного суперфосфата въ количествъ 12 пуд. на десятину и отчасти жмыховъ

<sup>1)</sup> Валовой доходъ контрольной дълянки = 149 р., считая по 30 к. пудъ съна.

<sup>2)</sup> Возка и разбрасываніе.

хлопковыхъ сѣмянъ; всѣ же остальныя удобренія въ указанныхъ количествахъ убыточны.

Зола съмянъ хлопчатника, внесенная въ количествъ 100 пуд. на десятину. абсолютно очень сильно повысила урожай люцерны (на 158 пуд.) и это, конечно, можно объяснить дъйствіемъ находящейся въ золь съмянъ фосфорной кислоты, которой содержится до 30%; однако примънять только золу очень невыгодно, такъ какъ пудъ ея, получающійся почти изъ 15 пуд. съмянъ хлопчатника, обходится не менъе 3 рублей (если считать пудъ съмянъ даже 3-го сорта по 20 коп.) а потому можно рекомендовать ея примъненіе (подъ люцерну, хлопчатникъ) лишь въ комбинаціи съ хлопковыми жмыхами (за отсутствіемъ навоза и суперфосфата), а именно: необходимое количество азота-21/2 пуда и фосфорной кислоты-4,5 пуда на десятину можно ввести съ 37 пудами жмыховъ (считая въ нихъ 6, 8% азота и 3% фосфорной кислоты) и 11,3 пуд. золы хлопковыхъ сёмянъ (съ этимъ количествомъ золы вносится около 3,4 пуда фосфорной кислоты, считая въ золъ съмянъ около 30% ея, а остальные 1,1 пуда фосфорной кислоты вносятся съ 37 пуд. жмыховъ). При такой комбинаціи удобреніе десятины обойдется около 43 рублей: жмыхи 37 пуд. х 30 к.= 11 р. 10 к. и зола  $11^{1}$ , в пудовъ (или 160 пуд. хлопковыхъ съмянъ по 20 коп.) = 32 руб.; тогда удобреніе золой и жмыхами будеть оправдываться нъкоторой выгодой.

Вся люцерна опытнаго поля обыкновенно скармливается своему рабочему и молочному скоту.

Травы: Тефъ — Poa abyssinica, ребрикъ — Triticum cristatum, овсяница овечья, мятликъ дуговой, райграсъ, клеверъ обыкновенный и эспарцеть, высъвавшеся на дълянкахъ опытнагоучастка, въ 25 кв. саж. каждая, вегетировали различно: тефъ, посъянный, какъ и другія травы, 12 апрыля, даль слабые всходы 18 апрыля, и росъ сначала туго, но послъ двухъ поливокъ онъ быстро поднялся и, достигнувъ около 11/2 арш. роста, созрълъ на съмена въ августъ: ребрикъ, съмена котораго выписаны съ Валуйской опытной станціи, далъ очень слабые всходы и послъ росъ очень туго, страдая, видимо, вначалъ отъ жары, а послъ отъ поливки; овсяница овечья и мятликъ луговой дали совершенно неудовлетворительные всходы и почти погибли къ осени; райграсъ принялся оченъ хорошо и далъ густой травостой; клеверъ обыкновенный тоже удался очень хорошо и даже опередиль по мощности развитія одновременно съ нимъ посъянную люцерну; эспарцетъ сначаларосътуго, но потомътакже развивался прекрасно. Наблюденія на будущій годъ покажуть, насколько пригодны тв или другія изъ этихъ травъ для полевой (или пастбищной) культуры въ Голодной степи.

## III. Опыты съ хлопчатникомъ.

Въ отчетномъ году опытное поле расширило посѣвную площадь подъ хлопчатникомъ до 14½ десятинъ; было заложено много опытовъ по выясненію вліянія различныхъ факторовъ роста на хлопчатникъ, для установленія оптимальныхъ условій культуры хлопчатника въ Голодной степи, и т. п.; но предположенія эти далеко не оправдались, благодаря въ высшей степени неблагопріятнымъ метеорологическимъ условіямъ 1907 г., и отчасти поврежденіямъ хлопчатника саранчей и гусеницей яровой совки (Heliothis amirgera), упоминавшимся выше.

Придерживаясь хронологическаго порядка заложенных опытовъ съ хлопчатникомъ, начнемъ описаніе культуры его въ 1907 г. съ опыта ранняго посъва подъ атмосферную влагу—безъ предварительнаго орошенія поля.

1. Поствъ хлопчатника безъ предварительнаго орошенія поля (сортовъ Аунсъ-боолъ 1), см. рис. 4, и Кокъ-чигитъ) былъ произведенъ 6 апръля въ 8-польъ съменами, вымачивавшимися въ водъ 2 сутокъ. Подготовка почвы была обычная: осенняя глубокая вспашка (рис. 2) мелкая весенняя; двъ предварительныя бороновки и посъвъ рядовой съялкой Баннера въ ряды, отстоящіе другь отъ друга на 1 аршинъ. Въ виду того, что почва была въ достаточно спъломъ состояніи (достаточно влажна, крошилась прекрасно плугомъ и пр.), пашня получилась хорошаяслитная, безъ комковъ и достаточно прогръта, чтобы съмена могли прорости нормально; температура почвы на глубинъ 10 сантиметр., была даже выше той, которую принято считать оптимальной для проростанія съмянъ хлопчатника (15—20° С.). Несмотря на это, всходы хлопчатника запоздали и вмъсто обычныхъ 6 дней появились на 10-11 день, были ръдки и первое время тянулись чрезвычайно туго; кром'в того, очень многія сімена оказались въ почві загнившими, а нізкоторыя съ развившимися уже съмядолями такъ и остались подъ поверхностной почвенной коркой. Объясняется это тъмъ, что наступившее съ 10 апръля понижение температуры и дожди, ослабили энергію проростанія, не дали возможности въ свое время выбиться наружу съмянодолямъ, и ихъ нъжныя ткани подъ образовавшейся отъ дождей коркой загнивали. Чтобы помочь всходамъ выбиться наружу, пришлось проборонить посъвъ, послъ чего всходы начали было выправляться, но новый дождь и образовавшаяся послъ него почвенная корка опять забила всходы; въ концъ концовъ часть посъва сорта Аунсъ-боолъ (% десятины) пришлось перепахать и послъ засъять кукурузой. —Все же часть посъянныхъ подъ атмосферную влагу Аунсъ-боолъ и Кокъ-чигить (3/8 десятины) уцъльли, хотя и изръженные, и это было на участкъ съ болъе сухой и рыхлой почвой, чъмъ въ первомъ случав. Несмотря на ранній посівь, эти сорта все время отставали оть хлопчатника болье позднихъ сроковъ посыва: такъ, хлопчатникъ тыхъ же сортовъ, посъянный 16 апръля, давъ всходы на 6 день, быстро обогналъ первый посвые и зацвыть 30 іюня, тогда какъ первые-только 8 іюля; затъмъ созръвание поздняго хлопчатника наступило 10 августа, а ран-

<sup>1)</sup> Англійское названіе этого сорта—Ounce boll, въ произношеніи—А'унсъ-боолъ; въ русскомъ переводъ—унцовая коробочка. Прим. ред.

няго только 16 августа. И вообще рость, длина вътвей, число коробокъ и урожай ранняго хлопчатника, посъяннаго подъ дождь, были значительно меньше болъ поздняго—нормальнаго посъва хлопчатника (16 апръля). Урожай ранняго хлопчатника выразился слъдующими количествами хлопка-сырца съ десятины:

Названіе сорта.	Время сбора.	I сборъ.	II сборъ.	III сборъ.	Bcero.
Аунсъ-боолъ	II/X, 8/X1 и 28/XI.	12⅓ пуд.	4 пуда.	3½ пуда.	20 пуд.
Кокъ-чигитъ	тоже.	17. »	11½ пуд.		28½ пуд

Разумъется, рано начавшіеся въ 1907 году дожди (23/IX) и заморозки (2/X), погубившіе не мало хлопка и надеждъ хлопководовъ, особенно сильно отозвались на этихъ поздно—развившихся сортахъ, почему съ нихъ по качеству урожая собрано было исключительно почти волокно 2-го и 3-го сортовъ.

Опыть этого года, между прочимъ, показалъ, что для борьбы съ вреднымъ вліяніемъ на всходы почвенной корки отъ дождей одной бороньбы не достаточно, особенно если всходы уже поднялись высоко и ихъ бороной легко погубить; необходимо практиковать разрыхленіе этой поверхности корки легкимъ каткомъ съ частыми короткими и широкими зубьями.

Промышленные сорта хлопчатника. (въ 8-польф): Кингъ, Кокъ-чигить, Малля-чигить, Кара-чигить и Russell были высвяны 21/24 апръля на площади въ 5 десятинъ, при чемъ подготовка почвы, посъвъ хлопчатника и уходъ за нимъ ничъмъ не отличались отъ обычнаго эти поля получили двъ вспашки-осеннюю глубокую и весеннюю мелкую, двъ предпосъвныя бороновки съ заглаживаніемъ пашни, посъвъ мочеными 11/2 сутокъ въ водъ съменами хлопчатника съ расходомъ ихъ на десятину отъ 2½ до 3 пудовъ-при высвив свялкой и разстояніемъ рядъ отъ ряда въ ¾ арш.; мотыженій ручныхъ (кетменемъ) впрочемъ, было дано не два, а одно, пропахивался же Planet'омъ (рис. 11) хлопчатникъ въ междурядьяхъ послъ каждой поливки-три раза, а сорть кокъ-чигить, кромъ того, быль пропахань еще одинъразъ въ поперечномъ къ длинъ рядовъ направленіи (при проръживаніи хлопчатника руками), такъ что въ данномъ случав получился какъ-бы не рядовой, а гивздовой посввъ. Всходы хлопчатника, поевяннаго 22 апрвля (Кингъ и Малля-чигить), показались 27 апрвля и пошли въ рость сначала хорошо, но дождемъ 4 мая и особенно 9 мая ихъ сильно прибило и стянуло образовавшейся коркой, разрушить которую бороной не представлялось возможнымъ, а пропашкой междурядій не было достигнуто разрыхленіе корки около самыхъ растеньицъ. Слъдовательно, и эти посъвы хлопчатника, задержанные въ самомъ началъ своего развитія, обречены были на опозданіе и слабое развитіе; и дъйствительно хлопчатникъ въ 8-польи былъ однимъ изъ слабыхъ, поздно-спълыхъ и мало-урожайныхъ. Правда, у сортовъ Кингъ и Малля-чигитъ цвътеніе началось еще съ 1 іюля, но созръваніе сильно затянулось, начавшись только около 25 августа. — Къ довершенію всего на Кингъ и Russell напала летучая мароккская кобылка и значительно изръдила его, такъ что всего его повреждено очень сильно около ¾ десятины; яровая совка тоже повредила его, хотя меньше другихъ. Неблагопріятныя метеорологическія условія осени, конечно, отразились и на этихъ посъвахъ хлопчатника, еще болъе понизивъ урожай хлопка.

Урожай сырца съ этихъ участковъ "промышленнаго" сѣвооборота былъ слъдующій.

Названіе сортовъ.	5 405 3 Link	Reported		сы ј	9912000	Ben na	
Hassanie Copioss.	Площадь.	I сборъ.	II сборъ.	III сборъ.	Bcero.	1 десятина.	
Кингъ	1 дес.	19½ п.	10 п.		29½ п.	29½ п.	
Кокъ-Чигитъ	840 кв. саж.	8¼ п.	41/4 п.	9000 <u>-1</u> 4 /	12¾ п.	35 п.	
Малля-Чигитъ	1½ дес.	25 п.	17 п.	9 п.	51 п.	34 п.	
Кара-Чигитъ	1⁵/6 дес.	22 п.	14 п.	6 п.	42 п.	23 п.	
Russell	3/5 дес.	11½ п.	7. п.	3 п. 30 ф.	22¼ п.	37 п.	

3. Опыть съ густотою посъва. Съ цѣлью опредѣленія урожайности хлопчатника въ зависимости отъ числа кустовъ въ гнѣздѣ, въ основномъ и андижанскомъ сѣвооборотъ, 20—24 апрѣля было посѣяно ¾ десят. хлопчатника "Ферганскій упландъ".

При соблюденіи одинаковыхъ условій обработки почвы, ухода за хлопчатникомъ и проч. двѣ опытныя дѣлянки здѣсь отличались лишь тѣмъ, что на одной (въ ¼ десятины) хлопчатникъ оставлялся при прорѣживаніи по 2 куста въ гнѣздѣ, а на другой (въ ½ дес.)—по одному кусту; посѣвъ же былъ произведенъ одинаково и тамъ и здѣсь сѣялкой Ваппег'а рядами, между которыми оставлялись промежутки въ 1 аршинъ. Результаты этого опыта таковы: всходы появились одновременно на обѣихъ дѣлянкахъ—черезъ 6 дней: цвѣтеніе наблюдалось на дѣлянкѣ съ 1 кустомъ хлопчатника въ гнѣздѣ съ 27 іюня, а съ 2 кустами въ гнѣздѣ 29 іюня; созрѣваніе началось на первой дѣлянкѣ съ 15 августа, а на второй съ 20 августа. Урожай хлопка—сырца былъ слѣдующій:

THOUGHT ORDER	Пло- щадь	Число кустовъ	Число кустовъ на де- сятинѣ.		Урожай	въ пудах	ъ.	Разни-	Разница въ доході валовомъ считая 3 р. пудъ.	
Названіе дёлянки.	дѣлян- ки.	на дѣ-		1_#	2-й сборъ.	Bcero.	На десят.	деся- тину.		
Съ однимъ кустомъ въ гиъздъ	½ дес.	11.000	22.000	15 п. 7 ф.	7 п. 37 ф.	23 п. 4 ф.	46 п. 8 ф.	ino oni ep <u>re</u> en	isaa alox	
Съ 2-мя кустами въ гнъздъ	1/4 дес.	9.520	38.000	12 п.	8п.21ф.	20 пуд. 21 ф.	82 п.	+ 35 н. 32 ф.	+ 107½ p	

Такимъ образомъ, данныя опыта этого года говорятъ, что оставленіе одного куста въ гніздів въ Голодной степи не имъеть за собой экономическихъ выгодъ, и преимущество слъдуетъ отдать рядовому посъву съ оставленіемъ двухъ кустовъ въ гнъздъ. Правда, одиночные кусты были развиты гораздо сильнее и правильнее двойныхъ, имели больше вътвей и коробочекъ, получая больше свъта, воды, простора для распространенія своей корневой системы; однако, ко времени созръванія, по производившимся подсчетамъ числа коробочекъ на 100 среднихъ кустахъ съ каждой изъ этихъ дёлянокъ, оказывалось, что на двухъ кустахъ въ гнъздъбыло обыкновенно въ суммъ 18,4 штуки вполнъ созръвшихъ коробочекъ, тогда какъ на одномъ кустъ въ гнъздъ имълось такихъ коробочекъ лишь 13,7 штукъ; такимъ образомъ, на десятинъ (при 21,600 гнъздъ, когда берется аршинное разстояніе между ними) съ 2-хъ кустовой посадкой въ гнъздъ коробочекъ будетъ на 101.520 шт. больше нежеди на десятинъ съ одно-кустовой посадкой въ гнъздъ, а это дастъ лишнихъ около 25½ пуд. сырца, считая, что въ одной коробочкъ имъется около 4 граммъ сырца.

4. Вліяніе числа и времени поливокъ. Для выясненія вліянія количества оросительной воды и времени поливокъ было выдълено 1/2 десятины въ 3-мъ полѣ основного сѣвооборста, которая была засѣяна сортомъ хлопчатника Кокъ-чигить рядовой съядкой, 20 апръля; по появленіи всходовъ (26 апръля) эта ¼ десятина была раздълена на 10 дёлянокъ по 120 кв. саж. каждая, при чемъ дёлянки отмежевывались одна отъ другого 1/2 — аршинной высоты валиками, такъ что поливались дълянки каждая отдёльно. Количество оросительной воды учитывалось водом'вромъ Фута, отстоявшимъ отъ опытныхъ дълянокъ въ 290 саж.; число и время поливокъ комбинировалось соотвътственно съ основными періодами вегетаціи хлопчатника: 1) временемъ отъ всхода до цвътенія, 2) цвътеніемъ и 3) созръваніемъ. Какъ и во всъхъ другихъ опытахъ, всё делянки здёсь, получивъ одинаковый уходъ и пр., разнились лишь количествомъ оросительной воды и временемъ поливокъ. Сборъ сырца съ дълянокъ былъ произведенъ: первый 10 октября, а второй 27 ноября. Результаты опыта сведены въ слъдующую таблицу:

На	гваніе д	STRUCET	писло			Урожай	сырца.					Чис короб				росите. цесятин	
110		вокъ.	THEST	дь д'Влянки.	Число кустовъ на десятивъ	Sopa.	cóopa,	Bcero.	десятин'в.	Высота кустар- ника.	вътвей.		KB.	До цвътенія.	При цвѣте- ніи.	При созрѣ- ваніи.	Bcero.
№№	До цвѣте- нія.	При цвѣте- ніи.	При созрѣ- ваніи.	Площадь	Число	1-ro c6opa.	2-ro c		На де		Число	Всѣхъ.	Спѣлыхъ.	Куб	бически:	хъ саж	енъ.
. 1	3	2	0	кв. саж. 120	22.000	37 ф.	1 п. 5 ф.	2 11 2 4	401/ n	1 арш. 7 в.	10	20	Ell	075	204		
													7½	375,0	主義:		609,0
2	2	2	0	))	22.600	37 ф.	1 п. 9 ф.	2 п. 6 ф.	411/10 II.	1 арш. 8 в.	20	20	7	177,0	234,0	-	411,0
3	2	4	0	))	23.840	1 п. 6 ф.	1 п. 10 ф.	2 п. 16 ф.	43½ п.	1 арш. 14в.	21	20	31/2	177,0	399,6	-	576,6
4	2	3	. 0	))	28.800	30 ф.	38 ф.	1 п. 28 ф.	25½ п.	1 арш. 13в.	22	23	33/4	235,0	293,6	_	528,6
5	2	1	1	))	26.840	34 ф.	1 п. 2 ф.	1 п. 36 ф.	301/з п.	1 арш. 10в.	18	18	4	249,6	117,4	140,6	507,6
6	0	4	0	n	33.000	1 п.	1 н. 10 ф.	2 п. 10 ф.	29½ п.	1 арш. 10в.	20	18	4		396,0	-	396,0
7	0	2	2	3)	25.200	1 п. 2 ф.	1 п. 5 ф.	2 п. 7 ф.	37¼ п.	1 арш. 9 в.	18	19	41/4	-	223,4	210,0	433,4
8	1	4	0	1)	25.200	34 ф.	1 п. 1 ф.	1 п. 35 ф.	32% п.	1арш.11в.	19	18	4	140,6	422,0	-	562,6
9	1	3	1	»	27.500	1 п.	1 п. 20 ф.	2 п. 20 ф.	39¼ п.	1 арш. 10в.	19	20	41/4	210,0	416,0	94,0	71,7
10	1	1	1	n	30.680	1 п. 3 ф.	1 п. 3 ф.	2 п. 6 ф.	30 п.	1 арш. 8 в.	17	18	5	280,0	200,0	83,0	563,0
		10															

Баблиотека Баблиотека СССР Какъ видно изъ таблицы, наибольшій урожай дала дѣлянка, получившая 6 поливокъ, двѣ изъ коихъ до цвѣтенія и четыре во время цвѣтенія; наименьшій же урожай дали дѣлянки, не получавшія воды до цвѣтенія, а равно получившія минимальное число поливокъ во время цвѣтенія; въ общемъ же, если комбинировать дѣлянки по группамъ съ однимъ числомъ поливокъ по одинаковымъ періодамъ, получается такая картина:

И въ этомъ году, слѣдовательно, подтверждается по опыту высказанное и въ прошломъ году заключеніе, что хлопчатникъ наиболѣе отзывчивъ на орошеніе во время цвѣтенія и отчасти до цвѣтенія, при чемъ количество оросительной воды для дѣлянокъ съ максимальнымъ урожаемъ хлопка колебалось отъ 450 до 580 куб. саж. на десятину; объясненіе такой зависимости урожая отъ поливокъ въ извѣстный періодъ вегетаціи хлопчатника приводилось уже въ отчетѣ за 1906 г.

5. Вліяніе предшествовавшихъ хлопчатнику растеній на урожай сырца въ 2-польномъ съвооборотъ.

Вліяніе чередованія хлопчатника съ другими полевыми растеніями, въ цѣляхъ опредѣленія наилучшаго плодосмѣна для хлопчатника, изучается на опытномъ полѣ уже 4-й годъ и результаты этого опыта продолжають получаться болѣе или менѣе одинаковыми за все время; такъ, оказывается, что больше всего урожай хлопка получился послѣ зеленаго удобренія, средній—послѣ маша, свеклы, пара и озимаго и худшій послѣ кунжута и хлопчатника же, какъ видно изъслѣдующей таблицы:

IO Ky.	Названіе растенія, предшество-	Площадь	Урожай	сырца.	% хлонка
Ne.Ne по порядку	вавшаго хлопчатнику.	дѣлянки.	Съ дѣлянки.	Съ десятины.	перваго сбора.
		Carrie arms	Пуд.	Пуд.	
1	По зеленому удобренію (машъ).	1/5 дес	9	45	51,7%
2	» свеклв	))	8	40	59%
3	» озимой пшеницъ	))	7,6	38	59% 55%
4	» пару черному	))	7,4	37	50,3%
5	« машу, на зерно	))	7,2	36	65,7%
6	» джугаръ	))	6,8	34	67,0%
7	» кукурузъ	))	5,6	28	53%
8	» просу	n	6	30	65,5%
9	» хлопчатнику	, ,	5,2	26	55%
10	» кунжуту	))	4,4	22	55,3%

Разумвется, въ болве удачный, чвмъ 1907 годъ, съ высокой температурой и продолжительнымъ безморознымъ періодомъ, результаты этого опыта были бы болбе убъдительны, такъ какъ тогда, несомнънно, урожай сырца по зеленому удобренію, по пару, машу былъ бы гораздо выше, а въ настоящемъ году на этихъ дълянкахъ и особенно по зеленому удобренію, всл'вдствіе пышнаго роста на ней хлопчатника, осталась масса коробочекъ, не успъвшихъ дозръть и погибшихъ отъ заморозка. Этотъ же опытъ показываеть, что въ годы съ сырымъ и холоднымъ лътомъ выгоднъе высъвать хлопчатникъ по джугаръ, машу-на зерно, по свеклъ, такъ какъ оказывается на такихъ поляхъ хлопчатникъ вызръваетъ раньше и процентъ хлопка 1-го сорта здъсь всего выше (67% по джугаръ, 66% по машу и пр., тогда какъ по пару-только 50% и по зеленому удобренію 51%). Чтобы построить по даннымъ этого опыта съвооборотъ наиболъе выгодный при культуръ хлопчатника въ Голодной степи, необходимо предварительно опредълить степень рентабельности здъсь зеленаго удобренія и проч. Какъ показалъ опыть съ удобреніями подъ хлопчатникъ, произведенный параллельно на дёлянкахъ въ 25 кв. саж. на опытномъ участкъ, при раннемъ посъвъ хлопчатника (8 апръля) результаты получаются болъе ръзкіе для сужденія о сравнительной рентабельности удобреній и, принимая ихъ, мы придемъ къ слъдующимъ выводамъ:

TRANSPORT DISCO	preta granda la compani.	Trees and the	19 00	ИЗ- ВЪ Б.	Стои	мость.	при-	
Какое удобреніе.	Количество удобренія.	Урожай въ пуд.	лио пу	Валовой и лишекъ въ сравн. съ контрольн.	Удобр.	Убор. излишы. урож.	Чистая при быль на деся:	
Зеленое удобреніе (запа-	250 w awaya	110	990	Руб.	Руб.		Руб.	
ханъ машъ)	350 п. сухорг. пещ. съ 4,3 пуд. азота.	110	330	+ 180	18	18	144	
Навозное	2.400 пуд. съ 12 пуд. азота.	87	261	111	20	11	80	
Контрольная дёл	0	50	150	+ 0	150 -	-	0	

Ясно, что въ годы съ благопріятствующими культурѣ хлопчатника условіями первенство останется за зеленымъ удобреніемъ, такъ какъ оно даетъ большій доходъ даже, нежели навозное удобреніе (на 64 р. съ десятины). Слѣдовательно, при построеніи сѣвооборота для хлопчатника въ Голодной степи съ внесеніемъ удобренія подъ хлопчатникъ преимущество должно быть отдано зеленому удобренію, въ видѣ запашки къ осени предшествовавшаго года бобоваго маша во время цвѣтенія. Въ отношеніи-же плодосмѣна наиболѣе выгоднымъ является для хлопчатника—чередованіе со свеклой, машемъ на зерно, озимой пшеницей, а при недостаткѣ воды и нехваткѣ рабочихъ рукъ и силь—съ чернымъ неудобреннымъ паромъ (однолѣтнимъ). Принявъ эти данныя, можно предложить слѣдующіе сѣвообороты для Голодной степи:

- I. 1 годъ: озимое + зеленое удобреніе.
- 2 » хлопчатникъ
- 3 » свекла + удобр. жмых. и суперфосфат.
- 4 » хлопчатникъ
- 5 » бобовое машъ на зерно.
- II. 1-озимое + зеленое удобр.
- 2-хлопчатникъ
- 3-машъ на зерно
- 4-хлопчатникъ + удобр.
- 5—свекла
- 6-машъ на зерно.
  - III. 1—свекла (или кукуруза)
- 2-машъ на зерно
- 3-озимое + зеленое удобреніе
- 4-хлопчатникъ
- 5-машъ на зерно
- 6-хлопчатникъ + удобреніе.

Какъ извъстно, въ Америкъ, судя по книгъ Burkett'a, («Хлопокъ» 1907 г.) съвообороть, подобный III-му, съ значительной площадью подъ бобовымъ (главнымъ образомъ коровій горошекъ или клеверъ), рекомендуется какъ правильный и довольно рентабельный. Необходимо добавить еще, что 5-лътній опыть посъва хлопчатника въ 2-польномъ съвооборотъ (черезъ годъ), безъ внесенія удобренія подъ хлопчатникъ или подъ предшествующія ему растенія этого съвооборота, показалъ съ очевидностью фактъ быстраго общаго пониженія съ годами урожайности всёхъ растеній сёвооборота, включая и хлопчатникъ кромъ того, особенно сильно выражается понижение урожаевъ хлопчатника послъ нъкоторыхъ растеній; такъ, сравнивая урожаи сырца 1905 года и 1907 г., мы видимъ, что, исключая абсолютно низкія цифры урожая отчетнаго 1907 года, когда хлопчатникъ былъ во всемъ Туркестанъ недозръвшимъ и убитъ заморозками, а волокно испорчено еще дождями, послъдовательность въ паденіи урожайности хлопчатника за эти три года совершенно измѣнилась.

PURE SEPTEMBER THE RESERVED	1905	годъ.	1907	годъ.
Названіе растеній, предшество- вавшихъ хлопчатнику.	Порядокъ урожайности.	Урожай на десятину (сырца).	Порядокъ урожайности.	Урожай на десятину.
		Пуд.		Пуд,
Зеленое удобрение	EGIO: STREET	THE REAL PROPERTY.	1	45 37
Черный паръ	1	149	2	37
Хлопчатникъ	2	92	10	26
Свекловица	3	89	3	40
Джугара	4	86	6	34
Кукуруза	5	78	8	28 .
Озимое	6	74	5	38
Кунжутъ	7	72	9	22
Просо	8	66	7	30
Машъ	9	62	4	36

Оказывается, что урожаи хлопка по кунжуту, джугарѣ, кукурузѣ и особенно по хлопчатнику же пали относительно ниже всего и, напримѣръ, мѣсто урожая хлопка по хлопчатнику со 2-го въ 1905 году перемѣстилось на 10-ое въ 1907 году, по кукурузѣ съ 5-го на 8-ое и т. д.; наоборотъ, урожаи по просу, машу и особенно по зеленому удобренію относительно стали выше и мѣсто урожая, напримѣръ, по машу передвинулось съ 9-го на 4-ое; наконецъ урожаи по пару, свеклѣ и отчасти по озимому сохранили свои мѣста.

Такое вліяніе на урожаи хлопчатника предшествующихъ ему культуръ легко объяснимо: повышение урожаевъ по зеленому удобренію и по машу зависить, конечно, оть обогащенія почвы азотомъ органическими веществами, вносимыми съ этими растеніями, и отъ улучшенія механическаго строенія почвы; постоянство урожаевъ посл'в свеклы, въроятно, можно поставить въ связь съ тъмъ, что она используеть гораздо болве глубокіе слои почвы, чвить хлопчатникъ, своей глубокой стержновой корневой системой (до 146 сант.), тогда какъ хлопчатникъ используетъ слой до 100 сант. и, кромъ того, захватываеть, по изследованіямъ Директора Одесскаго опытнаго поля г. Ротмистрова, большій объемъ почвы горизонтальными корнями; что касается пониженія урожайности хлопчатника по кунжуту, кукуруз'в и хлопчатнику же, то явленіе это зависить, въ первомъ случав, надо полагать, отъ того, что кунжутъ, какъ и хлопчатникъ, очень требовательное къ почвъ растеніе и къ легкоусвояемымъ элементамъ, оставляеть послъ себя мало корневыхъ остатковъ и въ плохомъ состояніи почву,-кукуруза же, обладая глубокой и широкой корневой системой, очевидно используеть питательные элементы не только въ области распространенія корней хлопчатника, но и шире и глубже его, такъ что послъ нея хлопчатникъ попадаеть въ объднъвшую почву. Наконецъ, понижение урожаевъ при посъвъ хлопчатника по хлопчатнику же безъ удобренія въ теченіе 3-хъ лъть, зависить отъ понятной причины-односторонняго быстраго объднънія почвы, какъ слъдствія однообразной культуры, возможнаго развитія спеціальныхъ для хлопчатника вредителей и бользней.

Изъ этого всего явствуеть, во-1-хъ, что какого бы чередованія растеній мы ни придерживались, хлопчатникь безь удобреція уже 3—4 года становится съять почти не выгодно на однихь и тъхъ же поляхь, а во-2-хъ, что посьвъ хлопчатника по хлопчатнику уже на третій годъ приводить къ такимъ низкимъ урожаямъ хлопка, что на 4-й годъ посьвъ хлопчатника на одномъ и томъ же мъсть принесь бы только убытокъ; поэтому-то при такой однообразной культуръ хлопчатника необходимо уже съ 3-го года вносить удобренія, главнымъ образомъ, азопистыя, органическія вещества и отчасти фосфорно-кислыя (зеленое удобреніе, жмыхи съ суперфсефатомъ и проч.).

**6.** Вліяніе способовъ посѣва хлопчатника. Въ виду того, что разсчетъ стоимости производства хлопка при разныхъ способахъ посѣва хлоп-

чатника приведенъ съ достаточною полнотою въ отчетъ за 1906 годъ, здъсь приводятся только результаты опыта 1907 года съ тъми же способами посъва: рядовымъ, разброснымъ, на широкихъ ручныхъ грядахъ (джоякахъ-сартовскихъ) и узкихъ грядахъ (механическихъ, сдъланныхъ окучникомъ).

Результаты сравненія этихъ способовъ и въ 1907 году опятьтаки говорять въ пользу посѣва хлопчатника рядовой сѣялкой въ сравненіи съ другими способами. Между прочимъ, въ 1907 году въ періодѣ ухода за хлопчатникомъ вмѣсто третьяго ручного мотыженія (кетменями) была съ успѣхомъ примѣнена пропашка междурядій Planet'омъ въ поперечномъ направленіи, кромѣ междурядій, и это сократило расходы по уходу за хлопчатникомъ процентовъ на 20.

Дълянки, предназначенныя для опытовъ посъва хлопчатника разными способами, подготовлялись къ посъву одинаково для всъхъ способовъ: каждая дълянка получила по одной глубокой осенней вспашкъ бр. Донскихъ плугомъ № 1, по одной мелкой вспашкъ весной (послъ предварительной поливки), по бороновкъ въ два слъда бороной зигъ-загъ; но дальнъйшія операціи по подготовкъ почвы были уже различны, именно: на дълячкъ съ рядовымъ посъвомъ пашня еще разъ заглаживалась тыльной стороной бороны и послъ уже производился посъвъ съмянъ хлопчатника (вымачивавшихся 11/2 сутокъ въ проточной водъ) съялкой Banner'а въ ряды съ разстояніями между ними въ 1 арш.; на дълянкъ съ разброснымъ посъвомъ моченыя съмена хлопчатника высъвались съвцомъ, какъ пшеница, разбрасываніемъ ихъ, послѣ чего проходили бороной въ два слѣда (съ заглаживаніемъ пашни); по д'влянк'в съ посввомъ въ узкія гряды, сдъланныя окучникомъ, послъ бороньбы проходили двойнымъ окучникомъ (тягой двухъ лошадей, направляемыхъ идущимъ впереди между ними погонщикомъ, а сзади-рабочимъ, удерживающимъ окучники въ бороздахъ) и дълали гряды; наконецъ, на дълянкъ съ посъвомъ хлопчатника на широкихъ сартовскихъ грядахъ (джоякахъ) послъ бороньбы по шнуру отбивались границы грядъ и дълались кетменями широкія (въ 11/2 арш.) гряды, между которыми проходили оросительныя канавки; послё этого по этимъ канавамъ пускалась вода и по границъ (верхней) смачиванія грядъ высаживались по бокамъ ихъ руками въ лунки замоченныя съмена хлопчатника, при чемъ лунка отъ лунки дълались на ¾ аршина, и съмена засыпались землей.

Посѣвъ произведенъ одновременно на всѣхъ дѣлянкахъ—26 апрѣля; всходы появились очень дружные, на рядовомъ посѣвѣ 30 апрѣля, тогда же, но не такіе ровные, замѣчены всходы на сартовскихъ широкихъ (2-рядныхъ) грядахъ, а на слѣдующій день появились еще болѣе неровные всходы на разбросномъ посѣвѣ и узкихъ грядахъ (съ посадкой хлопчатника въ лунки на гребнѣ грядъ). При прорѣживаніи всходовъ въ рядовомъ посѣвѣ оставлялось въ гнѣздѣ

по 2 куста, на сартовскихъ грядахъ-по 3, на узкихъ и на разбросномъ-по 2 куста.

Цвътение первое наблюдалось 29 іюня на рядовомъ посъвъ, послъ на сартовскихъ грядахъ и одновременно почти—на высокихъ мъстахъ дълянки съ разброснымъ посъвомъ, а 3 іюля— на узкихъ грядахъ.

Раскрытіе первыхъ коробочекъ наблюдалось на высокихъ мѣстахъ рядового посѣва 14 августа, тогда же открылись коробочки и на узкихъ грядахъ, потомъ на сартовскихъ грядахъ—19 августа и, наконецъ 21/VIII на разбросномъ посѣвѣ.

Первый сборъ быль произведень послѣ легкаго заморозка (—2,0° С.) 3 октября, и бывшихъ еще около 25 чиселъ сентября дождей, послѣ которыхъ волокно, однако, почти не пострадало, принявълишь мѣстами легкую желтинку.

Съ разныхъ дѣлянокъ первый сборъ производился въ слѣдующіе сроки: съ узкихъ грядъ—4 октября, съ рядового посѣва—8 октября, съ сартовскихъ грядъ—9 октября и съ разбросной дѣлянки—10 октября; второй сборъ—одновременно—производили на всѣхъ дѣлянкахъ—21 ноября. Результаты опыта сведены въ слѣдующую таблицу:

attongosene or to	Дъ.	кустовъ чтину.	Bu	Высота		вътвей.	Число боче	коро-	Уро	жай сы	рца.	На де-	%
од од куста.	Спѣ-	1-го сбора.	2-го сбора.	Bcero.	сырца.	-							
(annat.com)	Дес.	Чи на	HAR			Чв	250070	лыхъ.	П	удог	В Ъ.	Пуд.	coopa.
Рядовой посъвъ	1/4	38.000	1 ари	п. 5	В.	15	151/2	10	13	91/2	221/2	90	60%
На сартовскихъ ши- рокихъ грядахъ	1/4	40.000	1 »	2	))	151/2	18	6	8	7	15	60	50%
На узкихъ грядахъ— (окучникомъ)	1/4	34.000	1 »	3	))	131/2	14	8	6	71/2	13½	54	48%
Разбросной посъвъ	1/4	40.000	1 »	3	>>	13	12	6	8	41/2	121/2	50	60%

Мы видимъ, что при постви рядовой съялкой получился, во 1-хъ, большій урожай и, во 2-хъ, сырца перваго сбора, т. е. болке цъннаго, было 60% всего урожая, тогда какъ на грядахъ (широкихъ и узкихъ) только 48—50%; наименьшій урожай полученъ съ дѣлянки разброснаго посѣва; не лучше получился урожай на узкихъ грядахъ; вторымъ послѣ рядового посѣва по урожаю сырца стоитъ, какъ и въ прошломъ году, посѣвъ на сартовскихъ широкихъ грядахъ.

7. Сравненіе сортовъ хлопчатнина. Подъ посѣвъ различныхъ сортовъ хлопчатника было отведено 4-ое поле основного сѣвооборота, бывшее въ предыдущемъ году подъ кукурузой; поле это, подготовленное обычнымъ порядкомъ подъ посѣвъ хлопчатника, было раздѣлено на 10 дѣлянокъ, по 240 кв. саж. каждая, и на каждой дѣлянкѣ были вы-

свяны 15 апрыля рядовой свялкой отборныя свмена каждаго сорта хлопчатника, предварительно вымоченныя 11/2 сутокъ въ водъ. Всходы, вся вся в странции в промения температуры и прошедших в трехъ дождей, задержались и тъ, которые (какъ Кокъ-чигитъ, Ферганскій упландъ) появились на 7-8-й день, были ръдки, бользненны, тянулись туго; пришлось поле проборонить, чтобы помочь росткамъ выбиться наружу изъ- подъ почвенной корки, образовавшейся послъ дождей, и послъ этого только начали появляться слабые этіолированные всходы. Однако, многіе ряды были со столь ръдкими всходами, что производили впечатлъние случайнаго посъва и потому ихъ пришлось вновь пересъвать: отъ 1 до 5 мая большинство дълянокъ, особенно въ нижней (по уклону) половинъ пришлось перепахать и послъ вновь обсъять съменами тъхъ же сортовъ хлопчатника; въ общемъ получился довольно пестрый посъвъ и сравнительные выводы поэтому не могуть отличаться точностью. Въ настоящемъ году къ прежнимъ сортамъ хлопчатника, сравнивавшимся на опытномъполъ, были прибавлены еще двъ серіи-а) упланды: Кукъ-чудо, Мамонть, Пэть-Вильборнъ и Texas Burr, — б) туземные — Малля-гуза, Ташкентская гуза, Гуль-пахта и Бухарскій сорть; свмена твхъ и другихъ были присланы Туркестанской опытной станціей. Всв новые для опыта сорта (отъ Туркастанской станціи), къ сожальнію, до заморозка не дозръди и съ нихъ не пришлось собрать сырца хотя бы въ большомъ количествъ (для съмянъ); нъкоторые же изъ нихъ. напримъръ, Texas Burr, заслуживають вниманія по высокому % выходу волокна и нѣжности послѣдняго, Мамонтъ-по длинъ волокна и пр. Такимъобразомъ въ 1907 году на опытномъ полъ испытывалось всего 16сортовъ хлопчатника, именно:

А. Gossypium hirsutum: 1) 5 сортовъ акклиматизированнаго въ Туркестанъ упланда: Кокъ-чигитъ, Малля-чигитъ, Кара-чигитъ, Кукъ-чудо и смъсъ ферганскихъ; 2) 4 американскихъ сорта, прошедшихъ нъсколько поколъній въ Туркестанъ: Аунсъ-боллъ (Ounce boll), Петъвильборнъ, Мамонтъ и Техасъ-бурръ; 3) 4 американскихъ сорта отъ недавно полученныхъ оригинальныхъ съмянъ-Кing, Russeell, Peterkin и Hawkins.

Б. Gossypium herbaceum—3 сорта туземнаго хлопчатника: Ташкентская гуза, Малля-гуза и Бухарскій. Разумѣется, условія обработки, почвы ухода за хлопчатникомъ, поливки и пр. были для всѣхъ сортовъ одинаковы: посѣвъ быль одинъ для всѣхъ—рядовой сѣялкой съ междурядьями въ 1 аршинъ, продергиваніе произведено для сортовъ, посѣянныхъ 15-го апрѣля и давшихъ всходы 22—23 апрѣля, 6 мая черезъ 3 недѣли, при чемъ разстояніе между растеніями въ рядахъ оставлялись въ 1 аршинъ; мотыженій кетменями было произведено два, пропашекъ междурядій Planet'омъ—три и поливокъ дано три, кромѣ предпосѣвной. Результаты опыта съ сортами хлопчатника въ 1907 году таковы:

	annenografia e annana	янки.		Вр	емя.		й отъ созръ-	и 2-го	<b>3</b> 2	Урожай	і сырца съ нокъ.	-кийд
1224	Названіе сортовъ хлопчатника.	Площадь дѣлянки	Посѣва.	Bexota.	Цвътенія.	Созръванія.	Число дней всхода до со ванія.	Время 1-го з	Число кустовъ на десятину.	1-ro	2-го. р т а.	Всего.
	1. Кокъ-чигитъ	240 к.с.	15/IV	22/IV	26/vi	11/vm	110 ¹)	1-й cб.10/x	39.000	3 п. 5 ф.	2 пуда.	5 п. 5 ф.
	2. Малля-чигить	1/10 д.	»	23/iv	28/v1	14/viii	114	» »	_	3¼ п.	25 фун.	3 п. 35 ф.
-	3. Кара-чигитъ	1/10 Д.	»	n	29/vi	15/viii	115	2-й сборъ 25/хі	34.800	2¾ п.	2 п. 2 ф.	4 п. 32 ф.
	4. Смъсь ферганскихъ упланд	1/10 Д.	»	22/IV	26/vi	12/vIII	111	»	20.400	3 пуда.	1 п. 24 ф.	4 п. 24 ф.
	5. Кукъ-чудо	30 кв. с.	4/v	9/v	·14/vII	28/vIII	112 1)	»	Послѣ за	морозка с		чтожное
	6. Аунсъ-боолъ (Ounce boll)	1/10 Д.	15/IT	23/IV	29/vi	20/vIII	118	n	14.500	количе 1½ пуда.		2 п. 20 ф.
	7. Петъ-Вильборнъ	30 кв. с.	4/v	9/v	12/vII	28/vIII	112 1)	n	Послѣ за	морозка с количе		чтожное
	8. Мамонтъ	30 кв. с.	n	n	10/уп	»	112 1)	»	T	0	ж	e.
	9. Техасъ-Бурръ	30 кв. с.	»	10/v	13/vII	2/1x	118 1)	»	T	0	ж	e.
	10. King	1/10 д.	15/IV	23/IV	29/vi	11/viii	109	»	26.200	2 п. 3 ф.	1 п. 23 ф.	3 п. 26 ф.
	11. Russell	1/10 Д.	n	24/IV	2/vII	26/vIII	124	»	13.200	1 п. 25 ф.	10 ф.	1 и. 35 ф.
	12. Peterkin	<sup>1</sup> /10 Д.	»	»	30/vi	24/vIII	122	n	36.800	30 фун.	1 п. 11 ф.	2. п. 1 ф.
	13. Hawkins	1/10 Д.	»	n	n	27/vIII	125		21.000	1 п. 17 ф.	1 п. 18 ф.	2 п. 35 ф.
	14. Ташкентская гуза	30 кв. д.	4/v	9/v	12/vII	30/vIII	114 1)	»	Послѣ за	морозка со	брано нѣ	сколько
7	15. Малля-гуза	30 кв. с.	»	»	11/vII	29/уш	113 1)	>>	Једва тре	снувшихъ	коробо	чекъ.
	16. Бухарскій	30 кв. с.	4/v	10/v	12/vII	29/vIII	113 ¹)	»		ослѣ цвѣте ракомъ	нія вслѣдс корневой	

<sup>1)</sup> У этихъ сортовъ болье короткій періодъ созрыванія въ этомъ году объясняется позднимъ посывомъ ихъ и форсированнимъ развитіемъ ихъ благодаря болье жаркому времени во время ихъ роста и цвытенія. (Продолженіе таблицы см. на оборотть).

	copra.		локна.	волокна.	13	Кусто	овъ.	Короб	бочекъ.
Названіе сортовъ хлопчатника.	% перваго с	Съ десятины.	% выхода волокна	Качество вол	Длина волокна въ m. m.	Высота.	Число вѣтвей.	Beero.	Спѣлыхъ.
1. Кокъ-чигитъ	61%	39 пуд.	30,3%	Груб. кор.	24,1	1 ар. 8 в.	15	15	8
2. Малля-чигить	80%	39 пуд.	32,7	Тоже	24,3	1 ар. 11 в.	21	20	7
3. Кара-чигитъ	56,8%	29 пуд.	31,1	Нѣжн. ср.	27,3	1 ар. 10 в.	19	18	5
4. Смѣсь ферганскихъ упланд	65%	43 пуда.	En <u>la</u> C /	Средн.		1 ар. 8 в.	17	18	7
5. Кукъ-чудо	Послѣ зам	орозка соб	рано ничт	ожное кол	ичество.	1 ар. 10 в.	17	8	0,5
6. Аунсъ-боолъ (Ounce boll)	66%	35,6	34,6	хорош. дл.	25,6	1 ар. 8 в.	21	23	8
7. Петъ-Вильборнъ	Послѣ зам	орозка соб	рано ничт	ожное кол	ичество.	2 ap.	18	22	2
8. Мамонтъ	Т	0	ж	e.		1 ар. 9 в.	14	11	3
9. Техасъ-Бурръ	Т	0	ж	e.		1 ар. 12 в.	26	33	4
10. King	57%	40 пуд.	34,8	Ср. корот.	24	1 ар. 7 в.	18	21	7
11. Russell	50%	28 »	34,4	Нѣжн. дл.	25,9	1 ар. 11 в.	20	16	2
12. Peterkin	49,5%	16 »	33,2	Тоже ср.	25,0	1 ар. 9 в.	20	18	4
13. Hawkins	37%	19 »	35,4	Средн. дл.	26,0	1 ар. 14 в.	18	18	3
14. Ташкентская-гуза	Послѣ за	морозка	собрано	нѣс	колько	1 ар. 6 в.	17	13	1
15. Малля-гуза	} едва	треснув	шихъ ко	робо	чекъ.	1 ар. 6 в.	16	15	1
16. Бухарскій	Посохъ		ѣтенія во мъ корнев	лѣдствіе ой шейки.	заболѣва-	1 ар. 7 в.	20	7	0,5

Изъ этой таблицы видно, что больше всего получилось сырца отъ смъси «ферганскихъ» упландовъ (43 пуда на десятину), что объясняется темъ, что въ эту смесь у насъ входять главнымъ образомъ сорта: Кокъ-чигить, Малля-чигить и Кіпд (немного — Кара-чигить), отличающіеся урожайностью и скоросп'влостью; дал'ве по урожайности слъдуетъ King (40 пуд.), давшій въ этомъ году все же меньшій % волокна 1-го сорта (57%), но за то по выходу волокна (34,8%) при очисткъ опередившій всь остальные сорта, за исключеніемъ лишь развъ Hawkins'a; за нимъ идетъ Кокъ-чигитъ (39 пуд.) съ 61% волокна 1-го сбора и Малля-чигить (39 пуд.); высокая урожайность (сравнительно съ Кокъ-чигитомъ и King'омъ прошлыхъ лѣтъ) и необыкновенно высокій % волокна 1-го сбора (80%) послідняго сорта въ этомъ году однако, объясняются не его особенностями, а тъмъ, что этотъ сортъ былъ единственный непересъвавшійся вторично, а потому ранъе другихъ и созрѣвшій; видное мѣсто, далѣе, заняль новый у насъ сорть Аунсъ боолъ (Ounce boll), выписанный съ андижанскаго поля: хотя урожай его значительно ниже King'а и онъ болъе поздноспълъ, но высокій выходъ волокна при очисткъ (34,6%), порядочная длина волокна и отличныя качества послъдняго заставляють обратить на него особое вниманіе въ будущемъ (онъ, между прочимъ, обладаетъ еще большими по величинъ коробочками, чъмъ сортъ Russell; довольно высокій, сравнительно, урожай далъ и сорть Кара-чигить (29 пуд.) со своимъ довольно длиннымъ и нъжнымъ волокномъ; Russell, какъ и всегда, далъ малый % волокна 1-го сбора (50%), но въ общемъ-тоже порядочный урожай, а волокно у него было длинное, нъжное, шелковистое при выходъ изъ сырца въ 34,4%; наименьшій урожай дали, какъ и въ прежніе годы, сорта: Hawkins (19 пуд.) и Peterkin (16 пуд.), при чемъ первый даль волокна 1-го сбора только 37%, а второй 491/2%, въ общемъ, эти сорта для Голодной степи, повидимому, совершенно не пригодны. Такимъ бразомъ, сорта: King и Кокъ-чигитъ должны быть признаны единственными (изъ испытанныхъ на опытномъ полѣ) сортами, которые заслуживають въ Голодной степи широкаго распространенія, какъ по своей высокой урежайности, такъ и по скороспълости. и надъ ихъ улучшеніемъ, въ смыслѣ приданія волокну большей нѣжности и длины, слъдуеть потрудиться; а для этой цъли, повидимому. ихъ лучше всего гибридизировать сортами Russell и Ounce boll. которые отличаются длиннымъ и нъжнымъ волокномъ. На второй ступени стоять: Аунсь-бооль, Малля-чигить и отчасти Кара-чигить, а остальные не имфють практическаго значенія. Низкій урожай сырца

всъхъ вообще сортовъ хлопчатника въ 1907 году, какъ не разъ говорилось выше, объясняется главнымъ образомъ, позднимъ посъвомъ его, вслъдствіе сырой и холодной весны и ранними заморозками и дождями осенью, а затъмъ массовымъ пораженіемъ завязей хлопчатника гусеницей яровой совки (Heliothis armigera).

Эти обстоятельства заставляють рекомендовать на будущее время:

- 1) примъненіе самаго ранняго посъва хлопчатника, даже, пожалуй, безъ предварительной поливки поля подъ посъвъ (въ концъ марта).
- 2) уменьшение числа поливокъ, затягивающихъ рость хлопчатника, до возможнаго минимума, при чемъ центръ тяжести въ уходѣ за хлопчатникомъ перенести на обработку междурядій въ видѣ лишняго мотыженія или двухъ пропашекъ Planet'омъ съ цѣлью уничтоженія сорныхъ травъ и путемъ поверхностнаго рыхленія сохраненія влаги въ почвѣ, а равно—на глубокую вспашку полей подъ хлопчатникъ осенью.

Въ Америкъ между прочимъ эти пріемы считаются въ то же время и самыми раціональными въ борьбѣ съ гусеницей яровой совки; осенняя вспашка, ранній посѣвъ хлопчатника сѣменами скороспѣлыхъ сортовъ и частое рыхленіе почвы около растеніи, обезпечивая обильный и ранній урожай хлопка, оказываются и вѣрными средствами противъ распространенія гусеницы.

Кстати отмътимъ, что американцы Ouaintanc и Bruec въ своемъ трудѣ о коробочной гусеницѣ даютъ слѣдующій списокъ насѣкомыхъ, уничтожающихъ гусеницъ яровой совки: на первомъ мѣстѣ стоитъ оса—Polistes annularis, перетаскивающая огромное количество умерщвленныхъ ею гусеницъ, загѣмъ идутъ -паукъ Lycosa riparia, наѣздникъ—Deromyca angustipennis, муха Mallophora orcina и клопъ Metapodius femaratus; кромѣ того, называются и слѣдующіе враги гусеницъ: Homa, lodisca triguetra, Triphleps insidiosus, Hippodamia convergens, Solenopsis geminata-Chrisopa oculata и Calosoma scrutator.

Чтобы показать зависимость урожая хлопка и длину періода вегетаціи хлопчатника отъ всходовъ до созрѣванія отъ метеорологическихъ условій года, приведемъ слѣдующую таблицу:

Названіе сортовъ хлопчатника.	Посѣвъ.				Всходы.			Цвътеніе.			Созрѣваніе.			Въ 1907 г.				
	1904 г.	202	edo is Moist		На который день послѣ посѣва.			На который день послѣ всходовъ.			На который день послѣ всходовъ.			ько дней пе позд- 5 г.	мперат. по но- ше чѣмъ			
		1905 г.	1906 г.	1907 г.	1904 r.	1905 г.	1906 г.	1907 r.	1904 г.	1905 r.	1906 г.	1907 г.	1904 r.	1905 г.	1906 г.	1907 г.	На сколько дней созрѣваніе позд- нъе 1905 г.	Сумма температ. съ апръля по но- ябрь меньше чъмъ въ 1905 голу на
King	<sup>20</sup> /IV	3/v	15/IV	15/IV 5/V	8	6	8	8	54	53	62	67	100	_	103	110	13 д.	535° c
Кокъ-чигитъ	))	»	»	n	6	5	6	7	54	50	61	64	99	_	102	111	15 »	»
Малля-чигить	))	))	»	»	6	5	6	8	54	51	61	66	99		103	115	17 »	»
Кара-чигитъ	»	»	»	»	6	4	6	8	54	51	64	67	101	_	104	116	19 »	»
Смѣсь ферган- скихъ	n	»	»	n	6	7	6	7	55	50	61	64	103		105	112	15 »	»
Russell	n	»	»	»	12	7	12	9	60	60	69	69	121	_	127 20	125	19 »	»
Peterkin	»	n	»	»	12	8	12	9	59	59	67	70	112	_	123 16	123	23 »	»
Hawkins	»	))	))	»	8	6	9	9	62	60	68	68	115	_	125 17	125	20 »	n

Примѣчаніе. Первый заморозокъ въ 1905 г. былъ 16 октября, а въ 1907 г. уже 20 октября, такъ что безморозный періодъ въ 1905 г. былъ равенъ 195 днямъ (съ апрѣля по 16 октября), а въ 1907 г. только 181 дню - (1 апрѣля—2 октября).

Мы видимъ, что сумма температуръ въ періодъ роста и созрѣванія хлопчатника въ 1907 году была меньше таковой-же въ 1905 году на 585, и это въ связи въ облачностью и проч. отодвинуло созрѣваніе хлопчатника въ 1907 году на цѣлыхъ 13—20 дней.

Возможно, что при болъе раннемъ посъвъ такихъ скороспълыхъ сортовъ, какъ Кіпд и Кокъ-чигитъ, даже и въ 1907 году могъ-бы получиться урожай хлопка, особенно 1-го сорта, не ниже, чъмъ въ 1905 г. Слъдуетъ отмътить, что наиболъе устойчивымъ, въ смыслъ урожайности, являются сорта хлопчатника, давно акклиматизированные въ Туркестанъ, особенно Кокъ-чигитъ, Малля-чигитъ и смъсъ ферганскихъ; недавно же появившіеся здъсь американскіе сорта

даютъ очень сильно колеблющіеся урожаи хлопчатника, въ зависимости отъ погоды, особенно это относится къ сортамъ Hawkins и Russell. Эти послѣдніе два сорта обладаютъ къ тому-же и наиболѣе продолжительнымъ (въ среднемъ за 4 года) періодомъ отъ всходовъ до созрѣванія: Russell въ 120 дней, Наwkins въ 117 дней, тогда какъ Кіng только въ 102 дня.

- 8. Опытный участовъ въ 1 десятину, предназначенный для фенологическихъ наблюденій за хлопчатникомъ и др. полевыми растеніями, а также—для испытанія новыхъ растеній, въ 1907 году былъ занятъ главнымъ образомъ хлопчатникомъ Peterkin, съ которымъ и производились всв заложенные здѣсь опыты; кромѣ него, были выдѣлены грядки для коллекціонныхъ сортовъ хлопчатника, гдѣ, между прочимъ, изучались новые для нашего опытнаго поля сорта хлопчатника: Мамонтъ, Кукъ-чудо, Аунсъ-боолъ (Ounce boll) и, для сравненія, старые-Кокъ-чигитъ и Кингъ. Дѣлянки на опытномъ участкѣ были по 25 кв. саженъ; преобладающій посѣвъ (подъ опыты съ удобреніемъ, глубиной вспашки, съ чеканкой и пр.) былъ рядовой; уходъ, поливка и пр. обычные; посѣвъ хлопчатника Peterkin сдѣланъ 1—5 мая.
- а. Вліяніе удобреній на урожай хлопка. Всь удобренія, д'виствіе которыхъ на хлопчатникъ испытывалось на опытномъ участкъ, внесены были 15 февраля и мелко задълывались плужкомъ; навозъ, впрочемъ, былъ внесенъ еще въ декабръ мъсяцъ и тогда же запаханъ; количество удобреній вносилось по расчету на десятину навоза 2.400 п. (съ 12 пуд. азота), селитры—15 пуд. (съ 21/2 пуд. азота), двойного суперфосфата—12 пуд. (съ 5 пуд. фосфорн. кислоты), томасшлака 40 пуд. (съ 6 пуд. фосфорной кислоты), сърно-кислаго кали-10 пуд. (съ 4 пуд. калія), гипса—20 пуд., извести—100 пуд., ночного золота 600 пуд., перегнившихъ съмянъ хлопчатника-40 пуд., свъжихъ съмянъ хлопчатника—150 пуд., золы съмянъ хлопчатника—15 пуд. и золы стеблей хлопчатника—100 пуд. Хотя опытный участокъ подвергся наибольшему вліянію неблагопріятныхъ для хлопчатника метеорологическихъ условій осени 1907 г., такъ какъ здёсь былъ самый поздній посёвъ и при томъ контрольный сорть быль самъ по себъ наименъе урожаенъ, все же результаты опытовъ съ удобреніями на немъ заслуживають вниманія.

Самый большой эффектъ (см. таб. на стр. 55) произвело удобреніе ночнымъ золотомъ: почему получился наибольшій урожай (27 пуд.) съ десятины и хлопчатникъ на этой дѣлянкѣ рѣзко отличался отъ другихъ дѣлянокъ своимъ пышнымъ ростомъ, кустистостью и обиліемъ коробочекъ; вторымъ послѣ него по дѣйствію оказался сѣрно-кислый кали (26 пудовъ); затѣмъ идетъ по высотѣ урожая дѣлянка, удобренная золой сѣмянъ хлопчатника (25 пуд.), за ней—удобренная сѣменами хлопчатника (23 пуд.), далѣе—селитрой (22 пуда), навозомъ (21 пудъ), суперфосфатомъ (20 пуд.), известью (20 пуд.), томасшлакомъ (18 пуд.), контрольная (17 пуд.) и удобренная гипсомъ съ урожаемъ ниже контрольной (16 пуд.).

Rigers	янокъ.	322	Урожай	сырца.		пудовъ.	Кустъ.		Коробо- чекъ.	
Перечень опытовъ.	Площадь дѣлянокъ.	Число кустовъ на десятину.	1-ro c6opa.	2-ro c6opa.	Bcero.	На десятину пудовъ	Высота.	Число вътвей.	Bcero.	Спѣлыхъ.
а. Удобреніе.	Посѣв	ипокх а	атника по	здній 1—	5 мая.		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
1. Ночное золото	25 кв с.	34.000	7	51/3	121/3	+ 27	1 ар. 8 в.	16,0	14	2,5
2. Сърнокислый кали .	»	24.600	6	43/4	103/4	+26	1 ар.5 в.	13,5	10	0,5
3. Зола съмянъ хлоп- чатника	»	24.000	4	62/5	102/5	+ 25	1 ар.4 в.	15,5	12,5	2,6
4. Съмена хлопчат-	»	30.000	41/2	51/10	$9^{3}/5$	+23	1 ар.5 в.	11,5	9,0	1,6
5. Селитра	»	33.800	4½	44/6	91/6	+ 22	1 ар.8 в.	14,3	11,5	1,5
6. Навозъ	100 кв. с.	25.740	15½	19½	35	+21	1 ар.7 в.	15,0	10	1,5
7. Суперфосфатъ	25 кв. с.	31.000	$4^{2}/_{3}$	32/3	81/3	+20	1 ар.3 в.	14,0	8	1,5
8. Известь	»	34.000	4 0	$4^{1}/_{3}$	81/3	+19	1 ар.7 в.	18,0	12	1,8
9. Томасшлакъ	»	28.560	3	41/2	7½	+18	1 ар.3 в.	13,5	6	1,0
10. Гипсъ	»	24.000	4	23/4	63/4	— 16	1 ар.5 в.	14,0	8	0,6
	100 кв.с.	34.000	18	10	.28	17	1	14.0	10	
11. Контрольная	100 кв. с.	»	19	14	33	20	}1ар.6в.	14,0	10	1,2
б. Вліяніе глубины вспашки.	A BOOK A									
1. Безъ почвоуглуби- теля на 3 вершка .	250 кв. с.		1. п. 3 ф.	1 п. 8 ф.	2 п. 11 ф.	22 п.	_	-	acres (—	-
2. Съ почвоуглубите- лемъ на 4½ верш	250 кв. с.	_	1 п. 8 ф.	1 п. 10 ф.	2 п. 18 ф.	23 п.	_	_	-	-
в. Вліяніе задълки съчянъ.							1.00	1102	Software Co	1
1. Плугомъ	250 кв. с.	_	35 ф.	40 ф.	1 п. 35 ф.	18 п.	-	-	-	-
2. Planet'омъ	250 кв. с.	18 <u>5</u> 19	1 п. 13 ф.	1 п. 25 ф.	2 п. 38 ф.	28 п.	_	_	_	-
3. Рядовой съялкой .	250 кв.с.	in — 6	1 п. 8 ф.	1 п. 13 ф.	2 п. 21 ф.	24 п.	-	-	-	-
г. Вліяніе времени чеканки.					EE PAR				TARE	
1. 20 іюня	100 кв. с.	uu-in	1 п. 5 ф.	1 п. 15 ф.	2 п. 20 ф.	24 п.	¾ ф.	9,5	15,5	1,2
2. 15 іюля	»	WILL II	1 п. 15ф.	1 п. 23 ф.	2 п. 38 ф.	28 п.	1 ap.	12,5	13	1,2
-House Basevil										

entodolijajaja vija AS	янокъ.	3.12	Урожай	сырца.		пудовъ.	Кустъ.		Корбо- чекъ.	
Перечень опытовъ.	Площадь дѣлянокъ.	Число кустовъ на десятину.	1-го сбора.	2-го сбора.	Bcero.	На десятину пудовъ	Высота.	Число вѣтвей.	Bcero.	Спѣлыхъ.
3; 6:44		HE HIL	1 1000	elen e. le	ne sitasi				STOUR	
3. 1 августа (чеканка)	100 кв. с.	19619.0	1 п. 27 ф.	1 п. 26 ф.	3 п. 13 ф.	32 п.	1 ар.3 в.	15	10,6	2
4. Нечеканенный	»	121	1 п. 4 ф.	1 п. 7 ф.	2 п. 11 ф.	22 п.	1 ар.8 в.	17	13,0	2
д. Вліяніе сорта (зрѣлости) сѣмянъ.	as actors	gor <sub>a</sub> s Doubli		GBETSA TOBACK						
1. Съмена перваго сбора	25 кв. с.	100 - 111	5¾ ф.	5 ф.	10% ф.	26 п.	-	21-3 21-3		-
2. Съмена второго сбора	»	-	4 ф.	5 ф.	9 ф.	21 п.	OVE_YE	_		-
е. Вліяніе стерилизаціи сѣ- мянъ формалиномъ.					1.68 JA					
1. Стерилизац. форма- линомъ до мочки съмянъ	25 кв. с.	-	5¾ ф.	5 ф.	10¾ ф.	26 п.	100 H			
2. Стерплизац. фарма- линомъ послъмочки съмянъ	»		$4^2/5~\Phi.$	5 <sup>1</sup> /5 ф.	93/5 ф.	23 п.				_
ж. Сравненіе сортовъ хлоп- чатника.	Garage Garage						200			
1. Кокъ-чигитъ	25 кв. с.	_	8 ф.	6¼ ф.	14½ ф.	35 п.	NEW TON	ulsuffys	-	-
2. Кукъ-чудо	»	-	5 ф.	6 ф.	11 ф.	27 п.	1000	OI -		-
3. King	»		5¾ ф.	5 ф.	10¾ ф.	26 п.	r History Ma	-		-
4. Мамонть	»	-	5 ф.	31/з ф.	81/з ф.	20 п.	HERTA C			
5. Ounce boll	>>	-	3 ф.	4½ φ.	7½ ф.	18 п.	in The state of th	ours Ys	alass	-

Какъ видно изъ таблицы, наибольшій эффектъ получился отъ удобреній, съ которыми вносился въ почву главнымъ образомъ азотъ, напр., ночное золото, которое, какъ быстро дъйствующее вообще, повидимому, какъ нельзя лучше удовлетворяло требовательности хлопчатника на питательныя вещества въ усвояемой формъ.

Такимъ образомъ, наше предположение высказанное въ прошлогоднемъ отчетъ, что мъстныя почвы бъдны азотистыми соединеніями и потому должны быть отзывчивыми на нихъ, вполнъ оправдались при примънении метода Буссенго: "спрашивать мнъніе самого растенія". Дівиствительно, по новівшимъ анализамъ почвъ въ Голодной степи оказывается, что даже въ почвъ цълинной степи (около бугра Улькунъ-Салыкъ въ Голодной степи) содержатся всего азота 0,07%, т. е. почти въ 10 разъ меньше, чъмъ въ Воронежскомъ чернозем'; та же почва цълины оказалась бъдной и перегноемъ, котораго опредёлено въ ней около 0,9%, между темъ, какъ въ Воронежскомъ черноземъ его содержится около 11,0%, правда, по содержанію фосфорной кислоты наши почвы не уступають указанному чернозему, заключая около 0,16% Р2 О5, но, повидимому, она здёсь находится въ видь мало растворимыхъ "ретроградированныхъ" соединеній. Повидимому, болъе эффектное дъйствіе кислаго фосфата (вносился двойной суперфосфать) на нашей почвъ въ сравнени съ щелочнымъ (въ видъ томасшлака) фосфатомъ именно и объясняется темъ, что имъ отчасти нейтрализуется щелочность нашихъ почвъ, богатыхъ известью (щелочность почвъ опытнаго поля въ пахотномъ слов около 0,025%, выраженная по содъ); часть одноосновного фосфата [Са (Н2 РО4)2] при этомъ будеть использована, прежде чъмъ перейдеть, подъ вліяніемъ находящейся въ почвъ извести, (Са СО<sub>3</sub>), въ полурастворимый двуосновной фосфать (Са Н РО4), или даже въ нерастворимый трехкальціевый фосфать (Са, РО4). Что почвы, богатыя известью, очень скоро ретроградирують растворимые фосфаты въ нерастворимые и потому требують повышенія кислотности, чтобы дійствіе фосфорных удобреній производило на нихъ эффектъ, доказано давно извъстнымъ опытомъ Шталь-Шредера, — у него оказалось, что при смѣшеніи 2 гр. суперфосфата съ 8 гр. почвы, въ которой содержалось 0,84% Са СО3, въ силу ретроградацій, суперфосфать потеряль растворимой фосфорной кислоты—черезъ 1 день 37%, черезъ 10 дней 59% и черезъ 20 дней 62%.

Такимъ объясненіемъ, повидимому, только и можно обосновать дъйствіе сърнокислаго кали на наши почвы: внося эту физіологически—кислую соль, мы повышаемъ кислотность почвы, а вмъстъ съ тъмъ, быть можеть, заставляемъ часть нерастворимыхъ фосфатовъ почвы (фосфорной кислотой въ смыслъ "богатства" наши почвы не уступаютъ чернозему) перейти въ растворимыя, которыя и используются растеніемъ; впрочемъ, можетъ быть здъсь мы имъемъ и примъръ "замъны одного питательнаго элемента другимъ", въ смыслъ объясненія профессора С. Богданова, или непосредственнаго дъйствія самой сърной кислоты и пр. Однако, самый фактъ повышенія здъсь урожая отъ внесенія сърно-кислаго кали является установленнымъ и отмъченъ также въ работахъ Туркестанской опытной станціи. Въ отчетъ этой станціи за 1903 г. приводятся слъдующія данныя:

- 1) По суперфосфату озимая пшеница дала урожай въ 102<sup>3</sup>/4 пуда зерна на 1 десятину;
- 2) по сърнокислому кали получился урожай въ 108 пудовъ на 1 десятину;

- 3) хлопчатникъ по сърнокислому кали далъ урожай сырца въ 54 пуда на 1 десятину;
- 4) на контрольной дълянкъ собрано сырца 48 пудовъ на 1 десятину;
- хлопчатникъ по суперфосфату далъ урожай въ 63 пуда на -1 десятину и
- 6) хлопчатникъ по супрефосфату + сърнокислый кали далъ урожай сырца въ  $79^{1/2}$  пудовъ на 1 десятину.

Наши опыты въ Голодной степи съ удобреніями, между прочимъ, показали, что хотя въ почвѣ опытнаго поля въ минимумѣ и находится азотъ, но форма азотистыхъ удобреній не безразлична, въ смыслѣ рентабельности ихъ, такъ, селитра при всей высотѣ % усвояемаго азота оказала меньшій эффектъ, чѣмъ другія азотистыя, и это, конечно, зависитъ отъ легкой вымываемости ея изъ пахатнаго слоя водой при искусственномъ орошеніи; далѣе навозъ, вызывая сильный ростъ хлопчатника въ первый годъ по внесеніи удобренія, затягиваетъ созрѣваніе коробочекъ и потому даже при благопріятной погодѣ осенью на дѣлянкахъ по нему получается больше сырца 2-го сбора, не рѣдко отходящаго во 2-й сортъ.

Въ виду того, что удобреніе съменами хлопчатника дало относительно тоже порядочный урожай, можно бы было рекомендовать вносить и ихъ въ качествъ азотистаго и отчасти фосфорно-кислаго удобренія; но такъ какъ они дороги, пеудобпы для внесенія и медленно перегнивають, то ихъ выгоднѣе и цѣлесообразнѣе замѣнять хлопковыми жмыхами, внося послѣдніе вмѣстѣ съ суперфосфатомъ или золой съмянъ хлопчатника, или съ костяной мукой въ такихъ количествахъ на десятину: жмыховъ около 37 пудовъ, суперфосфата (двойного) около  $8^{1}/_{2}$  пуд., костяной мукой около 30 пудовъ и золы сѣмянъ хлопчатника около 12 пудовъ, при чемъ, если вносить эти удобренія мѣстно—въ рядки, подъ растенія (рядовой сѣялкой), то количество ихъ уменьшится вдвое.

Какъ уже сказано выше, внесеніе въ почву гипса и извести, въ виду богатства этими соединеніями нашихъ почвъ, конечно, излишне (гипса, по новъйшимъ анализамъ, въ почвахъ опытнаго поля содержится въ верхнихъ слояхъ до 0,1-0,2%, а на глубинъ 80-120 сан. до 10%, извести же около 13-15%).

б. Глубина вспашки подъхлопчатникъ хотя и вліяеть на урожай хлопка, повышая его въ случав приміненія глубокой вспашки или почвоуглубителя, но, повидимому, это вліяніе, не настолька сильно, чтобы этоть пріемъ можно было рекомендовать во всіхъ случаяхъ; можно полагать, что только глубокая вспашка осенью подъхлопчатникъ имбеть смыслъ, но ни въ коемъ случав не глубокая весенняя, такъ какъ значеніе послідней обычно сводится къ нулю слідующей же первой поливкой поля со всходами, а

иногда она, кром'в того, можеть принести даже и вредъ всл'вдствіе выворачиванія въ пахотный слой вредныхъ солей и заваливанія на недоступную молодымъ корнямъ растеній глубину верхняго культурнаго слоя, полнаго біологической жизнью; вообще на нашихъ поливныхъ почвахъ, съ постоянною ихъ наклонностью заплывать, гораздо важн'ве прим'внять рыхленіе верхняго слоя, въ ц'вляхъ удержанія въ нихъ влаги (что сокращаетъ число поливокъ), постоянной аэраціп и очищенія отъ сорной растительности.

в. Какъ и надо было ожидать, задёлка сёмянъ хлопчатника плугомъ—на большую, чёмъ 1 вершокъ глубину—очень рёзко понизила урожай хлопка, особенно по сравненію съ задёлкой ихъ Planet'омъ и сёялкой Banner'a, при чемъ глубина задёлки не превышала 3—5 сантиметровь.

г. В ліяніе чеканки на урожай хлопка сказалось въ этомъ году больше всего на дѣлянкѣ, получившей позднюю чеканку—отчасти въ періодѣ цвѣтенія; болѣе же ранняя чеканка хотя и дала нѣкоторый плюсъ въ сравненіи съ контрольной, но за то здѣсь созрѣваніе наступило позже, почему волокна перваго сорта меньше. Повидимому, чеканка въ ранній періодъ жизни хлопчатника обусловливаетъ усилиніе роста вегетативныхъ частей растенія, которыя при этомъ, дѣйствительно, дѣлаются «жирными» и раскидистыми, питаясь на счетъ плодоносящихъ вѣтокъ и самихъ коробокъ; въ сушности это напоминаетъ дѣйствіе «короткой» обрѣзки въ плодоводствѣ, когда, оставляя при обрѣзкѣ короткою вѣтку съ небольшимъ количествомъ глазковъ (почекъ), стремятся дать сильный рость одному-двумъ побѣгамъ, въ отличіе отъ «длинной подрѣзки — на плодъ», при чемъ оставляютъ длинныя вѣтки съ большимъ числомъ слабыхъ по росту боковыхъ побѣговъ, несущихъ на себѣ обычно плоды.

Слѣдовательно, примѣнять чеканку хлопчатника имѣетъ смыслъ въ тотъ періодъ, когда кустъ болѣе или менѣе сформировался (во время цвѣтенія). Подрѣзкой въ это время верхушекъ куста (и, вѣроятно, основныхъ вѣтвей) стараются добиться образованія большаго числа завязей и въ то же время снабдить ихъ большимъ количествомъ питательныхъ веществъ, которые безъ обрѣзки пошли бы иначе на удлинненіе и образованіе новыхъ вегетативныхъ органовъ въ верхушкѣ куста, безполезныхъ для плодоношенія, т. к. коробочки, если образуются здѣсь, то обычно не доразвиваются и не дозрѣваютъ; впрочемъ, окончательное рѣшеніе этого «стараго» и очень спорнаго вопроса (о чеканкѣ) нуждается еще въ дальнѣйшихъ опытахъ.

д. Вопросъ о томъ, какими сѣменами сѣять хлопчатникъ: первосортными или второсортными—рѣшенъ уже давно въ пользу первосортныхъ сѣмянъ и болѣе тяжеловѣсныхъ и крупныхъ; нашъ опытъ лишній разъ подтвердилъ выводы практики: на десятину получилась разница на 5 пудовъ сырца въ пользу дѣлянки, гдѣ были высъяны съмена 1 сбора, такъ что широко практикующійся въ Ферганъ пріемъ сбыванія съ заводовъ населенію вмѣсто съмянъ 1 сбора второсортныхъ влечетъ за собой колоссальныя потери въ урожаѣ; если считать, что лишь одна треть полей Ферганы засъвается съменами 2-го сбора, то и тогда населеніе не дополучаетъ на сырцѣ до 1½ милліоновъ рублей. Какъ видно изъ таблицы, при посъвъ хлопчатника второсортными съменами, помимо общаго уменьшенія урожая хлопка, получаются потери еще и на качествъ волокна, такъ какъ при этомъ получается больше волокна второго сорта, тогда какъ при посъвъ первосортными съменами повышается % сбора сырца 1 сорта.

е. О значеніи стерилизаціи съмянъ хлопчатника предъ посъвомъ мы уже говорили, указавъ на повышеніе всхожести съмянъ почти на 8% при стерилизаціи ихъ фармалиномъ до мочки; нашъ полевой опытъ показалъ, что примъненіе формалинизаціи на практикъ сопровождается также и повышеніемъ урожая, слъдовательно, этотъ пріемъ (къ тому же дешевый: бутылка 45% формалина въ 500 граммъ стоитъ не болъе 80 к., а ее хватитъ ведеръ на 6 воды) можно смъло рекомендовать, какъ выгодный пріемъ, предохраняющій отъ развитія грибковъ и бактерій, иногда приводящихъ хлопчатникъ къ заболъваніямъ.

ж. Наконецъ, о значеніи разныхъ сортовъ хлопчатника здъсь приходится лишній разъ сказать, что лучшими по урожайности и скороспълости сортовъ въ Голодной степи надо признать пока Кіпд и Кокъ-чигитъ, болье же высокіе урожам на опытномъ участкъ Мамонта и Кукъ-чудо, по сравненію съ урожаями на селекціонномъ участкъ, объясняются тъмъ, что эти сорта были высъяны на опытномъ участкъ на мъсяцъ раньше салекціонныхъ и Кокъ-чигита и Кіпд'а, высъянныхъ на опытномъ участкъ.

Изъ общихъ выводовъ этого года по полеводству слъдуетъ подчеркнуть слъдующіе:

I. Всего выгодные въ Голодной степи культивировать при условіи осолоненности почвы слъдующія растенія.

Изъ полевыхъ: 1) Люцерну—особенно съ удобреніемъ навозомъ и суперфосфатомъ. 2) Хлопчатникъ: Кіпд и Кокъ-чигитъ. 3) Свекловицу. 4) Кукурузу—Кутаисскій гибридъ, отчасти Бессарабскую. 5) Подсолнечникъ. 6) Табакъ. 7) Машъ на зерно и зеленое удобреніе. 8) Чумизу. 9) Ячмень озимый. 10) Иногда на новыхъ земляхъ—кунжутъ. 11) Арбузы и дыни—на новыхъ земляхъ и по люцернъ.

Изъ огородныхъ: томаты, огурцы.

Изъ садовыхъ: сливы (Джефферсонъ, Королева Викторія, Ажанъ). абрикосы (королевскій, душистый), отчасти персики, землянику (Лакстона скороспълка, Нобль и Шарплесъ).

Изъ лъсныхъ: американскій ясень, тополь, бълая акація, туть и карагачъ.

11. Наиболюе урожайными и скороспълыми сортами хлопчатника въ Голодной степи оказались King и Кокъ-Чигитъ. Если бы, напримъръ, Фергана начала съять сортъ King, то только благодаря высокому % выхода волокна у этого сорта (34% вмъсто обычнаго теперь въ Ферганъ выхода 30%) она могла получать въ годъ лишняго волокна около 765.000 пудовъ, на сумму около 7 мил. рублей.

III. Наиболте выгоднымъ способомъ поства является—рядовой (съялкой Banner'a), дающій на десятину противъ посъва руками на широкія сартовскія гряды—лишняго сырца процентовъ на 20—25 и сокращающій расходы по посъву и уходу за хлопчатникомъ процентовъ на 20.

Эти преимущества, если бы ими воспользовались хлопководы Ферганы, могуть сохранить при благопріятныхъ условіяхъ въ карманахъ производителей земледъльцевъ лишнихъ около 70-80 рублей на десятину въ первый же годъ и такимъ образомъ окупить затраты на покупку съядки Banner'a (50 руб.) и культиватора Planet'a (20 р.). а для всей Ферганы этотъ излишекъ далъ-бы десятки милліоновъ сбереженій. Разум'вется, введенію рядового пос'вва въ Ферган'в сильно препятствують общія условія тамошняго хозяйства: малоземелье, незначительные размъры отдъльныхъ земельныхъ участковъ каждаго хозяйства, при которыхъ пріобрѣтеніе сѣялки является слишкомъ большимъ расходомъ и не вполнъ соотвътствуетъ производительности ея, а затъмъ отсутствіе необходимаго сельско-хозяйственнаго кредита и достаточнаго количества лошадей, необходимыхъ для работы съялкой и планетомъ, такъ какъ преобладающимъ рабочимъ скотомъ являются не подходящіе для этихъ работь быки (хотя мы думаемъ, что и здёсь, какъ и въ Америкъ, лошадей можно замънить мулами).

IV. Наиболке выгодной при поскви хлопчатника въ Голодной степи оказывается слюдующая густота рядового посѣва сѣялкой:

- 1) при разстояніяхъ въ междурядьяхъ въ 1 аршинъ и между гнѣздами въ рядахъ тоже въ 1 аршинъ, больше урожая получается съ дѣлянокъ, гдѣ въ одномъ гнѣздѣ оставляется 2—3 растенія, а
- 2) при разстояніяхъ междурядій въ 1 аршинъ и между гнѣздами въ рядахъ въ ½ аршина выгоднѣе оставлять въ гнѣздѣ 1 растеніе.
- V. Лучшій урожай хлопчатника получается съ дълянокъ, поливавшихся больше всего въ періодъ цвѣтенія.
- VI. Большіе урожай хлопка получаются, когда хлопчатникъ слъдуеть за зеленымъ удобреніемъ, за свеклой, машемъ и за чернымъ паромъ.

VII. Лучшіе урожай хлопка получаются по внесеній подъ хлопчатникъ удобреній: зеленаго бобоваго (машъ), ночного золота, съмянъ хлопчатника, селитры и навоза.

### IV. Плодовый садъ, питомникъ, виноградникъ, пасѣка.

Маточный садъ опытнаго поля на 5-6-й годъ своего существованія объщаль съ весны очень богатый урожай: такъ обильно цвъли почти всъ деревья, что въ концъ марта и началъ апръля садъ казался совершенно бълымъ отъ цвътовъ; однако, вслъдствіе начавшихся тогда же дождей, повредившихъ опыленію, а затъмъ благодаря нападенію въ концъ апръля и началъ мая на груши, персики, яблоки и отчасти сливы листовой тли, появившейся на массъ деревьевъ, и, наконецъ, огромнаго испаренія и сухости воздуха въ іюнъ, іюль, дъйствіе которыхъ особенно сказывается при нашихъ осолоненныхъ почвахъ, значительная часть завязей плодовъ опала много плодовъ, кромъ того, получивъ солнечные ожоги въ іюль, падало уже въ стадіи, близкой къ ботанической спълости, и пр. Въ концъ концовъ урожай плодовъ получился посредственнымъ, самые плоды были малы, блъдной окраски и сплошь и рядомъ съ морщинами. Какъ и раньше, лучше всего были сливы и абрикосы, затымь не дурны были нъкогорыя груши, хуже яблоки и хуже всего персики, за исключеніемъ сорта Lord Palmerston (нектеринъ) и отчасти Lord Napier, которые отличались порядочною урожайностью и отличными вкусовыми качествами плодовъ-яркихъ, румяныхъ, сочныхъ и ароматныхъ. Изъ всъхъ 38 сортовъ яблонь маточнаго сада въ 1907 году плодоносили 27 сортовъ, остальные же не плодоносили и изъ 35 сортовъ т. н. Греберовскаго отдъленія плодоносили всего 20 сортовъ яблонь.

Изъ лътнихъ яблокъ самымъ раннимъ оказался сорть Sobs of Wine, собранный 28 іюня, плоды довольно хороши: большіе, завидной ярко-красной полосчатой окраски, ароматичны, довольно сочны, кислосладкіе, немного тверды и довольно лежки; дерево довольно урожайно. собрано лучшихъ яблокъ, не считая падалицы, мелочи и пр. 1 1/2 пуда съ дерева. Въ концъ іюня созръло "Безподобное Лангтона», плоды сняты 2 іюля и долежали до августа; дерево очень сильно плодоносить. Довольно обильно плодоносили также сорта: Чудо Хельмсфорда, Ренеть Лансбергскій, Гравенштейнское, Золотой зимній пармень, Ренетъ Орлеанскій, Ренетъ Шампанскій, Бельфлеръ желтый, Reinette Kulon's и Ренетъ Симиренко; но изъ всъхъ этихъ сортовь только ренетъ Симиренко, р. Орлеанскій и R. Kulon's можно назвать у насъ удачными, потому что всв остальные очень слабы въ лежкв, плохо держатся на деревъ, особенно, Гравенштейнское, Чудо Хельмсфорда и ренетъ Лансбергскій плоды котораго къ тому же (отчасти и у Ч. Хельмсфорда) загнивають даже на деревъ.

Ренеть Симиренко, впервые плодоносившій, даль съ дерева два пуда чистыхь, среднихь по величинь яблокь, долежавшихь у нась въ неприспособленномь помъщеніи почти до Пасхи.

Плоды подъ назв. Ренетъ Кулона изъ Греберовскаго отдѣленія, напоминавшіе Кальвиль бълый, —были завидной величины, нѣжно бѣловатые, слегка ребристые, сладковатые, сочные; дерево довольно урожайно. Ренетъ Шампанскій далъ очень маленькіе невзрачные плоды, какъ и Бѣлый розмаринъ, плоды котораго однако долежали у насъ до Пасхи и были хорошаго вкуса сочны, пріятнаго аромата.

Въ виду того, что многія деревья имѣли очень густую крону, и вѣтви ихъ перепутывались, осенью 1907 года пришлось во всемъ маточномъ саду сдѣлать подрѣзку; тогда же была произведена очистка штамбовъ и вѣтвей щеткой и послѣ—обмазка ихъ известковымъ молокомъ, повторенная также и весной.

Интересно отмътить, что деревья-груши и яблоки, обмазанныя смъсью 1: 6 карболинеума съ известковымъ молокомъ и до этого дававшіе слабый прирость, послі обмазки замітно усилили свой рость, были густолиственны и вообще выглядели здоровыми. Изъ грушъ всего созръла (9 іюля) «Слава Въны»: дерево дало пудъ довольно большихъ, красивыхъ румяныхъ грушъ, довольно сочныхъ и сладкихъ. Затъмъ въ августъ (20) собрана часть созръвшихъ большихъ, лимонно-желтыхъ грушъ Луціусъ; несмотря на привлекательный видъ наши "Луціусъ" на вкусъ были терпки, мало сочны съ гнъздами одеревянъвшей мякоти. Очень хороши по вкусу были груши Зефиринъ Грегуаръ, созръвшія около 20 сентября; плоды этой груши небольшіе но очень ароматичны, сочны и нъжны, хотя, правда, лежатъ не долго какъ и Луціусъ. Но лучшіе плоды и въ этомъ году дали груши "Оливье-де-Серт", Дюшест зимняя, Деканка зимняя, отчасти Жозефина Мехельская и, пожалуй, Берэ-Диль; особенно заслуживаеть вниманія въ Голодной степи Оливье де Серъ: плоды его здъсь, несмотря на вліяніе солонцеватости почвы на вкусъ (терпкость и пр.) здѣшнихъ плодовъ, отличались сравнительно большой величиной, были необыкновенно нъжны и сочны по вылежкъ и сохранялись у насъ при плохихъ условіяхъ до средины марта, а нѣкоторые до апрѣля; кромѣ того, сорть этоть средней урожайности. Всего изъ 48 сортовъ грушъ маточнаго сада плодоносило въ 1907 году 32 сорта, а изъ 28 сортовъ Гриберовскаго отдъленія—16 сортовъ.

Изъ сливъ раньше другихъ поспълъ сорть японскихъ сливъ Ogon (16-го іюня), затъмъ Ботанъ, Галь и Сатсума; лучшими изъ этихъ сливъ являются Ogon и Ботанъ: плоды ихъ крупные, шаровидные, у перваго золотисто жельтые, сладкіе и сочные; урожайность средняя— около пуда съ дерева. Наиболъ урожайными оказались: Королева Викторія, давшая съ одного дерева девять пудовъ, Джефферсонъ—восемь пудовъ съ дерева; плоды обоихъ сортовъ довольно эффектны, особенно у Джефферсонъ—очень крупные, красивые, желтые у Джефферсонъ и розово-красные у Королевы Викторіи; на вкусъ сливы К. Викторіи грубоваты, а Джефферсонъ—провосходные (спълые). Очень

хорошъ также сортъ сливъ Ажанъ съ нѣжными, сладкими и сочными на вкусъ плодами, съ дерева этихъ сливъ собирали 2—4 пуда. Другія сливы: Ренклодъ Альтанъ, Мирабель Флотова, угорка обыкновенная и итальянская, опошнянки и др. плодоносили плохо и подверглись нападенію птицъ, сильно уничтожавшихъ плоды. Вишни и черешни вообще плохо удаются въ Голодной степи, первыя страдаютъ камедетеченіемъ и плохо плодоносятъ, а вторыя, хотя и прекрасно растутъ, тоже слабо плодоносятъ; кромъ того, скворцы и воробьи почти никогда не даютъ собрать хотя немного вишни и черешни, склевывая ихъ иногда впрозелень.

Лучшимъ по урожайности абрикосомъ является у насъ сорть Королевскій, а по вкусу—Душистый и сахарный Голубскій; съ одного дерева Королевскаго собрано было абрикосовъ 7 пудовъ, при чемъ плоды были крупные, желтые, правильные, хотя не очень сочны, слегка крахмалисты; зато плоды Душистаго абрикоса были очень нѣжны, румяны, сочны и ароматны, не уступая по вкусу другому отличному у насъ, мало урожайнома сорту — Персиковому. Созрѣваніе "Королевскаго" началось въ первыхъ числахъ іюня, остальныхъ около 10 іюня.

Повидимому, сливамъ (особенно сортамъ "Королева Викторія, Джефферсонъ, Ажанъ, Одоп") и абрикосамъ (сортамъ "Королевскому, Душистому, Персиковому, а отчасти, въроятно, мъстныхъ ходжентскихъ сорторъ: Буаби, Кондакъ, Махраби, а затъмъ нъкоторымъ сортамъ персиковъ, какъ то: Lord Palmerston и Lord Napier, давшимъ въ 1907 году порядочный урожай въ 10-хъ числахъ августа (особенно первый), замъчательныхъ по вкусу плодовъ (голые нектарины), а также туземнымъ ходжентскимъ: Ругани Гау, Инжиръ-Шефтали, Міянъ Сали и Акъ Лючакъ—можно предсказать, на основаніи данныхъ опытнаго поля, большую будощность въ Голодной степи, нежели яблонямъ, грушамъ и вишнямъ, за исключеніемъ, быть можетъ, нъкоторыхъ сортовъ яблонь и грушъ. Впрочемъ айва на опытномъ полъ удается также отлично, и въ этомъ году, напримъръ, сорть Reas Mammout De Bourgeont и Champion дали очень много плодовъ, особенно R. Мамтичнь, и при томъ огромной величины.

Ортахъ грецкій въ саду и по полевой дорогѣ развивается плохо, страдая то отъ избытка влаги, то отъ морозовъ. Не важно чувствуетъ себя здѣсь и винная ягода, также фисташникъ.

#### Всего въ 1907 году плодоносило деревьевъ:

Изъ	125	яблонь	только		90	изъ	нихъ	хорошо		46	шт.
))	157	грушъ	, ))	0.0	91	))	»	))		30	))
, ,,	79	сливъ	))		54	))	»	))		15	)
»	9	айвы	))		6	))	»	))	1	4	))
"	6	MUHMUHHH			9	n	"	, ,		3000	- 1



Рис. 8. Плодовый питомникъ опытнаго поля.



Рис. 9. Улей Дадана на пасѣкъ хозяйства опытнаго поля.

Изъ	29	персиковъ то	лько .	o ispi	8 из	въ нихъ	хорон	10	1	шт.
>>	23					»				
»	12	черешенъ	»	19	3 0	»	»	oscal.	-0	))
»	22	вишенъ	· »		5 »	»	)	ag. at	-	))
))	15	орѣховъ	» .	•	3 »	» »	» »	arana)	100	))
)	5	винныхъ ягодъ	»	. 12 -		»	» »	May.	-	»
Итого	482	штуки	»·	2	71 »	»	))	godi- h	99	шт.

Новый плодовый садъ, заложенный 1 марта 1907 г. на старой семилътней люцернъ, подлежавшей перепашкъ вслъдствіе изръживанія, занимаеть десятину рядомъ съ питомникомъ и окруженъ со всъхъ сторонъ деревьями; такъ какъ онъ заложенъ съ промышленной цълью, то на немъ посажены изъ питомника опытнаго поля и будутъ садиться деревья только зарекомендовавшихъ себя въ Туркестанъ и на опытномъ полъ сортовъ, именно:

Штамбовыя.

		Штам	008ыя.			nup.	unt	1.			
іосажены:	изъ	яблонь	-Сары-синапъ.	10 шт.	; Ренетъ	Ша	мпа	нс	кit	i e	шт.
»	))	n	Бельфлеръ	10 »	Бельфл	еръ				. 8	3 >>
,			Кандильсенапъ	10 »	Кандил	ьси	нап	ь.		. 6	) »
»			Ренетъ Сими-								
			ренко	10 »	Ренетъ	Си	миј	рен	КС	8	))
)			Парменъ Золо-								
			той Зимній.	10 »	Бойкен	ъ.				8	))
»	))	»	Кандиль	10 »	Кальви	ль [	зим	ній	i.	8	)))
		»	T v ··· T								
			ринъ	10 »	Бѣлый	Роз	мар	ин	ъ.	9	))
			— Жозефина M								
		xe	льнская . 10 шт	.: Дек	анка зи	мня	я.			8	шт.
				Com	ъ Жерм	енъ				9	))
			a areanth an		вье де						
					гамотъ						
» ]	изъ	сливъ	— Реклодъ зел	e-							
			ный 1 шт	.; Ажа	анская					2	шт.
				Бота	анъ.		1.434	100	0	3	))
		Partition		к. І	Викторія	1 .		5.		5	))
				Пже	emmenco	нъ		ovina		2	))
» I	таъ а	брикосс	овъ—Буаби 1 шт	.: Кон	лакъ.	1,051	an	OH		1	))
god) equal	8111	Jan Janes	HOR THE	Кор	олевскії	i .		raid		1	))
» I	и чег	ерсик	–Ругани-гау 1 шт	.; Мія	нъ Сали			0		1	»
Будут	ъп	одсажен	ны въ 1908 году	изъ	грушъ	_0	лив	ье ;	де	C	еръ

5 штукъ, Слава Вѣны—5 штукъ; изъ абрикосовъ: Королевскій—1 шт., Душистый—1 шт., персиковый—1.

штамб.—10 штукъ, Дюшесъ Зимняя—10 штукъ, Зефиринъ Греугаръ

Каплики.

П

Изъ персиковъ: Lord Palmerston и L. Napier по 1 дер. и Акъ-Лючакъ, послъдній рядъ займуть вишни, черешни и айва.

Въ новомъ саду отдано предпочтение карликовымъ, такъ какъ въ Голодной степи, въ виду частыхъ и сильныхъ вътровъ и суховъевъ, высоко штамбовыя деревья часто страдаютъ отъ нихъ, ломаясь, усыхая въ верхушкахъ и теряя массу плодовъ — падалицы.

При посадкъ деревьевъ весной 1907 года, между прочимъ, заложены слъдующія опыты:

- 1) в лія ніе удобреній на плодовыя деревья: навоза, селитры, суперфосфата, сърнокислаго кали, томасшлака— отдъльно и въ комбинаціи;
- 2) вліяніе закладки слоевъ почвы при посадкъ: а)—верхняго—внизъ посадочной ямы, б)—нижняго—внизъ и в)—смъшеніе обоихъ слоевъ, и
- 3) вліяніе подръзки корней при посадкъ: а)—обычный, б)—по Стрингфелло—очень короткій и в)—безъ обръзки.

Нѣкоторая разница замѣтна была уже съ осени 1907 года въ приростѣ деревьевъ съ опытными пріемами, но мы выводовъ дѣлать пока не считаемъ возможнымъ, оставляя ихъ до будущаго года, когда результатъ опытовъ будетъ рельефнѣе. Междурядья въ новомъ плодовомъ саду перепаханы осенью 1907 года и будутъ заняты въ первые 4 года: одни—паромъ, другія—хлопчатникомъ, третьи—люцерной, четвертыя—машемъ, пятыя—арбузами и дынями, шестыя—картофелемъ, седьмыя—земляникой, смородиной и малиной, восьмыя—школкой сѣянцевъ плодовыхъ деревьевъ и девятыя—питомникомъ плодовыхъ деревьевъ.

Дълается это, во-первыхъ, для использованія междурядій, такъ какъ на старомъ маточномъ саду выяснено, что содержаніе ихъ подъ чернымъ паромъ при условіи искусственнаго орошенія и невыгодно, и очень хлопотливо и не всегда цълесообразно, особенно въ первые годы жизни плодоваго сада; во-вторыхъ, для изученія вліянія разныхъ междурядныхъ культуръ на прирость плодовыхъ деревьевъ; въ-третьихъ, для выясненія доходности при такихъ культурахъ самого сада и этихъ культуръ и, въ-четвертыхъ, для выработки, если возможно, съвооборота для сада съ занятыми полевыми растеніями междурядья сада и даже виноградника (въ первые годы) могли бы эксплоатироваться съ замътной выгодой и малымъ ущербомъ для почвы междурядій, такъ:

- 1) 1-й годъ—черный паръ;
  - 2-й » хлопчатникъ;
  - 3-й » -машъ.
- 2) 1-й годъ—люцерна или шабдаръ (персидскій клеверъ);
  - 2-й » то же или дыни—арбузы;
  - 3-й » —дыни, арбузы или хлопчатникъ;
  - 4-й » хлопчатникъ, паръ, или опять шабдаръ.

Питомникъ плодовый (рис. 8) увеличился въ 1907 году на 500 саженцевъ, окулированныхъ осенью 1906 года на своихъ дичкахъ, вырощенныхъ въ школкъ около плодоваго сада, а всего къ январю 1907 года въ немъ было 2.200 саженцевъ. Осенью 1907 года и весною 1908 года впервые изъ питомника было отпущено крестьянамъ с. Спасскаго, Духовского и др. 800 саженцевъ на сумму около 80 рублей (около 150 саженцевъ было роздано бъднъйшимъ крестьянамъ безплатно), при чемъ цъны на саженцы были установлены Туркестанскимъ Управленіемъ Земледълія и Гос. Имуществъ такія:

- 1) плодовыя деревья:
- а) сильныя однольтки. . . 10 коп. шт.
- в) слабыя однолътки . . . 10 » »
- е) сильныя » . . . 15 » »
- 2) декоративныя:
- а) однолътки. . . . . 5 коп. шт. и 4 руб. сотня.
  - в) 2-хъ лѣтки и старые. 10 » » » 8 » »
  - 3) дички плодовыхъ деревьевъ:
    - а) слабые . . . . 1 руб. 50 коп. сотня.
    - б) сильные . . . 2 » -- » »

Отпускались крестьянамъ изъ питомника больше всего Кандиль-Синапъ, Бельфлеръ, Р. Симиренко, Р. Баумана, Розмаринъ, Парменъ, Гравенштейнское и др. сорта яблонь; грушъ было мало, тоже сливъ и персиковъ.

Въ виду того, что питомникъ разбить на очень осолоненномъ полѣ, приростъ саженцевъ въ немъ очень слабый, много изъ молодыхъ саженцевъ, перенесенныхъ отсюда, гибнетъ, несмотря на хорошій уходъ (3-хъ-кратное мотыженіе кетменями кругомъ ихъ, 2 пропашки междурядій Planet'омъ и частыя поливки 5—6 разъ въ лѣто), — придется въ будущемъ перенести его на другое мѣсто, вѣроятно, въ междурядья новаго плодоваго сада, гдѣ саженцы по вспаханному люцернику должны пойти превосходно.

Въ школъ съянцевъ къ осени имълось первосортныхъ дичковъ:

яблонь . . . . 600 штукъ грушъ . . . . 400 » персиковъ . . . 500 »

урюка . . . . . 400 »

Часть съмнцевъ уже въ концъ іюля была готова для окулировки и въ августъ дъйствительно окулировано:

яблонь —120 шт. — сортами: Р. Симиренко, Р. Шампанскій, Бельфлеръ, Розмаринъ, Кандиль;

грушъ —120 шт. — сортами: Оливье де Серъ, Дюшесъ д'Ангулемъ, Дюшесъ Зимній, Зефиринъ Грегуаръ, С. Жерменъ, Слава Вѣны;

сливъ—165 шт. на урюкъ сортами: Королева Викторія, Жефферсонъ, Ogon, Ажанъ, Ренклодъ, Ботанъ;

абрикоса—136 шт. — сортами: Королевскій, Р. d. Nanci; персика —130 шт. — сортами: Lord Palmerston, L. Napier и др.

Лѣсной питомникъ увеличился въ 1907 году на 800 деревьевъ преимущественно тополей и карагачей; всего же къ январю 1908 года въ питомникѣ было 5.470 деревьевъ, изъ коихъ тута было 1.600 деревьевъ, тополя—1.000 штукъ, карагача—385 штукъ, адамоваго дерева—1.500 шт., ясеня—200 шт., клена—200 шт. и др.

Кром'в посадокъ въ питомник'в въ 1907 году было высажено на пастбище, по дорогамъ и арыкамъ изъ питомника и черенками тополя около 2.000 шт., акаціи до 800 шт., карагача — 1.000 шт., зоо шт. ясеня, 50 шт. клена и около 2.000 шт. мекморы для изгороди.

Затъмъ въ тутовникъ подсажено на опустъвшихъ рядахъ (по осолоненнымъ мъстамъ) около 1.000 шт. 2-хъ-лътняго тута, очень значительная часть котораго, однако, лътомъ того же года посохла (на солонцахъ).

Въ виноградникъ къ началу 1907 года насчитывалось 224 куста европейскихъ сортовъ винограда, а весной 1907 года было подсажено 410 чубуковъ туземнаго сорта изъ Ходжента; но въ виду того, что виноградникъ у насъ разбитъ, какъ и питомникъ, на солонцъ, около 250 шт. изъ этихъ чубуковъ не принялись, такъ что къ концу 1907 года имълось 384 куста винограда.

Изъ европейскихъ сортовъ винограда, которые вообще здѣсь растутъ хуже туземныхъ, нѣкоторые (пересаженные съ другого мѣста въ 1905 году) уже плодоносили въ 1907 году, такъ, около 23 іюля почти поспѣлъ виноградъ Савиньонъ, давшій мелкія, бѣлыя сладковатыя ягоды, тоже—Рислингъ—болѣе урожайный въ 1907 году, затѣмъ Саперави — съ мелкими, кислыми ягодами и среднимъ урожаемъ, Кабернэ — сильно плодоносившій и Мальбекъ — еще болѣе, давшій урожай чернаго, кисло-сладкаго винограда. Масса винограда была склевана птицами. Одинъ рядъ туземнаго винограда начали разводить по имеретинскому способу — около бѣлой акаціи, чтобы вѣтви плелись въ двѣ стороны по вѣтвямъ дерева, другія по-ряду—въ разстилку и одинъ по-Гюйо.

Изъ всёхъ сортовъ винограда наиболёе устойчивымъ здёсь въ смыслё приспособленія къ почвё и пр., судя по % погибшихъ кустовъ, оказываются:

Изъ европейскихъ: Мальбекъ. Саперави, Рислингъ, Кабернэ и отчасти

Изъ туземныхъ: Черный Тагоби. Бълый Хусайне, Бълый длинный, Ангуръ Сія и отчасти Таифи.

Наименъе же устойчивыми оказались лозы:

Европейскія: Мускать розовый, Сотернъ, Шасла бълая, Мускатъ венгерскій, Красный крупный. Пино-гри, Изабелла.

Опорто и Савиньонъ.

Туземныя: Акъ Чильги, Диль Кавтаръ, Кишмишъ бѣлый,

Въ виду слабаго прироста виноградныхъ кустовъ и постояннаго подсыханія ихъ, благодаря дъйствію солонцеватой почвы предполагается перенести виноградникъ на другое мъсто, по старому распахиваемому люцернику, и придерживаться впредь при разведеніи винограда посадки его не чубуками прямо на мъсто, а укоренившимися изъ чубуковъ 1-лътними кустами.

Огородъ и ягодникъ. Въ 1907 году въ огородномъ участкъ введенъ такой съвооборотъ:

1-й годъ по навозному удобренію-капуста; 2-й-картофель, томаты; 3-й-огурцы, арбузы, дыни, перецъ, горохъ, фасоль; 4-й-морковь, свекла, петрушка, лукъ, шпинатъ, салатъ.

На каждомъ изъ участковъ этого плодосмъна сравнивалось нъсколько сортовъ даннаго растенія и результаты этого года таковы:

1) Изъ капустъ лучше другихъ удались:

Ранняя «Первенецъ» . ) Поздняя Гендерсона . кочанная Брауншвейгская . . . . плохія: Савойская пудовая позд. Волгарская ран. . . . . . . кочанная

совсвиъ плохая: цввтная Гаагская;

2) изъ томатовъ: «Король раннихъ»-очень урожаенъ, но томаты не вкусны, съ пустотами, сладковаты. «Микадо»—урожаенъ, плоды крупные, сочные, нъжные. «Перфекціонъ»—плоды средніе, кисловатые.

«Гумбертъ»—плоды плотные, сред. урожайные. «Спаркъ Ирлеане»—кустъ стойкій, плоды какъ яблоки, твердые, сочные, вкусные;

- 3) изъ огурцовъ болъе урожайными оказались мъстные и Аксельскіе. Ягодникъ состояль въ 1907 году изъ:
  - а) 37 рядовъ земляники и клубники, при чемъ въ 1907 году подсажено 6 рядовъ.
  - b) 20 рядовъ смородины (200 кустовъ), изъ коихъ десять подсажено въ 1907 году.
  - с) 6 рядовъ крыжовника (25 кустовъ).

Изъ *земляники* лучшими сортами по урожайности, скороспѣлости и вкусу ягодъ у насъ оказались: скороспѣлка Лакстона, Шарплесъ и Нобль.

Смородина и прыжовнить здёсь удаются плохо, лучше другихъ удается смородина «Чудо Туркестана», а изъ крыжовника—Американскій горный. Земляника около 1 апрёля цвёла почти вся, «скороспёлка Лакстона» и Шарплесъ начали созрёвать уже около 20 апрёля.

Пасъка (рис. 9). Начало основанія пасъки на опытномъ полъ положено было лишь весной отчетнаго года (1907). 2-го мая привезены были изъ города Джизака отъ І. А. Бржезицкаго два улья Дадана. Семьи пчелъ скоро обжились и изъ большой изъ нихъ 1 іюня отроился рой, посаженный въ самодъльный улей; вскоръ отроился рой и изъ другого улья, эта новая семья была отдана мъстному крестьянину любителю-пчеловоду Косыхъ. Пчелы за взяткомъ летали иногда очень далеко, но больше всего собирали нектаръ съ ближайшихъ растеній: гречихи, нарочно посъянной, фацеліи, люцерны, кукурузы, хлопчатника (здёсь пчелы, какъ намъ не разъ приходилось наблюдать, ръдко залъзали въ зъвъ цвътка, а больше доставали нектаръ у основанія лепестковъ-снаружи), огурцовъ, дыней и изъ дикихъ, съ колючки и др. Можно ожидать, что, благодаря ихъ присутствію, въ будущемъ у насъ повысятся урожаи и въ плодовомъ саду и со многихъ полевыхъ растеній, такъ какъ пчелы являются однѣми изъ самыхъ надежныхъ «опылителей» цвътовъ, перенося пыльцу съ цвътка на цвътокъ, бояться же перекрестнаго опыленія хлопчатника и смъшенія сортовъ его пчелами, повидимому, нечего, такъ какъ пчелы, какъ сказано выше, не имъютъ нужды забираться въ цвътокъ хлопчатника, находя нектарникъ снаружи его. Всего въ сентябръ взято (безъ запасныхъ магазиновъ) съ двухъ ульевъ 1 пудъ чистаго, бълаго сотоваго меда и, кромъ того, самимъ пчеламъ оставлено по 25-30 фунтовъ сотоваго меда на зиму, -- такъ что каждый улей набралъ даже при такой поздней установкъ ихъ по 50 фунт. меду. На зиму пчелы въ какое-либо особое помъщение не перемъщались, а оставлялись на

евоихъ мѣстахъ (въ паркѣ подъ деревьями) укрытыя снутри обыкновенными при ульяхъ соломенными подушками, а снаружи—берданами въ одинъ слой (17 ноября); въ такомъ видѣ пчелы перезимовали великолѣпно, и когда дѣлался первый весенній осмотръ ихъ (18 февраля, по открытіи летковъ, сдѣлали облетъ и послѣ уже вылетали свободно), то въ ульяхъ почти не было подмора.

#### V. Рабочій и молочный скотъ опытнаго поля.

Рабочій скотъ въ 1907 году состоялъ изъ шести лошадей; увеличеніе числа ихъ по сравненію съ 1908 произошло на счетъ быковъ, которые были обмѣнены на лошадей. Ожиданія наши на счетъ выгодъ такой замѣны вполнѣ оправдались: если бы опытное поле осталось съ быками, то намъ никогда бы не удалось расширить площадь полеводства до 55 десятинъ. Объ уходѣ и кормленіи говорилось въ отчетѣ за 1906 годъ.

Молочное стадо въ 1907 году довольно сильно измѣнило свой составъ: всего въ срединѣ года было 20 головъ рогатаго скота съ приплодомъ, но къ концу года осталось только 11 головъ, такъ какъ 9 штукъ были проданы: самъ производитель «Голландъ»—на Туркестанскую сельскохозяйственную станцію, корова «Овчинка» на показательное хозяйство въ Голодной степи и 7 молодыхъ бычковъ, покупателями которыхъ явились исключительно крестьяне с. Духовскаго, Волынскаго и Солдатскаго; кромѣ того, въ іюнѣ 1907 года, одна корова «Орѣховка» пала отъ маляріи, очень распространенной на рогатомъ скотѣ (вслѣдъ за чумой, ящуромъ, эмфизематознымъ карбункуломъ и др.).

Въ содержаніи молочнаго скота противъ прошлаго года почти ничего не измѣнилось, если не считать повышенія дачъ свеклы вмѣстѣ съ хлопковыми сѣменами. Надо сказать, что правильное кормленіе и усиленныя дачи свеклы въ 1907 году не замедлили сказаться на удояхъ коровъ, очень сильно увеличивъ ихъ, какъ видно изъ таблицы:

Tr		У д	0 и.		
Кличка коровъ.	Въ 1906 г.	Въ 1907 г.	Число дней дойныхъ.	Средній удо въ день.	
Влизничка	150 в.	196 в.	360 д.	0,55 в.	
Уварка	120 »	142 »	284 »	0,5 »	
Гренетка	120 »	137 »	340 »	0,4 »	
Калинка	112 »	125 »	268 »	0,466 »	
Бълка	68 »	108 »	270 »	0,4 »	
Овчинка	74 »	85 »	245 »	0,35 '»	

Стадо опытнаго поля начали пасти съ 6 марта въ степи, подкармливая дома утромъ и вечеромъ; въ апрълъ коровы въ степи такъ хорошо навдались, что дома почти ничего не вли, и удои ихъ, начиная съ 1 апръля и по 15 мая очень сильно поднимались на зеленомъ корму. Къ концу года все стадо состояло изъ 10 головъ: 1 быка-производителя (Альгау-Харасанъ-метисъ), 5 дойныхъ коровъ, 2 стельныхъ телокъ и 2 телочекъ-мъсячныхъ.

Не лишнее будеть здёсь отмётить мнёніе о кормленіи скота хлопковыми сёменами ученаго американца Ч. Беркетта, автора книги «Хлопокъ», изданной въ трудахъ Хлопковаго Комитета при Департаментё Земледёлія; это тёмъ болёе будеть умёстно сдёлать, что практичный американецъ держится по вопросу о содержаніи скота въ хлопковомъ раіонё какъ разъ противоположнаго взгляда, чёмъ тоть, который намъ пришлось слышать отъ нёкоторыхъ лицъ, заинтересованныхъ въ хлопководстве. Между прочимъ, на страницё 198 указанной книги (въ русскомъ переводё) говорить буквально слёдующее: «По количеству содержащагося въ мукё изъ хлопчатниковаго сёмени перевариваемаго протеина она занимаетъ первое мёсто среди всёхъ растительныхъ матеріаловъ» 1).

Отсюда слъдуеть, что такъ какъ хлопководъ производить эту муку и такимъ образомъ располагаетъ самымъ цъннымъ средствомъ, то онъ долженъ непремънно съ хлопководствомъ одновременно вести и молочное хозяйство. При такой комбинаціи этихъ двухъ отраслей хозяйства онъ получить двойную прибыль (удобреніе и молоко), а хлопковыя земли будуть улучшаться».

Вотъ къ какимъ положеніямъ, далѣе, приходитъ тотъ же авторъ, говоря о значеніи хлопковыхъ сѣмянъ, какъ корма:

1) Качество коровьяго молока при дачѣ хлопковой муки коровамъ повышается,—оно дѣлается болъе прочнымъ, а въ смѣси съ кукурузнымъ кормленіемъ получается такое масло, которому нѣтъ равнаго въ свѣтѣ (см. также нашъ отчетъ за 1906 г.).

	Сырой протеинъ.	Сырого безазоти-		Зола.	Вода
Дъйствительно, въ:					
1) хлопков. съмени содержится	. 19,3	19,4	46,6	4,7	9,9
2) ишеничномъ зернъ	. 13,0	1,5	66,4	1,7	14,4
3) кукурузномъ	. 10,0	6,5	62,0	1,5	14,4
4) ячменномъ	. 10,0	2,5	63,0	2,2	14,3
5) овсяномъ	. 12,0	6,0	55,3	2,7	14,3
6) въ жмыхахъ хлопков. съмянъ .	. 43,2	13,4	33,6	7,0	8,5

- 2) Въ сравнени съ пшеничными отрубями хлопковая мука увеличиваетъ количество молока коровамъ на одну пятую.
- 3) Образуемый у быковъ при кормленіи ихъ хлопковою мукою жиръ болке высокаго качества, нежели жиръ откармливаемыхъ кукурузою быковъ.
- 4) Невозможно получить лучшаго мяса, какъ то, которое даетъ скотъ, откармливаемый мукою и кожурою хлопковыхъ съмянъ въ соединеніи съ кукурузнымъ кормомъ, при чемъ оказалось по опытамъ, что одинъ фунтъ хлопковой муки даетъ тотъ же эффектъ и при кормъ, что и 1,73 ф. кукурузной муки.

«Можеть ли послів этого хлопководь продолжать пренебрегать скотоводствомь, разь у него подь рукою самое дібіствительное кормовое средство, которое вмісті сь тімь дешевле другихь и даеть богатый удобрительный матеріаль?»—восклицаеть авторь.

Намъ, Туркестанцамъ, посылающимъ за гроши свои сѣмена и жмыхи хлопчатника въ Германію и Францію, казалось бы слѣдовало особенно хлопотать о прекращеніи этого расхищенія своего богатства и поближе познакомиться съ выводами американской практики....

# Асхабадское опытное поле

## въ 1907 году.

Отчеть завъдующаго полемъ инструктора по хлопководству И. Г. Ермакова.

Съвооборотъ опытнаго поля въ отчетномъ году былъ слъдующій: 1. Озимое. 2. Хлопчатникъ по удобренію (навозъ). 3. Яровое. 4. Хлопчатникъ по удобренію (навозъ). 5. Бобовое. 6. Люцерна (вводный клинъ).

На 1-мъ участк в, занятомъ озимой пшеницей, опыты велись по слъдующей программъ:

А — опыть на густоту ( а) посѣвъ 5 п. на 1 каз. десятину. посѣва. (б) " 4 " " 1 " "

Б—опыть на отзывчивость къ (б) половинное " " (1200 " " ) удобренію. (в) контрольная дълянка.

Осенью всё дёлянки были политы, вспаханы плугомъ Сакка на глубину 3½ — 4 вершковъ и 11 октября 1906 года засёяны, согласно указанному выше разсчету. На дёлянкахъ а и б опыта Б навозное удобреніе внесено за 1 мёсяцъ до посёва. Изъ-подъ снёга озими вышли 5-го февраля, пролежавъ подъ снёжнымъ покровомъ 10 дней, при чемъ вслёдствіе вновь наступившихъ заморозковъ кое-гдё наблюдались плёшины. Въ виду дождливой весны для озимой пшеницы потребовалась лишь одна поливка, произведенная 10-го марта. Къ 30-му марта пшеница выбрасывала колосья, къ 24-му апрёля отцвёла, а 22-го мая приступлено было къ уборкъ урожая серпами со связкою въ снопы.

Результаты урожая выражены въ слѣдующей таблицѣ:

Дѣ-	Размёръ	Названіе опытовъ.		учено рна.	1 P 1 255 Ca.	ану).		а съ з. де- ины.	Отношеніе зерна къ саману.
лянки.	участковъ.	1 - 1	II.	Φ.	II.	Φ.	п.	Φ.	саману.
а } А а б в } В	685 kb. caж. 324 » » 50 » » 50 » » 140 » »	Посъвъ 5 пуд. на 1 каз дес « 4 » » » » » » полное навозное удобреніе . Половинное навозное удобр. Контрольная дълянка	17 14 3 2 5	32 28 16 21 10	38 32 8 6 17	20 26 16	64 108 163 121 90	14 30 08 08	1:2,069 1:2,177 1:2,544 1:2,534 1:3,238

Отзывчивость почвы ко внесенію удобренія подтверждается полученными результатами: съ дълянки а (Б), гдъ было внесено полное навозное удобреніе, снять урожай въ 163 п. 08 ф. по разсчету на 1 десятину, а дълянка б (Б) съ половиннымъ удобреніемъ-121 п. 08 ф., въ то время какъ контрольная дълянка дала всего 90 пудовъ.

Что же касается произведеннаго опыта на густоту посъва, то посъвъ 4 пуд. на десятину оказался болъе благопріятнымъ, давъ 108 п. 30 фун., такъ какъ съ сосъдней дълянки, гдъ было посъяно 5 пудовъ получилось только 62 пуда 14 фунтовъ. Слъдуетъ замътить, что данный опыть прошель при не вполнъ нормальныхъ условіяхъ, потому, что дълянка, гдъ было высъяно 5 пудовъ на казенную десятину (а оп. А), затънялась деревьями въ бо́льшей степени, нежели дълянка  $\delta$ , въ виду чего посъвъ пострадалъ значительнъе отъ морозовъ.

Аналогичный опыть 1906 года, прошедшій при нормальных условіяхъ, является болье убъдительнымъ, подтвердивъ преимущество 5-пудоваго посъва, при которомъ съ десятины собрано было 138 п. 32 ф. (съ 4-пудоваго посѣва 132 п. 21 ф.).

Вообще говоря, опасаться уведиченія количества высъваемыхъ съмянъ на орошаемыхъ земляхъ, при достаточномъ количествъ воды, нъть основаній, въ то время какъ при богарныхъ-горныхъ поствахъ (безъ орошенія—подъ дождь), гдъ урожай находится въ тъсной зависимости отъ количества атмосферныхъ осадковъ, слъдуетъ отнестись весьма осторожно къ данному вопросу.

Уч. № 2. Опыты съ хлопчатникомъ (по удобренію).

Опыты съ хлопчатникомъ были произведены по той же программъ, что и въ предшествующіе 1905—1906 г.г.

Для выясненія наиболье выгоднаго времени примъненія чеканки, послъдняя производилась въ 4 срока. На участкъ произведены рядовой и разбросной (по туземному способу) посъвы при одинаковыхъ прочихъ условіяхъ культуры. Для установленія лучшаго контроля опытовъ отведено было двъ особыхъ контрольныхъ дълянки-одна въ срединъ участка, а другая - въ концъ. Такимъ образомъ помянутые опыты слъдовало выполнить по слъдующей программъ:

- А. а) Чеканка 1-го іюня.
  - 15-го
  - 1-го іюля.
  - " 16-го
- Б. Контрольная дёлянка.
- В. Разбросной посъвъ по туземному способу.
- Г. Гивздовой.
- Д. Контрольная дёлянка.

Но такъ какъ чеканка производилась не задолго до поливки участка или вскоръ послъ нея (съ цълью обезпеченія растеній влагой и скоръйшаго развитія боковыхъ побъговъ), поэтому сдъланы небольшія отступленія отъ указанныхъ сроковъ:

- а. 9-го іюня.
- б. 18-го
- в. 5-го іюля.
- г. 16-го "

Весь участокъ, предназначенный подъ опыты съ хлопчатникомъ, былъ съ осени перепаханъ и лежалъ въ пластахъ до весны. 10-го февраля, по разбивкъ его на дълянки въ 30 кв. саженъ, вывезенъ навозъ, который къ 5-му марта запаханъ, а въ концъ этого мъсяца начата предпосъвная поливка, послъ которой вспахано плугомъ Сакка (на 3½-4 вершка), забороновано и приступлено къ рядовому посъву на уч. А, Б, Д (съялкой Баннера съ разстояніемъ междурядій въ 1 аршинъ) на участкъ В посъвъ произведенъ руками въ разбросъ 3-го апръля съ задълкой съмянъ бороною (4-го апръля); наконецъ, на уч. Г-сдъланъ руками, подъ лопату, гнъздовой посъвъ по 3 — 4 съмени. Съ 9-го апръля начали появляться всходы на уч. В, а 10-го апръля на другихъ участкахъ. Гнъздовой посъвъ взошелъ позднъе, чъмъ всъ остальные, такъ какъ его забило дождемъ и 30-го апръля пришлось дълать пересъвъ. При столь позднемъ повторномъ посъвъ, хлопчатникъ созрѣвалъ здѣсь неравномѣрно, и недоборъ сырца былъ гораздо значительнее, чемъ на другихъ делянкахъ.

Прошедшіе послѣ посѣва дожди вызвали уплотненіе верхняго слоя почвы на всемъ участкѣ, препятствуя развитію растеній. Въ виду этого 26 апрѣля произведено мотыженіе, а на ряду съ нимъ сдѣлано первое прорѣживаніе. Къ 1-му мая на хлопчатникѣ образовался 4-ый листъ, 25-го мая произведено второе прорѣживаніе на 6—8 вершковъ.

Участокъ № 2 получилъ шесть поливокъ послѣ посѣва: первая 3-го іюня, вторая 27-го іюня, третья 21-го іюля, четвертая 3-го августа, пятая 19-го августа и шестая 9-го сентября (отмѣчено время начала поливокъ, продолжавшихся каждая 6—7 дней). Послѣ первыхъ двухъ поливокъ участокъ разрыхлялся культиваторомъ съ примѣненіемъ окучиванія растеній. Первый цвѣтокъ появился на дѣлянкѣ В 8-го іюня, а 17-го іюня растенія были въ полномъ цвѣту. Съ 20-го іюля начали открываться коробочки, сперва на дѣлянкѣ В (разбросной посѣвъ), а затѣмъ и на другихъ участкахъ. Къ сбору приступлено на уч. № 31-го августа. Собрано отдѣльно по участкамъ, по мѣсяцамъ:

		дълянокъ.		Со	бра	ано	въ	:	Во	ero					речи		Всего съ	
	Названіе опытовъ.	Площадь дѣ.	a) ryc	в- ств.	се тяб	рѣ.		к- рѣ.	собр	ано.		в- ть́.	тяб	ен- рѣ.	о тяб	к- рѣ.	деся собр	тины ано.
		Пло	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.
		кв. саж.			1000 1007 1007			100			1				i			
	а) Чеканка 9 іюня	76	1	14	1	16	-	15	3	05	42	25	44	08	11	34	98	27
A	б) » 18 іюня	116	3	14	2	23	-	13	6	10	69	12	53	11	6	29	129	12
	в) » 5 іюля	56	1	22	1	21	_	17	3	20	66	18	65	11	18	11	150	-
	г) » 16 іюля	52	1	03	1	11	-	26	3	-	49	24	58	34	34	30	138	18
Б.	Контрольная дёлянка	360	7	37	5	34	_	29	14	20	52	33	39	-	4	33	96	26
В.	Разбросной посѣвъ (туземный)	360	8	31	6	19	2	10	17	20	58	20	43	06	15	<u>.</u>	116	26
Γ.	Гнъздовой посъвъ	360	1	36	8	30	4	14	15	_	12	27	45	-	42	13	100	
Д.	Контрольная дъл	360	5	10	3	25	1	15	10	10	35	-	24	07	9	06	68	13

Наиболъе благопріятные результаты дала чеканка 5-го іюня— 150 пудовъ на десятину; ранняя же чеканка, 9-го іюня, дала всего 98 п. 27 ф., 18-го іюня—129 п. 12 ф. и 16-го іюля—138 п. 18 ф. По сравненію съ первой контрольной дълянкой (Б), увеличеніе урожая выразилось въ слъдующихъ цифрахъ:

1) При чеканкъ́ 9-го іюня 12 п. 01 ф. на дес. » » 18-го » 32 » 26 » » » » » 5-го іюля 53 » 14 » »

» » 16-го » 41 » 26 » »

Что касается второй контрольной дёлянки (Д), гдё условія культуры были ненормальны, то полученные результаты не могуть служить сравнительнымъ матеріаломъ.

Говоря о вліяніи чеканки, слѣдуеть упомянуть, что произведенная въ 1905 году 20-го іюня чеканка дала, по сравненію съ контрольной дѣлянкой, увеличеніе урожая на 21 пудъ 12 ф.; а чеканка 28 іюня 1906 года повысила урожай на 9 п. 38 ф. Поэтому нельзя не признать полезности примѣненія чеканки, хотя еще вполнѣ опредѣленно не выяснено, при какихъ условіяхъ чеканка дастъ наиболѣе выгодные результаты. Впрочемъ, данный вопросъ не получилъ еще опредѣленнаго разрѣшенія и въ Америкѣ, гдѣ техника культуры хлопчатника стоитъ на болѣе высокой ступени развитія. При одинаковыхъ пріемахъ культуры, примѣненіе чеканки дало, по Американскимъ опытнымъ даннымъ, противорѣчивые результаты, что, повидимому, объясняется различіемъ климатическихъ и почвенныхъ условій. Согласно даннымъ 1907 года Асхабадскаго опытнаго поля, іюньская и

іюльская чеканки дали большій урожай, при чемъ болье поздняя чеканка оказалась благопріятнье.

Въ слъдующей таблицъ выражено вліяніе чеканки на рость растеній.

	Дл	и на.	Число	
Время чеканки.	Стебля.	Боковыхъ вътвей.	боковыхъ	Число коробочекъ
1 180 BY 152 SER 1	Сантим	етровъ.	BBIBON.	andi 6 a:
9 іюня	25	39	15	24
16 »	. 51	38	12	21
	60	39	17	28
5 іюля	00	00		

Такимъ образомъ при ранней чеканкъ главный стебель менѣе развитъ, нежели при болѣе поздней. Средняя длина боковыхъ вътвей іюньской и іюльской чеканки почти одинакова, при чемъ іюньскіе боковые побъги длиннѣе на 9 сантиметровъ. Наибольшее число вътвей и коробочекъ получено при чеканкъ 5-го іюня (17 боковыхъ вътвей и 28 коробочекъ).

Съ цёлью провёрки полученныхъ результатовъ, въ 1908 году будутъ произведены повторительные опыты по той же программѣ.

Увеличеніе урожая при разбросномъ посѣвѣ на 20 пудовъ объясняется исключительно ненормальными условіями года, когда ранніе заморозки (7—9 октября) побили много оставшихся нераскрытыми коробочекъ (обычно первые заморозки бывають не ранѣе начала ноября). Тѣмъ не менѣе, хотя разбросной посѣвъ далъ лучшіе результаты въ смыслѣ количества, но качество волокна въ этомъ случаѣ было ниже. Во всякомъ случаѣ, при всѣхъ равныхъ условіяхъ преимущество будетъ всегда на сторонѣ рядового посѣва который допускаетъ конную междурядную обработку хлопчатника, что, особенно важно въ цѣляхъ сбереженія почвенной влаги именно для Закаспійской области, одной изъ бѣднѣйшихъ въ этомъ отношеніи среди всѣхъ Среднеазіатскихъ владѣній.

Гн в з довой посввъ въ 1907 году даль увеличение урожая, по сравнению съ контрольнымъ, на 3 п. 24 ф. Слъдуетъ замътить, что условія даннаго года были для гнъздового посва особенно неблагопріятны: съ весны всходы были забиты дождемъ, и мъстами пришлось пересвать, а ранніе заморозки погубили много коробочекъ, оставшихся нераскрытыми. При нормальныхъ условіяхъ гнъздового посва всегда можно разсчитывать получить вполнъ удовлетворительный урожай, что подтверждается опытными данными послъднихъ лътъ. При гнъз-

довомъ посѣвѣ кусты освѣщаются со всѣхъ сторонъ, достигая значительнаго роста (до 2½ аршинъ), при хорошемъ боковомъ вѣтвленіи; все это вызываетъ появленіе большого числа коробочекъ, достигающаго иногда, на отдѣльныхъ кустахъ, до 200 штукъ. Тѣмъ не менѣе, примѣнять гнѣздовой посѣвъ въ большихъ размѣрахъ не представляется возможнымъ въ виду отсутствія достаточнаго числа рабочихъ рукъ, особенно въ періодъ посѣвовъ.

Уч. № 3. Яровая пшеница, ячмень и овесъ. Весною (2-го марта), послѣ прошедшихъ дождей, весь участокъ былъ вспаханъ и произведенъ посѣвъ ячменя, пшеницы и овса въ разбросъ, съ задѣлкою сѣмянъ бороною. Съ цѣлью испытанія при мѣстныхъ условіяхъ вліянія происхожденія сѣмянъ, сѣмена пшеницы и ячменя были выписаны изъ Теджена и Ферганы 1). Съ 10-го марта начали появляться всходы. Пшеница и ячмень пошли въ колосъ съ 1-го мая, а овесъ съ 15-го мая. Пшеница и ячмень политы послѣ посѣва 25 апрѣля, а овесъ, кромѣ этого, политъ еще 26 мая. Къ уборкѣ ферганскаго ячменя приступлено 29 мая и тедженскаго—1-го іюня, пшеницы ферганской—6-го іюня, тедженской—7-го іюня, а овса—10-го іюня.

Съ участка № 3 собрано:

Названіе культуръ.	Размѣръ дѣлянокъ.		чество аго зерна.	по пере	тво зерна численіи 1 дес.	Отношеніе зерна къ
emanaerz radzero a	Саж.	Пуд.	Фунт.	Пуд.	Фунт.	соломѣ.
Пшеница Тедженская .	417½	8	28	50	26	1:2,28
» Ферганская .	»	5	26	32	15	1:2,85
Ячмень Тедженксій	n	6	10/-	34	28	1:3,22
» Ферганскій	))	4,	35	28	02	1:2,77
Овесъ	))	_	34	68	07	1:3,41

Еще до начала опытовъ можно было предвидѣть, что мѣстныя сѣмена дадуть лучшіе результаты, что дѣйствительно и подтвердилось: Тедженскія (сосѣдній уѣздъ) пшеница и ячмень оказались урожайнѣе Ферганскихъ. Низкій урожай на опытныхъ дѣлянкахъ объясняетъ тѣмъ, что въ періодъ налива зерна участокъ не поливался, отчего зерно вышло легкое и щуплое. Для полученія при мѣстныхъ климатическихъ условіяхъ благопріятныхъ результатовъ яровымъ хлѣбамъ нужно давать не менѣе 2-хъ поливокъ—одну до цвѣтенія и вторую при наливаніи зерна.

Уч. № 4. Опыты съ сортами хлопчатника. Въ февралъ мъсяцъ на участокъ былъ вывезенъ навозъ (2400 п. на десятину), а 4 апръля произведенъ посъвъ слъдующихъ сортовъ хлопчатника:

<sup>1)</sup> Въ Асхабадскомъ убздъ воздълываются озимые сорта этихъ культуръ.

Кингъ (одни сѣмена мѣстныя, урожая 1906 года, другіе—выписаны изъ Андижана), Кара-чигить, Кокъ-чигить, Ташкентскій. Условія культуры были одинаковы для всѣхъ названныхъ сортовъ и аналогичны съ участкомъ № 2. На всемъ участкѣ произведено 6 поливокъ посъва, при чемъ въ теченіе роста хлопчатника сдѣланы двухкратное прорѣживаніе, мотыженіе и окучиваніе растеній.

ному	93	C	об	p a	но	въ	11		101	C	обра	но	сь 1	дес	. въ:	
названіе сортовъ.		в-		ен- брѣ.	1000	к- брѣ.	В	cero.		в	4 0	ен-	1910	к-	Bcer	
Pas	п.	ф.	π.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.
1. Ташкентскій 437 кв. с.	n	))	8	31	15	35	24	26	»	»	48	09	87	06	135	15
2. Кингъ (съм. оп. поля). 690 кв. с.	4	35	7	03	15	>>	26	38	16	38	24	23	52	05	93	26
3. Кингъ (андижанскія съмена) 594	3	30	9	08	8	28	21	26	15	06	37	07	35	06	87	19
4. Кара-чигитъ 184	>>	>>	2	35	3	10	6	05	-	_	37	20	42	16	79	36
5. Кокъ-чигитъ	1	14	1	19	))	34	3	27	17	32	19	18	11	9	48	19

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что высшій урожай далъ Ташкентскій хлопчатникъ (135 п. 15 ф. сырца на десятину), что отчасти объясняется тѣмъ, что дѣлянка съ этимъ сортомъ хлопчатника находилась посреди участка, будучи лучше освѣщена и находясь въ лучшихъ культурныхъ условіяхъ. Между тѣмъ, часть сѣмянъ Кинга (мѣстныя) попала на уплотненную телѣгами (при вывозкѣ навоза) и плохо распаханную землю, почему всходы появлялись медленно, что несомнѣнно отразилось на общемъ пониженіи урожая. Андижанскій же Кингъ, Кара-чигитъ и, особенно Кокъ-чигитъ страдали отъ затѣненія деревьями.

и волокна).  % % выхода стабо волокия очистку. Выходъ чист локна изъ и скрца (при очистку). Выходъ чист локна изъ и сврца (при она заводѣ).  Длина волок
AS -SELECT OFFICE AND A SELECT OFFI
6 м. 36,4 14,56 11,76 22,0 милл. 98,0 гр
4 » 32,5 13,00 11,62 21,5 » 98,5 »
0 » 34,6 13,84 11,28 24,0 » 106,0 »
1 » 28,9 11,56 » 23,5 » 124,0 »
0 » 32,7 13,08 » 25,0 » 89,0 »
(

Полученный на опытномъ полъ сырецъ очищался на частномъ заводъ въ Асхабадъ, при чемъ очистка производилась въ то время, когда свои джины остановили для исправленія, такъ какъ они, послів продолжительной работы, требовали ремонта. По сравненію съ ручной очисткой заводская отличается, какъ въ отношеніи выхода чистаго волокна, такъ и по однородности продукта, независимо отъ сорта хлопчатника. Разница въ выходъ чистаго волокна изъ сырца опытнаго поля и сырца, скупленнаго у туземцевъ, получилась весьма замътная, составляя около 31/2 фунт. чистаго волокна на 1 пудъ сырца, что объясняется бол ве культурными свойствами воздвлываемыхъ на опытномъ пол'в сортовъ хлопчатника съ высшими выходами волокна. По величинъ площади первое мъсто занимаетъ ранній посъвъ сорта Кингъ, что дало возможность собрать сырецъ до наступленія заморозковъ, наступившихъ въ отчетномъ году особенно рано (5-8 октября). Наибольшій въсъ отдъльныхъ коробочекъ (волокно съ съменами) далъ сортъ Кокъ-чигить (5 гр. 421 млл.), оказавшійся однако наименње удачнымъ по выходу чистаго волокна. «Ташкентскій» хлопчатникъ представляетъ значительный интересъ въ смысле урожайности и длины волокна, но уступаеть сорту Кингъ (изъ мъстныхъ съмянъ) по выходу чистаго волокна (съ 1-го пуда сырца Кингъ далъ 14,56 фунта, а Ташкентскій—13,84 фунта). Результаты урожая опытныхъ посъвовъ мъстныхъ и андижанскихъ съмянъ King'а получились почти одинаковые, при различныхъ выходахъ чистаго волокна (мъстныя съмена—14,56 ф. волокна, андижанскія—13 ф.).

Для мъстныхъ условій King имъеть весьма существенное значеніе, такъ какъ поспъваетъ ранъе другихъ сортовъ, почему уборку возможно произвести до наступленія заморозковъ.

Участокъ № 5. Машъ, нутъ, фасоль и кунжутъ.

Послѣ прошедшихъ дождей, 29 марта весь участокъ былъ вспаханъ, заборонованъ и произведенъ рядовой посѣвъ сѣялкой Баннера съ разстояніями между рядами отъ 1/2 до 3/4 аршина. Съ 6-го апрѣля начали появляться всходы, при чемъ умаша онѣ были гуще, чѣмъ унута, требуя прорѣживанія. Въ виду перепадавшихъ дождей, поливка послѣ посѣва оттянулась до 22 мая. Междурядная обработка состояла въ рыхленіи коннымъ культиваторомъ. Уборка нута начата 18-го, а маша 20-го іюня. Урожай маша быль почти уничтоженъ въ одинъ день налетѣвшей стаей розовыхъ скворцовъ, такъ что съ

1224

участка въ 452 кв. саж. собранъ лишь 1 пудъ сѣмянъ, что составляеть 5 п. 13 ф. на десятину; нута собрано съ участка въ 330 кв. саж. 4 п. 30 ф. (34 п. 22 ф. на десятину).

	(а) Машъ, рядовой посъвъ 40 кв. с	аж.
тт	б) » разбросный посѣвъ. 200 »	>>
11.	б) » разбросный посъвъ. 200 » в) Кунжуть	» .
	г) Фасоль 40 »	))

Къ обработкъ этихъ дълянокъ приступлено съ 19-го апръля, когда поле послъ поливки было вспахано, забороновано и произведенъ посъвъ на участкъ а—рядовой съялкой, на участкахъ б, в, гручной, подъ борону. Съ 23-го апръля начали появляться всходы, которые развивались хорошо. Въ началъ мая (3-го) прошелъ ливень, повредившій культуры, почему часть маша и кунжута пришлось пересъвать (19-го мая). Послъ двухъ поливокъ 28-го іюня и 14-го іюля, урожай убранъ 10-го августа, при чемъ съ рядового посъва маша получено 20 фунт., разброснаго 37 фунт., кунжута 20 фунт. и фасоли 15 фунт. По разсчету на десятину получаются слъдующіе результаты:

	Названіе опытовъ.	Размъръ дълянокъ.		жай	Урожа на на ти		Примѣчаніе.
		Раз	п.	ф.	п.	ф.	in-cationals, and
. 1	а) Машъ рядовой посѣвъ	450 кв. с.	1		5	13	Пострадаль отъ на-
I. {	б) Нутъ » » .	330	4	30	34	22	иаденія сквор- цовъ.
-	( a) Машъ » » .	40 кв. с.	_	20	30	-	цовь.
	б) » разбросной	160	_	_	-	_	Залить потокомъ
II. {	б') » пересъянный	40	-:	37	55	20	силевыхъ водъ.
	в) Кунжуть	40	-	20	30	-	
	г) Фасоль	40	_	15	22	20	

Произведенные опыты культуры фасоли выяснили, что вводить ее въ сѣвооборотъ не раціонально, такъ какъ она требуетъ обильной поливки, черезъ каждые 10—12 дней и тщательнаго дорого стоющаго ухода. Если же поливку отложить на 20—25 дней, какъ это было въ настоящемъ году, то фасоль даетъ низкій урожай. Въ виду ненормальныхъ условій культуры маша, кунжута и нута въ текущемъ году не удалось

получить окончательных сравнительных данных о выгодности воздёлыванія этих растеній. Однако, можно съ очевидностью сказать, что нуть бываеть болье выгодень, т. к. требуеть меньшаго количества воды (даль 30 п. на дес.).

Участокъ № 6. Люцерна.

На участокъ, находившійся подъ люцерной, 24 февраля вывезенъ навозъ (2.400 пуд. на дес.), при чемъ для постановки сравнительныхъ опытовъ съ минеральными удобреніями были выдѣлены особыя дѣлянки. Опыты произведены по слѣдующей программѣ:

нокъ.	Названіе опытовъ. Величина дёлянокъ.
1	Полное навозное удобреніе
2	Половинное » »
3	Контрольный участокъ
4	Суперфосфать 10 пуд. на десятину 17 » »
5	Зола 120 пуд. на десятину
6	Суперфосфатъ 20 пуд. на десятину 21 » »
7	Зола 240 пуд. на десятину
8	Суперфосфать 40 пуд. на десятину
9	Суперфосфать 40 п. + 12½ п. селитры 14 » »

Люцерна орошалась семь разъ: съ 14 по 18 марта, съ 10 по 16 апръля, съ 20 по 29 мая (при чемъ 25—26 поливалась по ¼ дня, а 22, 23, 24 не поливалась), съ 10 по 15 іюня, съ 22 по 27 іюня, затъмъ одну половину участка поливали съ 31 іюля по 2 августа, а другую съ 14 по 19 августа, и, наконецъ, послъдняя поливка произведена съ 29 августа по 3 сентября.

Снято 6 укосовъ <sup>1</sup>): 1-ый—3 апрѣля, 2-ой—11 мая, 3-ій—13 іюня, 4-ый—8 іюля, 5-ый—10 августа и 6-ой—3 октября. Первый укосъ былъ поврежденъ слоникомъ (Phytonomus murinus), почему въ качествъ корма для лошадей люцерна этого укоса была совершенно непригодна. Результаты опытовъ съ люцерной приводятся въ слъдующей таблицъ:

<sup>1)</sup> Показаны начала укосовъ; каждая уборка продолжалась отъ 5 до 10 дней.

-, or from a will the	A CALCUS				У	к	(	)	c	Ы		SP 17	Dilly.	er:	W.	Ha	1 70	
Названіе опытовъ.	мфръ	Размъръ дълнокъ.	. 1	-й	2	-ñ	3	-ñ	4	l-n	5	-й	6	-Ü	Be	ero.		ину.
	Pa3	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	n.	ф.	II.	ψ.	п.	ф.	
I. Удобреніе навозомъ раннее	кв. саж		100	73	16	65	36	44	20	51	26	40	38	276	16	571	34	
II. Удобреніе навозомъ позднее.	163		1800 2000	8	30	3	35	1	30	3	25	2	32	20	32	306	13	
1. Полное навозное удобрение	25	(K) /	1	1	08	1	04	1	_	_	25	_	26	4	23	439	08	
2. Половинное удобрение.	16		-	1	10	1	.03	-	28	-	21	-	16	3	38	592	20	
3. Контрольный участокъ	16	-	-	1	05	-	38	-	31	-	14	-	16	3	24	577	20	
4. Удобреніе суперфосфатомъ (10 и на дес.).	17			1	12	1	10	_	33	-25	25	_	30	4	30	641	07	
5. Удобреніе золой (120 п. на десятину)	18	_	_	2	02	2	20	_	38	_	27	_	37	7	04	946	26	
6. Удобреніе суперфос- фатомъ (20 п. на дес.).	21	_	-	. 1.	30	1	20	1	01	_	28	-	10	5	09	596	07	
7. Удобреніе золой (240 п. на десятину)	17	_	_	1	17	1	36	_	36	_	28		18	5	15	617	26	
8. Удобреніе суперфос- фатомъ (40 п. па дес.)	13	·			39	1	10	_	31	_	22	_	11	3	33	706	06	
<ol> <li>Удобреніе суперфос- фатомъ (40 п.) + се- литрой (12½ п. на дес.).</li> </ol>	14	-		1	09	1	08	_	30	_	25		36	4	28	807	18	
Число дней между оче- редными укосами				9	18	. 9	3	2	25	8	33		54				_	

Нельзя не отмътить, что этотъ опытъ прошелъ при ненормальныхъ условіяхъ, такъ какъ удобренія внесены поздно (не получены своевременно) 16 апръля, когда было достаточно сухо и тепло и суперфосфать не могъ оказать должнаго вліянія; кромъ того, люцерна все льто страдала отъ недостатка воды (послъ укосовъ въ самое жаркое время поливка производилась спустя 10—12 дней). Возможно, что этимъ объясняются полученые противоръчивые результаты примъненія полнаго (439 п. 08 на десятину) и половиннаго навознаго удобреній (592 п. 20 ф.), не допускающіе возможности установить вліяніе вносимыхъ удобреній.

Внъ съвооборота произведены:

1) Сравнительный опыть культуры сортовь хлопчатника—Hawkins, Кокъ-чигить, Ounce boll, Кингь, (?) Improved и Кара-чигить.

Всѣ эти сорта высѣяны на грядкахъ 27 марта подъ лопату. Первые всходы появились у сорта Ounce boll—5 апрѣля, а 6 апрѣля взошли прочіе сорта. Въ виду сырой и холодной погоды всходы были недружные и въ дальнѣйшемъ развивались не вполнѣ удовлетворительно,

(показалась ржавчина). Поливки (6) сдъланы 23 мая, 14 и 30 іюня 15 іюля, 5 и 26 августа.

Собрано слъдующее количество сырца:

en and disease in a sure	() (E) (E)	4411	C o (	бр а	но	ВТ	b:	Po	ero	Уроз	
Названіе сортовъ.	Размъръ дълянокъ.	гус	з-	се тяб	ен- рѣ.	тяб		собр		сырц; разсче десят	ту на
	Par	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.
organical medical administration of	кв.саж.				1	19.19	Same		1807.	:17.18	nept
Hawkins	9	-	3,5	-	3,5	_	2	_	9	60	0.0
Кокъ-чигитъ	12		4	_	2	-	3	_	9	. 45	_
Ounce boll	15	-	6	-	3	_	3	102	12	48	-
Кингъ	10	-	4,5	_	3,5	-	5,75	_	13,75	82	20
Impoved (?)	12	_	2	_	6	_	3 .	_	11 .	55	_
Кара-чигить	15,25	_	4,5	_	6	-	4,75	_	15,25	60	-
Rogers of Bancon vis	GAGE	au.	anis.	10-	1	0191		11/4	1	VAN	The second

Почти всѣ грядки страдали отъ затѣненія деревьями, что трудно устранить въ виду ограниченности размѣра орошаемой площади на опытномъ полѣ. Однако, настоящій опытъ соотвѣтствуеть по своимъ результатамъ съ произведеннымъ въ 4-омъ полѣ опытомъ, гдѣ по величинѣ урожая послѣ Кіng'а (82 п. 20 ф.), слъдуетъ Кара-чигитъ (60 п.).

2) Опыть съ числомь и временемь поливокь хлопчатника.

Результаты этого опыта пом'вщены въ слѣдующей таблицѣ, при чемъ подъ первымъ періодомъ разум'вется рость хлопчатника до начала его цвѣтенія, подъ вторымъ—время отъ начала цвѣтенія до образованія коробочекъ и подъ третьимъ—время созрѣванія коробочекъ.

ъ.	дѣлянокъ.	лин	сло	въ	поливокъ періода.	Сб	оръ сыр фунтах	оца съ.	7-d27-2 3-843-1		Сбор		рца і чну.	на де	- 1		
№М дълянокъ.	Размъръ дъл	Первый.	Bropou.	Tperiå.	псло	ABrycre.	Сентябрь.	Октябрь.	ro		в-	Тяб	ен- рь.	О	к- рь.	Bee	его.
New	Pas	Пер	Bro	Tpe	Общее ч	ABL	Сен	Окт	Всего.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.	п.	ф.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	KB.Caж.   20   .	1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 3 3	1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3	-1 1 3 1 1 1 2 3 1 3 3 1 3 3	2 4 3 5 5 5 6 7 7 7	14,5 5,75 2,5 5,0 5,0 5,25 6,5 6,25 6,25 2,75	$\begin{array}{c} 2,5 \\ 11,0 \\ 13,25 \\ 7,5 \\ 14,0 \\ 13,25 \\ 13,75 \\ 24,5 \\ 20,75 \\ 20,5 \\ 11,5 \\ 5,0 \end{array}$	5,25 4,25 5,0 9,25 7,5 6,25 8,0 14,0 7,5 6,0 1,0	17 22 20 17,5 28,25 26,0 25,5 39,0 41,0 34,25 20,0 8,75	43 17 7 15 15 16 19 18 18 18 7 8	20 10 20 — 30 20 20 30 30 20 10	7 33 39 22 42 39 41 73 62 61 34 15	20 	15 12 15 27 22 18 24 42 22 18 3	30 30 30 20 30 10 10 20	51 66 60 52 84 78 76 117 123 102 60 26*)	20 30 20 10 30 10

<sup>\*)</sup> Дѣлянка № 12 затѣнялась, чѣмъ и объясняется столь низкій урожай.

Судя по полученнымъ результатамъ, хлопчатникъ до цвътенія можеть еще обходиться одной поливкой, но во время цвътенія и образованія коробочекъ, что обычно совпадаеть съ жаркимъ временемъ, требованія его къ водъ значительно возрастають. При наличности въ это время достаточнаго количества воды всегда можно, до извъстной степени, разсчитывать на лучшій урожай. Далѣе, изъ приведенныхъ данныхъ видно, что излишекъ влаги въ первомъ періодъ вызываетъ пониженіе урожая. Это объясняется тѣмъ, что почва послъ первыхъ двухъ поливокъ (считая въ томъ числѣ и предпосѣвную) содержить еще достаточно влаги для обезпеченія успѣшнаго роста растеній, и излишекъ влаги задерживаетъ рость, вызывая появленіе болѣзней. Въ третій періодъ (созрѣваніе коробочекъ) вода не менѣе необходима для успѣшнаго развитія коробочекъ и полученія волокна хорошаго качества.

Настоящій опыть подтверждаеть возможность культуры хлопчатника при 2-хъ поливкахъ, —одной въ первомъ и одной во второмъ періодахъ (51 пудъ сырца); при 3-хъ поливкахъ, по одной въ каждомъ періодъ, урожай повышался до 60 пудовъ, при непремънномъ условіи въ этихъ двухъ случаяхъ самой тщательной обработки почвы.

Въ заключение слъдуетъ привести учетъ стоимости отдъльныхъ культуръ на Асхабадскомъ опытномъ полъ въ 1907 г.

Участокъ № 1 (1.249 кв. саж.)—озимая пшеница.

1. Поливка передъ посѣвомъ (5 рабочихъ дней по 50 к.) 2 р. 50 к.; вспашка и бороньба (3 раб. дня лошад. 1 р.) 3 руб. и (1½ дня рабочаго по 50 к.) 75 к.; посѣвъ 25 к.; выравниваніе участка передъ посѣвомъ 50 к.; стоимость сѣмянъ (2½ п. 1 р. 20 к.) 3 р., а всего

0	к.; ст	оимость	свиянъ	(21/2	п.	1 p	. 20	K.)	3 p.,	, а всего.	10	p.	-	K.
	2. 3	Устройст	во поливі	ныхт	FI	ялъ	(41	раб.	лня	по 50 к.).	2	1)		<b>n</b>

3. Поливка постѣ постѣва (5 раб. пнет по 50 к.). 2 » — »

5. Охрана посъва отъ воробьевъ . . . . . . . . . . . . 5 » 30 »

8. Молотьба и очистка зерна (6 конскихъ дней по

1 р.) 6 руб. и (12 рабоч. дней по 50 к.) 6 руб., всего. . 12 » — »

Итого . . . . 41 р. 80 к.

Что составляеть на десятину 80 руб. 32 коп.

Валовой доходъ съ участка—43 п. 27 ф. зерна по 1 р. 20 к. = 52 р. 48 к. и 100 п. 22 ф. соломы по 20 к.=20 р. 11 к., а всего 72 р. 59 к. (139 р. 50 к. на десятину).

Такимъ образомъ чистый доходъ на десятину составляетъ 59 р. 18 к. Участокъ № 2 (1.800 кв. саж.).—Хлопчатникъ по навозному удобренію (2400 п. на дес.).

1. Осенняя подготовка почвы: поливка предъ вспашкой (5 раб. дней по 50 к.) 2 р. 50 к., вспашка

(2½ конскихъ дня по 1 р.) 2 р. 50 к. и (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> раб. дня				
по 50 к.) 63 к., а всего	5	p.	63	K.
2. Вывозка навоза (14 конск. дней по 1 р.) 14 р.				
и (12 раб. дней по 50 к.) 6 р., а всего	20	))	-	"
3. Разброска и запашка навоза (2½ раб. дня лошади				
по 1 р.) 2 р. 50 к. и (4¼ дня рабочаго по 50 к.) 2 р.				
13 к., а всего	4	))	63	*
4. Поливка передъ посѣвомъ ( $5\frac{1}{2}$ дней рабоч. по $50$ к.).	2	))	75	"
5. Вспашка передъ посъвомъ, бороньба и выравни-				
ваніе участка (6 раб. дней лошади по 1 р. и 5 дней				
рабочаго по 50 к.) 8 р. 50 к., 2/5 уч.—ручной посъвъ				
(3½ дня рабочаго по 50 к.)—1 р. 75 к.; 2 п. съмянъ				
(по 40 к.) 80 к., а всего	11	))	05	))
6. Шесть поливокъ послѣ посѣва (30 дней рабо-				
чихъ по 50 к.)	15	))	-	))
7. Устройство поливныхъ грядъ (4 дня рабочаго				
по 50 к.)	2	))	-	))
8. Разрыхленіе участка, полка сорныхъ травъ, моты-	00			
женіе			_	
9. Чеканка 1/5 участка (1 день рабочаго)			50	
10. Сборъ сырца (73 п. 26 ф. по 32 к.)	23	))	57	))
그리고 하는 사람들이 가는 것이 되었다. 그는 사람들이 되었다면 하는 것이 되었다면 하는 것이 없는 것이 없는데 없는데 없다면			10	
Итого	111	p.	13	к.,
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.	111	p.	13	к.,
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.				
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к. Валовой доходъ съ участка (73 п. 26 ф. сырца по	3 p.	60	) к.	)—
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к. Валовой доходъ съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч	3 p.	60	) к.	)—
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к. Валовой доходь съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляеть 205 р. 38 к.	3 p.	60	) к.	)—
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходъ съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляеть 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровые хлѣба.	3 p.	60	) к.	)—
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходъ съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляеть 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровы е хлѣба.  1. Осенняя вспашка, (3 дня лошади по 1 р.)—3 р.	3 р. исты	60 Ħ I	) к.	)— )дъ
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходъ съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляеть 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровые хлѣба.  1. Осенняя вспашка, (3 дня лошади по 1 р.)—3 р.  и (1½ дня рабочаго по 50 к.)—75 к., всего	3 р. исты	60 Ħ I	) к.	)— )дъ
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходъ съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляеть 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровые хлѣба.  1. Осенняя вспашка, (3 дня лошади по 1 р.)—3 р.  и (1½ дня рабочаго по 50 к.)—75 к., всего	3 р. исты	60 Ħ I	) к.	)— )дъ
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходь съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляеть 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровы е хлѣба.  1. Осенняя вспашка, (3 дня лошади по 1 р.)—3 р.  и (1½ дня рабочаго по 50 к.)—75 к., всего	3 р. исты	60 Ħ I	) к.	)— )дъ
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходъ съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляетъ 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровы е хлѣба.  1. Осенняя вспашка, (3 дня лошади по 1 р.)—3 р.  и (1½ дня рабочаго по 50 к.)—75 к., всего	3 р. исты	60 й д	) к.	)— одъ к.
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходъ съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляетъ 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровые хлѣба.  1. Осенняя вспашка, (3 дня лошади по 1 р.)—3 р.  и (1½ дня рабочаго по 50 к.)—75 к., всего	3 р. исты	60 й д	) к. цохо	)— одъ к.
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходъ съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляеть 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровые хлѣба.  1. Осенняя вспашка, (3 дня лошади по 1 р.)—3 р.  и (1½ дня рабочаго по 50 к.)—75 к., всего	3 р. исты 3	60 й д	) к. цохо	)— )дъ к.
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходь съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляеть 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровые хлѣба.  1. Осенняя вспашка, (3 дня лошади по 1 р.)—3 р.  и (1½ дня рабочаго по 50 к.)—75 к., всего	3 р. исты 3	60 й д р.	75 92	)— )ДЪ к.
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходь съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляеть 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровые хлѣба.  1. Осенняя вспашка, (3 дня лошади по 1 р.)—3 р.  и (1½ дня рабочаго по 50 к.)—75 к., всего	3 р. исты 3	60 斑 Д p.	75 92 50	)— одъ к.
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходъ съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляеть 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровые хлѣба.  1. Осенняя вспашка, (3 дня лошади по 1 р.)—3 р. и (1½ дня рабочаго по 50 к.)—75 к., всего	3 р. исты 3 10 2 4 5	60 苗 Д か 。 。 。 。 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	75 92	)— )Дъ к.
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходъ съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляеть 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровые хлѣба.  1. Осенняя вспашка, (3 дня лошади по 1 р.)—3 р.  и (1½ дня рабочаго по 50 к.)—75 к., всего	3 р. исты 3 10 2 4 5	60 苗 Д か 。 。 。 。 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	75 92 50  25	)— )Дъ к.
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходъ съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляеть 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровые хлѣба.  1. Осенняя вспашка, (3 дня лошади по 1 р.)—3 р. и (1½ дня рабочаго по 50 к.)—75 к., всего	3 р. исты 3 10 2 4 5 9	60 ガ ル ッ 。 。 。 。	75 92 50  25	)— одъ к.
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходь съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляеть 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровые хлѣба.  1. Осенняя вспашка, (3 дня лошади по 1 р.)—3 р.  и (1½ дня рабочаго по 50 к.)—75 к., всего.  2. Вспашка и посѣвъ: (4 дня лошади по 1 р.—4 р.  и 2½ раб. дня по 50 к.—1 р. 25) 5 р. 25 к.; стоимость сѣмянъ (1 п. 30 ф. ишеницы, 1 п. овса, 1 п. 30 ф. ячменя) 5 р. 67 к.  3. Устройство поливныхъ грядъ (5 дней рабочаго по 50 к.).  4. Поливки (8 дней рабочаго по 50 к.).  5. Охрана посѣва отъ воробьевъ  6. Уборка урожая серпами.  7. Молотьба (5 дней лошади по 1 р.—5 р. и 5 дней	3 р. исты 3 10 2 4 5 9	60 ガ ル ッ 。 。 。 。	75 92 50 - 25 25	)— одъ к.
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходь съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляеть 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровые хлѣба.  1. Осенняя вспашка, (3 дня лошади по 1 р.)—3 р.  и (1½ дня рабочаго по 50 к.)—75 к., всего.  2. Вспашка и посѣвъ: (4 дня лошади по 1 р.—4 р.  и 2½ раб. дня по 50 к.—1 р. 25) 5 р. 25 к.; стоимость сѣмянъ (1 п. 30 ф. ишеницы, 1 п. овса, 1 п. 30 ф. ячменя) 5 р. 67 к.  3. Устройство поливныхъ грядъ (5 дней рабочаго по 50 к.).  4. Поливки (8 дней рабочаго по 50 к.)	3 р. исты 3 10 2 4 5 9	60 苗 月 » » · · · · · · · · · · · · · · · · ·	75 92 50 - 25 25	)— одъ к.
что составляеть на 1 десятину 148 р. 14 к.  Валовой доходъ съ участка (73 п. 26 ф. сырца по 265 р. 14 к., т. е. на 1 десятину—353 р. 52 к. Поэтому ч съ десятины составляетъ 205 р. 38 к.  Участокъ № 3 (2.088 кв. с.)—я ровые хлѣба.  1. Осенняя вспашка, (3 дня лошади по 1 р.)—3 р. и (1½ дня рабочаго по 50 к.)—75 к., всего	3 р. исты 3 10 2 4 5 9 7	60 ガ Д か 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	75 92 50 	)— одъ к. » » » » » » »

Что составляеть на десятину 55 р. 37 к. Валовой доходъ съ участка: 14 п. 14 ф. пшеницы по 1 р. 20 к. - 17 р. 22 к.; 11 п. 34 ф. овса по 90 к.—10 р. 70 к.; 10 п. 35 ф. ячменя по 70 к.—7 р. 61 к.; 109 п. 05 ф. соломы по 20 к.—21 р. 82 к., а всего 57 р. 35 к., что составляетъ на десятину 65 р. 91 к.

Такимъ образомъ чистый доходъ съ десятины, равняется 10 р. 54 к.

Taking books included a decoration, passioned to p. 54 ft.
Участокъ № 4 (2.088 кв. саж.)—Хлопчатникъ по навоз-
ному удобренію (2400 пуд. на дес.).
1. Осенняя подготовка почвы: поливка (5½ дней
рабочаго по 50 к.)—2 р. 75 к.; вспашка (3 дня лошади
по 1 р.) — 3 р.; (1½ дня рабочаго по 50 к.) — 75 к., а
всего
2. Вывозка навоза (16½ дней лошади по 1 р.)—
16 р. 50 к. и (14½ дней рабочаго по 50 к.)—7 р. 25 к.,
a Bcero
3. Разброска навоза и его, запашка (3 дня лошади
1 р.)—3 р. и (4 дня рабочаго по 50 к.)—2 р., а всего 5 » — »
4. Поливка передъ посъвомъ
5. Вспашка передъ посъвомъ, бороньба и посъвъ
(7 дней лошади по 1 р.)—7 р. и (7 дней рабочаго по
50 к.)3 р. 50 к., а всего
6. Съмена (2½ п. по 40 к.)
7. Устройство поливныхъ грядъ (5 дней рабочаго
по 50 к.) 2 » 50 »
8. Шесть поливокъ послъ посъва (36 дней раб.
по 50 к.)
9. Рыхленіе, полка сорныхъ травъ, мотыженіе 32 » — »
10. Сборъ сырца (82 п. 02 ф. по 32 к. съ пуда) 26 » 26 »
Итого 128 р. 76 к.
(147 р. 93 к. на дес.);
Валовой доходъ съ участка (82 п. 02 ф. сырца по 3 р. 60 к.)—
295 р. 38 к. или 339 р. 51 к. съ десятины, а чистый доходъ съ деся-
тины 191 р. 58 к.
Участокъ № 5 (1.100 кв. с.) — бобовыя.
1. Осенняя вспашка 1 р. 25 к.
2. Поливка передъ посъвомъ 2 » — »
3. Вспашка и бороньба 2 » 50 »
3. Вспашка и бороньба
5. Устройство поливныхъ грядокъ
6. Проръживаніе, мотыженіе
7. Пересъвъ и сопряженные съ нимъ работы 2 » — »
8. Уборка и молотьба
State State 4 (G. Terry 1992) 12 (S. 1994) 11 (1994) 12 (S. 1994) 12 (S. 1994) 12 (S. 1994) 13 (
Итого 24 р. 50 к.

24 р. 50 к.

(53 р. 45 к. на дес.);

Валовой доходъ: зерно маша 2 п. 17 ф. по 1 р.—2 р. 42 к.; нута 4 п. 30 ф. по 1 р.—4 р. 75 к.; кунжута ½ п. по 1 р. 60 к.—80 к. и Фасоли 15 ф. по 5 к.—75 к., а всего 8 р. 72 к., что составляеть—17 р. 70 к. на дес., поэтому здѣсь получается убытокъ—36 р. 47 к.

Участокъ № 6 (1.495 кв. саж.)—люцерна.

1. Расходъ по удобренію навозомъ			22	p.	45	к.
2. » » минеральному удобренію на	гр	я-				
дахъ			3	))	_	))
3. Поливки (45 дней рабочаго по 50 к.)			22	))	50	))
4. Уборка 6 укосовъ			41	))	50	))
5. Связка въ снопы и вывозка						
Итого			109	n	65	Tr

Или 166 р. 39 к. на дес.; считая пудъ съна люцерны въ 45 к., получимъ съ 344 п. 35 ф.—155 р. 20 к., что составляетъ съ десятины 248 р. 78 к., т. е. чистый доходъ съ десятины 82 р. 39 к.

Приведенныя выше данныя пом'вщены въ сл'вдующей сводной таблиц'в.

Названіе участковъ	Расходы н	а культуру.	Доходы отъ культурь				
и опытовъ.	Рубли.	Кон.	Рубли.	Kon.			
1-й участокъ озимая							
пшеница	41	80	72	59			
2-й участокъ хлопчат-			4, 6, 8				
никъ	111	13	265	14			
3-й участокъ яровое	48	17	57	35			
4-й участокъ хлопчат-	128	76	295	38			
5-й участокъ бобовыя.	24	50	7	79			
6-й участокъ Люцерна.	103	65	155	20			
7-й Грядовая культура.	35			_			
Итого	493	01	853	45			

Такимъ образомъ общая чистая прибыль отъ посѣвовъ выражается 360 р. 44 к. Занято было въ 1907 году всего 4 дес. 550 кв. саж.:

озимой пшеницей	1.249	кв.	саж.
хлопчатникомъ (2-й и 4-й уч.). :	3.888	))	))
яровыми	2.088	))	))
бобовыми	1.100	))	))
люцерной	1.495	))	))
грядовыми посъвами	330	))	0

Таблица наблюденій Асхабадской метеорологической станціи за 1907 годъ.

	Барометръ при 0°.					температура.									
М всяцы.		Max.	Min.	7.	1.	9.	Средн.	Средн. Мах.	Средн. Min.	Абсол. Мах.	Число.	Абсол. Мін.	Число.	Средн. ам- плит.	Абсо ам- плит
Январь	745,1	758,2	732,4	0,4	7,2	2,1	3,1	14,7	- 9,1	20,0	12 и 17	— 17, <sub>2</sub>	25	23,8	37,
Февраль	44,1	53,2	30,8	- 2,2	4,3	0,2	0,8	14,2	- 9,8	21,0	24	- 17,7	. 8	24,0	38,
Мартъ	42,7	54,5	31,8	5,9	13,5	8,4	9,3	18,4	-3,1	25,9	31	- 3,8	5	21,5	29,
Апръль	39,4	49,6	31,6	14,1	20,9	15,6	16,9	28,9	10,0	34,6	26	4,0	6	18,9	22
Май	42,4	49,6	31,3	18,7	25,9	19,6	21,4	28,8	17,0	36,5	27	6,8	1	11,8	29,
Іюнь	38,8	43,5	33,7	24,6	32,1	25,0	27,2	32,5		40,1	15	12,0	4	8,3	28,
Іюль	36,1	39,8	31,7	29,7	38,7	29,6	32,7	36,9	_	43,7	22	16,5	13	7,4	27,
Августъ	38,9	43,7	33,3	26,3	35,2	26,9	29,4	33,1	-	41,0	18	15,0	13	7,1	26,
Сентябрь	42,4	48,4	33,0	18,8	28,9	20,7	22,8	29,2	19,4?	40,0	14	9,0	27 '	9,8	31,
Октябрь	48,4	59,3	42,5	8,9	17,6	10,5	12,5	19,6	5,6	26,5	1	- 3,7	31	14,0	30,
Ноябрь	46,9	54,3	37,4	5,1	5,8	5,6	5,5	8,4	3,0	30,0	3	- 8,4	26	5,4	38,
Декабрь	46,6	56,5	37,5	1,6	11,6	3,8	5,7	14,3	-4,4	24,7	18	- 13,0	30	18,7	37,
Годъ	742,7	759,3	730,8	12,7	20,1	14,0	15,6	23,3	_	43,7		-17,7	II-8	14,2	38,

М ѣ с я ц ы.			олюти кност		01	гносит	гельн	ная влаж	ность.		Обла	чност	гь.	0	сад	к и.	Температура на поверх- ности земли,							
	7.	1.	9.	Средн.	7.	1.	9.	Средн.	Min.	7.	1.	9.	Средн.	Сумма.	Max.	число.	7.	1.	9.	Средн.	Max.			
Январь	4,6	? 6,7	5,0	5,3	94	84?	91	90	25	6,4	6,4	5,6	6,2	27,7	11,3	28	-0,3	12,5	2,0	4,7	26,5			
Февраль	3,8	5,0	4,6	4,5	92	84?	93	90	35	5,3	5,8	3,7	4,9	20,9	10,4	27	-0,3	11,6	0,5	3,9	32,0			
Марть	5,7	6,1	6,3	6,0	82	56	76	72	15	6,2	6,0	4,8	5,7	72,5	35,2	4	6,1	21,6	7,5	11,7	37,0			
Апръль	9,1	9,1	9,8	9,3	76	51	75	67	9	5,7	5,6	4,0	5,1	5,80	16,0	11	14,6	27,9	14,5	19,0	42,5			
Май	10,1	6,4	10,9	9,2	62	41	64	56	13	6,0	5,0	4,0	5,0	61,4	20,1	16	19,0	35,0	18,7	24,2	45,0			
Іюнь	9,2	7,6	9,5	9,1	40	22	40	34	11	1,5	2,2	2,1	1,9	1,2	1,2	26	25,5	43,5	23,8	31,0	52,8			
	11,4	8,8	10,5	10,2	37	17	34	29	11	1,6	1,3	1,2	1,4	0,2	0,2	24	30,3	52,5	28,2	37,0	64,0			
Августъ	12,0	11,0	11,5	11,5	47	26	44	39	18	0,9	1,0	1,1	1,0	00	_	-	27,8	50,4	25,7	34,6	60,			
Сентябрь	7,9	? 8,4	8,0	8,1	49	29	44	41	11	1,5	1,4	1,2	1,4	00	_	-	20,6	41,7	19,2	27,2	54,8			
Октябрь	5,6	5,0	6,1	5,6	64	35	60	53	13	4,1	4,3	4,8	4,4	10.1	4,6	11	9,6	26,9	10,0	15,5	43,5			
Ноябрь	5,1	5,8	5,6	5,5	86	66	83	78	19	7,2	7,4	5,6	6,7	24,9	7,4	9	3,4	15,4	4,9	7,5	35,0			
Декабрь	4,2	5,1	4,7	4,7	82	55	78	71	20	5,0	4,2	2,9	4,0	0,2	0,1	13	0,8	17,5	2,6	6,9	30,			
Годъ	7,4	7,1	7,7	7,4	68	47	65	60	17	4,3	4,2	3,5	4,0	277,1	_	_	13,1	29,7	13,1	18,6	_			
										4.63						160		1010						

16.

Мъсяцы.	Число дней съ:											N	NNE		NE		ENE		Е		ESE		SE		SSE		S	SSW		SW		ws	w	B	W	NW I		W	NN	
	Осадками.	CHEROME.	градомъ. Крупой.	Туманомъ.	Грозой.	Сильи. вътромъ.	Госою.	Ясимъ небомъ.	Пасмур. небомъ.	Безъ оттепели.	Moposoms.	Ckonoctb.	Число.	Скорость.	Cronocur.	THETO.	Скорость.	Число.	Chopocrb.	THEJO.	Скорость.	Число.	UKOPOCTE.	CKODOCTE.	Число.	Скорость.	Число.	Cropocts.	Число.											
Январь	?	4 -		11	-	4	9	3 ?	?	?	?	2 4	1		4	11	3	8	11	38	5	12	1	3	1	5 3	3 7	3	20	5	12			4 9	9 9	23	9	33	3	
Февраль	?	? -		_	ŀ	_	90	- ?	?	?	?	4 8	3 _		2	4	5	9		10		5	1	2 -		_		5	13	4	10	1	2	1 3	3 4	11	4	9	5	
Марть	11	4	3	17	2	3	5	2 ?	?		?	1 2	2 2	6	2	4	2	4	10	46	10	32	2	6-		-		1	2	5	9	-		2 5	7	20	10	41	40	
Апръль	11	1,0		1	2	1	6 -	- 4	3	_ -	-	2 3	3 -	-	2	4	1	2	5	14	7	15	_		-	-	1 1	-	-	6	9	7 2	29	6 34	6	29	7	17	1	
Май	14		-	1	4	1 -	-	- ?	?	_ -	-	5 10	-	-	1	1	4	17	5	14	3	9	1	1	1	2 -	100	3	6	4	9	-	-	4 10	8	35	6	24	5	
Іюнь	1	_ -	-	-	-	2 -	-	- ?	?	- -	-	2	3 1	2	3	13	3	7	7	49	4	15	1	3	1	1	1 1	-	-	-	-	1	4	6 15	15	57	11	40	2	
Іюль	?	_	- -	-	-	-	- -	- ?	?		-	3 9	3	12	3	15	-	8	6	26	3	5	-		-	-	1 1	-	-	9	16	2	5	2 4	13	54	7	32	3	
Августь	-	-	10	-	-	2 -		- ?	?	-	-	3 8	3	11	5	16	6	23	2	10	1	2	-			-	1 2	2	5	1	1	-	-		- 7	30	9	36		
Сентябрь .	-	- -	18	-	_	-	17.80	- ?	?				- 1	3	6	15	6	38	5	21	3	8	1	2	-		-	-		3	5	1	2	2 4	8	37	8	28	2	
Октябрь	6	-	1 8	1	-	-	4 -	- 11	8		-	8 14	1 1	3	6	17	4	10	4	16	3	7	1	3	1	3	1 2	2	3	8	16	1	2	2 5	4	12	2	5	2	
Ноябрь	?	2-		6	-	2	6	1 ?	?		-	4 9	5	11	1	2	7	14	4	17	7	19	4	13	1	1 -	-	2	6	8	14	1	1	1 2	6	12	7	21	5	
Декабрь	?		- -	2	_	2	5 -	- ?	?	?	?	4 9	4	7	5	15	3	11	7	19	4	13	2	6	2	3	5 10	3	7 1	2	35	2	5	2 5	4	18	5	23	4	

# Мервская показательная хлопковая плантація.

До 1907 года плантація, находясь въ непосредственной связи съ дѣятельностью Асхабидскаго опытнаго поля, устраивалась поочередно въ различныхъ пунктахъ уѣзда. Однако опытъ показалъ, что при такой системѣ нельзя удовлетворительно организовать дѣло: арендныя земли ежегодно поступаютъ въ передѣлъ и переходятъ новымъ арендаторамъ, между тѣмъ какъ прежній арендаторъ, работая на показательной плантаціи въ качествѣ "дейхана", не успѣлъ еще освоиться съ тѣми орудіями (плугомъ и сѣялкой), на которыхъ ему предлагается работать. Находя поэтому, что лишь продолжительная работа однихъ и тѣхъ же лицъ можетъ убѣдить ихъ въ преимуществѣ европейской культуры хлопка передъ туземной съ отчетнаго года (вѣрнѣе съ осени 1906 г.) подъ г. Мервомъ устроена плантація на новыхъ основаніяхъ. Чтобы болѣе заинтересовать дейхановъ—арендаторовъ (35 человѣкъ) и заставить ихъ тщательнѣе исполнять всѣ работы, участокъ сданъ имъ въ арендное пользованіе на 6 лѣтъ.

На участкъ подъ наблюденіемъ инструктора по хлопководству установленъ трехпольный съвооборотъ съ запольнымъ клиномъ (люцерна): 1) паръ, 2) озимь и 3) хлопокъ.

Подъ каждымъ клиномъ находится приблизительно около 70 десятинъ (т. е. у каждаго хозяина по 2 десятины озимой ишеницы, 2 десятины хлопка и 1.600 кв. саж. люцерны). По оросительнымъ ва ликамъ съють арбузы, дыни и тыквы. Такимъ образомъ на данномъ участкъ туркменъ имъетъ всъ необходимые въ домашнемъ обиходъ продукты, а хлопокъ поступаетъ въ продажу. Близость участка отъ города позволяетъ инструктору ежедневно посъщать хозяйство и руководить дъломъ. Несмотря на рядъ неблагопріятныхъ условій, сопровождавшихъ начало организаціи показательной плантаціи на новыхъ основаніяхъ, аренда участка повысилась сразу на 40%, что также подтверждаетъ цълесообразность предпринятыхъ мъропріятій. Рядовой съялкой Баннера былъ произведенъ посъвъ 15 десятинъ хлопчатника, оказавшихся лучшаго качества и урожайнъе разброснаго посъва.

Туземцы весьма интересуются работой бороны и рядовымъ посъвомъ, но плуги считаютъ не подходящими для нихъ орудіями въвиду отсутствія хорошо обученныхъ упряжныхъ лошадей (лошадь туземца почти исключительно верховаго типа). Урожай на плантаціи,

какъ и во всемъ увздв, былъ не вполнв удовлетворителенъ, благодаря поврежденіямъ морозами.

Богарные показательные посъвы. Близъ молочной фермы, въ Гиндуварскомъ ущельъ были произведены посъвы озимой и яровой пшеницы (6 десятинъ) и овса (5 десятинъ) на горныхъ плато на высотъ 300 саж. надъ уровнемъ моря.

Озимые посъвы были неудовлетворительны, что объясняется отчасти засоренностью участка, находившагося до этого нъсколько лъть подъ культурой зерновыхъ хлъбовъ. Яровые же хлъба попали на свъжія земли, почему вышли удачнъе, хотя отсутствіе осадковъ во второй половинъ мая до конца уборки значительно отразилось на качествъ зерна. Урожай озимыхъ не превышалъ 20 п., а яровыхъ 30—35 п. Что касается овса, то съ весны онъ былъ хорошъ, но затъмъ вслъдствіе засухи урожай зерна съ 12 десятинъ опредълился въ 53 пуда.


Изъ посѣвовъ ряда лѣтъ можно убѣдиться, что воздѣлываніе овса возможно только на очень высокихъ плато, не ниже 500—600 саж. надъ уровнемъ моря.

Менѣе требовательными въ этомъ отношеніи являются пшеница и ячмень, которые при равныхъ условіяхъ даютъ удовлетворительные урожаи, при чемъ, чѣмъ благопріятнѣе была первая половина весны, тѣмъ успѣшнѣе они противустоятъ засухамъ въ періоды цвѣтенія и наливанія зерна.

Въ общемъ озимые богарные посъвы все же [надежнъе яровыхъ, за исключениемълътъ съ сильными холодами и безснъжными зимами, когда озимь пропадаетъ до наступленія весны.

## ПЛАНЪ РАСПОЛОЖЕНІЯ КУЛЬТУРЪ

на Асхабадскомъ опытномъ полъ въ 1907 г.



I Озимым пиненциа.

II Хлопгатнинъ съ удобрениемъ навозомъ.

III Яровыя: пшеница, ягмень и овесъ.

IV Плоплатнить съ удобрением в навозомъ.

VI Люцерна

А Демонстративный уг. элопгатника.

в Грядки съ сортами хлоптатника,

С Усадъба.

V Бобовыя: машь, нуть и (кунжуть)